Suppl. 69643/13

Wm Clark

J. W. CLARK,

MUSEUM OF ZOOLOGY

AND

COMPARATIVE ANATOMY

CAMBRIDGE.

ANATOMY DEPT. LIBRARY UNIV. CAMBRIDGE.
Presented by Zoology Museum.

F. Y. 14. 1

(02)

Dimensions
cf p xxii

and A.5.35 p.3
" A.5.7 p.3

F. 7. 14

Handbuch

der

menschlichen Anatomie.

L. 9. 32

Dimensions
cf p xxii

Durchaus nach eigenen Untersuchungen,

und mit

besonderer Rücksicht auf das Bedürfnifs der Studirenden, der praktischen Ärzte und Wundärzte und der Gerichtsärzte

verfafst

von

Carl Friedr. Theod. Krause M. D.

Professor der Anatomie, Mitglied der K. ärztlichen Prüfungsbehörde, und Landphysikus zu Hannover.

Ersten Bandes erste Abtheilung.

Hannover 1833.

Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.

Wellcome Library

Vorrede zum ersten Bande.

Wer die grofse Anzahl der bereits vorhandenen, zum Theil vortrefflichen, gröfseren und kleineren Handbücher der Anatomie um ein neues vermehrt, dem liegt es vorzüglich ob, möglichst überzeugend nachzuweisen, dafs er nicht Zeit und Mühe am Unnützen und Überflüssigen versplittert habe. Daher will ich die Gesichtspunkte, die bei Abfassung des hier erscheinenden Handbuchs mich leiteten, mit wenigen Worten andeuten.

Zunächst wünschte ich meinen Zuhörern, und den Studirenden der Arzneiwissenschaft überhaupt, ein Buch in die Hand zu geben, welches im möglichst beschränkten Raume alle mit Sicherheit ermittelten anatomischen Thatsachen enthält, deren Kenntnifs ihnen zur Einleitung in ein tieferes Studium der Physiologie und Pathologie nöthig ist, und deren sie zu gründlicher Erlernung und Ausübung der Chirurgie und Geburtshülfe, so wie zur Erforschung der für die gerichtliche Medicin wichtigeren Verhältnisse bedürfen. Es werden daher die Theile des menschlichen Körpers in solcher Ausführlichkeit beschrieben, dafs das Nachlesen des Buchs den Hauptinhalt des mündlichen Vortrags vergegenwärtigt, das aus demselben etwa falsch Aufgefafste berichtigt, und die Erinnerung an die zur Beschauung vorgezeigten Gegenstände lebhaft erhält, und dafs zugleich das Buch die bei selbsteigenen Untersuchungen zu beachtenden Verhältnisse nachweiset und den Zergliederer leitet. Es

soll aber der Gebrauch dieses Buchs noch über die Zeit des akademischen Studiums hinausreichen und in das praktische Leben begleiten, der Wundarzt und Gerichtsarzt soll aus demselben bei vorzunehmenden Operationen und Sectionen sich schnell, gründlich und vollständig Raths erholen können. Daher wird dieses Buch bei Weitem mehr enthalten, als die gebräuchlichen kleineren Lehr- und Handbücher der Anatomie, deren mehrere allerdings die Anfangsgründe recht gut vortragen, aber bei ihrer Dürftigkeit und Mangelhaftigkeit späterhin den Arzt und Wundarzt zwingen, aus anderen Schriften, aus sogenannten chirurgischen Anatomien u. a., dasjenige einzeln zu schöpfen, welches er hier in demselben Buche, mit dem er schon beim Beginn seines Studiums vertraut wurde und welches er vielleicht lieb gewinnt, beisammen findet.

Sollte aber ein solcher Grad von Ausführlichkeit bei mäfsiger Bogenzahl und geringem Preise erreicht werden, so mufste bei den Beschreibungen selbst aufser der Correctheit und Vollständigkeit, nach Bestimmtheit und Kürze des Ausdrucks ganz besonders gestrebt, und alle Weitschweifigkeit und Wiederholungen vermieden werden. Von letzteren hoffe ich mich freier erhalten zu haben, als mehrere der besten gröfseren ausführlicheren Handbücher, und dafür viele dem Praktiker wichtige Thatsachen und Verhältnisse angegeben zu haben, die in jenen vermifst werden. Es mufste auch bei einem Vortrage, welcher sich auf die reine Anatomie beschränken sollte, nicht alles alles Hypothetische, sondern auch alle Bemerkungen aus der pathologischen und vergleichenden Anatomie beseitigt werden, welche das Meckelsche und Hildebrandt-Webersche Handbuch, die beide über me

Lob weit erhaben sind, so reichhaltig und interessant machen; insbesondere aber das Beispiel der Engländer, welche ihre anatomischen Handbücher mit Beschreibungen von Operationen und selbst mit Krankengeschichten zu durchweben pflegen, streng vermieden werden. Diese Behandlungsweise, welche den Lehrgegenständen die Trockenheit nehmen soll, scheint mir eine gründliche Erlernung der Anatomie vielmehr zu hindern als zu fördern; überdies hat der Lehrer im mündlichen Vortrage und bei Zergliederungen Gelegenheit genug, dem Anfänger den Werth des anatomischen Studiums für praktische Zwecke fühlbar zu machen. Pathologische und vergleichende Anatomie mufs aber erst dann studirt werden, wenn der Studirende eine gründliche und vollständige Kenntnifs des gesunden menschlichen Körpers sich verschafft hat. Es sind daher auch solche Varietäten, welche nur als Ähnlichkeit mit dem Körperbau der Thiere interessant sind, unberücksichtigt geblieben; dagegen alle, welche für die Erkenntnifs der Entstehung gewisser Krankheiten von Wichtigkeit sind, oder auf das Verfahren des Praktikers Einflufs üben müssen, sorgfältig aufgenommen. Die Kritik wurde, gleichfalls aus den angeführten Gründen, aus vorliegendem Buche ausgeschlossen. Behuf Anleitung zu einem tieferen Studium ist indessen eine ausgewählte Literatur mitgetheilt; auf Vollständigkeit macht sie keinen Anspruch, da Hr. E. H. Weber hierin, wie in vielem Andern, so Vorzügliches geleistet hat.

Was die Nomenclatur betrifft, so habe ich die älteren längst recipirten Benennungen beibehalten, wenn sie nicht gänzlich unpassend waren und falsche Begriffe von den mit ihnen belegten Gegenständen erwecken konnten: — auch unter den Synonymen

nur die gebräuchlichsten und bezeichnendsten ausgewählt. Da es aber von Wichtigkeit ist, dafs jeder einzelne Theil, dessen Kenntnifs unentbehrlich, einen kurzen Namen führe, mit dem man ihn ohne Be- und Umschreibung bezeichnen könne; so habe ich hin und wieder versucht, für einzelne Gegenstände, die längst bekannt aber unbenannt waren, einen Namen auszuwählen. Eine besondere Aufmerksamkeit habe ich auf die Mafsverhältnisse gerichtet, um den Anfänger sogleich zu gewöhnen, dafs er mit der Gröfse gesunder Theile sich vertraut mache und sein Auge übe. Viele Krankheitsgeschichten und Sectionsberichte würden lehrreicher sein, wenn die organischen Veränderungen der Körpertheile auch in dieser Hinsicht genauer beschrieben wären. Sehr vieles ist seit Hrn. Nasse's Anregung (Meckels deutsch. Archiv. Bd. II.) in diesem Punkte durch neuere anatomische Forschungen geleistet, sehr vieles bleibt noch, um durchschnittliche Normalbestimmungen der Dimensionen aller Theile aufstellen zu können, zu thun übrig.

In der Anordnung des Stoffs und in der Methode überhaupt bin ich von dem gewöhnlichen Gebrauche der meisten Handbücher in mehreren Punkten abgewichen. Dieses ist nicht aus Neuerungssucht geschehen, sondern aus der Überzeugung, dafs die von mir gewählte Ordnung nicht allein die Übersicht und Erkenntnifs der zahllosen Einzelnheiten dem Anfänger wesentlich erleichtere, sondern auch naturgemäfser als manche andere sei, und ihre Eintheilungsgründe aus der Anatomie des Menschen selbst und nicht aus verwandten Wissenschaften hernehme. Eine solche Anordnung beeinträchtigt eine höhere umfassendere Naturanschauung nicht im Geringsten und ruhet auf einer Basis, die nur durch das Fortschreiten der ana-

tomischen Kenntnifs verändert, vielleicht verbreitert und befestigt, nie aber ganz umgestofsen werden kann: dagegen andere Eintheilungen nur zu leicht auf einem Grunde gemacht werden, dessen sehr baldige Erschütterung durch das Fortschreiten der Erfahrungswissenschaften und durch eine von diesem abhängige Erweiterung der Speculation vorauszusehen ist. Ob z. B. aus gewissen Theilen des Körpers Leim gesotten werden kann oder nicht, dürfte nie einen anatomischen Eintheilungsgrund abgeben. —

Ein zweiter Gesichtspunkt bei Abfassung dieses Buchs war der Wunsch, einen grofsen Theil desjenigen in der Kürze darzulegen, was eine seit vierzehn Jahren ununterbrochene, selbstständige, von den besten Hülfsmitteln unterstützte Forschung mich selbst gelehrt hat. Es ist in diesem Buche kein Theil von nur einiger Wichtigkeit beschrieben, den ich nicht zu oft wiederholten Malen unverdrossen mit eigener Hand und Auge untersucht und in seiner normalen Beschaffenheit und in seinen häufigeren und seltneren Varietäten kennen gelernt hätte. Natürlich können meine Beschreibungen bei den meisten Theilen des Körpers, die den Anatomen älterer und neuerer Zeit sehr gut bekannt waren, und über deren Bau kein Streit mehr obwaltet, nichts Neues enthalten und suchen sie nur das Alte zweckmäfsig und gut darzustellen. Auch diejenigen meiner, von den Angaben anderer Forscher abweichenden Erfahrungen, welche nach dem oben skizzirten Plane in ein Handbuch von beschränktem Umfange nicht pafsten, haben hier nicht aufgeführt werden können. Bei einigen noch nicht genau bekannten und streitigen Gegenständen und Verhältnissen, über welche ich selbst bis jetzt noch nicht genügend aufgeklärt bin, deren Erwähnung aber we-

gen ihrer Wichtigkeit hier nicht fehlen durfte — habe ich unter Anführung der wichtigeren Gewährsmänner diejenige Ansicht als wahrscheinlich hingestellt, die in Folge eigener noch nicht befriedigender Untersuchungen mir die richtigste schien. Da ich aber gerade diejenigen schwieriger zu erkennenden Verhältnisse, über welche die Meinungen der Anatomen getheilt sind, vorzüglich häufig und sorgfältig untersucht habe: so kann man meine einfachen Darstellungen derselben als eine, durch eigene Forschung zur subjectiven Überzeugung gediehene, Bestätigung oder Berichtigung der Angaben Anderer ansehen, wenn sie mit diesen übereinstimmen oder von ihnen abweichen. Ausführliche Erläuterungen und kritische Erörterungen konnten dabei nicht Platz finden, und müfsten solche für andere Orte und Gelegenheiten aufbehalten bleiben.

Die Angaben über die chemische Zusammensezzung der festen Theile und Flüssigkeiten sind natürlich erborgt; und habe ich, da mir über den Werth und die Zuverlässigkeit verschiedener Angaben dieser Art kein Urtheil zusteht, aus Berzelius und Gmelin überall da geschöpft, wo kein anderer Gewährsmann genannt ist. —

Noch einige Worte über die Eintheilung des Buchs überhaupt und Bemerkungen über einzelne Abschnitte.

Der erste Band enthält, in zwei Theilen, die Elemente der allgemeinen und speciellen Anatomie des erwachsenen menschlichen Körpers. Es schien mir zweckmäfsiger, den Bau des Körpers in der Blüthe des Lebens zuerst und gänzlich abgesondert von den, durch die Entwickelung und die späteren Lebensperioden bedingten Verschiedenheiten zu beschreiben:

anstatt, wie sonst gewöhnlich, auf die Beschreibung jedes einzelnen Theils die Darstellung seiner Entstehung und seines Wachsthums folgen zu lassen: eine Anordnung, die den Anfänger leicht verwirrt und ermüdet und eine leichte Übersicht und Erkenntnifs jener Verschiedenheiten erschwert. Dagegen wird der zweite Band die Darstellung der anatomischen Verhältnisse in den verschiedenen Lebensperioden, und eine für den Zergliederer und den Chirurgen wichtige Beschreibung der einzelnen Gegenden des Körpers mit den in denselben liegenden Theilen enthalten.

In der allgemeinen Anatomie folgt auf eine Übersicht der Mischungs- und einfachen Formbestandtheile die Beschreibung der gleichartigen Theile, und zwar nach Ordnung der organischen Systeme, welche die gröfsten Autoritäten für sich hat und vor der Classificirung nach dem Gewebe allein, grofse in die Augen springende Vorzüge darbietet. Hierin bin ich Hrn. Meckel dankbar gefolgt, und glaube die Anzahl der Systeme nicht unnöthig gehäuft zu haben, wenn ich den, von jenem grofsen Forscher und Ordner angenommenen, noch das elastische und Horn-System hinzugefügt habe: dagegen vermied ich es, für gewisse einzelne ihres Gleichen nicht habende Organe des menschlichen Körpers besondere Systeme zu creiren oder sie anderen gewaltsam unterzuordnen. Die in diesem Abschnitte des Buchs häufig vorkommenden Angaben über die kleinsten einfachen Theilchen der Organe enthalten manches Neue und bestätigen manches in Zweifel Gezogene, schliefsen auch manches von Anderen mit grofser Sicherheit behauptete gänzlich aus. Sie sind das Resultat sehr anhaltender mikroskopischer Forschungen, und verdienen, wie ich glaube, einiges Zutrauen. Sie sind mit höchst zahlreichen

Wiederholungen an den frischesten Theilen — und zwar frischer, als meistens ein anatomisches Theater solche darbieten kann — mit allen möglichen Cautelen gegen optischen Betrug, mit Ruhe, Geduld, Aufmerksamkeit und Freiheit von vorgefafsten Meinungen von Seiten des Beobachters — endlich mit Instrumenten angestellt, die zu den besten der gegenwärtigen Zeit gehören, und nicht in Jedermanns Händen sich befinden. Es dienten dazu vorzugsweise einfache Glaslinsen und Doublets, bald mit, bald ohne Wollastons von Goring verbesserter Beleuchtungsart: ferner eine Saphirlinse von Pritchard, (die indessen, bei starker Vergröfserung, wegen der Kleinheit und Dunkelheit des Sehfeldes, vorzüglich aber wegen der Kürze des Focus, selten bei Untersuchungen frischer, feuchter oder in Flüssigkeiten schwimmender Theilchen angewandt werden konnte), ein kleines Compositum von Ramsden mit Fraunhoferschen Linsen, und endlich ein grofses Compositum von Plössl. Letzeres treffliches vollkommen achromatisches und aplanatisches Instrument ist von allen Fehlern, welche die Beobachtung mit den besten ältern Instrumenten so unsicher machte, völlig frei; gestattet bei der weiten Öffnung seiner Objective ungestörten Gebrauch der stärksten Vergröfserungen bei der vortheilhaften gleichförmigen Beleuchtung trüber neblicher Tage; erlaubt selbst bei stärkeren Vergröfserungen eine Betrachtung opaker Gegenstände mit natürlicher Beleuchtung von oben, und sichert vor Täuschungen durch Beugung und Interferenz; es zeigt bei den stärksten Vergröfserungen die schwierigsten Probeobjecte genau so, wie die vorzüglichsten Doublets, und wie sie Pritchard (in Microscopical Illustrations, London, 1832) beschreibt und abbildet, und noch besser als jene: und gestattet,

da die Objective selbst bei einer tausendfältigen Linearvergröfserung noch 0, 2 Par. Lin. vom Objecte entfernt bleiben, eine freie Manipulation der zu untersuchenden Gegenstände. Alles, was ich beschrieben habe, ist bei einer Linearvergröfserung von 350 an hellen und trüben Tagen zu häufigen Malen gesehen worden: niemals habe ich mich dabei einer künstlich verstärkten Beleuchtung bedient. Wenn aber geübte Beobachter die mikroskopischen Charaktere der kleinsten Theilchen, so wie sie von mir beschrieben worden, nicht sogleich auffinden können: so wollen sie bedenken, dafs zum erfolgreichen Beobachten mehr gehört, als ein gesundes Auge und ein gutes Instrument: dafs Leeuwenhoeks Zeichner sogar nach langer Übung zarte Gegenstände bei dem Grade der Vergröfserung noch nicht wahrnehmen konnte, bei welchem Leeuwenhoek selbst sie sehr gut sah: und dafs einer der feinsten und zuverlässigsten Beobachter, Hr. J. Herschel, lange Zeit gebrauchte, bevor er die von Fraunhofer entdeckten dunklen Linien im Solarspectrum „sehen lernte“ (nach H. Babbage's Erzählung in Mechanics Magazine №. 379. 1830).

Um nur eines Beispiels der Verschiedenheit in den Angaben grofser Forscher und meiner eigenen zu gedenken, bemerke ich, dafs ich von der ziemlich allgemein geglaubten Existenz der Kerne im Innern frischer unzersetzter Blutkörnchen mich nicht habe überzeugen können. Dafs der helle oder dunkle Fleck in der Mitte eines Blutkörnchens, den Prevost und Dumas und viele Andere für einen Kern halten, ein solcher nicht sei: davon versichert man sich ziemlich leicht durch ein gutes aplanatisches Instrument. Die Körnchen, welche nach Hrn. J. Müller höchst schätzbaren Mittheilungen sich zeigen, wenn man Froschblut

mit vielem Wasser oder mit Essigsäure behandelt, sind mir sehr wohl bekannt und finde ich ähnliche auch nach Behandlung des menschlichen Blutes mit Essigsäure nicht so gar schwer zu sehen: ob sie aber in den intacten Blutkörnchen, ursprünglich vom Umfange abgesondert, als wahre Kerne existiren — oder erst durch die Einwirkung der Essigsäure und anderer Agentien sich bilden, scheint mir noch keineswegs ausgemittelt, und letzteres bei Weitem wahrscheinlicher.

Niemals habe ich kleine Gegenstände untersucht, ohne sie zugleich zu messen: eine wichtige Bedingung zu einer guten Beobachtung, deren Vernachlässigung viele Verwirrung und Mifsverständnisse veranlafst hat, und manche sonst werthvolle ältere Beobachtung unbrauchbar macht. Diese Messungen sind nach zwei verschiedenen Methoden einander controlirend angestellt: einmal, indem das am Mikroscop nicht beschäftigte Auge nach einem 8 Zoll entfernten Maasstabe schaut, und auf diesem das vergröfserte Bild des Gegenstandes erblickt: eine sehr sichere, aber anstrengende und ermüdende Methode: — zweitens vermittelst eines in das Ocularstück eines zusammengesetzten Mikroskops eingelegten Glasmikrometers. Die von mir gewöhnlich gebrauchten Mikrometer sind von Plöfsl getheilt, zu 30 und 60 Theilstrichen in der Wiener Linie und geben bei einer 350maligen Linearvergröfserung $\frac{1}{801}$ und $\frac{1}{1602}$ der Pariser Linie wahrer Gröfse unmittelbar an. Noch feiner getheilte Mikrometer finde ich weder nöthig noch besonders vortheilhaft, da sie ein zu starkes Ocular erfordern. Diese Methode ist äufserst bequem, gestattet eine grofse Menge Repetitionen (wenn man auf solche Werth legt) binnen kurzer Zeit und giebt bei dem längsten

Gebrauche des nie sich abnutzenden Mikrometers stets dieselben Resultate. Mit Unrecht hat daher neuerlich Hr. Schulz diese Art der Messung der mit dem Schraubenmikrometer nachsetzen wollen: mit einem Instrumente, welches nie so vollkommen gearbeitet werden kann, als die Theilmaschiene, von deren Güte die Genauigkeit des Glasmikrometers allein abhängt und auf deren Verfertigung der Künstler die höchste Sorgfalt verwendet: mit einem Instrumente, welches fast bei jeder Repetition eine verschiedene Dimension eines und desselben Gegenstandes angiebt und dessen Unsicherheit mit dem je längeren Gebrauche desto mehr zunimmt.

Aus der grofsen Anzahl der Messungsresultate sind die Mittelzahlen gezogen, und diese abgerundet. Denn die kleinsten organischen Theilchen, z. B. die Nervenkügelchen, haben nicht eine überall constante Gröfse, sondern zeigen verschiedene, binnen meistens ziemlich engen Gränzen wechselnde Dimensionen: Gränzen, die ich hin und wieder, anstatt der Durchschnittszahl angegeben habe; — überdiefs wird ein aufrichtiger Beobachter, wegen der unmerklichen Schwankungen des geübtesten Auges und der Parallaxe, für ein Zehntausendtheil einer Linie mehr oder weniger nicht einstehen wollen: und die Angaben auf viele Decimalstellen hinaus haben nur den Anschein einer gröfseren Genauigkeit, ohne in der That zuverlässiger zu sein. Wo mein Mefsapparat also z. B. $\frac{1}{534}$ einer Linie ergab, da habe ich $\frac{1}{530}$ gesetzt. Ich habe aber die Angabe in gemeinen Brüchen überall vorgezogen, weil $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{3}$ dem Gedächtnisse leichter sich einprägt, als 0,25 oder 0,3333....

Dafs die Theile bei der Messung stets ganz frisch und feucht oder von einer dünnen Schichte Serum

bedeckt waren, brauche ich kaum zu bemerken. Der Kaliber zarter Kanäle, z. B. der Nieren, Testikel u. a., ist stets in ihrem frischen Zustande, wenn sie nur die Secrete enthielten, gemessen, niemals wenn sie künstlich von Injectionsmassen ausgedehnt waren. —

Den Anfang der speciellen Anatomie macht eine ziemlich ausführliche Betrachtung der äufseren Gestalt des Körpers und seiner Dimensionen, die nicht an Kunstwerken, sondern an lebenden und todten wohlgebildeten Körpern gefunden sind. Im ersten Buche der speciellen Anatomie sind die Knochen zusammt ihren Verbindungen, und namentlich den Gelenken, abgehandelt: welche Anordnung vor der getrennten Beschreibung der Ligamente grofse Vorzüge darbietet. Viel Neues wird man hier nicht finden: indessen wird man hie und da einige Irrthümer französischer Anatomen durch Angabe der wahren Beschaffenheit berichtigt sehen; und dürften die allgemeineren Betrachtungen ganzer Abtheilungen des Skelets von einiger Ausführlichkeit einigen Nutzen gewähren. Auf die Ausmittelung der durchschnittlichen Verhältnisse des Beckens habe ich viel Zeit und Mühe verwandt, da man über diesen Gegenstand selbst bei angesehenen Schriftstellern auffallende Unrichtigkeiten findet.

Im zweiten Buche sind diejenigen Muskeln beschrieben, deren Verhältnisse nach vorgängiger Kenntnifs der äufseren Gestaltung des Körpers und der des Skelets erkannt werden können; diejenigen aber, welche zur Zusammensetzung der künstlicher gebaueten Organe und Apparate beitragen, folgen im dritten Buche bei der Beschreibung dieser Organe selbst. Ich habe hiebei die Ordnung der Lage der Muskeln streng befolgt und halte diese vortheilhafter für den Anfänger und für manche praktische Anwendung, als die

verwirrende Weise vieler Handbücher, nach welcher sie abwechselnd, bald nach der Lage, bald nach der Wirkung, aufgeführt werden: dafür habe ich am Ende der Muskellehre eine detaillirte Übersicht der Bewegungen und der bei denselben zusammen wirkenden Muskeln gegeben. Behuf dieser Darstellung der Bewegungen habe ich mich bemüht, das Maafs der Beweglichkeit nach Graden des Kreises durch eigene Versuche zu ermitteln: wobei natürlich die Versuche an Bauern und Holzhackern und die an Tänzern und Geigenspielern ein sehr verschiedenes Resultat geben müssen, und das mittlere Verhältnifs nur annähernd gefunden werden kann. Der Beschreibung der einzelnen Muskeln habe ich stets eine allgemeine Betrachtung der Lage derselben in den gröfseren Abtheilungen des Körpers vorangeschickt, welche den Überblick erleichtert, den Zergliederer orientirt und die Angabe der Lage des einzelnen Muskels abzukürzen erlaubt. Eine besondere Aufmerksamkeit habe ich den, für die Kenntnifs der Muskeln überhaupt und für die Chirurgie so wichtigen Fascien gewidmet; sie sind ausführlicher, als gewöhnlich und nach den sorgfältigsten Untersuchungen beschrieben und als für sich bestehende Organe (nicht als Köpfe und Caudae der Muskeln) dargestellt, wodurch die Erkenntnifs des Ursprungs und der Endigung vieler Muskeln aufserordentlich erleichtert wird.

In dem dritten Buche, welches die Beschreibung der zusammengesetzten Apparate enthält, wird man einige neue Angaben finden, von deren Richtigkeit ich mich überzeugt halte und deren Bestätigung durch andere Forscher ich wünsche und hoffe. Indem ich diese, oder etwaige Zweifel und Bedenklichkeiten zu einer näheren Erörterung erwarte, erlaube ich mir

hier nur einige abgerissene Bemerkungen und Andeu-
tungen. Hinsichtlich der Gestalt des Augapfels und
der merkwürdigen Krümmungen seiner strahlenbre-
chenden Theile verweise ich auf Meckels Archiv f
A. u. Ph. Bd. VI., woselbst ich diesen Gegenstand
ausführlicher dargestellt und die Methode der Unter-
suchung angegeben habe. Beiläufig sei hier erwähnt
dafs jener Aufsatz schon im December 1830 niederge-
schrieben worden. Seit jener Zeit habe ich eine
Menge neuer Messungen angestellt, welche mit den
dort mitgetheilten auf eine erfreuliche Weise harmo-
niren. Was die noch immer bestrittene Jacobsche
Haut (Membr. pigmenti m.) betrifft, glaube ich be-
haupten zu dürfen, dafs sie von den Beobachtern ga
nicht gesehen worden ist, welche einen aus dem Pig
mente nach dem Tode sich niederschlagenden Schlein
(?) für jene Haut annehmen. Die Wirkung des M
lacrymalis glaube ich richtig angegeben zu haben: ei
nen Druck auf den Thränensack kann er nicht aus
üben, da dieser gegen einen solchen durch die, di
Thränensackgrube überspannende Beinhaut vollkomme
geschützt ist.

Den Knorpel der Zunge vermisse ich bei Erwach
senen höchst selten; er wird indessen leicht bei ver
suchter Absonderung der ihm sehr genau anhanger
den Muskelfasern zerstört. Bei dem Kehlkopfe hab
ich die verschiedenen Gestalten, welche die Stimm
ritze annehmen kann und die Wirkungsart der Mu
keln, die man gemeiniglich nur schlechthin als E
weiterer oder Verengerer der Stimmritze bezeichne
genauer zu bestimmen gesucht.

Dafs der (immer zu früh!) verewigte Rudolphi di
cylindrischen Zotten im menschl. Darmkanal für d
Hauptform erklärte, ist mir stets unstatthaft erschi

nen, da ich die blattförmigen Zotten auch im Ileum immer in gröfserer Anzahl gesehen habe, als die cylindrischen oder keulenförmigen. Kürzlich hat Herr J. Müller auf das siebförmige Ansehen der Zottenhaut in dem Darm der Schaafe von Neuem aufmerksam gemacht. Dieses habe ich im menschlichen Darmkanal oft genug bemerkt: es rührt aber nicht von wirklichen Löchern her, sondern von runden oder länglich-runden Bläschen in der Basis und im Umfange der Villi, welche unter dem Mikroskope bei durchgehendem Lichte einige Ähnlichkeit mit schräg durchbohrenden Löchern haben. Sie werden als scheinbare Löcher nur dann sichtbar, wenn man die innerste Lage der Schleimhaut von ihrer äufseren mehr lokkeren Lage, und von der Zellschicht zwischen ihr und der Muskelhaut, vollkommen abtrennt, dabei aber natürlich die aus dieser in jene ein- und austretenden zarten Blut- und Lymphgefäschen zerreifst. Es sind die bläschenartigen blinden Anfänge der Lymphgefäfse, hin und wieder auch Windungen derselben; die, wenn sie von ihren Fortsetzungen abgerissen, geöffnet, entleert und bis auf eine ihrer unendlich dünnen Wände zerstört sind, das Licht leichter durchgehen lassen, als das Gewebe der Zottenhaut, und alsdann das Ansehen hellerer Grübchen oder Löcher darbieten. Von oben beleuchtet erscheinen sie, vorzüglich wenn der Darmkanal mit Milch oder Milchsuppe angefüllt gewesen, als runde weifse opake Körperchen: — sicherlich dieselben, welche Lieberkühn für Drüsen hielt.

Die hellere und dunklere Substanz der Leber, die sogenannte Mark- und Rindensubstanz, findet man keineswegs nur in kranken Lebern, wie Herr E. H. Weber versichert: ich habe sie häufig bei den gesundesten, an plötzlichen gewaltsamen Todesarten gestor-

benen Menschen sehr bald nach erfolgtem Tode bemerkt: eben so auch die weifslichen Körnchen der Milz, deren Natur mir aber noch unbekannt ist.

Dafs ich den Musculus ischiocavernosus für einen wirklichen Erector des Penis und der Clitoris halte, hat Herr O. M. R. Stieglitz ohnlängst erwähnt, und eine kurze Darstellung der Wirkungsart dieses Muskels in seinen pathologischen Untersuchungen mitgetheilt. Gewissermafsen ist diese Ansicht durch die Abhandlung Houstons, in Dublin Hospital Reports and Communications Vol. V., bestätigt: nachdem letztere mir bekannt geworden waren, habe ich meine früheren Untersuchungen über diesen Gegenstand wiederholt, und mufs den von Houston beschriebenen besonderen M. compressor venae dorsalis penis nur für eine Varietät, nämlich für das obere Bündel eines vorzüglich starken und gespaltenen M. ischiocavernosus halten.

Durch Hrn. Ehrenbergs interessante Untersuchungen zu einer häufigeren Betrachtung der sogenannten Infusionsthierchen veranlafst, habe ich auch in den menschlichen Spermatozoen etwaigen Spuren einer inneren Organisation nachgeforscht: habe aber in denselben keine der von Ehrenberg für Mägen erklärte Bläschen, noch auch andere Organe, entdecken können, deren erstere ich in mehreren Thierchen aus der Familie der Monadinen, die nicht gröfser als die menschlichen Spermatozoen waren, mit Bestimmtheit gesehen habe: auch konnte ich sie nicht, wie jene, zur Aufnahme gefärbten Futters bringen, wozu ihre Lebensdauer aufserhalb des Körpers von 8 Stunden würde hingereicht haben. Wird man aber, wenn man ihre Bewegungen, die Art, wie sie mit dem Schwanze schlagen, mit den Bewegungen gröfserer geschwänzter Thier-

chen, (Brachionen u. a.) vergleicht, ihnen den Besitz von Muskeln schlechthin abzusprechen wagen, weil solche bis jetzt noch nicht gesehen worden sind?

Im vierten Buche, welches die Angiologie enthält, habe ich zuerst die normale Vertheilung und Verlauf der Arterien beschrieben, und erst nachträglich eine Darstellung der Varietäten, welche für praktische Zwecke von besonderem Interesse sind, gegeben. Diese Anordnung schien mir vortheilhafter, als die Angabe der Varietäten bei jeder einzelnen Arterie, da die der einen gewöhnlich die einer anderen bedingt. Wie oft und dankbar ich hier den Canon der Arterienlehre, Hrn. Tiedemanns unübertreffliche Darstellung, benutzt habe, brauche ich nicht zu erwähnen: einige in jenem Werke nicht angegebene, mir aufgestofsene Varietäten werde ich gelegentlich an einem andern Orte beschreiben. Die Angabe des Kalibers einer jeden einzelnen namhaften Arterie wird man vielleicht vortheilhaft für physiologische Folgerungen, und gewifs nützlich für die Beurtheilung der Verletzungen von Seiten des Wundarztes finden: er ist vorzüglich durch unmittelbare Messung des Durchmessers der Arterien an frischen gelungen injicirten Körpern verschiedener Gröfse und Geschlechts ermittelt, und die Durchschnittzahl aus mehreren Messungen gezogen. Diese Messung kommt sicherlich der Wahrheit näher, als wenn man die leeren aufgeschlitzten Gefäfse ausbreitet, und aus dem gemessenen Umfange derselben ihren Durchmesser berechnet: da durch eine Injection, welche bis in die gröberen Capillargefäfse eindrang, die Arterien ungefähr denselben Grad der Ausdehnung erhalten werden, in welchem sie bei kräftiger Circulation während des Lebens sich befanden. Bei der zweiten Messungsart ist es unmög-

lich, die Gefäfse jedesmal gleichmäfsig stark auszudehnen, und ihren Wänden eine das lebendige Verhalten nachachmende Spannung zu ertheilen: auch habe ich bei einander entgegengestellten Messungen der ersten nnd zweiten Art meistens eine Differenz von $^2/_7$ des ganzen Duchmessers des Gefäfses erhalten.

Auch die Anordnung des Venen- und Lymphgefäfssystems wird man bequem und leicht übersichtlich finden, indem bei jenen die Hauptstämme, bei diesen die Hauptstämme und die Drüsenhaufen für sich beschrieben, und sodann die jenen Stämmen und Drüsenhaufen untergeordneten Venen und Lymphgefäfse nach topographischer Ordnung dargestellt sind. Bei den Lymphgefäfsen mufs ich ausdrücklich bemerken, dafs ich nicht, wie sonst bei allen in diesem Handbuche beschriebenen Theilen, jedes einzelne Lymphgefäfs zu wiederholten Malen gesehen und verfolgt habe, wozu die Lebenszeit und Kräfte eines Einzelnen nicht hinreichen möchten: sondern dafs ich, die Hauptsachen ausgenommen, auf Mascagni und andere mich verlassen mufste.

Dagegen ist wiederum das Nervensystem bis in seine geringsten Einzelnheiten ganz nach eigenen mit Eifer und Vorliebe vervielfältigten Untersuchungen dargestellt, wozu, wie man leicht erkennen wird, Ch. Bells Forschungen, die ich den Hauptsachen nach für richtig halte, obgleich ich in mehreren Punkten von ihm abweiche — den ersten Anstofs und Anleitung gegeben haben. Es erscheint eine der Bellschen einigermafsen ähnliche Anordnung zum erstenmal in einem deutschen Handbuche der Anatomie; und, wie ich aus den an meinen Schülern gemachten Erfahrungen hoffe, nicht ohne Nutzen für den, der diesen wichtigen Zweig der Anatomie gründlich sich aneignen will

Eine nähere Ansicht meiner Darstellung wird jede vorläufige erläuternde Bemerkung unnöthig machen. Man wird vielleicht mit Recht fragen, warum ich bei der Beschreibung des Gehirns und namentlich der Stränge des verlängerten Marks, den Darstellungen in Herrn Burdachs vortrefflichem Werke nicht mehr gefolgt bin: ich mufs aber gestehen, dafs ich von der Existenz und der Richtung aller der Faserungen, so wie jener verehrte Forscher sie beschreibt, mich nicht habe überzeugen können. An vielen Stellen des Hirns habe ich Gleiches oder Ähnliches, an anderen Abweichendes gefunden. Indessen darf man in diesem Handbuche eine erschöpfende Darstellung alles dessen, was ich bemerkt habe und vermuthe, nicht erwarten: man wird nur so viel oder vielmehr so wenig angegeben finden, was ich nach häufigen und stets übereinstimmenden Ergebnissen der Forschung für richtig, zuverlässig, und in jedem Hirne leicht nachzuweisen halte: eine Vorsicht, die bei keiner andern Untersuchung rathsamer erscheint, als bei Zergliederungen des Hirns, bei denen man so leicht aus einem Faserzuge in den anderen geräth. Über einige der am meisten bestrittenen Punkte der Nervenlehre habe ich bereits an anderen Orten meine Erfahrungen in Kürze mitgetheilt.

Die zweite Abtheilung dieses Bandes wird der ersten binnen kurzer Zeit, und alsdann auch der zweite, die Anatomie der Entwickelungsperioden und die der Regionen enthaltende Band möglichst bald nachfolgen.

Vorbemerkungen.

Die im Folgenden vorkommenden Abkürzungen bedeuten:

A. Arteria.	Nn. nervi.
a. arteriae.	nm. nervorum.
Aa. arteriae, in der Mehrzahl.	O. Os.
am. arteriarum.	oss. ossis, ossium.
Artic. Articulatio.	Proc. Processus.
Cart. Cartilago.	Tun. Tunica.
Fasc. Fascia, Fasciae.	V. Vena.
f. fasciae.	v. venae.
For. Foramen, Foramina.	Vv. Venae.
Gl. Glandula, Glandulae.	vm. venarum.
gl. glandulae.	V. lymph. Vasa lymphatica.
Lig. Ligamentum.	vas. lymph. vasorum lymphaticorum
lig. ligamenti.	m. K. menschlicher Körper.
Ligg. Ligamenta.	p. C. Hundertttheile.
ligm. ligamentorum.	p. M. Tausendtheile
M. Musculus.	sp. G. specifisches Gewicht
m. musculi.	Dm. Durchmesser.
Mm. Musculi, musculorum.	1′ ein Fufs zu 12 Zoll.
N. Nervus.	1″ ein Zoll zu 12 Linien.
n. nervi.	1‴ eine Linie.

Sämmtliche Dimensionen sind im Pariser oder alt-französischem Maafse ausgedrückt, welches zu den bekanntesten Maafsen anderer Länder sich verhält, wie folgt:

36′ Paris. kommen sehr nahe 37′ Wiener.
28′ — — — — 29′ Preufsen. Rheinland.
9′ — — — — 10′ Bayern. Hannover. Bern.
13′ — — — — 15′ Dresden. Leipzig. Amsterdam. Spanien.
53′ — — — — 60′ Würtemberg. Darmstadt. Hamburg.
8′ — — — — 9′ Bremen.
7′ — — — — 8′ Frankfurt a. M.
11′ — — — — 12′ Böhmen. Augsburg. Schweden.
15′ — — — — 16′ Baden. England. Rufsland.
27′ — — — — 28′ Dänemark.
1′ — — — — 325 Millimèters.
4‴ — — — — 9 Millimètres.
9‴ — — — — 0,8 des Englischen Zolles.
11′ — — — — 16 Römischen kleinen Palmi.
11′ — — — — 80 Russischen Werschok.

Das Gewicht ist nach dem sehr bekannten Deutschen Medicinal- oder Nurnberger Apothekergewicht bestimmt, in welchem 1 Pfund in 12 Unzen, 96 Drachmen oder Quentchen, 288 Scrupel, 5760 Gran, getheilt ist.

128 ℔ desselben kommen sehr nahe 109 ℔ Wiener Apoth. Gewichts.
108 ℔ — — — — 110 ℔ Preufs. Apoth. Gew.
24 ℔ — — — — 23 pounds Englischen Troy weight, zu 12 ounces, 96 drams, 5760 grains.
14 ℔ — — — — 11 — Englischen avoir du poids zu 16 ounces, = 7000 grains Troy w.
70 ℔ — — — — 51 livres Französ. poids de Marc zu 16 onces 128 gros. 9216 grains.
179 ℔ — — — — 64 Kilogrammes.
16 1/10 Gran — — — 1 Gramme.

Inhalt.

Seite

Einleitung XXVII

Erster Theil. Allgemeine Anatomie des erwachsenen menschlichen Körpers.

Von den Bestandtheilen des Körpers überhaupt . . . . . 3—12

Mischungsbestandtheile 3
Formbestandtheile 7
Flüssigkeiten 7
Feste Theile 10
Einfachster thierischer Stoff . . . . . —
Einfache organische Substanzen . . . . . —
Gewebe. Systeme 11

Von den organischen Systemen . . . . . 13—91

Zellsystem 13
Gefäfssystem 16
Arterien 20
Venen 21
Capillargefäfse 23
Aderhäute. Blutgefäfsknoten. Erectile Organe . . . 25
Blut 25
Lymphgefäfse 28
Lymphdrüsen 29
Lymphe 30
Nervensystem 31
Centrum encephalo-spinale 32
Nervi encephalo-spinales 35
Gangliennervensystem 38
Empfindungs- und Bewegungs-Nerven 39
Knochensystem 41
Knochen-Verbindungen 45
Knorpelsystem 48
Verbindungsknorpel 49
Organenknorpel 49
Faserknorpelsystem 50
Sehnenfasersystem 51
Fibröse Häute, Faserkapseln, Knochenbänder, Sehnen, Fascien, Sehnenscheiden 53. 54
Elastisches System 55
Muskelsystem 56
Solide Muskeln 60
Hohle Muskeln 65
Seröses System 65

Seite

Seröse Häute 66
Synovialhäute 68
Hautsystem 70
Schleimhäute 70
Lederhaut 72
Hornsystem 76
Epithelium und Epidermis 76
Nägel 78
Haare 80
Zähne 83
Drüsensystem 85
Glandulae simplices 87
Cryptae mucosae 87
Cryptae sebaceae 88
Glandulae compositae 89
Gl. aggregatae 89
Gl. acinosae 90
Gl. tubulosae 91
Eingeweide 91

Zweiter Theil. Specielle Anatomie des erwachsenen menschlichen Körpers.

Äufsere Form des Körpers 95
Dimensionen 101

Erstes Buch. Von den Knochen und ihren Verbindungen. . 105—208

Schädelknochen 109
Os basilare 109
O. sphenoideum 109
O. occipitis 112
Ossa temporum 114
Os frontis 117
Ossa parietalia 119
Os ethmoideum 120
Gesichtsknochen 122
Ossa maxillaria superiora 122
- palatina 125
- zygomatica 127
- nasi 128
- lacrymalia 128
Conchae inferiores 129
Vomer 130
Maxilla inferior 130
Kiefergelenk 131
Os hyoides 132
Allgemeine Betrachtung des knöchernen Kopfes 133
Äufsere Schädelfläche 133
Schädelhöhle 136
Gesicht 139
Augenhöhlen 139
Nasenhöhle 141
Mundhöhle 143
Fossa pterygopalatina 144
Knochen der Wirbelsäule 144

Seite

Vertebrae 145
Os sacrum 148
Os coccygis 149
Verbindungen der Wirbel 150
der einzelnen Wirbel 150
durch gemeinschaftliche Bänder 151
zwichen Kreuz- und Steifsbein 152
— Os occip. Atlas u. Epistropheus . . 153
Allgemeine Betrachtung der Wirbelsäule 154
Knochen des Brustkastens 158
Sternum 158
Costae 159
Verbindungen der Rippen 161
Allgemeine Betrachtung des Thorax 163
Knochen der oberen Extremitäten 165
Clavicula 165
Scapula 165
Articulatio sternoclavicularis, acromioclavicularis . . . 167
Os brachii 168
Schultergelenk 169
Ulna 170
Radius 170
Art. cubitoradiales 171
Ellenbogengelenk 172
Ossa carpi 173
Handgelenk 176
Ossa metacarpi 177
Phalanges digitorum manus 179
Fingergelenke 180
Sesambeine 180
Knochen der unteren Extremitäten 181
Ossa coxarum 181
Verbindungen der Hüftbeine 184
Becken 186
Os femoris 192
Hüftgelenk 194
Tibia 195
Patella 196
Fibula 196
Kniegelenk 198
Ossa tarsi 200
Fufsgelenk 204
Ossa metatarsi 205
Phalanges digitorum pedis 206
Ossa sesamoidea pedis 207
Weibliches Skelet 207

Zweites Buch. Von den Muskeln, Sehnen, Schleimbeuteln und Fascien . . . . . 209—321

Muskeln am Kopfe 213
Muskeln an der vorderen und Seitenfläche des Halses . . 223
Fascia cervicalis 224
Oberflächliche Schicht 225
Tiefere Schicht 229
Muskeln in der Nacken-, Rücken- und Lendengegend . . 231

Seite

Fascia lumbodorsalis 232
Erste Schicht 233
Zweite — 235
Dritte — 236
Vierte — 240
Muskeln an der Brust 242
Muskeln der oberen Extremität 245
Fascien 248
Muskeln an der Schulter 252
Muskeln am Oberarm 254
an der inneren vorderen Seite 254
an der hintern äufseren Seite 256
Muskeln am Vorderarm 256
an der äufseren und Radialseite 256
an der inneren und Ulnarseite 260
Muskeln an der Hand 264
Muskeln am Bauche 267
Fascia recta abdominis 269
Schenkelbogen, vorderer Leistenring 271
Fascia transversalis, hinterer Leistenring 275
Zwerchfell 277
Muskeln am Becken 280
Muskeln der unteren Extremität 280
Fascien 283
Muskeln an der Hüfte 290
Muskeln am Oberschenkel 294
oberflächliche 294
an der vorderen und äufseren Seite 294
an der inneren Seite 296
an der hinteren Seite 297
Muskeln am Unterschenkel 299
an der vorderen Seite 299
an der äufseren Seite 300
an der hinteren Seite 301
Muskeln am Fufse 304
am Fufsrücken 304
in der Fufssohle 305
Übersicht der Muskelthätigkeit bei den wichtigeren einfachen und zusammengesetzten Bewegungen . . . . . 308—321
Literatur . . . . . 323—370

Einleitung.

Die Anatomie oder Zergliederungskunde ist die Lehre von der Form und dem Baue des menschlichen Körpers und seiner einzelnen Theile. Sie hat die Betrachtung der materiellen Grundlage, an welche das Leben geknüpft ist, einer der vorzüglichsten Lebensbedingungen, zum Gegenstande: und ist daher einer der wichtigsten Theile der Physiologie, oder der Lehre von der Natur des lebenden Menschen überhaupt.

Sie betrachtet die einzelnen Körpertheile hinsichtlich ihrer äufseren Gestalt, Dimensionen, Schwere, Cohäsion, Elasticität, Farbe; hinsichtlich der Art ihrer Zusammenfügung aus kleineren Theilchen und ihrer chemischen Mischung; hinsichtlich ihrer Lage und Verbindung unter einander; und endlich hinsichtlich ihrer vorzüglichsten lebendigen Thätigkeits-Äufserungen, besonders solcher, welche schon aus den materiellen Verhältnissen erkannt werden

können. In letzterer Hinsicht betrachtet sie die Körpertheile als Werkzeuge oder Organe, welche eine bestimmte lebendige Function ausüben sollen; als Apparate oder Reihen zusammengehöriger Organe, deren einzelne Functionen sämmtlich auf eine Hauptverrichtung zusammenwirken; und den ganzen Körper als einen aus harmonisch zusammenwirkenden Organen und Apparaten zusammengesetzten Organismus.

Die Zergliederungskunst lehrt die Handgriffe und anderen Hälfsmittel kennen, durch welche die Gegenstände anatomischer Betrachtung am leichtesten und besten an todten Körpern erkannt werden: aus den durch Ausübung dieser Kunst gemachten Erfahrungen, und aus an Lebenden angestellten Beobachtungen, sucht aber die Anatomie das Verhalten aller Körpertheile im lebenden Zustande zu ermitteln.

Structur oder Bau nennt man gemeiniglich die Zusammensetzung des Körpers aus gröberen leicht in das Auge fallenden Theilen, aus den einzelnen Knochen, Muskeln, Nerven u. s. w.; Textur oder Gewebe dagegen die Zusammenfügung der gröberen Theile aus einfachen kleineren und kleinsten Theilchen: die Gränze zwischen beiden ist nicht überall genau zu bestimmen.

Die Anatomie zerfällt in die allgemeine und besondere oder specielle Anatomie. Die allgemeine Anatomie, *Anatomia generalis*, enthält die Beschreibung der einfachsten und kleinsten Theilchen selbst, und die allgemeinen

Regeln, nach welchen diese zur Bildung ganzer Reihen oder Systeme von einander ähnlichen Organen sich zusammenfügen: d. i. die Lehre von der Textur oder den Geweben, *Histologia*: aufserdem aber auch eine Beschreibung der allgemeineren Structur-Verhältnisse, durch welche die Organe von gleicher Textur sich auszeichnen. Die specielle oder beschreibende Anatomie, *Anatomia specialis s. descriptiva*, betrachtet jedes einzelne Organ hinsichtlich seiner besonderen Eigenschaften; ist also eine Structur-Beschreibung des ganzen Körpers nach systematischer, durch Textur, Function und Lage bedingter Ordnung. In der topographischen oder chirurgischen Anatomie, *Anatomia topographica*, s. regionum s. chirurgica, welche zur speciellen Anatomie gehört, werden die einzelnen Organe nur rücksichtlich ihrer Lage und des Raums, welchen sie in den verschiedenen Gegenden des Körpers einnehmen, abgehandelt.

Sowohl die allgemeine als die besondere Anatomie betrachtet zunächst den ganzen Körper, seine einzelnen Theile, und deren Verhältnisse zu einander, im regelmäfsigen und vollkommen ausgebildeten Zustande, ohne jedoch die von dem Geschlecht und den Lebensperioden (von den ersten Anfängen der Bildung an bis zum höchsten Alter) bedingten Verschiedenheiten, und die Varietäten, auszuschliefsen. Varietäten sind Abweichungen vom normalen Bau, welche schon bei der ersten Bildung des Körpers entstanden sind, und die Lebensverrichtungen des Organs, an welchem sie sich befinden, nicht merklich hindern, sonach die Gesundheit nicht merklich beeinträchtigen. Die patho-

logische Anatomie, *Anatomia pathologica*, lehrt die durch krankhaften Bildungsprocefs hervorgebrachten Abweichungen kennen; und die vergleichende Anatomie, *Anatomia comparativa*, die Verschiedenheiten zwischen der Bildung des Körpers des Menschen und der Thiere.

Erster Theil.

Allgemeine Anatomie

des

erwachsenen menschlichen Körpers.

Von den Bestandtheilen des Körpers überhaupt.

Unter den Bestandtheilen des menschlichen Körpers müssen die Bestandtheile der Mischung und die Bestandtheile der Form unterschieden werden. Erstere können gröfstentheils nur durch chemische Zerlegung dargestellt werden, und sind daher Gegenstand der organischen Chemie; ihre Kenntnifs ist aber für die Anatomie insofern wichtig, als sie die Einsicht in die Formverhältnisse erleichtert. Die Bestandtheile der Form werden nur durch eine kunstmäfsige von physischen und chemischen Hülfsmitteln unterstützte Zergliederung erkannt, und gehören ausschliefslich zum Gebiete der Anatomie.

Übersicht der Mischungsbestandtheile.

Von den zahlreichen in der Natur verbreiteten Elementarstoffen sind bis jetzt nur funfzehn in der Mischung des m. K. aufgefunden worden: nämlich der Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel, Phosphor, Chlor, Fluor, Kiesel, Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium, Eisen, Mangan. Sie kommen aber im m. K. nicht im freien Zustande, sondern in sehr mannigfaltigen Verbindungen vor: theils in binairen unorganischen Verbindungen, als Wasser, Säuren, Salzbasen, Salze: theils in nicht binairen, organischen, nur unter Einwirkung der Lebenskräfte entstehenden Verbindungen, von denen manche noch wenig gekannt sind.

A. *Unorganische Verbindungen.*

1. *Wasser*, in allen flüssigen und festen Formbestandtheilen des Körpers; am reichlichsten in den Augenflüssigkeiten, Thränen, Speichel, Schweifs, Serum; am wenigsten in den Knochen, Zähnen und hornigen Theilen.

2. *Kohlensäure* im Harn, in der Lungen- und Hautausdünstung, (im Blute?)

3. *Chlorwasserstoffsäure* (Salzsäure) im Magensaft und im Safte des Blinddarms.

4. *Schwefelsaures Kali* im Harn, Magensaft, Knorpel.

5. *Kohlensaures Kali* im Serum.

6. *Chlorkalium* im Serum, in der Lymphe, Muskelfleisch, Krystallinse, im Nasenschleim, Speichel, Magensaft, Harn, Milch.

7. *Schwefelcyankalium* im Speichel.

8. *Schwefelsaures Natron* im Knorpel, Harn, Galle, Schweifs, Liquor amnii.

9. *Kohlensaures Natron* in den Knorpeln, Knochen, Zähnen, Blutroth, Serum, Thränen, Nasenschleim, Speichel, Galle, Schweifs, Liquor amnii.

10. *Phosphorsaures Natron* im Knorpel, Muskelfleisch, Nägel, Blutroth, Serum, Thränen, Speichel, Harn, Galle, Schweifs, Liquor amnii.

11. *Chlornatrium* (Kochsalz) im Hirn, Knorpel, Knochen, Zähnen, Muskel, Augenschwarz, und in allen Flüssigkeiten.

12. *Kohlensaures Ammoniak,* im Liquor amnii aufgelöst, wird aber aus allen stickstoffhaltigen organischen Stoffen durch Feuerdecomposition erhalten.

13. *Doppelt kohlensaures Ammoniak* im Harn.

14. *Chlorammonium* (Salmiak) im Harn, Schweifs, Magensaft.

15. *Schwefelsaurer Kalk* in der Galle, Magensaft, Liquor amnii [in der Asche der Haare und Oberhaut].

16. *Kohlensaurer Kalk* in den Knochen, Zähnen, Knorpeln, Nägeln [Haaren, Augenschwarz, Blutroth, Hautschmiere, Speichel, Magensaft, Galle].

17. *Phosphorsaurer Kalk* in den Knorpeln, Knochen, Zähnen, Nägeln, Hirnsand, in allen Flüssigkeiten [und in der Asche aller übrigen festen Theile].

18. *Chlorcalcium* im Magensaft.

19. *Fluorcalcium* in den Zähnen, Knochen, Harn.

20. *Kohlensaure Talkerde* in der Hautschmiere.

21. *Phosphorsaure Talkerde* in den Knorpeln, Knochen, Zähnen, Hirnsand, [Haaren, Faserstoff des Bluts], Harn, Magensaft.

22. *Kieselerde* [in den Haaren, Faserstoff des Bluts], Harn.

23. *Eisenoxyd* [im Blutroth, Faserstoff des Bluts, Augenschwarz, Knorpel, Haare, Oberhaut, Schweifs].

24. *Phosphorsaures Eisenoxyd* [im Blutroth, Magensaft].

25. *Manganoxyd* [in den Haaren, Oberhaut, Magensaft].

B. *Metalloide im nicht oxydirten Zustand und in einer eigenthümlichen Verbindung mit organischer Materie.*

1. *Schwefel* in der Hirn- und Nervensubstanz, in den hornigen Theilen, namentlich in den Haaren.

2. *Phosphor* im Hirn und den Nerven, im Speichel.

3. *Eisen* im Blutroth.

C. *Salz-Verbindungen unorganischer Basen mit organischen Säuren.*

1. *Milchsaures Kali* im Muskelfleisch, Krystallinse, Serum, Milch, Ohrenschmalz.

2. *Milchsaures Natron* im Muskelfleisch, Serum, Milch, Schweifs.

3. *Milchsaures Ammoniak* im Muskelfleisch, Harn, Ausdünstung, Schweifs.

4. *Milchsaurer Kalk* in dem Muskelfleisch, Milch, Ohrenschmalz.

5. *Milchsaurer Talk* in der Milch, Muskelfleisch.

6. *Harnsaures Natron*
7. *Harnsaures Ammoniak* } im Harn.

8. *Harnbenzoësaures Natron* (im Harn junger Kinder?)

9. *Cholsaures Natron*
10. *Oelsaures Natron* } in der Galle.
11. *Margarinsaures Natron*

Alle diese unter A. B. C. aufgeführten Stoffe sind nur in sehr geringem quantitativen Verhältnifs zur thierischen Substanz im m. K. vorhanden: mit Ausnahme des Wassers, welches die Grundlage aller thierischen Flüssigkeiten bildet, und in fast allen festen Theilen enthalten ist: und des phosphorsauren und kohlensauren Kalks in den Knochen und Zähnen, welche zusammen 64 bis 96 pC. der ganzen Knochen- und Zahnmasse betragen.

Die im Wasser löslichen Salze, welche man in geringer Menge in den festen Theilen aufgefunden hat, gehören wahrscheinlich nicht diesen Theilen selbst an, sondern den Flüssigkeiten, von welchen sie durchdrungen sind.

Die Salze und Oxyde, neben welchen die solche enthaltenden Materien in [ ] eingeschlossen sind, haben nicht in den frischen festen Körpertheilen selbst, oder in den festen Bestandtheilen der abgedampften Flüssigkeiten, entdeckt werden können, sondern nur in der Asche dieser verbrannten Materien: daher es von vielen jener chemischen Körper zweifelhaft bleibt, ob sie wirklich in die Mischung der lebendigen Theile eingehen.

D. *Organische Verbindungen,*

1. *Faserstoff,* im Blute, Chylus, Lymphe, Muskelfaser.

2. *Eiweifs* in der Hirn- und Nervensubstanz, Muskelfaser, (Knorpeln?), Serum, Synovia, Lymphe, Augenflüssigkeiten, Hautschmiere, Ohrenschmalz, Eiflüssigkeit, Vernix caseosa

3. *Thierleim* (oder vielmehr eine Substanz, welche durch Einwirkung des kochenden Wassers in thierische Gallerte oder Leim sich verwandelt) in den Knochen (Knorpeln? Faserknorpeln, Sehnenfaser, Zellstoff, Zellhäuten, seröser Häuten.

4. *Schleim* oder Schleimstoff, in den von allen Schleimhäuten abgesonderten Schleimen, und zum Theil in den Thränen, Speichel, Magen- und Darmsaft und in der Galle aufgelöset.

5. *Hornstoff* in dem Epithelium, Oberhaut, Nägeln, Haaren, Zähnen.

6. *Thierische Extracte.*

a. *Alcohol-Fleischextract* (mit milchsauren Salzen und Wasserextracten verbunden gemeiniglich *Osmazom* genannt) in der Muskelfaser, Hirn, Knorpel, Krystallinse, Serum, Hautschmiere, Schweifs, Ohrenschmalz. Nasenschleim, Speichel, Galle, Harn, Milch, Liquor amnii, Vernix caseosa.

b. *Wasser-Extracte.*

aa. *Wasser-Fleischextracte* verschiedener und noch unbestimmter Art, im Blute, Serum, Muskelfaser, Knorpel, Linse, Augenflüssigkeiten, Nasenschleim, Hautschmiere, Ohrenschmalz, Schweifs, Galle, Harn, Liquor amnii.

bb. *Thränenstoff* in den Thränen.

cc. *Speichelstoff* im Speichel, (Galle?)

dd. *Linsenstoff* in der Krystallinse.

ee. *Spermatin* im Samen.

ff. *Zomidin* in der Muskelfaser.

7. *Harnstoff* im Harn, Liquor amnii.

8. *Käsestoff* in der Milch, Hautschmiere, Galle.

9. *Milchzucker* in der Milch.

10. *Gallenzucker* (Pikromel) in der Galle.

11. *Gallenharz* in der Galle.

12. *Essigsäure* im Magensaft und im Safte des Blinddarms

13. *Milchsäure* in der Milch, Muskelfleisch, Hirn, Harn, Schweifs.

14. *Harnsäure* im Harn.
15. *Pigmente.*
    a. *Blutroth* im Blute, Muskelfleisch.
    b. *Augenschwarz* im Auge.
    c. *Gallenbraun* in der Galle.
    d. *Harngelb* im Harn.
    e. *Farbstoff* der Oberhaut und Haare.
16. *Fett,* Stearin und Elaïn in verschiedenen Verhältnissen enthaltend; theils frei im Zellgewebe und in den Knochen (Knochenmark), theils mit anderen Substanzen innig verbunden im Chylus, Faserstoff, Hirnsubstanz (Hirnfett, Hirnelaïn, blättriges und pulverförmiges Hirnstearin), in der Milch (Butter), in der Galle (Cholesterin), in den Haaren (Haaröl) im Speichel, Hautschmiere, Ohrenschmalz, Vernix caseosa. —

Alle diese organischen Materien sind quaternaire Verbindungen des Sauerstoffs, Wasserstoffs, Kohlenstoffs und Stickstoffs (mit Ausnahme des Fettes, Milchzuckers und der Essigsäure, welche keinen Stickstoff enthalten); und würden hinsichtlich des gröfseren oder geringeren Antheils an jenen Elementen in folgende Ordnung zu stellen sein:

Sauerstoff:	Milchsäure, Milchzucker, Gallert, Harnsäure, Harnstoff, Eiweifs, Blutroth, Faserstoff, Käsestoff, Fett.
Wasserstoff:	Gallenfett, die anderen Fettarten, (Gallenharz?), Käsestoff, Gallert, Eiweifs, Faserstoff, Blutroth, Harnstoff, Milchzucker, Harnsäure.
Kohlenstoff:	Gallenfett und die anderen Fette, (Gallenharz?), die Pigmente, Käsestoff, Eiweifs, Faserstoff, Gallert, Milchzucker, Harnsäure, Harnstoff.
Stickstoff:	Harnstoff, Harnsäure, Käsestoff, Faserstoff, Blutroth, Gallert, Eiweifs.

Formbestandtheile.

Sie zerfallen in flüssige und feste.

Flüssigkeiten, Fluida.

Die Flüssigkeiten sind theils elastisch flüssig, gasartig; theils tropfbar flüssig, liquide.

Die elastischen Flüssigkeiten sind gemischte Gase verschiedener Art. Sie befinden sich im freien Zustande und in grösserer Menge nur in den sogenannten Luftwegen und den eigentlichen Respirationsorganen, so wie auch im Darmkanale, also in Höhlen, welche von der Oberfläche des Körpers her für Luft und andere Stoffe zugänglich sind; daher auch ihre Qualität und Zusammensetzung häufigem Wechsel unterworfen sind. Eine geringere Menge von Gasarten ist an die tropfbar flüssigen und an die festen Theile gebunden, und hinsichtlich ihrer Zusammensetzung noch fast unbekannt, wahrscheinlich aber einen bedeutenden Antheil von Kohlensäuregas enthaltend.

Die tropfbaren Flüssigkeiten oder Säfte, Humores, sind in bei weitem grösseren Gewichtsverhältnisse im Körper vorhanden, als die festen Theile, so dafs der Körper durch vollständiges Austrocknen ungefähr $^3/_4$ seines Gewichts verliert. Ihr Flüssigkeitsgrad, welcher vom dunstförmigen bis zum dickflüssigen Zustande wechselt, ihre Farbe und übrigen äufseren Eigenschaften, so wie ihre chemische Mischung, sind aufserordentlich verschieden, und letztere zum Theil sehr zusammengesetzt: dagegen ist ihre Gestalt und die Stelle, welche sie im Körper einnehmen, durchaus von den festen Theilen abhängig, in welchen sie bereitet und eingeschlossen sind. In letzterer Beziehung sowohl, als hinsichtlich der Art ihrer Entstehung und ihrer physiologischen Bedeutung, bieten sie wesentliche Verschiedenheiten dar:

A. Eine nicht geringe Quantität von Flüssigkeit durchdringt die Substanz aller festen Organe selbst, erhält sie weich und feucht, und bedingt grofsentheils ihr Volumen, Farbe, Cohäsionsgrad und Elasticität. Man kann sie als *durchweichende Flüssigkeit* oder als *thierisches Wasser* bezeichnen; sie besteht aus Wasser mit einem wahrscheinlich sehr geringen Antheil von Eiweifs, Extracten und löslichen Salzen, und kommt mit sehr verdünntem Serum fast überein.

B. Flüssigkeiten, welche in röhrenförmigen geschlossenen Kanälen, den sogenannten Gefässen, durch den ganzen Körper sich bewegen, aus welchen der Ansatz neuer fester Theile erfolgt, und welche wiederum zerfliefsende feste Theile in sich aufnehmen. Zu diesen *Bildungssäften* oder *Nahrungsflüssigkeiten,* aus welchen aber nicht allein jener

Stoffwechsel, sondern auch die Aushauchung und Secretion aller anderen Flüssigkeiten erfolgt, gehören das Blut, und der Chylus und die Lymphe, aus welchen das Blut bereitet wird.

C. Flüssigkeiten, welche aus dem Blute abgeschieden werden, *secernirte Säfte* oder *Secrete* im weiteren Sinne: diese zerfallen in

1. *Ausgehauchte Flüssigkeiten,* welche ohne Vermittelung anderer Organe aus dem Blute abgedunstet werden; und zwar

a. in geschlossene Höhlen: Serum im Zellgewebe und in den serösen Hautsäcken, Gelenkschmiere, Amniosflüssigkeit; die Flüssigkeiten des Augapfels und inneren Ohres.

b. auf die Oberfläche des Körpers oder in offene Höhlen: Hautausdünstung und Schweifs, Lungenausdünstung in den Lungenzellchen; zum Theil auch Magen- und Darmsaft.

2. *Drüsensäfte* oder eigentliche Secrete, welche von eigenthümlich gebaueten Körpern, den secernirenden Drüsen, abgesondert werden, die Hohlräume dieser Drüsen und ihre Ausführungsgänge erfüllen, und aus diesen auf die Oberfläche des Körpers, oder erst in gröfsere offene Höhlen dringen: Schleim, Hautschmiere, Ohrenschmalz, Augenbutter, Thränen, Mund- und Bauchspeichel, Magen- und Darmsaft zum Theil, Galle, Harn, Samenflüssigkeit, Flüssigkeit der Eibläschen, Milch.

Die meisten secernirten Flüssigkeiten werden zu besonderen Lebensverrichtungen innerhalb oder aufserhalb des Körpers verwandt. Die in geschlossene Höhlen ausgehauchten erhalten die festen Theile, welche von ihnen umspült werden, glatt und schlüpfrig, verhüten das Ankleben; oder sie dienen zur Durchleitung und Brechung der Lichtstrahlen oder zur Fortpflanzung des Schalles. Der Schleim, die Hautschmiere, Augenbutter, das Ohrenschmalz und die Thränen dienen als Schutz- und Befeuchtungsmittel: der Speichel, Magen- und Darmsaft und die Galle unterstützen die Umwandelung der Nahrungsmittel in Nahrungsflüssigkeiten; der Samen, die Flüssigkeit der Eibläschen und die Milch dienen zur Hervorbringung und Nährung neuer Organismen. — Diese Secrete werden zum Theil in die Blutmasse, aus welcher sie bereitet worden, wiederum aufgenommen, zum Theil aus dem Körper ausgeführt.

Andere Secrete, welche nur aus dem Körper ausgeführt, excernirt, werden, sind lediglich dazu bestimmt, die Blutmasse von gewissen Stoffen zu befreien. Zu diesen gehören die Lungen- und Hautausdünstung mit dem Schweifse, der Harn, und zum Theil die Galle und die Hautschmiere.

Feste Theile, Solida.

Die festen Formbestandtheile sind der vorzüglichste Gegenstand der Anatomie, und nehmen die genaueste Betrachtung in Anspruch, da ihnen stets eine bestimmte Gestalt, physische Eigenschaften und Lage zukommen.

Einfachste thierische Substanz.

Die festen Formbestandtheile bilden sich aus den flüssigen, in welche sie auch wiederum sich auflösen können: und erscheinen beim Übergange aus dem flüssigen Zustande in den festen als eine weiche zähe fast breiartige Masse, welche sehr kleine rundliche Körnchen oder Kügelchen von festerer Consistenz in veränderlicher Anzahl enthält: man nennt sie einfachste thierische Substanz oder Materie, oder Urthierstoff. Diese Substanz ist schon einer bestimmten Gestaltung fähig, und erhält dieselbe entweder nur durch Dehnung in entgegengesetzten Richtungen, oder durch Aneinanderreihen der Körnchen selbst der Länge und Breite nach, welche dann durch zwischenliegende zähe Masse zusammengeklebt und verbunden bleiben. Auf beiderlei Weise bilden sich Fasern und Blättchen, und aus diesen wiederum hohle Räume von verschiedener Gestalt, nämlich Bläschen, aus einem zur Hohlkugel geformten Blättchen bestehend; Röhren oder Kanäle, zu deren Bildung mehrere Bläschen sich der Länge nach an einander reihen und in einander öffnen; und Zellen, welche durch eine Verbindung mehrerer Blättchen unter abgerundeten Winkeln entstehen.

Einfache organische Substanzen.

Eine weitere lebendige Ausbildung jenes einfachsten Thierstoffes erzeugt aus demselben acht einfache organische Substanzen, welche durch physische Eigenschaften, chemisches Verhalten, und Äufserungen lebendiger Thätigkeit sehr bestimmt von einander sich unterscheiden, und schon an den ersteren bei der anatomischen Zergliederung mit Leichtigkeit erkannt werden können.

1. *Zellstoff.* Eine sehr weiche, feuchte, klebrige, sehr dehnbare und elastische, weifslich-durchsichtige Masse; aus Fasern, Blättchen und Zellen bestehend, welche indessen nur durch Ausdehnung und Anfüllung mit anderen Substanzen sichtbar werden.

2. *Hornsubstanz:* hart, trocken, elastisch, durchsichtig, von faserig-blätterigem Gefüge ohne Zellen: zum Theil auch undurchsichtig und biegsam.

3. *Knorpelsubstanz:* eine feste, ziemlich harte und trokkene, dichte Masse ohne Zellen, aus genau aneinander gefügten Fasern und Blättchen bestehend; milchweifs, sehr elastisch, aber wenig dehnbar.

4. *Knochensubstanz:* sehr hart, trocken, unbiegsam, gelblichweifs, undurchsichtig, von faserig-blättrigem Gefüge; theils dicht, theils Zellen und Höhlungen mit starren Wänden enthaltend.

5. *Sehnenfaser:* weifse, silberglänzende, harte, sehr feste aber wenig elastische, rundliche Faser.

6. *Elastische Faser:* gelblich oder gelbröthlich, platt, härtlich und ziemlich trocken; ihrer Länge nach sehr dehnbar und elastisch.

7. *Muskel-* oder *Fleischfaser:* roth, sehr weich und feucht, rundlich eckig, unelastisch, aber einer eigenthümlichen Ausdehnung und Zusammenziehung fähig.

8. *Nervensubstanz:* sehr weich und feucht, unelastisch, fast breiartig; zum Theil röthlich grau, schwärzlich oder gelblich; gröfstentheils aber von rein weifser nicht glänzender Farbe, und deutlich gefasert.

Gewebe. Organische Systeme.

Indem diese einfachen organischen Substanzen in verschiedener Anzahl und auf verschiedene Weise mit einander sich vereinigen, setzen sie alle künstlich gebaueten und vielgestaltigen Körpertheile zusammen; sie gehen also in die Textur oder das Gewebe der einzelnen Organe ein. Da aber in dem Gewebe gewisser an ganz verschiedenen Stellen des Körpers liegender Organe eine oder mehrere der einfachen organischen Substanzen vorherrschen, und in einem bestimmten Verhältnifs und Ordnung zusammengefügt sind: so müssen solche Organe, unbeschadet der Verschiedenheit ihrer äufseren Gestalt und Lage, dennoch hinsichtlich ihrer Tex-

tur und der von dieser abhängigen Eigenschaften *gleichartig* sein. So sind z. B. ein Armmuskel und ein Fufsmuskel gleichartige Theile, Partes similares; nicht aber ein Muskel und ein Knochen, auch wenn beide an demselben Gliede neben einander liegen. — Es können daher alle Organe hinsichtlich ihrer Textur in gewisse Klassen geordnet werden, so dafs jede Klasse der Lage nach verschiedene, der Textur nach aber gleichartige Gebilde enthält: und da das Gewebe den Eintheilungsgrund abgiebt, so nennt man auch diese Klassen selbst *die Gewebe, Telae,* Textus. So begreift z. B. das Muskelgewebe alle Muskeln, das Knochengewebe alle Knochen u. s. w.

Sucht man aber die Gleichartigkeit der Organe nicht allein in der Textur auf, sondern zugleich auch in gemeinschaftlichen Structurverhältnissen der einzelnen Organe, und ihren von Textur und Struktur zugleich abhängigen Functionen im lebenden Körper: so erhält man die umfassendere und fruchtbarere Anordnung der Körpertheile nach *organischen Systemen, Systemata organica.*

Die organischen Systeme zerfallen in allgemeine und besondere. Die zu den allgemeinen Systemen — Zellsystem, Gefäfssystem, Nervensystem — gehörigen Organe hangen genau unter einander zusammen, sind durch den ganzen Körper verbreitet, und tragen zur Zusammensetzung, Erhaltung und Belebung aller Organe ohne Ausnahme bei. Die besonderen Systeme enthalten einzelne Organe, welche nicht an allen Stellen des Körpers sich vorfinden, und selbst unter einander weniger genau oder gar nicht zusammenhängen. Hieher gehören das Knochen-, Knorpel-, Faserknorpel-, Sehnenfaser-, elastische, Muskel-, seröse, Haut-, Horn-, Drüsen-System. Aufserdem finden sich aber im m. K. mehrere Organe, deren jedes einen so eigenthümlichen und künstlich zusammengesetzten Bau hat, dafs zwar die einzelnen Theile, aus welchen es bestehet, einem jener Systeme angehören; dennoch aber ein solches Organ, als ein Ganzes, keinem einzelnen Gewebe oder Systeme beigeordnet werden kann: — diese Organe vereinigt man unter dem Namen der Eingeweide.

Von den organischen Systemen.

Allgemeine Systeme.

Zellsystem.

Der *Zellstoff* oder *Zellgewebe*, Schleimgewebe, Bildungsgewebe, *Tela cellulosa* s. mucosa s. textus cellulosus, ist eine sehr weiche, feuchte, klebrige, weifsliche oder weifsgraue, ziemlich durchsichtige Substanz, welche vermöge dieser Eigenschaften zwar eine äufserliche Ähnlichkeit mit Schleim besitzt, von demselben aber durch eine bestimmte Gestaltung sich unterscheidet. Er besteht nämlich aus unzähligen Fasern, Blättchen, und den von diesen eingeschlossenen Zellen, welche wegen ihrer Weichheit dicht an einander liegen und ihm das einförmige Ansehen verleihen; aber sogleich sichtbar werden, sobald der Zellstoff leicht ausgedehnt wird, oder die Zellen mit anderen Substanzen angefüllt sind. Die gröfseren dem bloſsen Auge noch sichtbaren Fasern und Blättchen bestehen aus sehr kleinen, glatten, nicht gekörnten, durchsichtigen, geschlängelten, und einander durchkreuzenden Fasern von $^1/_{1200}'''$ bis $^1/_{3500}'''$ Dm., und aus unregelmäfsigen Klümpchen von $^1/_{260}'''$ bis $^1/_{1720}'''$ Dm., welche theils einzeln zwischen den Fasern, theils neben einander und fast zusammenfliefsend, angetroffen werden: durch eine gewaltsame Ausdehnung werden die Fasern gerade, und die Klümpchen zum Theil in Fasern verwandelt. — Der Zellstoff ist sehr dehnbar, aber so elastisch, dafs er, nachdem er mechanisch ausgedehnt gewesen, beinahe bis auf sein früheres Volumen sich zusammenzieht: aufser der Elasticität besitzt er organische Contractilität oder ein lebendiges Vermögen, auf gewifse Reize sein Volumen zu verändern; aber keine merkliche Empfindlichkeit. In seinen gröberen Fasern und Blättchen verbreiten sich überall sehr zahlreiche Netze von Capillarblut- und Lymphgefäfsen, daher er leicht wuchert und sich reproducirt. Er nimmt wässerige Flüssigkeiten leicht in sich auf und dadurch an Volumen zu; und wird

bei seiner Weichheit und zelligem Gefüge von Luft und anderen Körpern mit Leichtigkeit durchdrungen.

Der Zellstoff ist durch den ganzen Körper auf zweierlei Weise verbreitet.

I. *Umhüllungs-* und *Verbindungszellstoff* oder athmosphärisches Zellgewebe. Dieser umgiebt die Oberfläche der meisten einzelnen Organe, verbindet sie mit einander, füllt die Zwischenräume, gleicht Unebenheiten aus, gestattet und erleichtert eine geringe Ortsveränderung der Organe, wobei er selbst gedehnt wird. Man nennt dieses Zellgewebe kurz und straff, wenn es dünne Schichten kurzer Fasern und Blätter mit engen Zellen bildet, und die Theile, zwischen welchen es liegt, genauer mit einander verbindet: dagegen heifst es locker und schlaff, wenn es aus grofsen Blättern und Zellen bestehet, und eine gröfsere Entfernung der Theile von einander gestattet. Das letztere kommt am häufigsten vor; und eine ziemlich dicke Lage desselben liegt zunächst unter der äufseren Haut, *Unterhautzellgewebe, Tela cellulosa subcutanea,* welches aber mit den Schichten, die in gröfserer Tiefe des Stammes und der Glieder die einzelnen Muskeln, Gefäfse, Nerven, Knochen etc. umgeben, ununterbrochen zusammenhängt. Daher, und weil die einzelnen Zellen häufig und leicht in einander sich öffnen, kann ein fremder Körper, welcher in das Zellgewebe eindrang, in demselben sehr beträchtliche Strecken weit fortrücken.

Aufserdem dafs alle Fasern und Blättchen des Zellstoffs mit der allgemeinen durchweichenden Flüssigkeit getränkt sind, werden die einzelnen Zellen des Umhüllungszellstoffs noch mit einem wässerigen Dunst erfüllt, welcher in den gröfseren Zellen selbst zu Tropfen verdichtet häufig sich vorfindet. Man nennt diese klare oft schwach gelbliche Flüssigkeit *Zellgewebsserum;* es ist vom Serum der serösen Häute nicht wesentlich verschieden. Ferner enthält der Umhüllungszellstoff eine ansehnliche Menge freien *Fettes, Adeps* s. pinguedo, welches ungefähr den zwanzigsten Theil des Gewichts des ganzen Körpers beträgt. Es ist gelblich, von fadem Geschmak, geruchlos, flüssig wie dickes Öl, wird aber nach dem Tode festweich. Sehr kleine Tröpfchen desselben sind in zarte aus Zellstoff gebildete Bläschen vollständig eingeschlossen, und stellen sich mit denselben als

ügelchen von $^1/_{108}$‴ bis $^1/_{22}$‴ Dm. dar; zwischen diesen erbreiten sich Capillargefäfschen, an welchen die Fettbläschen wie Beeren an einem Stiel hängen, und welche auf den Bläschen selbst noch feiner sich verzweigen. Eine grofse Menge solcher Fettkügelchen oder Bläschen werden dann von einer gröfseren Zelle aufgenommen, und bilden ein gröfseres oder kleineres Fettklümpchen von unregelmäfsiger Gestalt. Das Fett füllt Ungleichheiten aus, erleichtert als weiches Polster die Bewegungen der Organe, und verhütet als schlechter Wärmeleiter die Zerstreuung der Wärme und plötzliche Abkühlung; es ist daher am reichlichsten in der Umgebung sehr beweglicher und empfindlicher Organe und überhaupt im Unterhautzellgewebe angehäuft, welches daher auch den Namen *Fetthaut, Panniculus adiposus* führt. Ansehnlichere Fettmengen finden sich übrigens in den Augenhöhlen, im Rückgratskanal, in den Cava mediastinorum, in der Bauchhöhle, am Schamberg, in den tieferen Gruben zwischen den Muskeln, Achselhöhle, Kniekehle u. a. m. In der Schädelhöhle, an den Augenliedern, am Hodensack, Penis, Clitoris und kleinen Schamlefzen fehlt es gänzlich, und ist unter der Kopfhaut, an dem äufseren Ohr, Nase und Lippen nur in sehr geringer Quantität vorhanden.

II. Der *zusammensetzende Zellstoff*, oder das parenchymatose oder Organen-Zellgewebe, befindet sich nicht an der Oberfläche, sondern im inneren Gewebe der meisten Organe, und verbindet die einzelnen Theilchen eines Organs zu einem Ganzen, oder bildet für sich allein häutige Ausbreitungen, welche Organe von complicirtem Bau zusammensetzen helfen. Zu ersterer Form gehören die röhrenförmigen Scheiden der feineren Muskel- und Nervenfasern, so wie das äufsere Neurilema und Perimysium; ferner der Zellstoff, welcher kleine Gefäfs- und Nervenschlingen zu Büscheln verknüpft; in den Drüsen die Acini oder Secretionskanäle und die Gefäfse zusammenklebt: in anderen Organen die Flächen verschiedener Häute mit einander vereinigt u. a. m.

Die häutigen Ausbreitungen, welche ganz aus verdichtetem Zellstoff bestehen, nennt man *Zellhäute, Membranae s. Tunicae cellulosae.* Sie sind weifslich oder durchsichtig, sehr dehnbar und elastisch, und gewöhnlich auf beiden Flä-

chen rauh und flockig, wenigstens auf der äuſseren, welche überhaupt mehr locker gewebt ist, und meistens mit dem Umhüllungszellgewebe in Verbindung steht. In diesen Häuten liegen die Fasern und Blättchen ohne zellige Zwischenräume dicht an einander, so daſs zwischen ihnen nur Gefäſse und Nerven sich verbreiten. Es gehören hieher die innerste und äuſsere Haut der Gefäſse (Tunicae vasorum), die äuſsere Haut der Ausführungsgänge der Drüsen, die Haut des Knochenmarks, die äuſsere Haut des Schlundkopfs und Schlundes, der Gallen- und Harnblase, der Scheide: die Pigmenthaut im Auge.

Andere Häute, deren Grundlage aus Zellgewebe bestehet, die aber zu anderen Systemen gehören, sind die sog. Aderhäute oder Gefäſshäute, Tunicae vasculosae, die Nervenmarkhäute, die serösen und Synovialhäute, die Schleimhäute und die äuſsere Haut. Einen geringeren Antheil nimmt der Zellstoff auch an der Bildung der fibrösen und zellulos-fibrösen Häute und der Muskelhäute.

Gefäſssystem.

Das Gefäſssystem ist nächst dem Zellsystem am meisten allgemein im Körper verbreitet, und besteht aus einer sehr groſsen Anzahl häutiger unter einander zusammenhängender Röhren oder Kanäle, den Gefäſsen oder Adern, und ihrem gemeinschaftlichen Mittelpunkte, dem Herzen. Das *Herz, Cor,* ist eine gröſsere muskulöse Höhle, durch eine Scheidewand in eine rechte und linke Hälfte abgetheilt, von denen jede wiederum in eine Herzkammer und Vorhof zerfällt: diese stehen unter einander durch mit Klappen versehene Öffnungen in Verbindung, so daſs das ganze Herz die Einrichtung einer doppelten Saug- und Druckpumpe darbietet. Die *Gefäſse, Vasa,* werden nach ihrem Inhalte unterschieden in *Blutgefäſse, Vasa sanguifera* (Blutgefäſssystem), welche wiederum in *Schlag-* oder *Pulsadern, Arteriae* (Arteriensystem), und *Blutadern, Venae* (Venensystem), zerfallen: und in *Lymphgefäſse* oder *Saugadern, Vasa lymphatica* s. *Venae absorbentes,* (Lymphgefäſssystem).

Das Herz und die Blutgefäſse enthalten das Blut, welches durch die Arterien zu allen Organen hingeführt, durch die Venen aber zum Herzen zurückgeleitet wird: daher

tehen die Arterien und Venen mit dem Herzen in unmittelbarer Verbindung, erstere mit den Herzkammern, letztere mit den Vorhöfen. Der Blutumlauf geht in zwei verschiedenen Richtungen vor sich, indem das Blut aus der linken Herzkammer durch die Körperarterien oder das Aortensystem zu allen Organen strömt, und durch die Körpervenen oder das Hohlvenensystem zum rechten Vorhof zurückfliefst: d. i. der grofse oder Körperkreislauf, *Circulus sanguinis major:* — alsdann aber aus der rechten Herzkammer durch die Lungenarterien in die Lungen, und aus diesen durch die Lungenvenen zum linken Vorhof geführt wird: d. i. der kleine oder Lungenkreislauf, *Circulus sanguinis minor.* Hiernach zerfallen Herz und Blutgefäfse in die Abtheilungen des grofsen und kleinen Kreislaufs: zu dem ersteren gehört die linke Herzkammer, die Körperarterien, die Körpervenen und der rechte Vorhof; zum zweiten die rechte Herzkammer, die Lungenarterien, die Lungenvenen und der linke Vorhof. Nach der Verschiedenheit des Bluts in den einzelnen Abtheilungen des Gefäfssystems unterscheidet man auch das System des rothen und schwarzen Blutes; zum ersteren gehört die linke Herzenshälfte, die Körperarterien und Lungenvenen; zum letzteren das rechte Herz, die Körpervenen und Lungenarterien.

Das Lymphgefäfssystem enthält nicht Blut, sondern nur Säfte, welche erst zu Blut umgewandelt werden sollen, Chylus und Lymphe: und steht nicht mit dem Herzen, sondern nur mit dem Venensystem in unmittelbarer Verbindung, und führt durch dieses seinen Inhalt der Blutmasse zu.

Dem Laufe der Säfte nach ist der Anfang der Arterien im Herzen, der Anfang der Venen aber vom Herzen entfernt, in den Organen, aufzusuchen. Betrachtet man aber die allgemeine Anordnung der Gefäfse vom Herzen, dem gemeinschaftlichen Mittelpunkte, aus: so zeigen sich die gröfsten Gefäfsstämme in der Nähe desselben, und verbreiten sich von hier aus baumförmig nach allen Richtungen, indem sich die gröfseren Stämme in kleinere Stämmchen, Äste und Ästchen spalten — *Ramificatio vasorum.* Am häufigsten geschieht diese unter spitzigen Winkeln; öfters gabelförmig; nicht selten auch unter einem rechten und sogar

stumpfen Winkel; oder ein Stamm beschreibt einen Bogen, von welchem die Äste, und zwar vorzüglich von der convexen Seite des Bogens, entspringen. Von einer Spaltung zur anderen verändert das Gefäfs seinen Kaliber (*Lumen*) nicht; die Äste sind zwar absolut kleiner als der Stamm, aus dem sie entspringen, jedoch wächst ihr Kaliber im Verhältnifs zu dem des Stammes bei jeder Spaltung, so dafs die vereinigt gedachten Äste bedeutend weiter sind, einen ansehnlicheren Hohlraum enthalten, als der Stamm. Indessen fliefsen auch oft einzelne Gefäfse derselben Art wieder zusammen, worauf sie von Neuem sich verzweigen. Eine solche Zusammenmündung zweier Gefäfse — *Anastomosis* — findet um so häufiger Statt, je kleiner und vom Herzen entfernter die Gefäfse sind; sie erfolgt gewöhnlich in einem Bogen, seltner durch Queeräste zwischen zwei parallellaufenden Gefäfsen oder unter spitzen Winkeln. Verbinden sich mehrere kleinere Gefäfse vermittelst zahlreicher Anastomosen, so entsteht ein Gefäfsnetz, *Rete vasculare*. Ist der Hauptstamm verschlossen, so erweitern sich die anastomosirenden Äste. Der Lauf der gröfseren Stämme geht gemeiniglich in der kürzesten Richtung gegen die Organe hin, für welche sie bestimmt sind: vor dem Eintritt in dieselben verzweigen sie sich aber, und die kleineren Äste machen Biegungen: indessen haben auch manche gröfsere Stämme einen gebogenen, und kleinere sogar einen geschlängelten Lauf, vorzüglich die Gefäfse solcher Organe, deren Volumen und Lage häufigen Veränderungen ausgesetzt ist. Häufig finden sich auch Varietäten in der Verästelung und im Laufe; so wie überhaupt das Gefäfssystem weniger symmetrisch angeordnet ist, als die meisten anderen Systeme.

Die Gefäfse werden von mehreren schichtweise einander umgebenden Häuten, *Tunica vasorum*, gebildet, von welchen die innerste, *Tunica vasorum intima* s. communis, die wesentlichste ist, und allen drei Hauptarten der Gefäfse und selbst dem Herzen zukommt: sie ist sehr dünn, aber von festem aus verdichtetem Zellstoff bestehenden Gewebe; ziemlich dehnbar, durchsichtig oder weifslich, an ihrer inneren Fläche äufserst glatt. Die äufserste Schicht des Gefäfses ist gleichfalls eine Zellhaut, *Tun. vasorum externa*

s. cellulosa: diese ist dicker, aber von mehr lockerem Gewebe, sehr dehnbar, weifslich; sie besteht aus zahlreichen longitudinal und schräg laufenden dicht verwebten Zellstofffasern und schmalen Blättchen; und hängt mit dem Umhüllungszellgewebe, in welches die meisten gröfseren Gefäfse locker eingesenkt sind, (und welches daher zuweilen Gefäfsscheide genannt wird) durch zahlreiche schlaffe dehnbare Zellfasern zusammen. Sie bestimmt die Biegungen der Gefäfse, indem sie oft an der einen Seite des Gefäfses straffer oder mit nahgelegenen Theilen genauer verbunden ist, als an der anderen, und das Gefäfs nach der entgegengesetzten nachgiebigeren Seite sich krümmt. Zwischen der Tun. externa und intima liegt bei den Arterien und gröfseren Venen noch eine mittlere, von den elastischen ziemlich locker zusammengeklebten Fasern gebildete Haut, *Tun. vasorum media* s. elastica (unpassend auch Tun. fibrosa oder Tun. muscularis genannt). — Übrigens werden die mittlere und äufsere Haut um so dünner, je kleiner die Gefäfse durch fortgesetzte Ramificationen werden, und verschwinden bei Gefäfsen von $^1/_5$‴ bis $^1/_{10}$‴ Dm. gänzlich, so dafs solche nur aus der innersten Gefäfshaut gebildet werden.

Diese Häute werden von eigenen kleinen Gefäfsen, Vasa vasorum, ernährt, welche nicht von dem Stücke eines Gefäfses, für welches sie bestimmt sind, sondern von einem nächst benachbarten Gefäfse entspringen, durch das Umhüllungszellgewebe zuerst zur äufseren Haut gelangen, in dieser sich vertheilen; alsdann die mittlere Haut durchdringen, und auf der äufseren Fläche der innersten zu endigen scheinen. Die gröfseren Gefäfse werden gröfstentheils von Nerven begleitet, und viele selbst von ansehnlichen Nervengeflechten netzartig umschlungen, welche indessen (mit Ausnahme weniger und sehr zarter Nerven, welche in den Gefäfshäuten sich verlieren) nicht für das Gefäfs selbst, sondern für die Organe, an welche dasselbe sich vertheilt, bestimmt sind. Die Gefäfse besitzen Elasticität und vitale Contractilität, und zwar die gröfseren Gefäfse mehr Elasticität, die kleineren mehr Contractilität: aber keine merkliche Empfindlichkeit. Verwundete Gefäfse heilen leicht, und zwar um so vollständiger, je kleiner sie sind; Arterien aber

schwieriger als Venen und Lymphgefäfse: auch bilden kleine Gefäfse sich leicht von Neuem.

Die *Arterien* sind, im Vergleich zu den Venen, enger, weniger zahlreich, liegen mehr entfernt von der Oberfläche des Körpers; ihre Anastomosen sind seltener zwischen den gröfseren Stämmen, indessen sehr zahlreich zwischen den kleineren, welche oft Bögen und Netze bilden. Die Tunica intima ist brüchiger, weniger ausdehnbar: durch eine Verdoppelung nach Innen bildet sie in der Höhle der Gefäfse Klappen, aber nur an den beiden Stellen des Ausgangs der Aorta (des Hauptstammes der Körperarterien) und des Lungenarterienstammes aus dem Herzen: diese Klappen sind halbmondförmig, und öffnen sich in der Richtung gegen die Arterien hin, schliefsen sich in der Richtung gegen das Herz. — Die mittlere Haut ist sehr vollständig ausgebildet, dick, vorzüglich an den gröfseren Gefäfsen, an den Theilungsstellen und an der convexen Seite der Biegungen; die elastischen Fasern, aus welchen sie besteht, sind ringförmig in queerer und etwas schräger Richtung um die Arterie, und in mehreren Schichten übereinander gelagert: die innerste Schicht ist sehr innig und fast unzertrennlich mit der Tun. intima verwachsen: übrigens liegen die einzelnen Fasern locker und so schwach zusammengeklebt an einander, dafs sie leicht getrennt werden können. An den kleinsten Arterien von ungefähr $\frac{1}{5}'''$ Dm. ist die mittlere Haut nicht mehr zu erkennen, so dafs diese hinsichtlich der Dicke ihrer Wände den Venen gleichkommen. Diese mittlere Haut giebt den Arterienwänden eine grofse Stärke, wodurch sie eine bedeutende Ausdehnung von Innen ertragen können, und vermittelst der Elasticität ihrer Fasern an allen Punkten einen starken anhaltenden Druck auf die in ihnen enthaltene Blutsäule ausüben; aufserdem verleihet sie den Arterien eine gewisse Härte und Steifigkeit, wodurch sie schon durch das Gefühl von einer Vene sich unterscheiden lassen, und offen stehen bleiben, wenn sie entleert und durchschnitten sind. Dagegen kann diese Haut eine stärkere Ausdehnung der Arterie ihrer Länge nach durchaus nicht vertragen; bei starker Zerrung und bei Unterbindung mit einem feinen Faden trennen sich die ringförmigen Fasern leicht von einander, wobei zugleich die innerste genau

mit ihnen verwachsene Haut zerreifst, die mehr dehnbare äufsere Haut aber unverletzt bleibt. Aus diesem Grunde sind auch die meisten und wichtigsten Arterien an der vorderen Seite des Stammes und der Beugeseite der Glieder gelagert, und vor den Dehnungen geschützt, welche sie bei starken Beugungen erleiden würden, wenn sie an den Streckseiten verliefen. — Die Tun. externa ist dicker und stärker, als die der Venen, die ernährenden Gefäfse zahlreicher. Alle Arterien, mit Ausnahme der kleinsten, bewegen sich während des Lebens regelmäfsig und stofsweise, sie pulsiren. Die Ursache der *Pulsation* liegt in der periodisch erfolgenden Zusammenziehung der Herzkammern, welche jedesmal eine neue Quantität Blutes in die Stämme der Aorta und Lungenarterie einpressen: dadurch wird die ganze verzweigte Blutsäule, von welcher die Arterien während des Lebens stets genau ausgefüllt werden, in der Richtung vom Herzen nach den Organen hin fortgeschoben, zugleich die Arterienwände erschüttert, und die ganze Arterie nach der Richtung des Blutstroms, also ihrer Länge nach, bewegt; welches an den gebogenen und geschlängelten Arterien am Deutlichsten sich zeigt. Zugleich erleiden die gröfseren Arterien eine verhältnifsmäfsig geringe Erweiterung ihres Durchmessers. In der Zeit zwischen einer Zusammenziehung der Herzkammer bis zur anderen scheint die Blutsäule in den Arterien zu ruhen, wird aber in der That durch den von den sehr elastischen Arterienwänden ausgeübten Drnck immer vorwärts getrieben: denn während des Lebens befinden sich die Arterien stets in dem Zustande mechanischer Ausdehnung.

Die *Venen* sind in gröfserer Anzahl vorhanden, als die Arterien; sind weiter, ausdehnbarer; haben zahlreichere Anastomosen, auch zwischen ansehnlicheren Blutadern; sie begleiten an den meisten Stellen die Arterien, laufen aber häufig auch von ihnen entfernt; in mehr gerader Richtung als jene, und der Oberfläche näher. Aufser den Venen, welche die Arterien unmittelbar begleiten — wobei häufig für eine Arterie zwei ihr entsprechende Venen vorhanden sind — verläuft noch eine Reihe oberflächlicher Blutadern im Unterhautzellgewebe des Stammes und der Glieder, *Venae subcutaneae* s. superficiales; welche mit den tieferen

Venen vielfach anastomosiren. Alle Venen beginnen in und zwischen den Organen als kleine netzförmig anastomosirende Gefäfse, sog. Venenwurzeln; wachsen durch Vereinigung zu gröfseren Stämmen, und fliefsen fast sämmtlich zuletzt zu sehr ansehnlichen Stämmen (der oberen und unteren Hohlvene, und den Lungenvenen) zusammen, welche das durch die Arterien in die Organe geführte Blut in das Herz zurück ergiefsen; — indessen gehen die Venen aus einer grofsen Abtheilung des Körpers, nämlich aus den Eingeweiden innerhalb des Bauchfellsackes, nicht unmittelbar zu den Hauptstämmen und durch diese zum Herzen hin, sondern vereinigen sich zu einem besonderen grofsen Stamm, der Pfortader, der sich von Neuem baumförmig in der Leber verzweigt; wonach erst durch neu entsprossene Venen das Leberblut zur unteren Hohlvene gelangt. — Die innere Haut der Venen ist schlaffer als die der Arterien, und bildet innerhalb der gröfseren Blutadern eine ansehnliche Menge von taschenähnlichen *Klappen*, deren gewöhnlich zwei einander gegenüber mit einem stark gekrümmten Rande am inneren Umfange der Vene festsitzen; und mit dem freien, etwas dickeren, leicht concaven und gegen das Herz hin gerichteten Rande sich genau berühren können. Strömt das Blut zum Herzen hin, so legen sie sich dicht an die Wände der Vene; strömt es in entgegengesetzter Richtung, so breiten sie sich taschenförmig aus, und fangen das Blut auf. Man findet sie am häufigsten an spitzwinkeligen Vereinigungen gröfserer Stämme, aber nie in den kleinsten Venen; schon in den von $\frac{1}{2}'''$ Dm. sind sie kaum merklich; anstatt eines Paares ist an vielen Stellen nur eine, an anderen drei (bis fünf?) vorhanden. In vielen Venen der oberen Körperhälfte und mehrerer Eingeweide fehlen sie gänzlich, dagegen sind sie in den Blutadern der unteren Körperhälfte und der Gliedmafsen vorzüglich häufig und stark entwickelt. Oft bildet die Vene unmittelbar oberhalb der Klappe eine leichte Erweiterung. — Die mittlere Haut wird nur in den Hauptstämmen des Venensystems, und in den gröfseren oberflächlichen, nahe unter der äufseren Haut laufenden, Blutadern angetroffen: ihre Fasern laufen gröfstentheils longitudinal, zum Theil auch queer und einander unregelmäfsig durchkreuzend; sind aber viel

sparsamer vorhanden, als in der mittleren Arterienhaut, und lockerer mit einander verbunden; und daher diese Haut jedesmal viel dünner als in Arterien von gleichem Kaliber. Auch die Tun. externa ist dünner und schlaffer als die der Arterien; sie fehlt gänzlich bei den Venen, welche in Kanäle mit starren Wänden z. B. in Knochen, in der harten Hirnhaut, eingeschlossen sind. Wegen der geringeren Stärke und Straffheit des Baues der Häute fallen die Wände entleerter Venen zusammen, wenn sie nur von schlaffem Zellgewebe oder Häuten umgeben werden: sind sie aber in knöchernen oder faserhäutigen Kanälen, in der Substanz dicker fester Organe, oder zwischen zwei Platten einer fibrösen Muskelscheide eingeschlossen, und mit ihren Umgebungen verwachsen, so bleiben sie auch nach der Entleerung offen. Elasticität und Contractilität kommt den Venen im geringeren Grade zu als den Arterien; sie pulsiren nicht: an den gröfseren Stämmen in der Nähe des Herzens bemerkt man aber ein abwechselndes Zusammensinken und Ausdehnung der Wände, erstere gleichzeitig mit der Ausdehnung der Vorhöfe.

Die Arterien und Venen stehen im unmittelbaren Zusammenhange durch die überall im Umhüllungs- und Organenzellstoff verbreiteten sog. *Haargefäfse*, *Vasa capillaria*. Diese sind nur die letzten Endigungen der Arterien und Anfänge der Venen: die kleinsten Äste der Arterien, welche so eng sind, dafs sie nur eins oder höchstens einige neben einanderlaufende Blutkörnchen enthalten, nennt man arteriöse Capillargefäfse; und ein Gefäfs von demselben Kaliber, in welchem das Blut in der Richtung gegen das Herz hinströmt, ist ein venöses Capillargefäfs, welches demnächst in eine Venenwurzel übergeht. Beiderlei Haargefäfse unterscheiden sich nur durch die Richtung des Blutstroms, nicht durch ihre Textur; sie werden nur von der höchst verfeinerten Tunica intima gebildet, und die feineren unter ihnen scheinen sogar nur, in Rinnen des Zellstoffs laufende, Blutströmchen ohne häutige Wände zu sein. Wenn sie feiner sind, als der Dm. eines Blutkörnchens, so nennt man sie seröse Capillargefäfse: solche können sich aber leicht erweitern, so dafs sie einem oder mehreren Blutkügelchen den Durchgang gestatten. Da die Haarge-

fäfse zwar Blutströmchen führen, die aber nur aus einer sehr geringen Anzahl Blutkörnchen bestehen: so sind sie gelblich, durchsichtig, und dem bloſsen Auge unsichtbar; und werden daher zuweilen, aber unpassend, als kein rothes Blut führend, Arteriae non rubrae, bezeichnet. — Der Übergang eines arteriösen Capillargefäfses in ein venöses geschieht entweder so, daſs ersteres sich einfach umbiegt, und dadurch zum venösen Haargefäfse wird, beide also eine einfache Haargefäfsschlinge bilden: oder daſs ein arteriöses und venöses Capillargefäfs parallel neben einander laufen, und durch mehrere Queeräste und endlich durch eine Schlinge communiciren: oder daſs zahlreiche Capillargefäfse von beiderlei Art ein Netz bilden, in welchem das Blut nach scheinbar sehr verschiedenen und wechselnden Richtungen strömt, und in welcher einerseits eine kleine Arterie mit mehreren Ästen sich auflöset, andererseits eine kleine Venenwurzel ihren Anfang nimmt. Diese netzförmige Anordnung der Capillargefäfse kommt am häufigsten in dünnen häutigen Ausbreitungen vor: es unterscheiden sich aber solche Netze von einander weniger durch eine verschiedene Stärke der einzelnen Haargefäfschen, als vorzüglich durch die sehr verschiedene Anzahl derselben, wodurch das Netz enger oder weiter, und die Räume zwischen den einzelnen Gefäfschen, die Maschen des Netzes, kleiner oder gröſser werden. — Das Blut bewegt sich in den Haargefäfsen gleichförmig und ununterbrochen, ohne Pulsation, und sehr viel langsamer, als in den gröſseren Gefäfsen.

Da die feinsten Capillargefäfse wahrscheinlich keine häutige Wände haben, und jedenfalls die sehr zarten Häute dieser Gefäfse leicht von Flüssigkeiten durchfeuchtet und durchdrungen werden: so können nicht allein flüssig gewordene Körpertheilchen, sondern auch verschiedene zufällig in das Zellgewebe gelangte Flüssigkeiten und manche in diesen aufgelösete Substanzen in das Innere der venösen Capillargefäfse gelangen, mit dem Blute gemischt, und in den Kreislauf gezogen werden. Hierauf beruhet die den Venen zugeschriebene Einsaugungskraft. —

Das Blutgefäfssystem nimmt an der Zusammensetzung folgender Gebilde einen besonders wesentlichen Antheil:

1. *Aderhäute* oder *Gefäfshäute*, *Membranae s. Tunicae*

vasculosae. Einfache aus verdichtetem Zellstoff gebildete Häute werden von zahlreichen und verhältnifsmäfsig ansehnlichen Blutgefäfsen durchzogen, die aber gröfstentheils nicht zur Ernährung dieser Häute selbst, sondern für die von ihnen bekleideten Organe, oder zu anderen besonderen Lebensverrichtungen bestimmt sind. Hieher gehören die weiche Hirnhaut, (Pia mater) die Zellgewebsschicht zwischen Muskelhaut und Schleimhaut des Verdauungskanals, die Aderhaut (Choroidea) des Auges.

2. *Blutgefäfsknoten,* Blutdrüsen oder unvollkommene Drüsen, *Ganglia vascularia* s. Glandulae spuriae: weiche rundliche Körper von schwammigem gelapptem Bau, welche eine äufserliche Ähnlichkeit mit secernirenden Drüsen haben, aber fast nur aus Knaueln ansehnlicher Blutgefäfse, und gröfseren und kleineren von Flüssigkeiten angefüllten Höhlungen, bestehen: die Milz, die Schilddrüse, die Brustdrüse (Thymus) und die Nebennieren. Sie scheinen einen eigenthümlichen noch unerforschten Einfluſs auf die Blutmischung auszuüben.

3. *Erectile Organe,* welche äufserlich von einer festen, oft fibrösen, Haut umgeben, im Innern nur aus einer grofsen Menge von Blutgefäfsen bestehen: diese Gefäfse sind gröfstentheils ansehnliche Venen, welche in vielfachen Windungen und Verschlingungen mit einander anastomosiren und beträchtliche Erweiterungen bilden. Das Blut kann in ihnen, meistens durch eine besondere mechanische Vorrichtung, eine Zeitlang zurückgehalten werden; wodurch diese Organe an Volumen zunehmen, hart und steif werden. Es gehören hieher die Ruthe (Penis) die Clitoris, die kleinen Schamlefzen, und die Brustwarzen. —

Das *Blut, Sanguis,* ist ein rother Saft, etwas dickflüssiger und schwerer als Wasser, von 1,0527 bis 1,0570 spec. Gewicht, klebrig, von fadem etwas salzigem Geschmack und eigenthümlichen Geruch: es besteht aus einer dünnen durchsichtigen schwach gelblichen oder grünlichen, alkalisch reagirenden Flüssigkeit, dem *Blutwasser, Serum sanguinis;* und aus den festweichen im Blutwasser schwimmenden *Blutkörnchen* oder Blutkügelchen, *Granula* s. Globuli sanguinis. Letztere bestehen aus Faserstoff und Blutroth, sind im Allgemeinen plattrund, scheibenförmig, können aber an einander

gedrückt auch eine ovale, längliche, oder an einem Rande eingedrückte Gestalt annehmen: in der Mitte sind sie nicht beträchtlich dicker als an den Rändern, ohne auch einen von dem Umfange wesentlich verschiedenen Kern in der Mitte einzuschliefsen: einzeln betrachtet erscheinen sie hellgelb, haufenweise aber roth, und geben dem Blute seine eigenthümliche Farbe. Ihr Dm. beträgt $^1/_{400}'''$ bis $^1/_{480}'''$, ihre Dicke im Allgemeinen $^1/_{800}'''$ bis $^1/_{1200}'''$. — Aufserhalb der Gefäfse gerinnt das Blut, wobei die Körnchen eine wirbelnde Bewegung zeigen, und der mit Wasserdunst verbundene Riechstoff, Halitus sanguinis, verfliegt: und scheidet sich in eine festere Masse, den Blutkuchen, *Crassamentum* s. placenta sanguinis, und in das Blutwasser, *Serum sanguinis*. Das quantitative Verhältnifs zwischen beiden ist wechselnd, jedoch beträgt der noch feuchte Blutkuchen gewöhnlich ein Viertheil der ganzen Blutmenge. Er besteht aus den Blutkörnchen mit einem kleinen Antheil Faserstoff, welcher im Blutwasser aufgelöst gewesen; also fast ganz aus Faserstoff und Blutroth oder Blutfarbstoff, Cruor s. pigmentum sanguinis. 1000 Theile des vollkommen getrockneten Blutkuchens enthalten

Faserstoff (mit 4, bis 4,5 p. C. Fett [und phosphorsaurem Kalk und Talk, einer Spur von Eisen und Kieselerde in der Asche])	350
Blutroth [aus dessen Asche 0,3 p. C. kohlensaures und phosphors. Natron, 0,3 p. C. kohlens. und phosphors. Kalk, und 0,5 p. C. Eisen erhalten werden]	580
Kohlensaures Natron	13
Wasserextracte mit anderen Salzen	40
Kohlensäure und Verlust	17
	1000

Das Blutserum enthält

Wasser	905, 9
Eiweifs	80, 0
Alcohol Extract u. milchsaures Natron	4, 0
Chlornatrium	6, 0
Kohlens. u. phosphors. Natron mit Eiweifs	4, 1
	1000, 0

Das Wasser im Blute beträgt ungefähr 784, die festen Theile 216 p. M.; von letzteren kommen auf den Blutkuchen 129, auf das Serum 87 p. M.

Das rothe (oder arterielle) Blut (S. 17.) ist lebhaft roth, enthält etwa 1 p. C. mehr Blutkörnchen als das schwarze (oder venöse); letzteres ist von schwarzrother Farbe, und sein Cruor reicher an Kohlenstoff, ärmer an Sauerstoff. Das Blut der Capillargefäfse ist merklich dunkler, als das der Arterien. (Berzelius). —

Nach den neuesten umfassenderen Untersuchungen von Lecanu enthält das Blut überhaupt:

	von Frauen,		*von Männern*
Wasser	804,371	—	789,320
Eiweifs	69,721	—	67,500
Lösliche Salze und Extracte . . .	9,944	—	10,689
Blutkörnchen	115,963	—	132,491
	1000,000		1000,000

und nach einzelnen Bestandtheilen:

Wasser	782,867
Faserstoff	2,832
Blutroth	126,313
Eiweifs	67,252
Krystallinisches Fett	3,365
Öliges Fett	1,760
Alcoholische und wässerige Extracte . .	1,855
Eiweifsnatron	1,637
Chlorkalium, Chlornatrium, phosphorsaures, kohlensaures u. schwefelsaures Alkali .	7,837
Kohlensaure Kalk- und Talkerde . .	1,757
Phosphorsaure = = = . .	
Eisenoxyd und phosphorsaures Eisen . .	
Verlust	2,493
	1000,000

Hierin ist der Faserstoff und das Blutroth als wasserfrei angenommen: ersterer enthält im feuchten Zustande $^4/_5$ seines Gewichts an Wasser.

Das Serum allein besteht aus

Wasser	903, 50
Eiweifs	79, 60
Alcohol- und Wasserextracte .	1, 87
Eiweifs mit Natron	2, 32
Krystallinisches Fett.	1, 65
Öliges Fett	1, 15
Chlorkalium u. Chlornatrium .	5, 66
Kohlens., phosphors. und schwefels. Alkali	2, 05
Kohlensaure Kalk- und Talkerde, Phosphors. Kalk- und Talkerde und Eisen	0, 89
Verlust	1, 31
	1000, 00

Die *Lymphgefäfse* entstehen überall im Umhüllungs- und Organenzellgewebe, sowohl in der Substanz, als an der Oberfläche der Organe; und laufen im Allgemeinen in ziemlich gerader Richtung gegen das Herz hin, welches sie aber nicht erreichen, sondern in das System der Körpervenen sich einsenken. Der Anfang eines jeden Lymphgefäfses ist ein sehr kleines aus höchst feinem Zellstoff geformtes Bläschen oder Zellchen, welches sich in ein sehr enges durchsichtiges nur aus der innersten Gefäfshaut gebildetes Kanälchen verlängert: dieses anastomosirt alsbald mit den nächstgelegenen zarten Saugadern, und bildet mit ihnen sehr dichte Netze. Aus den Netzen gehen stärkere Lymphgefäfse hervor, die aber meistens einen Dm. von nur $^1/_{20}$‴ bis $^1/_5$ haben: diese laufen oft eine ansehnliche Strecke neben einander hin, bevor sie unter sehr spitzen Winkeln in dickere Stämmchen zusammenfliefsen; spalten sich alsdann oft von Neuem und vereinigen sich wieder. Im Allgemeinen begleiten sie die gröfseren Blutgefäfse, jedoch nicht vollkommen genau; und laufen an den meisten Stellen des Körpers, vorzüglich an den Gliedmafsen, einestheils in der Tiefe zwischen den Organen neben den ansehnlicheren Arterien- und Venenstämmen, anderntheils aber im Unterhautzellgewebe neben den Venae subcutaneae; sie lassen sich daher oft als Vasa lymphat. profunda und superficialia oder subcutanea unterscheiden. Im fortgesetzten Laufe tre-

en sie jedesmal durch Lymphknoten oder Lymphdrüsen, nd sammeln sich zuletzt in einem in der linken Hälfte es Stammes aufsteigenden Hauptstamm, Truncus sinister asorum lymphaticorum s. Ductus thoracicus, Brustgang — nd in einen oder zwei kleineren Stämmen in der rechten Körperhälfte, Trunci dextri vas. lymph. Beide sind im Verhältnifs zu den grofsen Blutgefäfsstämmen sehr eng; ler erstere hat 1‴ im Dm., der leztere ist noch enger, und zerfällt überdies oft in mehrere kleinere Stämmchen: ie münden in der Nähe des Herzens in grofse Venen. Ein kleiner Theil der Lymphgefäfse, namentlich der in der Bauchhöhle verlaufenden, gelangt aber nicht zu jenen beiden Hauptstämmen des Lymphgefäfssystems, sondern senkt ich schon früher in Capillarvenen ein (nach Meckel s. u. . Fohmann, Lippi, Geoffroy St. Hilaire, Cuvier u. a). Das Lymphgefäfssystem steht also mit dem Venensystem in der nächsten Verbindung, und ist wie dieses durch den ganzen Körper verbreitet; die einzelnen Saugadern übertreffen an Anzahl bei weitem die Blutadern, stehen ihnen aber an Dicke so sehr nach, dafs das ganze Saugadersystem wahrscheinlich weit weniger geräumig ist, als das Venensystem.

Hinsichtlich der Textur sind die Lymphgefäfse den Venen sehr ähnlich, und bestehen nur aus der innersten nd der äufseren Gefäfshaut von solcher Zartheit, dafs elbst die gröfseren Lymphgefäfse durchsichtig sind: jedoch zerreifsen diese dünnen Häute nicht leicht, und sind verhältnifsmäfsig stärker, als die der Venen; daher sie eine bedeutende Ausdehnung ertragen können. Die innerste Gefäfshaut bildet noch zahlreichere paarweise stehende Klappen; oberhalb eines jeden Klappenpaares erweitert sich die Saugader etwas, so dafs sie im angefüllten Zustande ein knotiges Ansehen enthält.

Die Lymphknoten oder Lymphdrüsen, Ganglia lymphatica s. Glandulae lymphaticae s. conglobatae, liegen an bestimmten Stellen des Körpers, gemeiniglich haufenweise in veränderlicher Anzahl, locker in fettreiches Zellgewebe eingehüllt; und hängen durch Lymphgefäfse, die von einem zum andern gehen, zusammen. Es sind länglich runde etwas plattgedrückte Körper, 1‴ bis höchstens 1″ lang, aber weniger breit, nur die kleinsten sind kreisrund und

von der Gröfse und Gestalt einer Erbse oder Linse: haben eine grauröthliche oder braunrothe oder schwarze Farbe, sind ziemlich hart und glatt; erhalten viele kleine, aber im Verhältnifs zu ihrer Gröfse ansehnliche Blutgefäfse, aber keine sichtbare Nerven, obgleich nicht selten eine Lymphdrüse von einem Nerven durchbohrt wird. Die Oberfläche des Lymphknoten wird von einer dünnen festen Zellhaut gebildet; unter dieser liegt das Gewebe, welches im Wesentlichen aus einem Knauel von Lymph- und Blutgefäfsen besteht. Jede Lymphdrüse dient nämlich zum Vereinigungspuncte mehrerer Lymphgefäfse, welche an einer Seite derselben eintreten, *Vasa lymph. inferentia*: diese verästeln sich im Innern der Drüse, bilden Windungen und Knauel, und fliefsen noch innerhalb derselben wieder zusammen: werden aber zugleich von einem Netz der in sehr zarte Capillargefäfse sich auflösenden Blutgefäfse überall umsponnen: und hier kann ein Übergang der Flüssigkeiten aus den Lymphgefäfsen in venöse Capillargefäfse, wahrscheinlich durch wirkliche Anastomose dieser Gefäfse, Statt finden. Endlich treten die Saugadern wieder aus der Drüse hervor als *Vasa lymph. efferentia*, welche immer in geringerer Anzahl vorhanden, aber stärker sind, als die Vasa lymph. inferentia, und setzen ihren Lauf in der Richtung zum Herzen fort: treten aber sehr häufig von Neuem durch einen anderen Lymphknoten.

Die Lymphe, Lympha, von welcher die meisten Saugadern angefüllt werden, ist eine dünne klare farblose oder blafsgelbe Flüssigkeit, aus welcher beim Gerinnen ein sehr kleines weifslich durchsichtiges Crassament aus Faserstoff sich absetzt. Sie enthält in 1000 Theilen

Wasser	959, 8
Faserstoff	2, 7
Eiweifs, Chlornatrium u. a. Salze	37, 5
	1000, 0

Über den Chylus, welcher in den Saugadern des Darmkanals und im Truncus sinister vas. lymph. sich vorfindet, s. spec. Anat. Verdauungsapparat.

Das Gefäfssystem des männlichen Körpers ist stärker und dicker in Gewebe und Bau, als das des weiblichen

Körpers. In der Ramification und Lauf der Gefäfse finden sich häufige Varietäten; diese werden an kleinen Venen und Lymphgefäfsen öfterer bemerkt, als an kleinen Arterien: dagegen weichen die grofsen Arterien häufiger vom regelmäfsigen Zustande ab, als die ansehnlicheren Venenstämme.

Nervensystem.

Das Nervensystem besteht aus einem gröfseren, theils eiförmigen, theils cylindrischen, in der Schädel- und Rückgratshöhle eingeschlossenen Organe, dem Hirn oder Gehirn und dem Rückenmark: — und aus einer grofsen Anzahl durch den ganzen Körper vertheilter weicher weifser Fäden und Stränge, den Nerven. Das Hirn und Rückenmark bilden den Mittelpunkt, den Centraltheil des ganzen Nervensystems, im Gegensatze zu den Nerven, welche im Allgemeinen der Oberfläche des Körpers näher liegen, und daher als peripherischer Theil des Nervensystems angesehen werden.

Alle diese Theile bestehen aus der weichen breiartigen unelastischen Nervensubstanz, *Substantia nervea*, die aber nicht überall dasselbe Ansehen hat. Der gröfste Theil der Nervensubstanz ist von rein weifser, nicht glänzender Farbe, an einigen Stellen auch gelblich gefärbt: man nennt sie *Nervenmark* oder Marksubstanz, *Substantia medullaris* s. alba. Ein anderer Theil ist von etwas weicherer Consistenz und von grau röthlicher, stellenweise auch schwärzlicher, Farbe; d. i. die *graue Nervensubstanz*, *Substantia cinerea*. Beide Abarten der Nervensubstanz bestehen aus sehr kleinen durch eine zähe einförmige durchsichtige Masse zusammengeklebten Kügelchen, Globuli nervei. Diese sind vollkommen sphärisch, haben gröfstentheils einen Dm. von $^1/_{640}$‴ bis $^1/_{800}$‴; jedoch kommen auch einzelne noch kleinere oder etwas gröfsere vor; und zwischen ihnen bemerkt man häufig noch rundlich eckige unregelmäfsige Klümpchen von ungefähr $^1/_{260}$‴ Dm., welche aber aus mehrern der kleinen Kügelchen zu bestehen scheinen. Die Kügelchen trennen sich leicht von der zähen in Wasser auflöslichen Masse, und erscheinen einzeln betrachtet hell und durchsichtig, haufenweise beisammen aber weifs. In der grauen Sub-

stanz liegen sie ohne Ordnung neben einander; in der Marksubstanz aber ordnen sie sich in Reihen, und bilden dadurch die einfachsten Nervenfäserchen, *Fibrillae nerveae*, von denen die kleinsten rund sind und nur aus einer Reihe Kügelchen bestehen; die gröfseren aber von höchstens $^1/_{400}$‴ Dm. aus mehren nicht genau in einer Reihe geordneten Kügelchen zusammengesetzt sind. In manchen Fibrillen erscheinen die Nervenkügelchen einzeln, einander nicht berührend; in andern aber an einander stofsend und beinahe zusammenfliefsend. — Eine grofse Anzahl solcher Fibrillen legen sich parallel an einander, werden von einer dünneren oder dickeren Lage der zähen Masse umgeben und zusammengeklebt, und bilden dadurch abgerundet eckige Nervenfasern, *Fibrae nerveae* von $^1/_{160}$‴ bis $^1/_{108}$‴ Dicke: und indem solche Fasern theils parallel theils schräg durchkreuzt und verflochten zusammentreten, entstehen plattrundliche Nervenfäden, und kleinere und gröfsere Bündel, *Filamenta* und *Fasciculi*. Die Fäden und Bündel werden stets von einer deutlichen Schichte Zellstoff eingehüllt, welcher im Centralorgane sehr zart und weich, in den Nerven aber beträchtlich stärker ist.

Die Nervensubstanz enthält an

Wasser	800, 0
Eiweifs	70, 0
Hirnfett { Stearin 45, 3 / Elain 7, 0 } . . .	52, 3
Phosphor	15, 0
Fleischextracte	11, 2
Phosphorsaure Salze, Schwefel, (Säuren?)	51, 5
	1000, 0

Das Centralorgan des Nervensystems, Centrum encephalospinale, zerfällt in den in dem Kanal der Wirbelsäule hangenden Theil, das *Rückenmark, Medulla spinalis*; und in dem in der Schädelhöhle ruhenden Theil, *das Hirn, Encephalon:* beide hangen aber ununterbrochen mit einander zusammen, und sind sehr symmetrisch gebauet, indem der gröfste Theil ihrer Masse zwei völlig gleiche Seitenhälften bildet, welche durch tiefe Spalten geschieden, aber durch mehrere in der Mittellinie liegende Theile, die man im

llgemeinen *Commissuren* nennt, verbunden werden. — Das *ückenmark* ist aus zwei halbcylindrischen durch einen chmalen Streifen verbundenen Seitenhälften zusammenge-etzt; sein Umfang besteht gänzlich aus Marksubstanz; n Innern enthält es einen verhältnifsmäfsig kleinen aus rauer Substanz gebildeten Kern. In der Marksubstanz der eitenhälften liegen die Fasern und Bündel ziemlich parallel er Länge nach, und sondern sich in jeder Seitenhälfte in inen vordern, mittleren oder seitlichen, und hinteren *Haupt-trang*. Diese Sonderung ist weniger deutlich am unteren nde des Rückenmarks, woselbst nicht allein die Stränge, ondern sogar die Seitenhälften zusammenfliefsen, dagegen t sie am deutlichsten am oberen länglichrundlichen Ende es Rückenmarks, dem sogenannten *verlängerten Mark*, *Me-ulla oblongata*, oder Markknopf, Bulbus rhachidicus: wel-hes aber innerhalb der Schädelhöhle liegt, und daher ge-neiniglich zum Encephalon gerechnet wird.

Das Encephalon besteht aus dem *grofsen Gehirn*, *Cere-rum*, dem *kleinen Gehirn*, *Cerebellum*, und dem *Mittelgehirn*, *Mesencephalon*. Letzteres begreift drei zusammenhangende n der Mittellinie liegende Körper, nämlich das *verlängerte Mark*, *Medulla oblongata*, den *Hirnknoten* oder die *Brücke*, *Vodus cerebri* s. *Pons Varolii*, und die *Vierhügel*, *Eminentia uadrigemina*. Es nimmt zunächst die drei Stränge einer eden Seitenhälfte des Rückenmarks auf, von welchen die ittleren fast gänzlich in der Eminentia quadrigemina en-igen, die hinteren aber zum kleinen Gehirn, die vorderen um grofsen Gehirn dringen: und verbindet, theils durch iese longitudinellen Stränge, theils durch Bündel von Queerfasern, das grofse und kleine Gehirn und das Rücken-nark auf das Genaueste mit einander. — Das *kleine Ge-irn* besteht aus zwei ungefähr halbkugelförmigen Seiten-älften, *Hemisphaerae cerebelli*, welche durch einen mittleren Körper, den sogen. *Vermis*, und aufserdem durch das Mes-encephalon zusammengehalten werden. Sowohl die Hemi-sphären als der Vermis enthalten einen aus Marksubstanz gebildeten Kern, welcher nach der Peripherie hin in ein-zelne Blätter sich theilt, die von einer Schichte grauer Substanz (hier Rindensubstanz, Subst. corticalis, genannt) umgeben und belegt werden: die grauen freien Ränder die-

ser Blätter erscheinen auf der Oberfläche des Cerebellum als schmale Windungen, Gyri genannt. Durch die hinteren Stränge des Rückenmarks, welche in den Kern der Hemisphären eindringen, hängt das kleine Gehirn ununterbrochen mit dem Rückenmark zusammen; dagegen steht es mit dem grofsen Gehirn nur durch das Mesencephalon, vorzüglich durch die Eminentia quadrigemina, in Verbindung. — Das *grofse Gehirn* ist der ansehnlichste und wichtigste Theil des Centralorgans und des ganzen Nervensystems überhaupt. Es zerfällt in zwei ungefähr halbeiförmige Seitenhälften, *Hemisphaerae cerebri*, welche durch eine sehr tiefe Spalte getrennt, und von einer grofsen Anzahl verschiedentlich gestalteter und benannter Commissuren zusammengehalten werden. Im Inneren enthält die Hemisphäre einen ansehnlichen Markkern, *Centrum semiovale*, welcher theils aus longitudinal aufsteigenden und divergirend sich ausbreitenden ansehnlichen Bündeln von Nervenfasern, theils aber aus queerlaufenden mit den ersteren sich durchkreuzenden und verwebenden Bündeln besteht. Die Longitudinalbündel sind unmittelbare Fortsetzungen des vorderen Hauptstrangs des Rückenmarks, welcher, bei seinem Durchgange durch das Mesencephalon sich verstärkend, eine Art von Stiel oder Stamm, *Pedunculus* s. Caudex, bildet, auf welchem die ganze Hemisphäre sich erhebt, und aus welcher sie grofsentheils sich entwickelt. Die Queerbündel gehören dagegen grofsentheils den Commissuren an. Von dem Markkern aus verbreiten sich, wie bei dem kleinen Gehirn, gewundene Blätter nach allen Richtungen, welche von einer Schichte grauer Substanz, (Subst. corticalis) umgeben werden, und auf der Oberfläche der Hemisphären als breite unregelmäfsig gewundene Gyri cerebri erscheinen. In den Zwischenräumen zwischen dem Kern der Hemisphären und den Commissuren, und auch an anderen Stellen des Encephalon überhaupt, liegen aufserdem rundliche aus grauer und weifser Substanz zusammengesetzte Körper, sogenannte *Hirnganglien.*

Das ganze Encephalon enthält mehrere unter einander zusammenhangende Höhlen, *Ventriculi cerebri,* die mit der Oberfläche an gewissen Stellen durch die Hirnspalten, Fissurae cerebri, in Verbindung stehen. Die Oberflächen

nd Höhlen des ganzen Centrum encephalo-spinale werden on den Hirnhäuten, *Menin gs,* bekleidet, nämlich von ei- er Gefäfshaut, Pia mater s. pia meninx, weicher Hirnhaut; on einer serösen Haut, Tunica arachnoidea, Spinnweben- aut; und von einer starken fibrösen Haut, Dura mater s. l. meninx, harter Hirnhaut, welche eine ziemlich vollstän- lig geschlossene und verhältnifsmäfsig weite Höhle um das- elbe bildet. Das Encephalon und Rückenmark, vorzüglich las erstere, erhalten eine sehr ansehnliche Blutmenge; die röfseren blutführenden Gefäfse sind durch ihre Lage oder durch Einschliefsung in die Dura mater also angeordnet, lafs sie keinen Druck auf die Nervenmasse ausüben kön- nen: sie gehen sehr schnell durch Spaltung in kleinere Gefäfse und feine Capillargefäfsnetze über, welche vorzüg- ich in der grauen Substanz sich verbreiten, dagegen die Marksubstanz mehr blutarm ist.

Der *peripherische Theil des Nervensystems* zerfällt in wei Abtheilungen, die Hirn-Rückenmarksnerven, Nervi ncephalo-spinales, und das Gangliensystem, Systema gang- iosum.

Die *Nervi encephalo-spinales* sind weifse, weiche, dün- nere und dickere Stränge, aus Fibrillen, Fasern, Fäden und Bündeln bestehend, welche regelmäfsig und symmetrisch in der rechten und linken Körperhälfte vertheilt sind. Die einen aus parallelen und genau an einander liegenden Ner- venfasern zusammengesetzten Fäden vereinigen sich, theils durch einfaches Aneinanderlegen, theils durch Verschlingung und Durchkreuzung, zu dickeren Bündeln; und setzen, je nach der verschiedenen Anzahl der Fäden und Bündel, dün- nere oder dickere Nerven zusammen. Das feinste Filament, so wie das dickste Bündel, erhält seine eigene aus feinem Zellstoff gebildete röhrenförmige Scheide, durch welche es isolirt, aber zugleich mit den nächstbenachbarten zusam- mengeklebt wird: in den dickeren Bündeln bildet überdies die röhrenförmige Scheide platte gegen den Mittelpunkt des Bündels hingerichtete Scheidewände, zur besseren Unterstü- tzung der Nervenfasern. Auch der ganze Nerv wird von einer dickeren und glänzenden zellstoffigen Röhre umgeben, welche die einzelnen Bündel und meistens auch zugleich etwas freies Fett einschliefst, und durch ihren allmähligen Übergang in

das Umhüllungszellgewebe die Lage der Nerven sichert. Diese ganze Hülle des Nerven, nämlich die äufsere stärkere und die zahlreichen feineren inneren Röhren, nennt man die *äufsere* und *innere Nervenscheide, Neurilema.* Sie ertheilt dem ganzen Nerven Elasticität und Contractilität — Eigenschaften, welche sein Mark allein nicht besitzt —: und nimmt die verhältnifsmäfsig zahlreichen obgleich kleinen ernährenden Blutgefäfse auf, welche in dem äufseren Neurilema zuerst sich verästeln, und sodann aufwärts und abwärts zwischen die Bündel und Fäden eindringen, oft auch in der Mitte eines Bündels verlaufen, und bald in weitmaschige Haargefäfsnetze übergehen. — Durch die im Allgemeinen parallel laufenden Bündel erscheint die Oberfläche der Nerven der Länge nach gefurcht; aufserdem bemerkt man sehr flache spiralförmige Queerfalten des Neurilema, welche durch Ausdehnung verschwinden.

Man zählt 43 *Paare* solcher Hirn-Rückenmarksnerven, und unterscheidet an jedem derselben den Stamm, das Centralende, und das peripherische Ende. Der Stamm ist der dickere, meistens kurze, ungetheilte Strang, welcher in der Nähe des Centralorgans liegt. Öfters findet man an ihm eine rundliche oder platte graue knotige Anschwellung, durch welche der ganze Stamm, oder nur eine Seite desselben, verdickt erscheint. Man nennt einen solchen Knoten ein *Stammganglion.* In demselben verflechten und verschlingen sich die eigenen Nervenfäden und Fasern des Stammes vielfach mit einander und mit andern neu hinzutretenden Fäden des Gangliensystems; wobei diese Fäden innerhalb des Ganglions von einem grauröthlichen und Nervenkügelchen enthaltendem Zellgewebe umgeben werden. — Das eine Ende dieses Stammes steht mit dem Encephalon oder dem Rückenmark in unmittelbarer Verbindung, und wird daher das *Centralende* oder die *Wurzel* des Nerven genannt, indem man diese Nerven als vom Centralorgane entspringend zu betrachten pflegt. Eine solche Wurzel liegt mehr oder weniger tief in dem Gehirn oder Rückenmark verborgen, gewöhnlich in unmittelbarer Berührung mit grauer Substanz; und besteht meistens aus mehreren Bündeln, welche, so weit sie innerhalb der Schädel- oder Rückgratshöhle liegen, noch von den Hirnhäuten umgeben wer-

den. Ohne Rücksicht auf die Zahl der Bündel, nennt man die Wurzel einfach, wenn alle ihre Bündel mit einem und demselben Theile des Centralorgans in Verbindung stehen: doppelt aber, wenn sie an zwei verschiedenen Theilen, z. B. den vorderen und den hinteren Strängen des Rückenmarks, ihren Anfang nimmt. Auch an den Wurzeln findet man oft Knoten, *Wurzelganglien*, welche dieselbe Beschaffenheit haben, wie die Stammganglien, und gleichfalls Zeichen der Verbindung eines Nervus encephalo-spinalis mit dem Gangliensysteme sind.

Das *peripherische Ende* der Nerven geht zu den Organen, welche durch die Nerven mit dem Centralorgane des Nervensystems in Verbindung gesetzt werden sollen. Dieses Ende breitet sich zuweilen hautförmig aus, und bildet eine sogen. *Nervenmarkhaut:* gewöhnlich aber spaltet es sich in gröfsere Äste, die sich in immer kleinere Zweige theilen. Schon in den Stämmen liegen die Äste, und in den Ästen die kleineren Zweige, deutlich von einander getrennt, jeder von seinem eigenen Neurilema umgeben, obgleich noch in dem äufseren Neurilema des Stammes oder der gröfseren Äste eingeschlossen. Gemeiniglich laufen die Äste in der kürzesten Richtung zu den Organen hin, von schlaffem Zellgewebe umgeben und leicht geschlängelt, so dafs sie bei den Bewegungen nicht gezerrt werden können; seltener machen sie Biegungen und Umwege. Häufig vereinigen sich Äste zweier benachbarter Nerven mit einander oder mit einem Stamme: diese Vereinigung, *Nervenschlinge* oder *Ansa* genannt, geschieht meistens unter einem spitzen Winkel, zuweilen auch bogenförmig. Indessen findet nicht immer in einer solchen Ansa eine vollkommene Verschmelzung des Markes beider Nerven Statt; sondern die Vereinigung ist zuweilen nur scheinbar, indem beide Nerven eine gewisse Strecke lang in einem gemeinschaftlichen Neurilema laufen, und alsdann sich wieder von einander trennen. Eine netzähnliche Verbindung mehrerer Nervenäste vermittelst mehrerer Ansae wird ein *Nervengeflecht, Plexus nervosus*, genannt. Sowohl aus einer Ansa als aus einem Plexus können untergeordnete von Neuem in Äste sich theilende Nerven erwachsen, die alsdann zweien oder mehreren verschiedenen Nervenpaaren ihre Entstehung

verdanken. Die letzte Endigung der in immer feinere Zweige sich auflösenden Nerven ist noch nicht mit Sicherheit bekannt; wahrscheinlich aber, wenigstens in vielen Organen, bilden die feinsten dem bloſsen Auge nicht mehr erkennbaren Zweige durch Umbeugung einfache Schlingen, mit welchen sie kleine Theilchen der Organe umfassen.

Das Gangliennervensystem besteht aus einer sehr groſsen Anzahl einzelner freiliegender Nervenknoten, *Ganglia nervosa composita*, welche durch eine Menge dünner Nerven unter einander und mit den Hirn-Rückenmarksnerven zusammenhangen, und aus welchen zahlreiche feine Nerven zu den Organen gehen. Diese *isolirten Ganglien* sind grauröthliche ziemlich harte Körper von verschiedener meistens plattrundlicher Gestalt, welche an bestimmten Stellen in fettreiches Zellgewebe eingesenkt liegen. Von verschiedenen Seiten treten in dieselben Nerven ein, welche im Innern des Ganglions in platte weiche Bündel und Fäden sich auflösen, mit einander verschmelzen, und von einer grauröthlichen, weichen, aber zähen Masse umgeben werden; diese besteht aus Zellgewebe, vielen kleinen Blutgefäſsen, Nervenkügelchen und Fettbläschen. Äuſserlich wird das Ganglion von einer festen Zellhaut umgeben. An anderen Seiten des Ganglion treten wiederum Nerven hervor, welche zu den Organen sich begeben. Auf solche Weise bildet jedes Ganglion einen Centralpunkt für eine gröſsere oder geringere Anzahl von Nerven, welche innerhalb desselben eine sehr innige Verbindung eingehen. Die zum Gangliensystem gehörenden Nerven bestehen meistens aus einem einfachen, von einem verhältniſsmäſsig dicken Neurilema umgebenen, Bündel von Markfasern, zwischen welchen man oft eine geringe Menge der grauröthlichen Gangliensubstanz findet; daher auch diese Nerven weniger weiſs und weicher erscheinen, als die Hirn-Rückenmarksnerven. Sie laufen mehr geschlängelt, als die letztgenannten, und vereinigen sich häufig unter einander durch Ansae und Ganglien, wodurch die *Gangliengeflechte, Plexus gangliosi*, enstehen. In ihrem Verlaufe zu den Organen begleiten sie meistens die Blutgefäſse, welche von ihnen netzartig umstrickt werden. Mit dem Centrum encephalo-spinale steht das Gangliensystem (mit Ausnahme sehr weniger und zarter Fäden) nicht

n unmittelbarer Verbindung; dagegen ist es mit fast allen Nervi encephalo-spinales durch dünne Zweige verknüpft. Man unterscheidet im Gangliensystem eine doppelte, längs der Wirbelsäule herablaufende Kette von Ganglien, die durch dünne, kurze Nerven vereinigt werden: die sog. Nervi sympathici: — und eine grofse Anzahl einzelner im Kopfe, am Halse, in der Brust- und Bauchhöhle zerstreuter, jedoch unter einander und mit den Nervi sympathici zusammenhangender Ganglien und Ganglienplexus, aus welchen Nerven für zusammengesetzte Apparate hervorgehen.

Das Encephalon, und vorzugsweise das grofse Gehirn, ist das Organ der Seele, der Sitz aller geistigen Thätigkeiten: das Rückenmark und die Nerven sind leitende Organe, durch welche jenes mit allen Theilen des Körpers in Verbindung gesetzt wird. Diese Leitung geht in den Hirn-Rückenmarksnerven in zwei verschiedenen Richtungen, von den Organen zum Hirn, und von dem Hirn zu den Organen hin, vor sich: und für jede Art von Leitung sind besondere Nervenfasern bestimmt. Die von den Organen zum Hirn leitenden Fasern sind *Empfindungsnervenfasern, Fibrae nerveae sensitivae*: sie pflanzen den Eindruck, den sie durch eine Reizung ihrer peripherischen Enden erfahren, bis zum Hirn fort, erregen daselbst eine Vorstellung von der Reizung; und verleihen auf solche Weise den Theilen, in welchen ihre peripherischen Enden verbreitet sind, die Empfindlichkeit, Sensibilität: — entweder eine allgemeine Empfindlichkeit für mehrere verschiedene Arten von Reizen; oder eine beschränkte eigenthümliche Empfindlichkeit für Reize ganz besonderer Art, z. B. für das Licht, den Schall, u. a. Der gröfste Theil dieser Empfindungsfasern sammelt sich in den hinteren Strängen des Rückenmarks und den Fortsetzungen derselben im Encephalon, welche als ihr Centralorgan anzusehen sind. — Die vom Hirn zu den Organen leitenden Fasern gehen nur zu den Muskeln, und reizen diese zu Zusammenziehungen, wodurch Bewegungen erfolgen; diese werden daher *Bewegungsnervenfasern, Fibrae nerveae motivae,* genannt. Die Bewegungsnervenfasern sind grofsentheils nur Leiter des Willens, und bringen willkührliche Bewegungen zu Stande; diese haben ihren Sammlungspunkt oder Ursprung in den vorderen Strängen des

Rückenmarks und deren Fortsetzungen im Encephalon. Ein anderer Theil der motiven Nervenfasern leitet nicht allein den Willen, sondern auch andere Seelenthätigkeiten, z. B. Affecte, Instinkt u. a., zu den Muskeln, und ruft dadurch Bewegungen hervor, die bald willkührlich, bald aber unwillkührlich (spontan, automatisch) erfolgen: — diese Art von Bewegungsnervenfasern hat die mittleren Stränge des Rückenmarks zum Vereinigungspunkt oder Ursprung. In den einzelnen Nerven und ihren Ästen und Zweigen sind aber in der Regel Empfindungs- und Bewegungsnervenfasern unter einander gemischt, indem sie entweder mittelst doppelter Wurzeln entspringen; oder mit einfacher Wurzel entsprungen, dennoch durch eine Verbindung mit anderen Nerven die bei ihrem Ursprunge noch fehlende Art von Nervenfasern alsbald zugemischt erhalten: jener Unterschied in der Wirkungsweise der Nerven zeigt sich rein und deutlich nur bei einzelnen wenigen Nervenstämmen, die gänzlich aus Empfindungsfasern bestehen, und an den Nervenwurzeln, vorzüglich an den doppelten. — Auch die Nerven des Gangliensystems sind aus Empfindungs- und Bewegungsfasern gemischt, und verleihen den Organen, in welchen sie sich verbreiten, Empfindung und Bewegung. Da aber das Gangliensystem, obgleich es dem allgemeinen Einflusse des Centrum encephalo-spinale nicht entzogen ist, dennoch mit demselben nicht in unmittelbarer Verbindung steht, so erregen die dasselbe treffenden Reize keine so deutliche Vorstellungen; und die Muskelbewegungen, welche es hervorbringt, sind der Willkühr gänzlich entzogen.

Unter der Bezeichnung des animalischen Nervensystems werden das Hirn, das Rückenmark und alle Nervi encephalo-spinales zusammengefafst, da das Hirn das Organ der geistigen Thätigkeiten ist, und die Hirn-Rückenmarksnerven vorzugsweise an die Organe der Sinne, der Stimme und Sprache, und der Ortsbewegung sich verbreiten. Diesem animalischen Nervensystem wird das Gangliensystem als vegetatives oder organisches Nervensystem entgegengesetzt, da es insbesondere für die Organe der Ernährung und Bereitung der Säfte bestimmt ist. Ein Unterschied, welcher nicht genau und streng durchgeführt werden kann.

Besondere Systeme.

Knochensystem.

Es besteht aus einer grofsen Anzahl einzelner fester Körper, den *Knochen* oder Beinen, *Ossa,* welche durch besondere, anderen Systemen angehörende Verbindungsmittel zu einem Ganzen verbunden sind, welches man das Knochengerüst, *Skelet, Sceleton* oder *Sceletus,* nennt. Dieses bestimmt überhaupt die Gestalt des menschlichen Körpers, dient allen übrigen Organen zur Stütze, bildet um einzelne derselben schützende Höhlen, und giebt feste Punkte und Hebelarme ab, welche durch die Muskeln bewegt werden. Es ist nach vollkommener seitlicher Symmetrie gebauet, so dafs die meisten Knochen paarweise vorhanden sind, und die unpaaren in der Mittellinie liegenden aus zwei zusammengeschmolzenen völlig ähnlichen Seitenhälften bestehen.

Die Knochen sind gelblich weifs, hart, fest, trocken, in sehr geringem Grade elastisch, unempfindlich. Sie enthalten eine festweiche, stark zusammenhangende, sehr elastische, halbdurchsichtige, von Gefäfsen durchzogene Materie, welche im kochendem Wasser schnell in Leim sich verwandelt: d. i. der sog. *Knochenknorpel* oder *Bildungsknorpel, Cartilago ossium formativa* s. ossescens: — und die, vorzüglich aus phosphorsaurem und kohlensaurem Kalke gemengte, sog. *Knochenerde,* welche den Knochenknorpel innigst durchdringt. Das Verhältnifs zwischen beiden ist nach Alter und Individualität verschieden, und vielleicht auch in den einzelnen Knochen nicht ganz gleich; gewöhnlich beträgt bei Erwachsenen der Knochenknorpel ungefähr $\frac{1}{3}$ der ganzen Knochenmasse. 100 Theile trockener Knochensubstanz enthalten:

Knochenknorpel	32, 17
Gefäfse	1, 13
Basisch phosphorsaure Kalkerde mit ein wenig Fluorcalcium	53, 04
Kohlensaure Kalkerde	11, 30
Phosphorsaure oder kohlensaure Talkerde	1, 16
Natron mit sehr wenig Kochsalz . .	1, 50
	100, 00

Im Gewebe der Knochen bemerkt man theils kurze, grobe und rauhe Fasern, meistens von $^1/_{22}$''' bis $^1/_9$''' Dm., welche nirgends in gröfseren Strecken parallel laufen, sondern mit den nächstgelegenen zusammenfliefsend sich netzartig verschlingen, und unregelmäfsige Zwischenräume und kurze gewundene Kanäle zwischen sich lassen: — theils aber kleine dünne Blättchen von irregulairer Gestalt, welche kleinere und gröfsere Zellen einschliefsen. Sowohl die Fasern als die Blättchen enthalten sehr enge Kanälchen für die ernährenden Haargefäfse, welche ein durch den ganzen Knochen zusammenhangendes, weitmaschiges Netz bilden. Je nachdem die Fasern und Blättchen dichter oder lockerer an einander liegen, erhält die Knochensubstanz eine verschiedene Form: man unterscheidet:

1. *dichte Knochensubstanz, Substantia ossium compacta,* welche überall den äufseren Umfang des Knochens, seine *Rinde* bildet, daher auch Substantia corticalis genannt wird: sie erscheint dem unbewaffneten Auge gleichförmig dicht, enthält aber zahlreiche Kanälchen und Zellchen, meistens von $^1/_{40}$''' Dm.

2. *lockere, schwammige Knochensubstanz, Substantia ossium spongiosa*; in dieser lassen die Fasern und Blättchen gröfsere Räume, unregelmäfsige mit einander communicirende Zellchen zwischen sich, wodurch sie ein netzartiges oder zelliges Ansehen erhält (Subst. oss. reticularis und cellularis).

Die dichte Knochenrinde verleihet vorzüglich dem Knochen seine Festigkeit, die schwammige Knochensubstanz aber eine gröfsere Leichtigkeit ohne Verminderung seines Umfang.

Die äufsere Fläche der Knochen wird von einer sehnenfaserigen (fibrösen) Haut überzogen, *Beinhaut, Periosteum,* genannt. Diese ist an einigen Knochen dick und rauh, an anderen dünn und glatter; hängt an den rauhen Stellen der Knochen fester, als an den glatten; bekleidet aber nicht diejenigen Enden und Flächen, vermittelst welcher die Knochen unmittelbar einander berühren, sondern springt hier, indem sie meistens in die Gelenkbänder übergeht, von einem Knochen zum andern über. Sie ist mit den Knochen durch kurzes Zellgewebe, durch einzelne Schnenfasern,

elche in die Vertiefungen und Kanälchen der Rinde ein-
ringen, und durch Gefäfse verbunden. Sie enthält nämlich
ie zur Ernährung der Knochen bestimmten Gefäfse, *Vasa*
utritia ossium, welche zum Theil schon in dieser Haut
ich verästeln, und durch zahlreiche Löcher an der Ober-
äche der Knochen, *Foramina nutritia* in denselben eindrin-
en. Die kleineren Arterien für die compacte Substanz
erbreiten sich sogleich in den Kanälchen der Rinde; grö-
sere Arterien für die schwammige Substanz und vorzüglich
ir das Knochenmark durchdringen die ganze Rinde, und
erästeln sich erst im Innern des Knochens. Die gröfseren
enen verlaufen in vielen Knochen durch besondere, platte,
ewundene Kanäle und Löcher. Diese Blutgefäfse sind zahl-
eich und ziemlich ansehnlich; dagegen haben sehr wenige
ymphgefäfse und Nerven nur bis in die Beinhaut verfolgt
erden können, obgleich sie höchstwahrscheinlich in den
nochen selbst und bis zu seinem Marke eindringen. Die
nochensubstanz an sich besitzt durchaus keine Empfind-
ichkeit.

Das Innere des Knochens, nämlich die gröfseren und
leineren Zellen der schwammigen Substanz, und zum Theil
uch die gröfseren Kanälchen der Knochenrinde, sind von
reiem Fett angefüllt, dem *Knochenmark, Medulla ossium.*
Dieses besteht aus kleineren und gröfseren Fettbläschen,
elche in eine äufserst dünne durchsichtige Zellhaut, die
Knochenmarkhaut, Membrana medullaris, eingeschlossen sind.
n den gröfseren Knochenzellen ist die Markhaut deutlicher,
nd das Mark fester, gelblich, dem Zellgewebsfett ähnlich;
n den kleinen Zellchen ist die Markhaut höchst zart, das
Mark mehr flüssig und röthlich, und scheint nur aus einem
nit Öltropfen vermengten Blutwasser zu bestehen. In dem
Marke verästeln sich die gröfseren Vasa nutritia, indem sie
heils auf der Markhaut in Capillargefäfsnetze sich auflösen,
heils in die schwammige Knochensubstanz selbst eindrin-
gen; überall aber vom Mark umhüllt und geschützt wer-
len; worin der vorzüglichste Nutzen des Markes zu be-
tehen scheint.

Hinsichtlich der äufseren Gestalt der Knochen unter-
cheidet man lange oder *Röhrenknochen, Ossa longa s. cy-*
lindrica, breite oder platte *Knochen, Ossa lata s. plana,*

und *kurze* unregelmäfsig geformte Knochen, *Ossa brevia s. multiformia.*

Die Röhrenknochen haben ein längliches, mehr oder weniger dreiseitiges Mittelstück, Corpus s. Diaphysis, mit dicker Rinde und einer inneren gröfseren Markhöhle; ihre Enden, Extremitates s. Apophyses, sind dicker, als das Mittelstück, und enthalten mehr Substantia spongiosa. Die platten Knochen sind dünn, breit, gebogen; ihre Rindensubstanz bildet zwei Tafeln, zwischen welchen eine dünne Lage schwammiger Substanz, hier gemeiniglich *Diploë* genannt, sich befindet. Die kurzen Knochen sind mehr oder weniger rundlich oder würfelförmig; oder sie sind aus länglichen, platten und unregelmäfsig gestalteten Knochenstücken zusammengesetzt; sie besitzen eine sehr dünne Rinde, die im Innern ganz mit Substantia spongiosa ausgefüllt ist. Meistens liegen sie in gröfserer Anzahl neben einander.

Aufser dieser allgemeinen Gestaltung der Knochen, aufser ihren Flächen, Superficies, ihren Rändern, Margines, ihren Winkeln, Anguli — betrachtet man noch die Erhabenheiten und Vertiefungen, durch welche ihre äufseren Flächen uneben werden, aber an Ausdehnung gewinnen. Erstere heifsen im Allgemeinen Fortsätze, Processus s. Apophyses; erhalten aber nach ihrer Gestalt besondere Namen. Tubera sind rauhe mit breiter Basis aufsitzende gröfsere Höcker; Tubercula kleinere solche Höcker; Spinae — dünne spitzige Stacheln; Lineae — rauhe wenig hervorragende Linien; Cristae, Kämme oder Leisten — schärfere stärker hervorspringende Linien oder Ränder. Spinae und Cristae werden häufig verwechselt. Ein glatter zur Bildung eines Gelenks beitragender Vorsprung wird ein Gelenkkopf, Caput, genannt, wenn er halbkugelförmig ist; dagegen Gelenkknopf oder Gelenkknorren, Condylus, wenn er mehr platt ist; der dünnere Theil, auf welchem ein Gelenkknopf oder ein Gelenkknorren sitzt, heifst ein Knochenhals, Collum. Eine grofse Vertiefung oder Grube nennt man Fossa, ein kleines flaches Grübchen Fovea oder Fossula; dringt sie tief zwischen Knochenwände ein, so heifst sie eine Höhle, Antrum, Sinus. Ist die Vertiefung zur Aufnahme eines Caput oder Condylus bestimmt, so heifst sie Fossa s. Cavitas gle-

oidea, Gelenkgrube, und wenn sie besonders tief ist, Fossa tyloidea. Sulcus ist eine längliche Vertiefung, Incisura t ein Ausschnitt an einem Knochenrande. Eine Öffnung, elche den Knochen vollkommen durchdringt, heifst Fissura, enn sie eine längliche Spalte — Canalis, wenn sie einen ngeren Gang — Foramen, wenn sie ein kurzes Loch bil- et. Die speciellen Benennungen dieser Erhabenheiten und ertiefungen werden von ihrer Gestalt, Ähnlichkeit mit nderen Gegenständen, Lage und Beziehung zu benachbar- n Theilen u. a. m. entnommen. —

Weibliche Knochen sind im Allgemeinen dünner und rundlicher: re Ecken und Fortsätze springen weniger scharf hervor. —

Die Verbindung der Knochen wird theils durch die ei- enthümliche Gestalt der Knochenenden, deren Erhabenheiten nd Vertiefungen in einander greifen, vermittelt: theils urch besondere Zwischenkörper und Verbindungsmittel, norpel, Faserknorpel, Bänder. Ein sehr wichtiger Unter- chied zwischen diesen Verbindungsarten beruht darauf, ob ie Knochenenden möglichst nahe an einander fest liegen, der frei in einer von einer Synovialhaut gebildeten Höhle ich befinden. Die erste Art von Verbindungen ist völlig der beinahe unbeweglich, die letztere aber beweglich.

I. Die *unbewegliche Verbindung, Synarthrosis*, hat meh- ere Unterarten:

1. *Die Nath, Sutura*: die Ränder platter Knochen grei- en mit Zacken und Incisuren in einander, und werden urch eine dünne Knorpelschicht, den Nathknorpel, noch enauer vereinigt. Man unterscheidet: die *Sägennath, Sut. errata* mit kurzen in doppelter Reihe stehenden Zähnen; ie *Zahnnath, Sut. dentata* mit langen spitzigen Zacken; die Saumnath, *Sut. limbosa*, bei welcher die Knochenränder nit gröfseren Aus- und Einbiegungen, und diese wiederum nit kleineren Zacken versehen sind. Sind die Ränder nur auh ohne hervorspringende Zacken, so nennt man die Nath ine *falsche Nath, Sut. spuria;* und zwar eine *Schuppennath, Sut. squamosa*, wenn ein Knochenrand über den andern ich legt, — eine *Anlage, Harmonia*, dagegen, wenn zwei bei- nahe gerade Knochenränder sich an einander legen, und weniger durch Zacken, als durch Nathknorpel und durch Unterstützung anderer Knochen zusammenhaften. Bei den

Suturen aller Art überzieht die Beinhaut den Nathknorpel, geht über die Nath von einem Knochen zum anderen, und ist fester mit der Nath, als mit den Flächen der Knochen verbunden.

2. *Die Fuge, Symphysis*: zwischen zwei ebenen Knochenflächen liegt ein mit beiden innig verwachsener Faserknorpel (Fibrocartilago).

3. Die *Knorpelhaft, Synchondrosis*, wobei ein wahrer Knorpel (Cartilago) zwei Knochen ganz wie bei der Symphysis vereinigt.

Sowohl bei dieser, als bei der Symphysis, findet vermöge der Elasticität des Knorpels und Faserknorpels, welche sich zusammendrücken und etwas ausdehnen lassen, ein geringer Grad von Beweglichkeit Statt: diese ist um so gröfser, je dicker und weicher der Knorpel oder Faserknorpel ist, erreicht aber nie die Beweglichkeit eines Gelenks. Bei gleich grofser Beweglichkeit ist die Symphysis stärker als die Synchondrosis.

4. *Die Bandhaft, Syndesmosis:* bei dieser werden zwei dicht aneinanderliegende Knochen durch kurze straffe Bänder vereinigt.

Die Einkeilung eines zapfenförmigen Körpers in eine knöcherne Höhle, Gomphosis, ist die Verbindung zwischen Knochen und den nicht zum Knochensystem gehörenden Zähnen.

II. Die bewegliche Knochenverbindung, das *Gelenk*, Diarthrosis, *Articulatio*, Junctura, ist verschieden nach der Art und dem Grade der Beweglichkeit, die von der Gestalt der verbundenen Knochenenden und der Verbindungsmittel abhängt. Letztere sind Gelenkknorpel, Cartilagines articulares, Knorpelscheiben, welche die Gelenkenden der Knochen überziehen: — Zwischenknorpel, Cartilagines interarticulares, Faserknorpelscheiben, welche zwischen den Gelenkflächen zweier Knochen frei liegen: — Kapselbänder, Ligamenta capsularia, aus einer Synovialhaut und einem sehnenfaserigen Blatte gebildet, welche an beide Knochen geheftet einen weiteren Sack, die Gelenkkapsel, um ihre Gelenkenden bilden und die Gelenkhöhle umschliefsen: — und Hülfsbänder, Ligamenta accessoria, welche innerhalb

der aufserhalb der Gelenkhöhle von einem Knochen zum nderen gehen.

1. *Freies Gelenk, Arthrodia,* mit Beweglichkeit nach ehreren verschiedenen Richtungen. Es gehört dazu ein rofser Gelenkkopf oder Knopf an dem einen, und eine undliche Gelenkgrube an dem anderen Knochen. Die Beeglichkeit ist um so ausgedehnter, je näher der Halbkuelgestalt und je gröfser der Gelenkkopf oder Gelenkknopf n Verhältnifs zu der ihn aufnehmenden kleineren Gelenkrube ist. Man unterscheidet beschränkte und freie Arrodien: bei der ersteren findet eine Bewegung nach wenigstens vier Richtungen Statt, die aber nicht gleich usgedehnt zu sein pflegen: bei der freien Arthrodie der dem Nufsgelenk, Enarthrosis, kann der nach allen eiten hin in grofser Ausdehnung bewegliche Knochen auch m seine eigene Axe gedreht werden.

2. *Gewinde, Ginglymus,* Charnier- oder Gewerbgelenk. Die Bewegung geschieht nur in den beiden Richtungen der Beugung und Streckung. Gewöhnlich hat das Gelenkende es einen Knochen die Gestalt einer halben Rolle, Trochlea ssea, nämlich die eines queerliegenden in der Mitte vertieften Halbcyclinders; die Gelenkfläche des anderen Knochens esitzt dagegen eine Erhabenheit in der Mitte und zwei Vertiefungen an den Seiten. Seltener ruhet der eine Knohen in einer Gelenkgrube des anderen, und wird von wei an der Seite der letzteren hervorspringenden Fortsäzen eingeklemmt. Die accessorischen Bänder liegen bei em Ginglymus vorzüglich an den Seiten des Gelenks, nach welchen keine Bewegung Statt findet.

3. *Drehgelenk, Rotatio,* Trochoïdes. Ein auf dem anern ruhender Knochen dreht sich zur Hälfte um seine xe, ohne übrigens seine Richtung zu verändern: dieser st stets in einen vollständigen, von der Gelenkfläche des nderen Knochens, und einem Ligamente gebildeten, Ring ingeschlossen.

4. *Straffes Gelenk, Amphiarthrosis,* Arthrodia plana. lach convex-concave Gelenkflächen werden durch kurze tarke accessorische Bänder so fest aneinander gehalten, dafs ie zwar nach mehreren Richtungen, jedoch nur wenig, an inander hin und her gleiten können.

Knorpelsystem.

Der *Knorpel, Cartilago,* Chondros, ist fest und hart, jedoch weicher als der Knochen, so dafs er leicht mit dem Messer sich schneiden läfst; trocken, glatt, von milchweifser öfters leicht bläulicher oder gelblicher Farbe; in dicken Stücken undurchsichtig, in dünnen Blättern durchscheinend. Er besitzt grofse Elasticität, welche sich vorzüglich bei angebrachtem Drucke äufsert; dagegen er bis zu einem gewissen Grade gebogen gerade durchbricht. Der Luft ausgesetzt wird er öfters dunkelroth; getrocknet wird er dunkelgelb, durchscheineud und spröde. Im Innern enthält er keine dem blofsen Auge sichtbare Höhlungen, und scheint ein überall gleichartiges dichtes Gefüge zu besitzen: er ist aber aus einzelnen, auf Bruchflächen deutlich sichtbaren, Fasern von ungleicher Dicke zusammengesetzt. Diese Fasern liegen ziemlich genau an einander, setzen an vielen Stellen Blätter zusammen, und haben im Allgemeinen eine fast parallele, dem längsten Durchmesser des Knorpels entgegengesetzte, Richtung (bei dünnen breiten Knorpeln erstrecken sie sich von der einen Fläche zur anderen), und sind daher kurz. Zwischen den Fasern bleiben sehr kleine unregelmäfsige Zwischenräume, die von einer etwas weicheren und nicht gefaserten Knorpelmasse vollkommen angefüllt werden; in dieser verlaufen zahlreiche runde und plattrunde Kanäle von $^1/_{90}$‴ bis $^1/_{360}$‴ Dm.

Die chemische Zusammensetzung der Knorpelsubstanz ist noch nicht hinlänglich erforscht: frischer Knorpel enthält 55 bis 70 p. C. Wasser, ungefähr 3 p. C. Knochenerde (s. S. 41), in welcher bald der phosphorsaure, bald der kohlensaure Kalk überwiegt; und etwas kohlensaures Natron und Kochsalz: die Knochenerde ist mit einer organischen Substanz verbunden, von welcher es noch unentschieden ist, ob sie ein geronnenes Eiweifs oder Leimstoff sei.

Einige Knorpel werden von einer eigenen sehnenfaserigen (fibrösen) *Knorpelhaut, Perichondrium,* überzogen, andere von Synovialhäuten bekleidet. Sie erhalten verhältnifsmäfsig sehr wenige Blutgefäfse, welche meistens Capillargefäfse sind, und nur an einzelnen Stellen eine solche

lutmenge führen, dafs sie dem bloſsen Auge sichtbar wer-
en: diese Gefäſse dringen meistens von den bekleidenden
äuten aus in den Knorpel ein. Sichtbare Nerven sind
isher in den Knorpeln nicht aufgefunden; und besitzen
ieselben keine Empfindlichkeit. Sie liegen theils an den
nden der Knochen, und tragen zur Verbindung der letz-
ren bei; theils finden sie sich in Organen von zusammen-
esetztem Bau, und bilden die feste Grundlage derselben,
welche weichere Theile sich anlegen und befestigen.

I. Verbindungsknorpel.

1. *Nathknorpel, Cartilagines suturarum,* sind sehr dünne
norpelstreifen zwischen den durch eine Nath vereinigten
nochenrändern, welche diese genauer zusammenhalten.

2. *Knorpel der Synchondrosen,* länglich platt oder schei-
nförmig: diese, sowie die Nathknorpel, werden von der
einhaut, indem sie von einem Knochen zum andern über-
ht, bekleidet.

3. *Gelenkknorpel, Cart. articulares,* sind dünne gebo-
ne Knorpelscheiben, welche die Gelenkflächen der Kno-
en bekleiden, und nach der Form derselben eine convexe
der concave Gestalt annehmen. Sie haben eine Dicke von
$\frac{1}{4}'''$ bis $\frac{5}{4}'''$, sind in der Mitte dicker als an den Rändern;
e eine ihrer Flächen ist mit der Knochensubstanz unmit-
lbar und sehr fest verklebt und durch Gefäſse verbunden;
e andere freie sehr glatte Fläche wird von der sehr ver-
inerten Synovialhaut der Gelenkkapsel überzogen, welche
it dem Knorpel innigst verwächst. Diese Knorpel ertheil-
n den Gelenkenden der Knochen Glätte und Elasticität,
nd verminderen die Reibung bei Bewegungen. — Die
ippenknorpel sind theils verlängerte und eine Strecke weit
ei liegende Gelenkknorpel, theils Synchondrosenknorpel:
e werden, mit Ausnahme ihrer eingelenkten und von Sy-
ovialhaut bekleideten Enden, von der fortgesetzten Bein-
aut der Rippen überzogen.

II. Organenknorpel

nd meistens dünne in verschiedenen Richtungen gebogene
cheiben oder Platten, und werden von einem feinen
stanhangenden Perichondri um überzogen. Sie geben
en zusammengesetzten Organen, in welchen sie sich befin-
en eine bestimmte Gestalt und eine gewisse Steifigkeit ne-

ben grofser Biegsamkeit und Elasticität. Zu ihnen gehören die Knorpel der Augenlieder, des äufseren Ohres und der Tubae Eustachii, der äufseren Nase, der Zunge, des Kehlkopfs, und die Knorpelringe und Knorpelstücke der Luftröhre und ihrer Äste. —

Die Knorpel (oder wahren Knorpel) müssen von den Bildungsknorpeln der Knochen (S. 41) wohl unterschieden werden: im Gegensatz zu diesen nennt man sie auch Cartilagines permanentes, da sie bei vollkommener Ausbildung des Körpers stets Knorpel bleiben sollen: indessen haben sie eine Neigung, im höheren Alter zu verknöchern, vorzüglich die Nathknorpel, Rippenknorpel, und Knorpel des Kehlkopfs.

Faserknorpelsystem.

Der *Faserknorpel, Fibrocartilago*, Cartilago ligamentosa, Chondrosyndesmos, ist weifs, fest, sehr elastisch, und überhaupt in vielen Beziehungen dem wahren Knorpel sehr ähnlich: zwar weicher, biegsamer und nachgiebiger als dieser, besitzt aber dabei einen bei Weitem festeren Zusammenhang, bricht nicht bei starker Biegung, und läfst sich durch gewaltsame Dehnung viel eher von den Theilen, mit welchen er verbunden ist, ablösen, als zerreifsen. Er besteht aus einer Mischung von Sehnenfasern und Knorpelsubstanz; erstere bilden concentrische Blätter und einander durchkreuzende Streifen; in deren Zwischenräumen, vorzüglich in der Mitte des Faserknorpels, eine weichere oft gallertartige Knorpelsubstanz liegt. Er hat keine eigenthümliche äufsere häutige Bekleidung, obgleich auch er häufig von Beinhaut oder Synovialhaut überzogen wird: an Gefäfsen und Nerven ist er eben so arm, als der wahre Knorpel; verknöchert aber seltener als dieser.

Die Faserknorpel stehen überall mit dem Knochen- und Sehnenfasersystem in der nächsten Berührung und Vereinigung, und dienen sämmtlich zur Verbindung der Knochen unter einander und mit den Muskeln, unter folgenden Formen:

1. *Faserknorpel der Knochenfugen, Fibrocartilagines symphysium*, scheibenförmig, entsprechend der Gestalt der Knochenenden, zwischen welchen sie liegen; sie sind an

rer freien Fläche mit der Beinhaut verwachsen, berühren mittelbar die Knochensubstanz, und dringen mit ihren genen Sehnenfasern in kleine Löcher der Knochenen- en ein.

2. *Labra glenoidea*, sind ringförmige Streifen, welche f den Rändern der Gelenkgruben festsitzen, und diese ver- öfsern und vertiefen; sie sind einerseits mit dem eigent- hen Gelenkknorpel, andererseits mit der Beinhaut und den igamenten verschmolzen.

3. *Zwischengelenkknorpel, Fibrocartilagines interarticu- res*, liegen innerhalb einiger Gelenkhöhlen zwischen den elenkenden der Knochen, mindern die Reibung zwischen esen, oder vergröfsern und vertiefen die Gelenkgruben. re Flächen werden von der Synovialhaut der Gelenkkap- l bekleidet; an ihren Rändern sind sie mit der Faserkap- l verwachsen. Sie haben die Gestalt von Scheiben, die der Mitte dünner, an den Rändern dicker sind (werden sdann unpassend Menisci genannt), oder von gebogenen reifen.

4. *Sesamknorpel, Fibrocart. sesamoideae*, kleine Faser- norpel von plankonvexer Gestalt, welche in Sehnen einge- ebt sind, und ihnen eine elastische Unterlage und eine ränderte Richtung geben.

5. Eine *faserknorpelige Rolle*, Trochlea fibro-cartilaginea, ein an einem Knochen befestigter halber Ring, durch elchen eine Sehne wie über eine Rolle läuft, und ihre chtung verändert.

Sehnenfasersystem.

Zum Sehnenfasersystem oder Fasersystem, Systema rosum, gehören alle einzelnen zahlreichen aus Zellstoff id den weifsen glänzenden harten und festen Sehnenfasern webten Theile, oder *fibrösen* Organe. Die feinsten Seh- nfasern, *Fibrillae tendineae*, von $^1/_{533}$‴ bis $^1/_{640}$‴ Dm. sind nd, glatt, im Verhältnifs zu ihrer Dicke sehr lang, liegen icht geschlängelt sehr dicht und parallel an einander, und lden dadurch gröbere, dem bloſsen Auge sichtbare, rund- h eckige Fasern, *Fibrae tendineae*; diese werden von ei- r dünnen Lage straffen Zellstoffs eingewickelt und fest

zusammengeklebt, so dafs sie nur schwer von einander sich absondern lassen: und setzen dadurch gröfsere rundliche oder platte Faserbündel zusammen, welche in theils paralleler theils durchkreuzender Richtung wiederum durch Zellgewebe sich verbinden.

Alle fibrösen Organe sind ziemlich hart und trocken, jedoch sehr biegsam; und besitzen bei einem geringen Umfange eine sehr grofse Festigkeit, aber nur sehr geringe Ausdehnbarkeit und Elasticität, welche letztere mehr von dem in ihrem Gewebe befindlichen Zellstoff, als von den Sehnenfasern selbst abhängt. Sie enthalten ungefähr 60 p. C. Wasser, und werden, wenn dieses durch Trocknen entfernt ist, durchsichtig, bernsteinfarbig, härter und elastischer: durch Kochen im Wasser verwandeln sie sich gänzlich in Leim. Nur wenige und kleine Blutgefäfse, meistens Capillargefäfse, dringen in das Gewebe dieser Organe ein; die zarten Nerven, welche man zu ihnen gehen sieht, gehören wahrscheinlich nicht ihnen selbst, sondern andern mit ihnen verbundenen Theilen an; Empfindlichkeit und Contractilität mangelt ihnen.

Die fibrösen Organe haben entweder die Form dünner breiter hautähnlicher Ausbreitungen, oder dickerer platter oder rundlicher Bündel; oder es zeigen sich an ihnen beide Formen. Zu anderen Organen stehen sie in dreifacher Beziehung; indem sie entweder einfache Hüllen bilden; oder ein Organ umhüllen und zugleich zwei andere mit einander verbinden; oder nur einfach von einem Theile zu einem andern gehend beide zusammenhalten.

1. *Fibröse Häute, Membranae s. Tunicae fibrosae,* Flechsenhäute, sind aus kurzen platten, vielfach einander durchkreuzenden Faserbündeln mit mehr oder weniger Zellstoff gewebt: und umgeben andere Organe als deren äufsere sackförmige Hülle; sie werden von den zu dem eingeschlossenen Organe laufenden Gefäfsen und Nerven durchbohrt. Solche fibröse Häute sind die Bein- und Knorpelhaut, Periosteum und Perichondrium (S. 42. 48.) und die sogen. *Tunicae albugineae,* welche Organen von sehr zusammengesetztem Bau eine äufsere feste Hülle verleihen: nämlich die Tun. sclerotica des Auges, die Tun. albuginea der Milz, Nieren, Hoden, Eierstöcke, und der Corpora caver-

osa des Penis und der Clitoris. Andere fibröse Häute, ämlich die Dura mater, das äufsere Blatt des Herzbeutels nd die Tun. vaginalis communis, schliefsen sich genau an ie äufsere Fläche der von serösen Häuten gebildeten Säcke, oraus die sogen. fibrös-serösen Häute entstehen; noch anere sind mit der äufseren Fläche gewisser Schleimhäute enau verwachsen (fibrös-mucöse Häute) z. B. die Beinhaut es Gaumens, der Nasenhöhle, und die fibröse Haut der uftröhre, in welche überdiefs noch Knorpelringe eingebt sind.

2. Fibröse Kapselbänder der Gelenke, *Faserkapseln, Ligamenta capsularia fibrosa,* sind hautähnliche sackförmige Organe von gröfserer oder geringerer Dicke, welche mit der einhaut verschmelzend von den Gelenkenden des einen nochens zu denen des anderen gehen, und diese zusamenhalten: zugleich aber die Synovialkapseln, mit deren ufseren Flächen sie genau verwachsen sind, mehr oder weiger vollständig umgeben; und dadurch die Gelenkhöhlen, welchen die Knochenenden frei liegen, bilden helfen.

3. Einfache *Knochenbänder* oder *Hülfsbänder der Gelen-*, *Ligamenta accessoria articulationum,* sind einfache aus arallelen Sehnenfaserbündeln gewebte Streifen, welche von nem Knochen zum andern laufen und sie zusammenhalten: ire Enden gehen in die Beinhaut über. Sie sind platt nglich oder rundlich, platt dreieckig oder viereckig, selner prismatisch, zuweilen ringförmig; liegen meistens ufserhalb der Faserkapsel und sind oft mit ihr genau verebt, so dafs sie nur stärkere Streifen der Faserkapsel darellen: zuweilen dagegen liegen sie innerhalb des Sakes er Faserkapsel, und werden sodann von der Synovialkapl bekleidet. Am stärksten sind sie an den Seiten des Genks entwickelt, nach welchen hin keine Bewegung Statt ndet.

4. *Sehnen* oder Flechsen, *Tendines,* sind alle fibrösen Organe on verschiedener Gestalt, welche eine Vereinigung mit Muskelsern eingehen. Meistens sind sie an den Enden der Muskeln, endines extremi s. terminales vorhanden, als dünnere aber arke Fortsetzungen der Muskeln, welche durch dieselben it den Knochen oder Knorpeln oder Fascien verbunden erden; zuweilen aber finden sie sich auch in der Mitte

eines Muskels zwischen zwei Bäuchen desselben, als Tendines intermedii. Da wo sie mit dem Muskelfleisch in Berührung treten, breiten sich ihre Fasern an den äufseren Flächen und im Inneren des Muskels auseinander, so dafs sie den Muskelfasern möglichst viele Berührungspunkte darbieten: übrigens legen sich die Muskel- und Sehnenfasern nicht mit ihren äufsersten Enden allein, sondern ihrer Länge nach sehr genau und fest an einander, so dafs man kaum ein verbindendes Zellgewebe wahrnimmt, und beide zu verschmelzen scheinen. Der mittlere freie Theil einer Sehne, welcher meistens von einer feinen aber ziemlich festen Zellgewebsschicht eingehüllt wird, ist dünner; das an einem Knochen oder Knorpel befestigte Ende wird wiederum dicker, indem die Fasern aus einander weichen, und mit der Bein- oder Knorpelhaut verschmelzen. Man unterscheidet zwei Hauptformen der Sehnen: a) breite, platte, dünne, hautähnliche Sehnen, *Aponeuroses*, welche meistens an den Enden breiter platter Muskeln sich finden, und nicht allein an Knochen, sondern auch in Fasciae musculares übergehen, und die Wände gröfserer Höhlen bilden helfen: b) *strangförmige Sehnen*, vorzugsweise *Tendines* genannt, welche bald dick und kurz, bald dünn, länglich und schlank, und zwar selten vollkommen rund, meistens etwas plattgedrückt sind: sie dienen nur zur Befestigung der Muskeln an Knochen und Knorpel. Zuweilen sind diese Sehnen zum Durchgange anderer Sehnen durchbohrt; oder sie spalten sich in mehrere an verschiedene Knochenstellen geheftete Zipfel: auch fliefsen wohl mehrere Sehnen zu einem gemeinschaftlichen Tendo zusammen. Zuweilen enthalten sie nahe an ihren Enden eingewebte plattrundliche Sesambeinchen oder Sesamfaserknorpel.

5. *Muskelbinden*, *Fasciae musculares:* dünne hautähnliche aus Sehnenfasern und verdichtetem Zellstoff gewebte Ausbreitungen, welche das ganze Muskelsystem und einzelne Abtheilungen desselben umhüllen, und diese genauer in ihrer Lage befestigen. Eine solche dünne Unterhautfascia *Fascia superficialis* s. subcutanea, umgiebt die ganze äufsere Fläche des Muskelsystems, vorzüglich am Stamm des Körpers: an einzelnen Stellen ist sie deutlich zu einem fibrösen Blatt entwickelt, an anderen erscheint sie nur als ver

ichteter Zellstoff, und verliehrt sich allmählig in das Unter-
autzellgewebe, oder vereinigt sich mit den tiefer gelegenen
ascien. Letztere hüllen einzelne Abtheilungen des Mus-
elsystems ein, und erhalten meistens nach der Gegend, in
elcher sie sich befinden, besondere Namen: sie hangen
ber durch den ganzen Körper mit einander zusammen,
dem sie geradezu in einander übergehen; oder an Kno-
enrändern, mit deren Beinhaut sie verwachsen, zusam-
enstofsen. Vorzüglich stark ausgebildete durchaus fibröse
nd scharf begränzte Fascien finden sich am Schädel, an
er unteren Hälfte des Stammes und an den Gliedmafsen:
e umgeben nicht allein ganze Muskellagen, sondern bilden
ich mehr oder weniger vollständige Scheidewände zwischen
nzelnen Muskeln; diese sind oft von doppelten Blättern
er Fascia zusammengesetzt und an Knochenränder gehef-
t, und werden *Ligamenta intermuscularia* genannt. An an-
eren Stellen enthalten die Fascien stärkere platte Streifen
ingewebt, sog. *Ligamenta muscularia*, welche einzelne
Iuskeln oder Sehnen sehr genau in ihrer Lage befestigen
nd ihnen diejenige Richtung geben, in welcher sie auf die
nochen wirken sollen. Einige Muskeln werden locker von
en Fascien umhüllt; andere stehen mit ihnen in genaue-
er Verbindung, indem sie von ihnen zum Theil entsprin-
en, oder mit ihren Aponeurosen in die Fascien übergehen,
nd dieselben anspannen können.

6. *Fibröse Sehnenscheiden, Vaginae tendinum fibrosae*, sind
ingliche ziemlich enge Halbkanäle, welche an ihren Rän-
ern mit Knochen verbunden sind, und mit diesen gemeinschaft-
ch vollständige Kanäle bilden: in diesen Kanälen laufen
nge schlanke Sehnen geschützt und in unverrückbarer
ichtung. Diese fibrösen Sehnenscheiden bestehen oft nur
us einzelnen durch Zwischenräume getrennten Streifen,
ogenannten Sehnenligamenten, Ligamenta tendinum; sie
mgeben übrigens die Synovialsehnenscheiden, und werden
on diesen inwendig bekleidet.

Elastisches System.

Die feinsten elastischen Fasern haben einen Dm. von $^1/_{533}'''$ bis $^1/_{640}'''$, gleich den der feinsten Sehnenfasern, und

ein glattes nicht körniges Ansehen: dagegen sind sie im Verhältnifs zu ihrer Dicke sehr kurz, nicht geschlängelt, nicht in längeren Strecken parallel neben einander laufend, sondern einander vielfach schräg durchkreuzend. Durch einfaches Aneinanderlegen, ohne sichtbare Verbindung durch Zellstoff, bilden sie gröbere, längliche, platte Fasern und Bündel von gelblicher oder gelbröthlicher Farbe, ohne Glanz: diese sind trocken und härtlich, jedoch weicher und feuchter, als Sehnenfasern; ziemlich biegsam, und viel schwächer als Sehnenfasern, aber stärker als Muskelfasern: ihrer Länge nach ausgedehnt ziehen sie sich schnell wiederum zusammen; werden sie durch stärkere Ausdehnung zerrissen, so erscheinen ihre Enden, indem sie sich auf sich selbst zusammenziehen, eben und glatt. — Indem nun diese gröberen Fasern und Bündel theils parallel an einander sich legen, theils in schrägen Richtungen sich verflechten, meistens aber nur schwach an einander kleben — entstehen die *elastischen Organe*, welche eine platte hautähnliche oder bündelförmige Gestalt haben, in ihrem Gewebe höchst wenig Zellstoff enthalten, keine eigenthümliche Bekleidung, nur sehr wenige baumförmig verzweigte Capillargefäfse, und keine sichtbare Nerven besitzen: weder Empfindlichkeit noch Contractilität äufsern, aber durch ziemliche Festigkeit und sehr grofse Elasticität sich auszeichnen. Ihre chemische Zusammensetzung ist noch nicht hinlänglich erforscht; sie verwandeln sich durch Kochen im Wasser nicht in Leim, wie die Sehnenfasern; und enthalten keinen Faserstoff, wie die Muskelfasern.

Im menschlichen Körper sind verhältnifsmäfsig nur wenige elastische Organe vorhanden; nämlich die mittlere Haut der Arterien und der gröfseren Venen, die Ligamenta intercrüralia der Wirbelsäule, die Ligamenta obturatoria zwischen dem Hinterhauptbein und dem ersten Halswirbel, die Haut der hinteren Wand der Luftröhre, das Ligamentum hyoepiglotticum, Lig. thyreoepiglotticum, und die Ligg. thyreoarytaenoidea superiora.

Muskelsystem.

Dieses begreift sämmtliche *Muskeln, Musculi:* weiche, röthliche, vorzüglich aus parallelen Muskelfasern gebildete,

olide oder hohle Organe, welche durch Zusammenziehung nd Ausdehnung die Bewegung der Theile, mit welchen sie n Verbindung stehen, bewirken.

Alle Muskel- oder Fleischfasern haben eine eigenthümiche, blassere oder dunklere, rothe Farbe, sind sehr feucht nd weich, und lassen sich leicht von einander sondern und erreissen, wonach ihre der Luft ausgesetzten Enden bald reiartig zerfliefsen: hinsichtlich ihrer Gröfse und Gestalt eigen sie aber mehrere Verschiedenheiten. Die feinsten Iuskelfäserchen, *Fibrillae musculares* s. Fila muscularia, ehören zu den kleinsten Theilen des Körpers, indem sie inen Dm. von nur $^1/_{800}'''$ bis $^1/_{1060}'''$ haben: sie sind rund, aben ein körniges Ansehen; ein jedes besteht aus nur ei- er Reihe dicht an einander liegender Kügelchen, welche ich ziemlich leicht von einander absondern lassen, und ein- eln betrachtet eine vollkommen sphärische Gestalt, eine elbliche Farbe, und einen Dm. von $^1/_{1060}'''$ bis $^1/_{1600}'''$ dar- ieten. Diese Kügelchen werden durch eine wasserklare ähe Feuchtigkeit zusammengeklebt und zu Fibrillen verei- igt. Die einzelnen Fibrillen selbst besitzen keine eigen- hümliche Bekleidung; sie legen sich in verschiedener, von bis 500 wechselnder, Anzahl und in paralleler Richtung enau an einander, und bilden dadurch einfache, dem blo- sen Auge grofsentheils schon sichtbare Muskelfasern, *Fibrae usculares.* Eine solche Fibra hat eine prismatische, mei- tens ungleich vierseitige oder fünfseitige Gestalt mit abge- undeten Ecken; die ansehnlichsten sind $^1/_{32}'''$ breit und $^1/_{50}'''$ dick; die kleinsten dagegen $^1/_{108}'''$ breit und $^1/_{260}'''$ ick; aufser dieser Gestalt und Gröfse unterscheiden sie ich aber von den Fibrillen durch eine, aus Zellstoff gebil- ete, sehr feine röhrenförmige Hülle, welche eine grofse nzahl einzelner Fibrillen zur Fibra vereinigt. Diese Hülle eigt zahlreiche Queerfalten (welche bei schwächeren Ver- röfserungen nur als dunkle Striche erscheinen), deren reite, Höhe und Abstand von einander, meistens gleich- näfsig $^1/_{1280}'''$ beträgt. Aus den Fibrae, welche in der Re- el eine parallele Richtung beibehalten nnd selten einander chräg durchkreuzen, setzen sich sodann Muskelbündel, *asciculi musculares,* von sehr verschiedener Länge und icke zusammen, von denen jedes seine besondere Umhül-

lung aus Zellstoff besitzt, die bei den gröfseren Bündeln meistens etwas, die Zwischenräume der kleineren Bündel ausfüllendes, Fett enthält. Aus einzelnen Bündeln erwächst der ganze Muskel, dessen äufsere Fläche von einer stärkeren Zellgewebsschicht bekleidet wird. Die zellstoffige Hülle des ganzen Muskels und der einzelnen Bündel und Fasern hangen überall unter einander zusammen, und bilden ein System von in einander geschobenen kleineren und gröfseren Röhren, dem Neurilema ähnlich: man belegt sie mit dem gemeinschaftlichen Namen der *Muskelscheide*, *Perimysium*; und unterscheidet die äufsere Hülle des ganzen Muskels, Perimysium externum s. Vagina muscularis, von der Bekleidung der einzelnen Bündel und Fasern, Perimysium internum.

In diesem Perimysium verlaufen die verhältnifsmäfsig sehr zahlreichen und ansehnlichen Gefäfse und Nerven der Muskeln. Die Arterien dringen, meistens schon in mehrere Äste gespalten, gegen die Mitte des Muskels ein; ihre kleineren Zweige verlaufen dann aufwärts und abwärts zwischen den Bündeln, und lösen sich in ein Netz von Capillargefäfsen auf, welches überall die longitudinale Hauptrichtung beibehaltend die einzelnen Fasern umspinnt. Die aus diesem Capillargefäfsnetz hervortretenden Venenwürzelchen und die Lymphgefäfse wenden sich, aus der Tiefe des Muskels, bald auf dessen Oberfläche, um sich hier zu gröfseren Stämmchen zu vereinigen. Die Äste der Nerven verlaufen zwar anfänglich gleichfalls in der Längenrichtung zwischen den Muskelbündeln; ihre feinsten Endigungen kreuzen sich aber mit den Muskelfasern unter rechten oder wenig spitzigen Winkeln, und umfassen dieselben wahrscheinlich mit äufserst zahlreichen feinen Schlingen.

Von den benachbarten Muskeln und anderen Organen wird jeder Muskel durch meistens lockeres und fettreiches Zellgewebe abgegränzt.

Hundert Theile Muskelsubstanz (von welcher aber die Gefäfse, Nerven und Zellgewebe nicht vollständig gesondert werden können) enthalten:

Faserstoff, Gefäfse und Nerven	15, 80
Zellstoff	1, 90
Eiweifs und Blutroth	2, 20

Alcohol-Extracte mit Milchsäure; mit milchsaurem Kali, Natron, Kalk, Talk u. Ammoniak; mit Chlorkalium u. Chlornatrium	1, 80
Zomidin und drei bis vier andere noch nicht näher bestimmte Wasser-Extracte mit phosphors. Natron	1, 05
Phosphorsaurer Kalk mit Eiweifs . . .	0, 08
Wasser und Verlust	77, 17
	100, 00

Wegen der Weichheit der Fasern und ihrer lockeren Verbindung mit einander besitzt der Muskel an sich nur geringe Festigkeit, und zerreifst im todten Zustande ziemlich leicht. Im Leben zerreifst er dagegen sehr schwer, und besitzt aufser dieser Festigkeit und Stärke auch einen ziemlich bedeutenden Grad von Elasticität, vermöge welcher er grofse mechanische Ausdehnungen erträgt, und nach dem Aufhören derselben, wenn sie nicht zu anhaltend einwirkten, zu seinem früheren Volumen zurückkehrt. Da die Nerven des Muskels gröfstentheils Bewegungsnervenfasern enthalten, so besitzt er nur wenig Empfindlichkeit. Was ihn aber im lebenden Zustande vor allen anderen Organen auszeichnet, ist eine eigenthümliche, indessen von dem Nerveneinflufs und der Blutcirculation im Muskel abhängige Kraft; nämlich das allen Muskelfasern einwohnende Vermögen, sich ihrer Länge nach beträchtlich auszudehnen und zusammenzuziehen: welches man die *Muskelreizbarkeit* oder Muskelkraft, *Irritabilitas* s. Vis musculorum, nennt. Bei der Zusammenziehung gerathen die einzelnen Muskelfasern in eine schwingende zitternde Bewegung, Oscillation; sie bekommen ein runzeliches Ansehn, und ihr Lauf erscheint geschlängelt, Zickzack bildend; der ganze Muskel wird dicker, aber kürzer und härter, seine Dichtigkeit nimmt zu, und sein Umfang überhaupt wird geringer: dadurch werden die Theile, an welche der Muskel mit seinen beiden Enden befestigt ist, einander genähert: oder die von Muskelfasern umgebenen hohlen Räume verengert. Es erfolgt diese Volumenveränderung des Muskels mit grofser Kraft und Schnelligkeit auf Reize verschiedener Art: auf äufsere materielle Reize, welche die im Muskel verbreiteten Nervenendigungen selbst treffen: oder meistens auf innere imma-

terielle, von den Centralorganen des Nervensystems ausgehende Reize; unter welchen der Einfluſs des Willens, durch die Nerven zum Muskel geleitet, der vorzüglichste ist. Die Muskelcontraction dauert übrigens nur eine Zeitlang, nach welcher der Muskel gleichsam ermüdet; seine Fasern nehmen wiederum eine gestreckte Richtung an, der ganze Muskel wird wiederum so lang, als er vor der Contraction war, wodurch er zu einer neuen Zusammenziehung fähig wird. Von dieser Muskelkraft hängt fast allein die Festigkeit des Zusammenhanges im lebenden Muskel ab, die um so gröſser wird, je stärker und dauernder die Zusammenziehung ist: bald nach dem Tode erlischt die Irritabilität, in einigen Muskeln früher, in anderen später; und alsdann ist der Muskel leicht zerreifsbar.

Der Form nach zerfallen die Muskeln in solide und hohle, die in vielen Beziehungen von einander sich unterscheiden.

I. Die soliden Muskeln bilden den gröfsten Theil der Masse des Körpers, sind in der Regel an Knochen geheftet, und an beiden Enden meistens mit Sehnen genau verbunden, und bilden mit Hülfe der letzteren die Bewegungsorgane für die Knochen des Stammes, des Kopfes und der Glieder, und für die einzelnen Knochen, Knorpel und weichen Theile der Sinnes- und Sprachorgane.

Diejenige Stelle der Anheftung eines soliden Muskels, welche bei der Contraction desselben in unveränderter Lage ruhend bleibt, nennt man den festen oder Anheftungspunkt, *Punctum adhaesionis s. fixum;* oder, indem man den Muskel als von dieser Stelle ausgehend betrachtet, seinen *Ursprung, Origo*: gewöhnlich ist dieser ein Knochen, seltener ein Knorpel oder sehniger Körper. Derjenige Theil oder Stelle des Körpers, welche bei der Zusammenziehung des Muskels gegen den festen Punkt hingezogen wird, heifst der *Ansatz, Insertion, Punctum insertionis* s. *mobile:* auch dieser ist gewöhnlich ein Knochen oder Knorpel, oft eine Fascia; seltener ein anderer Muskel oder ein häutiges Organ. Das Ende des Muskels, welches an den festen Punkt geheftet ist, nennt man seinen Kopf, *Caput;* der mittlere fleischige Theil ist der Muskelbauch, *Venter;* das mit dem beweglichen Punkte verbundene Ende der Schwanz, *Cauda.* Die

ehnen finden sich gewöhnlich am Muskelkopfe und vorüglich an der Cauda, seltener in der Mitte des Muskels: n letzteren Falle trennen solche Tendines intermedii den Iuskel in zwei Bäuche (M. biventer, digastricus) oder auch ı mehrere Bäuche: durch welche Anordnung der Muskel tärker und fester wird, und seine Gestalt bei der Contracion schlanker bleibt. Nicht selten reichen auch sehnige treifen aus den Enden weit in den Bauch hinein, ohne urch Bildung wirklicher Tendines intermedii den Muskel ı mehrere Bäuche zu theilen: auch diese Durchwachsung it Sehnenfaserbündeln erhöhet die Festigkeit des Muskels edeutend.

Die soliden Muskeln zerfallen ihrer Gestalt nach in ehrere Unterabtheilungen:

A. *Längliche Muskeln.* Unter diesen bemerkt man:

1. Einfache spindelförmige Muskeln, Musculi fusiformes, it einem dünneren, meistens sehnigen, von einer rundlichen nochenerhabenheit oder Vertiefung entspringenden Kopfe, inem dickeren, rundlichen, etwas plattgedrückten Bauche, nd einer spitzigen, meistens in eine schlanke Sehne auslaufenden Cauda. Ist letztere nicht mit einer Sehne verehen, so breiten sich die Muskelfasern pinselförmig aus. Die Fasern laufen in gerader Richtung von dem Ursprunge ur Insertion.

2. Zusammengesetzte länglich rundliche oder länglich latte Muskeln: diese haben

a. zwei oder mehrere Bäuche, Mm. digastrici, polygastrici;

b. oder zwei, drei, und mehrere Köpfe, die von verschiedenen Stellen entspringen und zu einem Bauche sich vereinigen, Mm. bicipites, tricipites, polycipites;

c. oder ihre Cauda spaltet sich in mehrere an verschiedenen Stellen befestigte Zipfel, welches vorzüglich oft bei den vielköpfigen Muskeln Statt findet;

d. oder die Fleischfasern laufen, von ihrem Ursprunge (gewöhnlich einem längeren Knochenrande) an, schräg zu der gegen den Insertionspunkt gerade hinlaufenden Sehne, welche in beträchtlicher Länge in der Mitte oder an dem einen Rande des Muskelbauchs frei liegt. Solche Muskeln nennt man ge-

fiederte oder halbgefiederte Muskeln, Mm. pennati, semipennati; sie ähneln einer Feder, indem die Sehne den Kiel, die Fleischfasern die Fahne der Feder vorstellen.

B. *Breite Muskeln.* Diese sind platt und dünn, und dienen nicht allein zur Bewegung, sondern auch zur Bildung von Höhlen. Sie entspringen meistens von langen Knochenrändern oder von Fascien; ihre Köpfe sind entweder Aponeurosen oder fleischige kurze Zacken, Dentationes s. Digitationes genannt; ihre Caudae sind gewöhnlich Aponeurosen, welche an Knochenränder sich heften oder in Fasciae musculares übergehen.

C. *Kurze Muskeln:* würfelförmig oder pyramidalisch, und von einer ihrer Länge ungefähr gleichen Breite und Dicke: sie besitzen im Verhältnifs zu ihrem Umfange die gröfste Stärke.

D. *Ringförmige Muskeln*, *Musculi orbiculares.* Diese sind gar nicht, oder nur mit einem Ende an Knochen oder andere feste Punkte geheftet, und besitzen in diesem Falle nur an der befestigten Stelle Sehnenfasern. Ihre einzelnen Fleischfaserbündel sind stark gekrümmt; bilden jedoch nie einen vollständigen Kreis, legen sich aber mit ihren Enden dergestalt an einander, dafs der ganze Muskel einen Ring darstellt. Sie liegen in den Wänden von Kanälen und an den natürlichen Öffnungen der Oberfläche des Körpers, welche von ihnen verengert und verschlossen werden können: und stehen mit den nahgelegenen weichen Theilen in Verbindung. Sie näheren sich durch Gestalt und Wirkung den hohlen Muskeln.

Die soliden Muskeln sind sehr symmetrisch in den beiden Seitenhälften des Körpers vertheilt, und fast insgesammt paarweise vorhanden. Ihre zahlreichen und ansehnlichen Nerven, welche den Nn. encephalo-spinales angehören, enthalten nur wenig Empfindungsnervenfasern, und bestehen fast gänzlich aus Bewegungsnervenfasern. Im Allgemeinen sind diese Muskeln der Willkühr unterworfen; viele von ihnen können aber auch unwillkührlich und wider Willen sich zusammenziehen. Durch ihre Contraction werden die weichen Theile, an welche mehrere von ihnen befestigt sind, geradezu gegen den Adhaesionspunkt hingezogen: die

sten Theile aber, insbesondere die Knochen mit Allem, as an diese befestigt ist, werden nach Art der Hebelarme, dem sie sich auf andere ruhende, als Unterlage dienende nochen stützen, in den Gelenken bewegt. Der von den nochen und Muskeln gebildete Hebel ist meistens ein so- enannter Wurfhebel (einarmiger Hebel, an welchem die raft (oder der Muskel) zwischen dem Stütz- oder Dreh- unkte und der Last angebracht ist), welcher eine sehr sgedehnte und schnelle Bewegung gestattet, aber grofse raftanstrengung erfordert: bei Weitem seltener ist er ein raghebel (einarmiger Hebel, an welchem die Last zwischen tützpunkt und Kraft liegt), — oder ein ungleicharmiger ruckhebel (doppelarmiger Hebel, dessen Stützpunkt zwi- hen Last und Kraft sich befindet). Wird der zu bewe- ende Knochen von einer gröfseren Gewalt, als der Muskel szuüben vermag, ruhend erhalten, so wird derjenige nochen bewegt, welcher ursprünglich den festen Punkt gab: auf solche Weise kann ein Muskel abwechselnd die eiden verschiedenen Knochen bewegen, mit welchen sein opf und seine Cauda verbunden ist. Muskeln, welche ei- en und denselben Theil, aber in entgegengesetzten Rich- ngen, bewegen (z. B. Beugemuskeln und Streckmuskeln), ennt man Antagonisten, *Musculi Antagonistae.*

Die Stärke, Schnelligkeit und Ausdehnung der Bewe- ng ist von verschiedenen Verhältnissen abhängig.

1. Je kürzer und dicker der Muskel, desto kräftiger irkt er: daher wird ein langer, dünner Muskel oft durch endines intermedii in mehrere kürzere Muskeln getheilt nd dadurch verstärkt.

2. Muskeln, welche gerade und in kürzester Richtung om festen Punkte zum Insertionspunkte gehen, sind stär- er als die schräglaufenden: letztere wirken aber schneller, nd bringen, bei im Verhältnifs ihrer Länge gleich starker erkürzung ihrer Fasern, eine gröfsere Annäherung hervor, ls erstere. Laufen die Muskelfasern, wie bei den Musculi ennati, nicht in gleicher Richtung mit der Sehne, so würde war der Muskel wegen der schrägen Richtung der Fasern chwächer sein, als ein gerader Muskel mit gleich langen asern. Da aber in den Mm. pennati die Fasern vermöge rer schrägen Richtung die Sehne früher erreichen und da-

selbst endigen, und also kürzer sind, als wenn sie durch die ganze Länge des Muskels sich erstreckten: so dient hier der schräge Verlauf der Fasern zur Verstärkung des Muskels.

3. Je entfernter die Insertionsstelle des Muskels von dem Gelenke, dem Mittelpunkte der Bewegung, liegt, desto kräftiger wirkt der Muskel. Im Allgemeinen liegen aber die Insertionspunkte den Gelenken sehr nahe, wodurch viel Kraft verloren geht. Dieses ungünstige Verhältnifs findet vorzüglich Statt bei den Wurfhebeln; aber auch bei den Druckhebeln, indem bei diesen derjenige Arm, an welchem der Muskel (die Kraft) sich befestigt, kürzer ist, als der andere, welcher mit den an ihm befestigten Organen die Last bildet: überdies ist jener kürzere Arm oft nach der Richtung, in welcher der Muskel wirkt, hingebogen.

4. Je mehr der Winkel, den der Muskel mit dem zu bewegenden Knochen macht, einem rechten sich nähert desto stärker wirkt der Muskel. Die meisten Muskeln laufen unter sehr spitzigen Winkeln gegen die Insertion hin verändern indessen oft nahe vor dieser ihre Richtung, und treffen alsdann unter einem gröfseren Winkel mit dem Knochen zusammen. Dieser wird vermittelt, indem der Muskel an einem stark herausragenden Knochenfortsatz sich inserirt; oder indem er von einer Fascia oder einer faserknorpeligen Trochlea (S. 51.) umfafst und von seiner anfänglichen Richtung abgelenkt wird; oder indem er nahe vor seiner Insertion über einen Körper hinläuft, welcher ihn von dem Knochen etwas entfernt. Solche Körper sind Knochenerhabenheiten, oder plattrundliche, verschiebbare in die Sehnen eingewebte Knochen oder Faserknorpel (die Kniescheibe, die Sesambeine und Sesamfaserknorpel), oder Schleimbeutel, Bursae synoviales s. mucosae.

5. Je gröfser die Gelenkflächen der Knochen, und je schwerer die von den Knochen gestützten weichen Organe sind, eine desto gröfsere Reibung haben die Muskeln bei der Bewegung zu überwinden.

6. Je mehr der Muskel von Fett umgeben, und je sicherer eine Abweichung aus seiner Lage und Richtung durch eine Fascia muscularis verhütet wird, desto leichter und kräftiger wirkt er. —

II. Die hohlen Muskeln sind bei Weitem geringer
Anzahl und Masse, und finden sich nur am Halse, in
r Brust- und Bauchhöhle vor, indem sie entweder für
ch hohle Organe bilden (Herz, Gebärmutter), oder ande-
n zusammengesetzten hohlen Organen (Speisekanal, Harn-
ase) eine *Muskelhaut*, *Tunica muscularis*, geben. Die Fa-
rn und Bündel dieser Muskeln sind kurz, gebogen, oft
tig oder gabelförmig gespalten; sie bilden meistens Kreis-
schnitte und Ringe; laufen weniger parallel, mehr netz-
tig verschlungen, als die der soliden Muskeln, und liegen
ters in mehreren Schichten über einander. Sie haben
ine Antagonisten, und ihre Wirkung ist nur auf eine
eränderung des Umfanges der von ihnen gebildeten Höh-
n oder Kanäle, auf Verengerung, Erweiterung oder Ver-
irzung derselben gerichtet. Ihre Fasern sind (mit Aus-
hme derer des Herzens) blasser, weicher, jedoch stärker,
s die der soliden Muskeln. Sie erhalten bald mehr, bald
eniger Gefäfse als jene, jedesmal aber weniger Nerven,
elche gröfstentheils dem Gangliensysteme angehören: ihre
ntractionen sind durchaus unwillkührlich. —

Da die soliden Muskeln vorzüglich den Organen der
rtsbewegung, der Sprache und der Sinne, die hohlen aber
n Organen der Ernährung angehören: so hat man sie oft
s Muskeln des animalischen und des vegetativen oder or-
nischen Lebens von einander unterschieden. Dieser Un-
rschied ist aber nicht streng durchzuführen, da mehrere
lide Muskeln beiden Klassen der Lebensverrichtungen an-
hören. Noch weniger scharf lassen sich die Muskeln in
llkührliche und unwillkührliche abtheilen.

Die Muskeln sind häufigen Varietäten der Anzahl und
rm unterworfen. In weiblichen Körpern haben sie über-
upt geringeren Umfang und Stärke.

Seröses System.

Das seröse System besteht aus zahlreichen, einzelnen,
öfseren und kleineren, vollkommen geschlossenen und
lbst zum Durchgange von Gefäfsen und Nerven nirgends
rchbohrten Säcken, welche von einer serösen Haut, Mem-
ana serosa, gebildet werden. Eine solche Haut ist aus
ır feinen, gewundenen und mit einander unregelmäfsig

verwebten Zellstofffasern und dicht auf einander liegende Zellstoffblättchen gewebt; dünn und durchsichtig; ihre innere gegen die Höhle des Sacks gekehrte und nicht mit anderen Theilen verwachsene Fläche — die *freie* Fläche — ist sehr glatt, sehr feucht und schlüpfrig und daher matt glänzend; die äufsere, durch kurzes oder schlaffes Zellgewebe an benachbarte Theile geheftete Fläche — die *befestigte* Fläche — ist rauh. Auf der letzteren verlaufen zahlreiche aber sehr kleine Capillarblutgefäfse und Saugadern aber keine sichtbare in das Gewebe der Haut selbst eindringende Nerven. Im gesunden Zustande sind die serösen Häute unempfindlich, besitzen aber sehr bedeutende Elasticität und Contractilität: sie bilden Hüllen um andere Organe, und enthalten eine vorzüglich aus Wasser und etwas Eiweifs bestehende Flüssigkeit.

Zum serösen Systeme gehören die eigentlichen serösen Häute und die Synovialhäute.

I. Seröse Häute, Membranae serosae. Zu diesen gehören das Bauchfell, Peritonaeum, die Brustfelle, Pleurae, die Spinnwebenhaut, Tunica arachnoidea, der Herzbeutel, Pericardium, die eigenen Scheidenhäute der Hoden, Tunicae vaginales propriae testiculorum. Sie bilden eine doppelte Hülle um einzelne Organe, indem sie dieselben gänzlich oder gröfstentheils genau umgeben, und aufserdem in einen weiteren häutigen Sack locker einschliefsen. Man unterscheidet daher bei jeder serösen Haut zunächst einen gröfseren äufseren Sack, welcher mit seiner äufseren befestigten Fläche sehr genau an die knöchernen, fibrösen und muskulösen Wände ansehnlicher Höhlen geheftet ist; seine freie glatte Fläche aber den Organen zuwendet, welche von ihn eingeschlossen sind. An einer oder mehreren Stellen stülpt der äufsere Sack sich nach Innen um, und bildet dadurch kleinere innerhalb des äufseren Sacks liegende Säcke oder Taschen: diese inneren Säcke enthalten aber Organe von zusammengesetztem Bau, verwachsen meistens genau mit denselben, und bilden sonach ihren äufseren häutigen Überzug, dessen rauhe Fläche das Gewebe des Organs berührt, dessen freie Fläche dagegen an der Oberfläche des Organs erscheint, und derselben Glätte und Schlüpfrigkeit verleiht. Liegt das Organ nahe an dem äufseren grofs-

ıcke, so bildet dieser oft nur eine flachere Einbiegung, elcher das Organ nicht ganz bekleidet, sondern eine oder ehrere Seiten desselben unbedeckt läfst. Liegt aber das rgan in der Mitte des äufseren Sackes oder überhaupt ›m Umfange desselben weiter entfernt: so hängt die das-lbe überziehende Tasche mit dem äufseren Sacke durch ne aus zwei serösen Blättern gebildete platte Falte zusam-en, welche von der Stelle der Umstülpung ausgeht, und ı dem Organe selbst zu der dasselbe bekleidenden Tasche ch erweitert. Sehr oft geht aber auch die seröse Haut in estalt einer solchen Falte von dem einen Organe zu einem ıderen, in demselben äufseren Sacke eingeschlossenen, Or-ne über, oder sogar über das Organ hinaus als frei her-›hangende Falte. Solche durch Verdoppelung (Duplicatur) r serösen Haut gebildete Falten nennt man im Allgemeinen *igamenta serosa;* einzelne erhalten aber auch besondere amen (z. B. Gekröse, Netze u. a.); sie schliefsen zwischen ren Blättern, aufser einigem Zellgewebe und mehr oder eniger Fett, die Gefäfse und Nerven für die Organe ein, elche von den eingestülpten Taschen bekleidet werden. ı länger solche Falten sind, desto leichter können die Or-ne, welche nur von den eingestülpten Taschen überzogen ıd befestigt werden, ihre Lage verändern, ohne jedoch n äufseren grofsen Sack zu verlassen.

Die auf der freien Fläche der serösen Häute ausgehauchte üssigkeit, *das Serum der serösen Häute,* ist im gesunden ustande sehr dünnflüssig, wasserhell und klar; von 1,010 s 1,020 spec. Gewicht; und hinsichtlich seiner chemischen usammensetzung einem mit dem siebenfachen Volumen inen Wassers verdünnten Blutserum höchst ähnlich: es ıthält an Eiweifs nur 1 bis 2 p. M., an Alcoholextract mit ilchsaurem Natron etwa 2 p. M., und an Chlorkalium und hlornatrium 7 p. M. Es wird nur in solch geringer Quan-tät ausgehaucht, welche hinreicht, die ganze freie Fläche es äufseren Sacks und der eingestülpten Taschen feucht nd schlüpfrig zu erhalten, die Reibung der Organe zu ver-ıindern, und ihr Aneinanderkleben zu verhüten. Höchst ahrscheinlich ist es auch während des Lebens tropfbar üssig; und keineswegs dunstförmig, wie man gemeiniglich ınimmt.

II. Die Synovialhäute, Membranae synoviales, gehören dem Bewegungsapparate an, und stehen mit den Knochen, Bändern, Sehnen und Aponeurosen in genauer Verbindung. In ihrer Textur kommen sie mit den eigentlichen serösen Häuten überein. Die in reichlicher Menge in ihnen enthaltene Flüssigkeit, *Gelenkschmiere, Synovia*, ist tropfbar flüssig, schlüpfrig und sehr klebrig, läfst sich in Fäden ziehen, und sieht überhaupt einem verdünnten Eiweifs sehr ähnlich. Ihre chemische Zusammensetzung kommt der des Serum der serösen Häute sehr nahe; jedoch enthält die Synovia bei Weitem mehr Eiweifs, ungefähr 6 p. C.; und reagirt alkalisch.

Die Synovialhäute kommen in dreifacher Form vor, als Synovialkapseln, Sehnenscheiden und Schleimbeutel.

A. Die *Synovialkapseln der Gelenke, Capsulae synoviales articulationum*, sind weite Säcke, welche die Gelenkenden zweier, selten mehrerer, Knochen locker umgeben, und mit der Beinhaut derselben durch kurzes Zellgewebe fest verwachsen. Auf solche Weise bilden sie die eigentlichen Höhlen der Gelenke, *Cava articulationum*. Aufserdem stülpen sie sich aber, nach Art der serösen Häute, nach innen um, und bekleiden alle innerhalb der Gelenkhöhle befindlichen Theile, namentlich die Gelenkknorpel, welche kein Perichondrium besitzen, und denen sie allein einen sehr feinen fest anhangenden Überzug geben: ferner die innerhalb der Gelenkhöhle ausgespannten accessorischen Knochenbänder, und die hier und da durch eine Gelenkhöhle laufenden Sehnen. Jedes Gelenk besitzt in der Regel nur eine Synovialkapsel: nur in den mit einem scheibenförmigen Zwischenknorpel versehenen Gelenken finden sich zwei abgeschlossene Synovialsäcke, deren jeder die eine Seite des Zwischenknorpels überzieht: also auch zwei Gelenkhöhlen. Öfters bildet die Synovialkapsel freie in das Gelenk hervorragende Falten, Plicae synoviales s. Lig. mucosa genannt, welche meistens röthliche härtliche Fettklümpchen, Gelenkfett (sog. Havers'sche Drüsen, Glandulae Haversianae) enthalten, und nicht selten eine gezackte, gefranzte, hahnenkammähnliche Gestalt darbieten. Die äufsere Fläche der Synovialkapsel wird von der Faserkapsel und den accessorischen Knochenbändern bekleidet. Die in ihrer Höhle ent

ıltene Synovia erhält die überknorpelten Knochenenden att, feucht und schlüpfrig, und erleichtert durch Vermin-ɛrung der Reibung die Bewegungen.

B. Die *Synovial-* oder *Schleimscheiden der Sehnen, Va-inae tendinum synoviales s. mucosae,* Bursae mucosae vagi-ıles, bilden lange Kanäle, welche vorzüglich lange schlanke ɛhnen als lockere mit Synovia gefüllte Scheiden umgeben. m unteren Ende der Sehne sind sie blind geschlossen, am ɔeren Ende gehen sie ununterbrochen in die zellstoffige ɛkleidung der Sehne oder in das Perimysium über. Äu-erlich sind sie zum Theil von einer fibrösen Sehnenscheide ɛkleidet, zum Theil aber an den Knochen geheftet, längs elchen die Sehne verläuft. Gleich den serösen Häuten hlagen sie sich in ihre Höhle um, und geben der Sehne nen zweiten innig mit ihr verwebten Überzug: bilden auch ındartige Falten, Vincula s. Ligg. mucosa tendinum, wel-ıe die Sehnen mit den Wänden des Kanals locker ver-ınden, und die Ernährungsgefäfse zu ihnen leiten; oder cheidewände zwischen den Sehnen darstellen, wenn ein .anal deren mehrere enthält; überhaupt aber die Abson-ɛrungsfläche der Synovia, welche das Gleiten der Sehne ınerhalb des Kanals erleichtert, vergröfsern.

C. Die *Schleimbeutel* oder Schleimbälge, *Bursae syno-ales* s. Bursae mucosae vesiculares, sind einfache, rund-che, etwas plattgedrückte, geschlossene und mit Synovia efüllte Säcke von 1‴ bis 10‴ Dm., welche überhaupt zwi-ɛhen solchen Theilen liegen, die bei Bewegungen einen .arken Druck und Reibung erleiden. Daher finden sie sich n häufigsten zwischen Knochen und Sehnen in der Nähe ırer Insertion, geben ihnen eine elastische Unterlage, und ergröfsern den Insertionswinkel. Zuweilen werden sie von er Sehne so stark eingedrükt, dafs sie zu beiden Seiten erselben hervorquellen, und sie ziemlich vollständig um-eben. — Seltener finden sich Schleimbeutel zwischen zwei ehnen, oder zwei Muskeln, oder zwei Knochen; häufiger agegen unter solchen Stellen der äufseren Haut, welche uf harten fibrösen Theilen der Gelenke oder auf Knochen-ervorragungen dicht aufliegen, und bei Bewegungen stark espannt und einer bedeutenden Reibung ausgesetzt werden. ıetztere nennt man *Bursae synoviales* s. mucosae *subcutaneae;*

sie finden sich vorzüglich an der Streckseite der Ginglymi der Extremitäten. — Auch in den Höhlen der Schleimbeutel bemerkt man nicht selten hervorragende Falten der Synovialhaut mit röthlichen körnigen Fettanhäufungen.

Hautsystem.

Das Hautsystem begreift diejenigen weichen und feuchten, aus verdichtetem Zellstoff gewebten, sehr gefäfs- und nervenreichen, häutigen Ausbreitungen, welche die Aufsenfläche des Körpers selbst, oder die von Aufsen her zugänglichen Höhlen zusammengesetzter Organe bekleiden; welche nur mit einer Fläche angeheftet sind; und deren freie, nur von einer dünnen Hornschicht überzogene Fläche, durch sehr zahlreiche kleine Hervorragungen, ein rauhes Ansehn darbietet. Diese Hervorragungen von sehr verschiedener Gröfse und Gestalt, bestehen aus feinen Gefäfsschlingen und Nervenendigungen, und werden mit einem allgemeinen Ausdruck als *Warzengebilde, Textus papillaris*, Corpus papillare, bezeichnet.

Es gehören zu diesem System die äufsere Haut, Cutis, und die inneren Schleimhäute, Membranae mucosae; welche obwohl merklich von einander verschieden, dennoch in jenen wesentlichen Beziehungen einander gleich kommen. Erstere ist die allgemeine äufsere Hülle des ganzen Körpers, welche nur einzelne gröfsere Öffnungen enthält: diese Öffnungen, Aperturae cutis, sind die Augenliedspalten, die Mündungen der äufseren Gehörgänge, die Nasenlöcher, die Mundspalte, der After, die Mündungen der Harnröhre und der weiblichen Geschlechtstheile. Die letzteren überziehen die inneren Flächen der zahlreichen hohlen und röhrenförmigen Organe und Apparate, welche zwar im Innern des Körpers verborgen, aber durch jene Öffnungen von Aufsen her zugänglich sind: und gehen an den Rändern jener Öffnungen ununterbrochen in die äufsere Haut über.

I. Schleimhäute, Membranae mucosae, sind weiche, weifs- weifsröthliche oder rothe, aus verdichtetem Zellstoff gewebte, und *mit Schleimdrüsen versehene* Häute. Ihre Dicke ist sehr verschieden, ihre Festigkeit gering: dagegen sind sie sehr ausdehnbar, ziemlich elastisch, und besitzen Contractilität und Empfindlichkeit in nicht geringem, stellen-

eise sogar ausgezeichnet hohem Grade. Ihre befestigte er angewachsene (äufsere) Fläche ist durch eine Lage urzen, ziemlich dichten, fettlosen Zellgewebes (welche an anchen Stellen Tunica nervea genannt wird), an den in- ren Umfang hohler Organe festgeheftet; und steht dadurch häufigsten mit Muskelhäuten, fibrösen und Zellhäuten Berührung. Ihre freie (innere) Fläche ist der Höhlung gewandt, nur von Epithelium bekleidet, stets feucht und lüpfrig, und mit einer eigenthümlichen Flüssigkeit, dem *hleim, Mucus*, überzogen. Dieser Schleim wird vielleicht manchen Stellen in kleinen Vertiefungen der Schleimhaut bst bereitet; in der Regel jedoch von den Schleimdrüsen gesondert, welche gröfstentheils über die befestigte Fläche r Schleimhaut hervorragen, und in der verbindenden llgewebsschicht gelagert, zuweilen auch weiter von der hleimhaut entfernt sind. Indessen liegen die Mündungen eser Drüsen stets im Gewebe der Schleimhaut selbst, und gieſsen den Schleim auf die freie Fläche der letzteren. . Drüsensystem). — Die gröfseren der zahlreichen Blut- id Lymphgefäfse und Nerven verästeln sich in der Zell- websschicht an der befestigten Fläche, und dringen als- nn durch die ganze Dicke der Schleimhaut auf die freie äche derselben: hier bilden die ersteren ein sehr enges etz zarter meistens farbloser Gefäfse, zwischen welchen erall die Anfänge der Lymphgefäfse, und wahrscheinlich ch die feinsten Nervenendigungen verbreitet sind. Auf r freien Fläche erheben sich sehr zahlreiche kleinere und öfsere Hervorragungen, welche Büschel der feinsten Ge- fsschlingen, blasenartige Anfänge der Lymphgefäfse, Ner- nendigungen und feinen Zellstoff enthalten. Die mehr ndlichen Hervorragungen von derberer Textur, welche ehr Blutgefäfse und Nerven besitzen, werden Wärzchen, pillae, genannt; dagegen die weicheren, platten, flocken- nlichen Hervorragungen, welche mehr Anfänge der Lymph- efäfse enthalten, als Zotten, Villi, bezeichnet zu werden legen. Durch diese Hervorragungen erscheint die freie läche der Schleimhaut bedeutend rauher, als die freie Fläche er serösen und Synovialhäute. — Aufserdem zeigen sich f ihrer freien Fläche öfters stärkere längliche Erhaben- eiten, Runzeln, Falten (häufig Frenula genannt), und Klap-

pen (Valvulae), welche aus zwei Platten der Schleimhaut bestehen.

Es kommen im m. K. mehrere von einander gänzlich getrennte Ausbreitungen von Schleimhäuten vor.

1. Die ausgedehnteste von allen ist die Schleimhaut des Digestions- und Respirationsapparats, Membrana mucosa pneumenterica s. gastropulmonalis, welche in Gestalt eines Kanals mit mehreren blinden Verlängerungen von den Nasenlöchern und der Mundspalte bis zum After reicht. Sie überzieht in ununterbrochenem Zusammenhange die Nasenhöhle mit ihren Nebenhöhlen, und den Nasenthränengang und Thränensack; die Mundhöhle mit der Zunge, Gaumen, und Speichelgängen, die Höhle des Schlundkopfs (Rachen) mit den Tubae Eustachii, den Paukenhöhlen und Cellulae mastoideae; steigt alsdann mit ihrer vorderen Abtheilung in den Kehlkopf, die Luftröhre und deren feinere Verzweigungen (Bronchien); ihre hintere Abtheilung bekleidet die Speiseröhre, den Magen und Darmkanal, die Gallengänge, die Gallenblase, und den Ductus pancreaticus.

2. Eine andere grofse Schleimhaut ist den Harn- und Geschlechtsorganen bestimmt — Membrana mucosa genitourinaria: sie fängt theils im Eingange der weiblichen Geschlechtsorgane an und bekleidet die Schamlefzen, Scheide, Gebärmutter und Muttertrompeten: theils beginnt sie an der Mündung der Harnröhre, und steigt in ihr zur Höhle der Harnblase, der Harnleiter, bis zu den Nierenkelchen aufwärts; bekleidet im männlichen Geschlechte auch die Samenausführungsgänge und Samenbläschen, so wie die Ausführungsgänge der Prostata und Cowperschen Drüsen.

3. Die Bindehaut, Tunica conjunctiva, an der hinteren Fläche der Augenlieder und der vorderen Fläche des Augapfels, welche durch die Thränenkanälchen mit der Nasenschleimhaut in genauer Verbindung steht, und

4. die Haut des äufseren Gehörganges — sind kleine blinde Schleimhautsäcke, welche manche Eigenthümlichkeiten darbieten.

5. Auch die Milchgänge werden inwendig von einer Schleimhaut bekleidet.

II. Die äufsere Haut oder *Lederhaut*, *Cutis s. Corium s.* Derma, folgt in ihrer Ausbreitung genau der Oberfläch

s Körpers und bildet dessen allgemeine Hülle: ihre freie
fsere, nur von dem Oberhäutchen bekleidete Fläche bildet
n äufsersten Umfang desselben; ihre befestigte innere
äche ist durch das Unterhautzellgewebe an die tieferlie-
nden Organe, meistens an Fasciae musculares, locker an-
heftet, so dafs sie sich mehr oder weniger leicht verschie-
n und in Falten aufheben läfst. Sie ist beträchtlich dicker,
s die Schleimhäute; weifs und an der freien Oberfläche
thlich weifs; aus innig verflochtenen und in verschiede-
n Richtungen durchkreuzten Zellstofffasern gewebt; da-
r sie bei grofser Dichtigkeit und Stärke dennoch einen
hen Grad von Dehnbarkeit, Elasticität und Contractilität
sitzt. Sie erhält eine grofse Anzahl von Blut- und Lymph-
fäfsen, und aufserordentlich zahlreiche Nerven, die in-
ssen nicht an alle Stellen der Haut gleichmäfsig vertheilt
nd: diese stammen von den Nn. encephalo-spinales her,
stehen gänzlich aus Empfindungsnervenfasern, und ver-
ihen der Haut den höchsten Grad der allgemeinen Em-
indlichkeit, so dafs sie als das allgemeine Organ des Tast-
nnes, Organon tactus, anzusehen ist.

Die frische Haut enthält ungefähr 32½ p. C. von Ge-
fsen durchzogene Zellstofffasern, welche sich in kochen-
m Wasser, in Säuren und Alkalien, in Leim verwandeln;
nd 67½ p. C. Flüssigkeiten, bestehend aus

Wasser	57,5 p. C.
Eiweifs	1,5 - -
Alcohol-Extract	0,8 - -
Wasser-Extracte	7,6 - -

dessen können letztgenannte Stoffe auch — nicht dem
autgewebe selbst — sondern dem Sebum cutaneum ange-
ören.

Die befestigte Fläche der Haut ist bei Weitem lockerer
ewebt, als die freie Fläche; sie besitzt zahlreiche weite
wischenräume oder Maschen, welche mit Fett oder Zell-
ewebsserum angefüllt sind: und geht ohne deutliche Grenze
das Unterhautzellgewebe über, und zwar meistens in
anniculus adiposus, welcher gleichsam ein weiches Polster
ir die Haut abgiebt, und zu dem Ende an einigen Stellen
ich Bursae synoviales subcutaneae (S. 69.) enthält. Von
en durch die Haut bedeckten Fascien und Muskeln gehen

hin und wieder Sehnenfasern und Muskelfasern in das Gewebe ihrer inneren Fläche über, so dafs die Haut an solchen Stellen durch die Contraction gewisser Muskeln stärker gespannt oder wirklich bewegt werden kann. — Auf der dicht gewebten freien Fläche des Corium verbreitet sich ein äufserst enges und gleichförmiges Netz von nicht sehr feinen Capillargefäfsen und Saugadern; erstere geben der Hautoberfläche die röthliche und stellenweise selbst rothe Farbe, und nehmen wesentlichen Antheil an der Bildung des Textus papillaris. Dieser besteht aus rundlichen oder länglich rundlichen Hervorragungen von ungefähr $^1/_{30}$‴ Dm., zusammengesetzt aus Büscheln von Gefäfsschlingen, die dem oberflächlichen Capillargefäfsnetz angehören, und aus Nervenendigungen: — *Gefühlswärzchen, Papillae tactus*, genannt: sie stehen an den meisten Stellen nahe beisammen, aber einzeln; an anderen vorzüglich empfindlichen Stellen, namentlich an den Fingern, fliefsen sie zusammen, und bilden parallele, gekrümmte, zum Theil spiral und wirbelförmig laufende Streifen von $^1/_6$‴ Breite, welche durch schmalere Furchen von einander geschieden, und mit kleinen runden Grübchen versehen sind.

Aufser den grofsen Öffnungen der Haut, Aperturae cutis (S. 70.), an welchen diese in die Schleimhäute übergeht, finden sich noch zahlreiche kleinere Löcher, welche nur in geschlossene häutige Säckchen, nämlich in die Haarbälge und in die Talgdrüsen führen, und daher meistens von einem Haare, oder von einem Klümpchen Sebum cutaneum, oder von beiden zugleich angefüllt werden; indem ein Haarbalg und eine Talgdrüse sehr häufig eine gemeinschaftliche Mündung auf der äufseren Hautfläche besitzen. — Aufserdem bildet die Haut durch Verdoppelung einige längere Falten und eine grofse Anzahl von Runzeln; die ersteren finden sich an den Genitalien als sog. Vorhäute, Praeputia, und Schamlefzen, Labia. Unter den letzteren bemerkt man wenige gröfsere Runzeln, welche an häufig bewegten Stellen sich bilden, besonders wenn hier der Panniculus adiposus dünn ist oder gänzlich fehlt, also die Haut fester an den unterliegenden Theilen hängt und nicht von einem Fettpolster ausgespannt wird: z. B. an den Augenliedern, an den Gelenken, nicht selten auch an der Stirn

d Wangen: die kleineren Runzeln sind dagegen sehr zahlich, kurz, schmal, und durchkreuzen einander häufig tzförmig. Alle diese Runzeln, insbesondere die gröfseren, rschwinden durch Ausdehnung der Haut, vorzüglich wenn ese durch stärkere Anhäufung von Fett oder Serum im terhautzellgewebe bewirkt wird.

Im Gesichte, an der Vorderfläche des Körpers, und an r inneren Seite der Glieder, mit Ausnahme der Handteller d Fufssohlen, ist die Cutis dünner und weicher, als auf m Kopfe, am Rücken und der äufseren Seite der Glieder: z. B. an den Augenliedern $^1/_4'''$, auf dem Rücken $^5/_4'''$ ck. An weiblichen Körpern ist sie im Allgemeinen dünr und weicher, als an männlichen.

Die Haut ist nicht allein die allgemeine schützende ecke in Gemeinschaft mit dem Unterhautzellgewebe, und s Organ des Tastsinns: sondern steht auch noch einer ichtigen Absonderung, der *Hautausdünstung*, *Perspiratio tanea*, vor; durch welche die Temperatur des Körpers gulirt, und verschiedene dem Leben feindliche Materien s dem Blute ausgeschieden und entfernt werden. Diese sdünstung geht meistens unmerklich in dunstförmiger estalt vor sich als Perspiratio insensibilis: oft aber auch tropfbar flüssiger Gestalt als *Schweifs*, *Sudor*. Die Ausnstungsmaterie, Materia perspirabilis, hat einen eigenümlichen Geruch, enthält überhaupt Wasser in grofser enge; ferner Kohlensäure uud milchsaures (essigsaures?) mmoniak. In dem trockenen Rückstande des Schweifses, elcher 0,5 bis 1,25 p. C. beträgt, hat man aufserdem an Vasser-Fleischextract, kohlensaurem, phosphorsaurem und hwefelsaurem Natron ungefähr 21 p. C.; an Alcohol-eischextract mit Chlornatrium und Chlorammonium 48 C., an Alcohol-Fleischextract mit Milchsäure und milchuren Salzen 29 p. C.: und in der Asche eine geringe enge von phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk und puren von Eisenoxyd, aufgefunden. Übrigens ist die autausdünstung invidnell, und selbst nach den einzelnen örperstellen eines und desselben Individuums, merklich erschieden.

Hornsystem.

Die reine Hornsubstanz ist hart, trocken, elastisch und durchsichtig; indessen erscheint sie, wenn sie von Flüssigkeiten durchdrungen ist, weich und opak; und wenn Pigmente und Erden in ihr abgelagert sind, verschiedentlich gefärbt, undurchsichtig und brüchig. Sie besitzt weder Gefäfse noch Nerven, und ist daher vollkommen unempfindlich: sie wird aus Capillargefäfsnetzen, theils auf der freien Fläche der Schleimhäute und Lederhaut, theils in besonderen häutigen Säcken erzeugt, und als eine leblose Masse nach aufsen hin abgesetzt: sie findet sich nämlich nur an der äufseren Fläche des Körpers, und in solchen Höhlen, die dem Zutritte der Atmosphäre ausgesetzt sind. Bei ihrer Erzeugung erscheint sie im weichen Zustande (wenn sie nicht schon von Anfang an von Erden durchdrungen ist); erhärtet aber schnell durch Berührung der Luft; und erzeugt sich, wo sie zerstört worden, schnell von Neuem.

Sie kommt im m. K. vor in der Form dünner häutiger Ausbreitungen, Epithelium, Oberhaut: oder dickerer Platten, Nägel: oder dünner Fäden, Haare: oder zapfenähnlicher Körper, Zähne.

I. Das Epithelium ist eine dünne, weiche, etwas brüchige, vollkommen durchsichtige, glatte Hornschichte, welche die freie Fläche der Schleimhäute überzieht; vorzüglich dick und fest ist es in der Nähe der grofsen Hautöffnungen, woselbst es mit der Oberhaut ununterbrochen zusammenhängt; namentlich in der Mund- und Nasenhöhle, im Schlundkopf, Kehlkopf, Speiseröhre, Magen, im unteren Theile des Mastdarms, in der Harnröhre: und an diesen Stellen meistens $^1/_{25}'''$ dick. An den weiter nach Innen liegenden Ausbreitungen der Schleimhäute ist es weicher und äufserst zart.

II. Die Oberhaut, Epidermis s. Cuticula bildet den äufsersten Überzug des Körpers, geht an den grofsen Öffnungen der Cutis in das Epithelium über, und ist gleich diesem eine dünne homogene Hornplatte; jedoch dicker, trockner, fester und elastischer als das Epithelium; wenigstens $^1/_{20}'''$, und an der Hohlhandfläche und Fufssohle $^1/_2'''$ bis $1'''$ dick. Sie folgt allen Erhabenheiten und Vertiefun-

n der Cutis, daher ihre äufsere Fläche dieselben Runzeln
d übrigen dem Papillargewebe angehörigen Hervorra-
ugen und Grübchen darbietet. An und für sich ist diese
fsere Fläche glatt, mattglänzend, härter und trockener
die innere, und in beständiger Abnutzung begriffen: sie
rfällt nämlich bei anhaltender Berührung der Luft in
nne über einander liegende Blättchen, welche sich von
lbst, oder durch mechanische Einwirkung anderer Körper
ösen, und von tieferen Schichten der Epidermis ersetzt
rden. Ihre innere Fläche ist mit der Cutis unmittelbar
d innigst verbunden, ist weicher, rauher, und weniger
rchsichtig, als die äufsere; man bemerkt an ihr zahlrei-
e Grübchen (Abdrücke der Papillae der Cutis), und im
ıfang derselben feine zaserige Hervorragungen, welche
Verein mit jenen Grübchen der ganzen inneren Fläche
ı unregelmäfsig netzförmiges Ansehen geben.

Die Epidermis hat, gleich dem Epithelium, kein durch-
s compactes Gefüge, sondern enthält zahlreiche unregel-
ifsig rundliche Zellchen von $^1/_{70}$‴ bis $^1/_{720}$‴ Dm. welche
ofsentheils nicht mit einander communiciren. Nirgends
sie von eigentlichen Löchern durchbohrt: sie bildet
er zahlreiche, auf der inneren Fläche hervorragende,
hrenförmige oder trichterförmige Scheiden, welche durch
e kleinen Löcher der Cutis in die Haarbälge und Talg-
äsen eindringen. Von wässerigen Flüssigkeiten wird sie
mählig durchweicht, und läfst alsdann diese in Dunstform
er in kleinen Tropfen mit Leichtigkeit durchdringen:
wie sie auch im trockenen Zustande gasförmigen und
nchen anderen Stoffen den Durchgang durch ihr Gewebe
bst gestattet. Sie bestimmt die Farbe der Aufsenfläche
s Körpers, den Teint. Wo sie dünn und vollkommen
rchsichtig ist, läfst sie die weifse oder weifsröthliche Cu-
hindurchscheinen, z. B. bei blonden Europäern: indes-
n ist sie auch bei diesen in einzelnen Gegenden (den
hselhöhlen, Genitalien u. a.) gelblich gefärbt, und an den
ckeren Stellen weifslich und wenig durchsichtig. Bei
ünetten Menschen ist sie stärker und allgemeiner gelb-
h oder gelbbräunlich gefärbt, und daher weniger durch-
chtig; beim Neger grau, schwarz oder braunschwarz,
d undurchsichtig. Das Pigment ist in Gestalt sehr klei-

ner Schuppen und Körner in das ganze Gewebe der Oberhaut eingestreuet, vorzüglich an der inneren Fläche; welche aus diesem Grunde, und wegen ihrer mehr feuchten und rauhen Beschaffenheit und geringeren Durchsichtigkeit, dunkler als die äufsere erscheint.

Die Oberhaut enthält ungefähr 95 p. C. Hornstoff, ½ p. C. Fett, einen geringen Antheil phosphorsauren und schwefelsauren Kalk, und Spuren von Mangan und Eisen: aufserdem hat man in ihr einige p. C. der Alcoholextracte, Milchsäure und Salze gefunden, welche in der Ausdünstungsmaterie und dem Sebum cutaneum enthalten sind, und wahrscheinlich der Oberhaut nur noch ankleben.

Die innerste zaserige weichere Schichte der Epidermis, welche durch Einwirkung des heifsen Wassers und durch Fäulnifs leicht zerfliefst, und alsdann einige Ähnlichkeit mit einem zähen Schleim darbietet, wird von Vielen (aber mit Unrecht) als ein besonderes Organ angesehen, und mit dem Namen des Malpighischen Schleimnetzes, Mucus Malpighii, Rete mucosum, Corpus reticulare, belegt. Andere verstehen unter dem Namen Reticulum das unter der Epidermis liegende aber der Cutis angehörige Capillargefäfsnetz. Eben so unrichtig werden einzelne hellere und dunklere Lagen einer schwieligen Epidermis als verschiedene eigenthümlich organisirte Schichten betrachtet.

Die Substanz, aus welcher das Epithelium und die Epidermis bestehen, wird aus dem oberflächlichen Gefäfsnetz der Schleimhäute und des Corium abgesetzt. Es dienen diese Häute als schützende Hüllen des Textus papillaris: die Oberhaut hindert auch die Verdunstung, da sie erst dann wässerige Flüssigkeiten durchgehen läfst, wenn ihr Gewebe solche in beträchtlicher Menge angeschluckt hat und durchaus feucht geworden ist: auch hemmt sie in gewissem Grade den Durchgang der Luft, der Wärme und Kälte, und der electrischen Strömungen.

III. Die Nägel, Ungues, sind dünne, halbdurchsichtige, gebogene Hornplatten, zwanzig an der Zahl, welche auf dem Rücken der Finger- und Zehenspitzen der Epidermis anhangen. Sie sind dicker, härter und elastischer, als die Epidermis, von mehr dichtem homogenem Gefüge, indem sie weniger zahlreiche und kleinere Zellchen von $^1/_{545}$‴ bis

^{333}‴ Dm. einschliefsen: enthalten übrigens oft regellos wechselnde, dunklere und hellere, lockere und dichtere hichten von ungefähr $^{1}/_{60}$‴ Dicke, ohne aus einzelnen geennten, über einander liegenden Blättern zu bestehen. er hintere dünnere weichere Theil, die *Nagelwurzel*, *adix unguis*, ist fast gänzlich in einer Falte des Corium rborgen; sie beträgt den fünften Theil der Länge des nzen Nagels, und endigt hinterwärts mit einem convexen harfen Rande: nach vorn geht sie in den Nagelkörper über, dafs ihr vorderes Ende, von der Haut unbedeckt, als ein eifser halbmondförmiger Fleck, Lunula, erscheint. Der rdere dickste Theil des Nagels, die *Nagelspitze*, ragt über e Finger- oder Zehenspitze frei hervor, und ist stumpfitzig, wenn sie nicht beschnitten wird. Der mittlere Theil der *Nagelkörper*; die Seitenränder desselben stecken öfstentheils in Falten der Cutis, seine obere Fläche ist nvex, glatt und hart; die untere concave weichere Fläche sitzt longitudinale Furchen und Erhabenheiten, und durch ein gestreiftes Ansehn; und wird von Epidermis geldet. Letztere macht an der Wurzel und an den Rändern nen Vorsprung, begiebt sich alsdann unter den Nagel, id verschmilzt aufs Genaueste mit dessen unterer Fläche, s sie unter der Nagelspitze von demselben sich entfernt, id an die Fingerspitze übergeht.

Die Stelle des Corium auf dem Rücken der Fingerspitze, it welcher die concave Seite des Nagels in Berührung eht, und die Falte derselben, in welcher die Nagelwurzel eckt, sind dick, weich und vorzüglich gefäfsreich und npfindlich: auf der ersteren besteht der Textus papillaris s longitudinalen Erhabenheiten und Furchen, welche sich der concaven Seite des Nagels abdrucken, und ihr das streifte Ansehn geben. Beide Hautstellen, vorzüglich aber e Falte, die *Nagelmutter*, *Matrix unguis*, genannt, setzen e anfänglich weiche Substanz des Nagels ab: welcher daer von der Wurzel und concaven Fläche aus hervorwächst, id nach theilweiser Zerstörung leicht von hier aus sich inzlich reproducirt. Der Nagel wird, wie die Epidermis, ir durch ein Zusammenkleben seiner weicheren, genau liegenden concaven Fläche und Wurzel mit dem feuchn Corium, nicht aber durch gefaserte Organe oder

Gefäfse, befestigt. In weiblichen Körpern sind Epidermi und Nägel feiner und durchsichtiger.

Die Nägel geben den Finger- und Zehenspitzen gröfser Festigkeit, erleichtern bei ersteren das Ergreifen und Fes halten, und erhöhen durch Gegendruck die Empfindlichke beim Tasten.

IV. Die Haare, Pili s. Crines, sind dünne aber ver hältnifsmäfsig sehr starke, solide Hornfäden, welche d ganze Oberfläche des Körpers mit Ausnahme weniger Stelle bedecken. Man unterscheidet an ihnen den über die Ha frei hervorragenden Haarschaft, und die in der Haut ve borgene Wurzel. Der Haarschaft oder Haarcylinder, *Tru cus pili,* ist hart, glatt, trocken, biegsam, um ungefähr e Viertheil seiner Länge ausdehnbar, und sehr elastisch: se ten vollkommen gerade, sondern meistens leicht gekrümm öfters auch wellenförmig gebogen oder spiralförmig gewu den. Haare der ersteren Art bleiben auch bei gröfsere Länge schlicht; solche der letzteren Art aber kräuseln sic bilden Locken. Der Haarcylinder ist an seiner Oberfläch und auf dem Durchschnitt stark glänzend, weifs, grau, gel roth, braun oder schwarz in den verschiedensten Nüanc gefärbt; durchsichtig oder wenigstens durchscheinend. Sei Länge wechselt zwischen $\frac{1}{2}'''$ und 5′; sein Dm. zwisch $\frac{1}{13}'''$ und $\frac{1}{325}'''$; sein freies Ende ist stark zugespitzt; se ne Gestalt die eines plattgedrückten und zuweilen an ein Seite ausgehöhlten Cylinders; so dafs der Haarschaft i Allgemeinen um ein Viertheil breiter als dick ist, u sein Durchnitt oval oder nierenförmig erscheint. Je gröb und krauser das Haar ist, desto mehr ist es plattgedrück und zuweilen um mehr als das Doppelte breiter, als dic An der Oberfläcke der dickeren Haarcylinder bemerkt m zahlreiche, unregelmäfsige, queer- und schräglaufen Furchen von $\frac{1}{1200}'''$ Breite, welche $\frac{1}{200}'''$ bis $\frac{1}{400}'''$ v einander entfernt stehen, und häufig zusammenfliefsen: z weilen auch eine beinahe spirale Richtung annehmen. Das I nere des Haarcylinders besteht aus gleichartiger dicht Hornsubstanz, welche nur künstlich in feinere Fäden si zertheilen läfst; keinen Kanal, aber einzelne, kleine, rundli eckige, nicht zusammenhangende Zellchen von $\frac{1}{650}'''$ $\frac{1}{1600}'''$ Dm. enthält; und in der Mitte dunkler Haare

ıkler als die Peripherie und die Spitze erscheint: indem ar die Farbe des Haars durch die ganze Substanz und ke desselben ziemlich gleichmäfsig verbreitet ist, vorlich bei hellen Haaren: aber bei dunklen Haaren sich einzelnen Stellen, und besonders gegen die Mitte hin äuft, und hier in Gestalt kleiner unregelmäfsiger dunk- Körnchen von verschiedener Gröfse erscheint.

Die *Wurzel* des Haars, *Radix pili*, ist in der Haut borgen, merklich weicher und etwas dünner und schwär als der Schaft, und meistens weifslich opak, weniıs heller gefärbt als der Cylinder. Nur das äufserste le der Wurzel, die sog. *Haarzwiebel*, *Bulbus pili*, ist as dicker als der Haarschaft und leicht ausgehöhlt. Die urzel steckt in dem *Haarbalge*, *Folliculus pili*, in welm das Haar erzeugt wird. Es ist dieser ein länglich irmiger aus einer einfachen weifslichen Haut gebildeter k, welcher bei gröfseren Haaren mit seinem geschlossei Grunde in das Unterhautzellgewebe reicht, mit seinem as erweiterten mittlern Theil in der Substanz des Com steckt, und mit einer engeren Mündung auf der freiFläche des Corium sich öffnet. Inwendig ist der Haarg glatt, mit einer weifslichen oder röthlichen Flüssigkeit üllt: er hängt mit der Haarwurzel nur durch ein weis rundliches Knötchen, *den Haarkeim*, *Blastema pili* s. *pa pili*, zusammen, welches von dem Boden des Haarges sich erhebt, röthlich, bräunlich oder schwärzlich ärbt, gefäfsreich und empfindlich ist, die Aushöhlung der arzwiebel ausfüllt, und die Haarsubstanz absondert. Die ndung des Haarbalgs umschliefst die Haarwurzel nicht au, dagegen dringt die Epidermis durch dieselbe in Get einer engen trichterförmigen Scheide in den Haarbalg , lockert sich in demselben etwas auf, wird dicker, weir; bekleidet die Haarwurzel ringsum sehr genau, und schmilzt ohne deutliche Gränze mit dem Umfange der arzwiebel. Durch diese Umgebung mit Epidermis wird Haarwurzel in der Mitte des Balges bedeutend dicker, die Mündung des Balges; und dadurch, sowie durch rklebung der Zwiebel mit der Pulpa, die Haarwurzel dem Balge festgehalten. Die Mündung des Haarbalges, lcher zuweilen zwei Haare enthält, ist oft zugleich die

einer Talgdrüse; und in diesem Falle wird das Haar, indem es auf die Haut hervortritt, von einem Klümpchen des Sebum cutaneum umgeben. Der ganze Haarbalg und die von ihm eingeschlossene Wurzel sind meistens schräg vom Kopfe gegen die Füfse hin gerichtet.

Die Haare enthalten aufser der Hornsubstanz noch ein flüssiges Fett, Haaröl, welches in rothen Haaren eine blutrothe, in schwarzen Haaren eine graugrüne Farbe hat, in blonden Haaren gelblich oder farblos ist: ferner Schwefeleisen, welches im schwarzen Haar reichlicher vorhanden ist. In der Asche der Haare findet man Eisenoxyd, schwefelsauren, phosphorsauren und kohlensauren Kalk, Spuren von Kieselerde und Manganoxyd. Aufserdem erhält man aus ihnen Chlornatrium, Chlorkalium, Chlorammonium, Alcoholextract mit Milchsäure und milchsauren Salzen, und Wasserextracte: welche aber sämmtlich nicht den Haaren selbst, sondern der ihnen anklebenden Ausdünstungsmaterie und Sebum cutaneum angehören. — Sie sind sehr schlechte Wärmeleiter, halten daher die Haut warm, begünstigen die Ausdünstung; durch Reiben werden sie stark electrisch.

Längere und dickere Haare stehen an gewissen Stellen in dichten Haufen beisammen, z. B. das *Haupthaar*, *Capilli* s. Coma s. Cesaries; im Mittel $^1/_{27}'''$ breit und $^1/_{45}'''$ dick; — der *Bart*, *Barba*, am unteren Theile des Gesichts der Männer, $^1/_{16}'''$ breit und $^1/_{30}'''$ dick; — die *Schamhaare*, *Pubes*, an den äufseren Geschlechtstheilen und am After, welche stark gekräuselt und $^1/_{15}'''$ breit und $^1/_{33}'''$ dick sind; — die Haare in den Achselhöhlen, den Schamhaaren ähnlich. Kürzere Haare von mittlerer Stärke, meistens dünner als das Kopfhaar, stehen mehr oder weniger vereinzelt an der äufseren Seite der Extremitäten und auf der Brust der Männer; einzelne dichtere Haufen oder Reihen kurzer dicker Haare finden sich an den Augenbrauenbogen — *Augenbrauen*, *Supercilia:* an den Augenliedrändern — *Wimpern*, *Cilia*: in den Nasenlöchern — *Vibrissae:* im äufseren Gehörgange. An allen übrigen Stellen der Haut stehen nur sehr kurze feine weiche weifsliche Haare, *Wollhaar*, *Lanugo;* im Mittel $^1/_{140}'''$ breit und $^1/_{180}'''$ dick; und auch diese fehlen gänzlich an der Hohlhand und Fufssohle, an dem Rücken der dritten Finger- und Zehenglieder, an

er Vorderfläche der Augenlieder, und am vorderen Theile es männlichen Gliedes. Übrigens ist die Behaarung hinichtlich ihrer Dichtigkeit und der Stärke der einzelnen Haare individuell sehr verschieden: in weiblichen Körpern st sie überhaupt schwächer als im männlichen: bei ihnen ind am unteren Theile des Gesichts, auf der Brust und n der äufseren Seite der Glieder nur zarte kurze weifsche Haare vorhanden, und alle anderen Haare sind feier; nur das Kopfhaar zeichnet sich durch seine gröfsere änge aus.

V. Die Zähne, Dentes, sind zapfenförmige Körper von weifser Farbe, welche an Härte, Festigkeit und Sprödigkeit lle andere Organe übertreffen; aus Hornsubstanz und nochenerde zusammengesetzt und daher äufserlich den nochen ähnlich sind, im Innern aber einen weichen Kern nthalten.

Der weifse harte Theil des Zahns ist vollkommen gefäfslos und unempfindlich: er besteht aus einem in der Mundhöhle frei hervorragenden Theile, der *Zahnkrone, Corona dentis;* aus einem dünneren vom Zahnfleich umfafsten Theile, dem *Zahnhalse, Collum dentis;* und einer, in einer Zahnzelle (Alveolus) der Kieferknochen steckenden, einfachen oder zwei- bis vierfach gespaltenen *Zahnwurzel, Radix dentis.* Letztere wird von einer dünnen aber festen gefäfsreichen Zellhaut, *Capsula dentis*, umgeben, welche mit der Beinhaut des Alveolus genau verwachsen ist, und dadurch die in letzteren eingezapfte oder eingekeilte Wurzel noch genauer befestigt. Von der Krone und dem Collum wird die verhältnifsmäfsig kleine den Zahnkern enthaltende *Zahnhöhle, Cavum dentis,* umschlossen, deren Gestalt von der des ganzen Zahns abhängt: sie hat glatte Wände, und geht in einen oder mehrere enge Kanäle über, welche die einfache oder gespaltene Wurzel durchbohren, und an dem Ende derselben münden.

Im Gewebe des weifsen harten Theiles des Zahns unterscheidet man zwei Substanzen, das Zahnbein und den Schmelz. *Das Zahnbein* oder die Knochensubstanz der Zähne, *Ebur* s. Substantia ossea dentium, bildet das Innere der Krone, den Hals und die Wurzel, und enthält das Cavum dentis: ist weifs oder leicht gelblich weifs, am Ende

der Wurzel durchscheinend: vollkommen compact ohne Zellen und Kanäle: bricht am leichtesten nach der Länge des Zahns, und zeigt auf der matt glänzenden glatten Bruchfläche feine concentrische schillernde Streifen, welche gegen die Oberfläche des Zahns hin schwach convex gekrümmt sind. Es besteht aus

Thierischer Substanz (Hornstoff)	28,0
Phosphorsaurer Kalkerde mit Fluorcalcium .	64,3
Kohlensaurem Kalk	5,3
Phosphorsaurer Talkerde	1,0
Natron mit etwas Kochsalz	1,4
	100,0

Der *Schmelz* oder das Email, *Substantia vitrea dentium*, bildet die Rinde der Krone, an deren Zahnbein er äufserst fest anliegt, ohne mit ihm zu verschmelzen: an der Kaufläche der Krone ist er am dicksten, am Anfange des Halses am dünnsten. Er unterscheidet sich vom Zahnbein durch eine milchweifse leicht bläuliche Farbe, durch noch gröfsere Härte, Dichtigkeit, specifische Schwere und Sprödigkeit, durch lebhafteren Glanz seiner freien sehr glatten Fläche. Seine Bruchfläche erscheint dagegen matter und rauher, und zeigt gröbere Streifen, welche sämmtlich gegen den Mittelpunkt der Krone hin gerichtet sind, also auf der Kaufläche senkrecht, auf den Seitenflächen queer laufen, und gegen die Zahnhöhle hin leicht convex gekrümmt sind. Er besteht fast ganz aus unorganischen Stoffen, nämlich

Thierische Substanz, Alkali, Wasser . . .	2,0
Phosphorsaurer Kalk und Fluorcalcium . .	88,5
Kohlensaurer Kalk	8,0
Phosphorsaure Talkerde	1,5
	100,0

Der *Zahnkern* oder *Zahnkeim*, *Nucleus* s. *Blastema* s. *Pulpa dentis*, ist ein röthlicher weicher Körper, aus Zellstoff, und aus zahlreichen Capillargefäfsen und Nervenendigungen bestehend, deren Stämmchen durch die Kanäle der Wurzeln zu ihm gelangen. Er hat im Allgemeinen die Gestalt des Zahns selbst; ist das Organ für die Bildung des Zahnbeins, und ist um so gröfser, je weiter der Zahn von seiner vollkommenen Ausbildung entfernt ist. Geraume

eit vor der Entstehung des Zahns ist nämlich nur ein ndliches vollkommen geschlossenes *Zahnsäckchen* oder *ahnkapsel, Folliculus* s. *Capsula dentis,* vorhanden, welches it Ausnahme seines Bodens aus zwei häutigen Blättern esteht, und anfänglich nur mit röthlicher Flüssigkeit ge-llt ist. Aus dem Boden wächst der sehr grofse Zahn-eim hervor, auf dessen äufserer Fläche zuerst der äufserste mfang der Krone, alsdann der des Halses und des Anfan-s der Wurzel, sich ablagert. Der Schmelz wird aber n dem inneren Blatte des Zahnsäckchens oder aus der n dieser abgesonderten Flüssigkeit, welche den Zahnkeim nerhalb des Zahnsäckchens umspült, erzeugt; anfänglich als ne weiche feuchte von den Erdsalzen des Schmelzes durch-ungene Masse, welche nach und nach fest und hart wird. ei zunehmender Vergröfserung und Verdickung der Krone hwindet der die Krone umgebende Theil des Zahnsäck-ens und die mit demselben verwachsene Stelle des Zahn-eisches, so dafs die Krone in der Mundhöhle zum Vor-hein kommt („durchbricht"): alsdann bilden sich die Wurzeln weiter aus, der Keim wird in die verkleinerte öhle des Zahns vollkommen eingeschlossen; und der Rest s Zahnsäckchens oder Zahnkapsel bildet fernerhin den berzug des Halses und der Wurzel.

Im erwachsenen Körper finden sich 32 bleibende Zähne, ntes permanentes, deren Kronen aber erst vom sechsten s zum zwanzigsten Lebensjahre hervorbrechen. In den iheren Lebensperioden wird ihre Stelle von 20 Wechsel-hnen oder Milchzähnen, Dentes decidui s. lactei, einge-mmen, welche vor den noch in ihrer Ausbildung begrif-nen, und in den Kiefern verborgenen, bleibenden Zähnen ecken, und von diesen durch geringere Gröfse, weitere öhle und kürzere Wurzeln sich unterscheiden.

Drüsensystem.

Die Drüsen, Glandulae, sind weiche rundliche röthliche hr gefäfsreiche Körper, welche in besonderen in ihrem neren enthaltenen *Hohlräumen* eigenthümliche Flüssigkei-n absondern, und diese durch kürzere oder längere *Aus-hrungsgänge, Ductus excretorii,* auf die freien Flächen des autsystems ergiefsen.

Sie liegen theils an der Oberfläche des Körpers, meistens aber tiefer zwischen anderen Organen, und durch Zellgewebe befestigt. Ihre Gestalt ist sehr verschieden, häufig gelappt; ihre äufsere Fläche meistens höckerig, und öfters von einer eigenen fibrösen Haut, einer Tunica albuginea, oder von einer serösen Haut bekleidet. Ihre Gröfse wechselt von $^1/_{10}'''$ bis zu 12″ Dm.; ihre Farbe vom hellen Weifsroth bis zum tiefsten Braunroth. Ihr Gewebe besteht aus einem weichen zarten lockeren Zellstoff, in welchem die im Verhältnifs zur Gröfse der Drüse stets sehr zahlreichen und ansehnlichen Blutgefäfse und Saugadern sich verästeln, und Schlingen, Netze und Büschel der zartesten Capillargefäfse bilden: — aus verhältnifsmäfsig wenigen und dünnen meistens vom Gangliensysteme abstammenden Nerven: — und aus den von einer besonderen dünnen, aus dichtem Zellstoff gewebten, Haut umschlossenen Hohlräumen. Diese Hohlräume sind sehr verschieden an Anzahl, Gröfse und Gestalt; theils kleine Säcke, theils zahlreiche an baumförmig verzweigten Ausführungsgängen hangende Bläschen, theils lange enge gewundene Kanäle: alle diese Hohlräume sind aber beträchlich weiter als die kleinsten Capillargefäfse, welche mit sehr dichten und engen Netzen in den häutigen Wänden derselben sich verbreiten. Die Ausführungsgänge sind theils so kurz und weit, dafs sie von den Hohlräumen der Drüsen kaum sich unterscheiden, theils aber lang und verhältnifsmäfsig eng: sie werden wesentlich von einer Fortsetzung der Schleimhäute oder des Corium gebildet; erhalten aber noch eine äufsere starke Zellhaut, wenn sie nach ihrem Austritt aus der Drüse frei zwischen anderen Theilen verlaufen, bevor sie an einer entfernteren Stelle ausmünden. Gewisse einzelne Ausführungsgänge erweitern sich in ihrem Verlaufe zu geräumigen Schläuchen oder Blasen, in welchen die abgesonderte Flüssigkeit sich ansammeln und verweilen kann, bevor sie vollständig ausgeführt wird.

Die Drüsen haben geringe Festigkeit, und zerreifsen wegen ihres lockeren Baues und ihrer geringen Elasticität ziemlich leicht, wenn nicht der Zusammenhang ihres Gewebes durch eine starke Tunica albuginea gesichert ist sie besitzen nur geringe Contractilität, aber eine ausge

ichnete Sensibilität für Reize besonderer Art, obgleich eistens nur geringe Empfindlichkeit für äufsere Reize: re Nerven stammen gänzlich oder gröfsentheils vom Ganiensystem. Ihre Function ist die Bereitung der nach physchen Merkmalen, chemischer Zusammensetzung und physologischer Bedeutung sehr verschiedenen Drüsensäfte, elche aus dem Blute der Capillargefäfsnetze, die in den Wänden der Hohlräume sich verbreiten, abgesondert werı, die Hohlräume erfüllen, und durch die Ausführungsnge entleert werden: und welche theils noch zu anderen ebensverrichtungen verwandt, theils aus dem Körper völ- ausgestofsen werden; und ihn dadurch von Stoffen beeien, welche nicht mehr zu seiner Erhaltung brauchbar ler nöthig sind.

Nach ihrem mehr oder weniger künstlichen Bau zerllen die Drüsen in einfache und zusammengesetzte, und in ehrere Unterarten.

I. Einfache Drüsen, Glandulae simplices s. *Cryptae* Folliculi s. Lacunae. Kleine sackförmige Drüsen mit einer nzigen weiteren Höhle, deren Wände und Boden oft mit leineren Vertiefungen oder gegen die gröfsere Höhle hin fenen Zellen versehen sind. Eine jede solche Drüse münt mit einer besonderen weiten Öffnung oder einem sehr rzen weiten Ausführungsgange. Zu ihnen gehören die hleimdrüsen und Talgdrüsen.

1. *Schleimdrüsen* oder Schleimbälge, *Cryptae mucosae* s. lliculi mucosi, haben eine rundliche meistens linsenförmige estalt, eine grofse Höhle, aber verhältnifsmäfsig sehr dicke thliche Wände; und münden mit einfacher Öffnung. Die leinsten haben die Gröfse eines Sandkorns; die gröfseren nsenförmigen sind ungefähr 1‴ breit und ½‴ dick; ihre öhle ⅖‴ weit und ⅕‴ tief; die Mündung oder der kurze usführungsgang ist ⅙‴ weit und eben so lang, und wird wendig vom Epithelium bekleidet. Die kleineren Schleimrüsen liegen in der Schleimhaut selbst, die gröfseren an er befestigten Fläche der Schleimhäute in der verbindenen Zellgewebsschichte, so dafs nur ihre Mündung im Gevebe der Schleimhaut verborgen ist: einige werden sogar on der Schleimhaut durch andere Häute getrennt, und urchbohren die letzteren mit etwas längeren Ausführungs-

gängen. Sie liegen meistens einzeln oder nahe neben einander, Cryptae mucosae solitariae: an gewissen Stellen aber haufenweise aneinander gedrängt, Cryptae mucosae agminatae, z. B. die Glandulae Peyerianae im Dünndarm. Sie sondern *Schleim*, *Mucus*, ab, welcher die freie Fläche der Schleimhäute in dünneren oder dickeren Lagen überzieht und diese feucht und schlüpfrig erhält, und sie gegen unmittelbare Berührung reizender Substanzen schützt. Er ist dickflüssig, zähe, fädenziehend, schlüpfrig, klebrig, wasserhell oder opak und weifslich; und enthält zahlreiche weiche plattrundliche Körnchen von $^1/_{260}'''$ bis $^1/_{430}'''$ Dm., welche durch Reiben sich leicht in kleinere runde Körnchen von $^1/_{800}'''$ bis $^1/_{1200}'''$ Dm. theilen lassen. Er besteht vorzüglich aus Wasser und dem eigentlichen Schleim oder Schleimstoff mit einem höchst geringen Antheil Natron verbunden; und enthält aufserdem eine geringe Menge von Alcoholextract mit milchsauren Salzen, von wässerigen Extracten mit phosphorsauren Salzen, von Chlorkalium und Chlornatrium. Übrigens sind die Schleime der einzelnen Schleimhäute in chemischer Hinsicht merklich verschieden.

2. *Talgdrüsen* oder Hautbälge, *Cryptae sebaceae* s. Folliculi sebacei, haben eine längliche schlauchförmige, meistens flaschenförmige Gestalt, und dünne weifsliche oder durchsichtige Wände, und sind meistens mit kleinen offenen Zellen an ihrem Boden, zuweilen auch an den Wänden, versehen. Die gröfseren sind ungefähr $^1/_2'''$ lang und $^1/_5'''$ weit und ihre Zellen $^1/_{20}'''$ tief; ihre Mündung oder sehr kurzer Ausführungsgang hat im Mittel einen Dm. von $^1/_{10}'''$. Sie liegen gänzlich in der Substanz des Corium verborgen, und nur die längeren ragen mit ihrem Boden über dessen befestigte Fläche hinaus in das Unterhautzellgewebe: sie münden (häufig gemeinschaftlich mit einem Haarbalge) auf der freien Fläche der äufseren Haut und der Oberhaut, so dafs die letztere mit röhrenförmigen Verlängerungen in diese Drüse eindringt, und ihre Höhle (ganz oder zum Theil?) bekleidet. Sie stehen einzeln, nicht an einander gränzend, sind aber nicht an allen Stellen der Cutis gleich stark entwickelt; am zahlreichsten und ansehnlichsten findet man sie in der Nähe der grofsen Öffnungen der Haut, in der Umgebung des Mundes und der Nase, der Augenliederspalten, über

upt im Gesicht; am After, an den äufseren Geschlechts-
eilen: aber auch an der Bauch- und Rückenfläche des
ammes; weniger zahlreich und kleiner an den Extremi-
en: an den Händen und Füfsen scheinen sie gänzlich zu
ılen. Sie sondern die *Hautschmiere* oder Hautsalbe, *Se-
m cutaneum* s. Smegma, ab; ein weifsliches oder weifs-
lbliches fettiges Secret von der Consistenz eines dicken
es oder weicher Butter, bestehend (nach Esenbeck) aus

Talg	24,2 p. C.
Osmazom mit Spuren von Öl . .	12,6 - -
Wasserextracte	11,6 - -
Eiweifs und Käsestoff	24,2 - -
Kohlensaure Kalkerde	2,1 - -
Phosphorsaure Kalkerde	20,0 - -
Kohlensaure Talkerde	1,6 - -
Essigsaures und salzsaures Natron	Spuren.

Die Hautschmiere bietet indessen an verschiedenen Stel-
des Körpers bedeutende Abweichungen nach Consistenz,
sammensetzung und Geruch dar. Sie hängt sich an die
idermis und an die Haare fest, schützt sie bis zu einem
wissen Grade gegen Durchnässung, daher sie auch am
chlichsten an solchen Stellen abgesondert wird, welche
er häufigen Benetzung ausgesetzt sind: hindert zugleich
r auch eine zu starke Austrocknung der Epidermis, in-
n sie die zu schnelle Verdunstung des von Innen her die
idermis durchdringenden Wasserdunstes beschränkt. —

Zu den Cryptae sebaceae gehören noch die im äufseren
hörgange liegenden Ohrenschmalzdrüsen, Cryptae ceru-
nosae; und die, an den Augenliedern reihenweise ge-
llten, in der Caruncula lacrymalis haufenweise zusammen-
drängten, Glandulae Meibomianae: welche letztere durch
gröfsere Anzahl von Zellen innerhalb ihrer sehr läng-
nen Bälge schon den zusammengesetzten Drüsen sich an-
hern. Das Secret beider ist von dem eigentlichen Sebum
taneum in mehrerer Hinsicht abweichend.

II. Zusammengesetzte Drüsen, Glandulae compositae conglomeratae. Gröfsere Drüsen mit zahlreichen engeren
hlräumen, und verzweigten meistens längeren und engen
tsführungsgängen versehen.

1. *Glandulae aggregatae* s. agglutinatae: aus zahlrei-

chen gröfseren mit einander verwachsenen Cryptae zusammengesetzt, welche wiederum mit kleineren Cryptae zusammenhängen. Sie münden vermittelst mehrerer Öffnungen oder kurzer Ausführungsgänge, in welchen immer mehrere Cryptae zugleich ihren Ausgang finden. Nur die kleineren dieser Drüsen haben einen einzigen Ausführungsgang. Solche Glandulae aggregatae sind die gröfseren Schleimdrüsen der Zunge und Lippen, die Tonsillen, die Prostata und die Glandulae Cowperi.

2. *Glandulae acinosae,* blasige Drüsen. Diese meistens ansehnlichen Drüsen enthalten eine aufserordentlich grofse Anzahl kleiner dünnhäutiger, rundlich eckiger oder länglicher Bläschen, *Acini*, von $^1/_{50}$‴ bis $^1/_{100}$‴ Dm., und langen vielfach gespaltene und baumförmig verzweigte Ausführungsgänge, in welche die Acini sich öffnen. Die ganze Drüse ist mehr oder weniger deutlich in gröfsere und kleinere Lappen getheilt, welche aus kleineren rundlichen Körnchen, *Granula,* von ungefähr $^1/_{12}$‴ Dm. bestehen. Jedes Körnchen enthält einen dünnen Zweig (oder Wurzel) des Ausführungsganges, genau umgeben von an einander gedrängten Acini, welche aus der Haut des Ausführungsganges selbst gebildet zu sein scheinen, und daher auch als blasenartige Erweiterungen desselben angesehen werden können. Die Acini und der Zweig des Ausführungsganges, welche zusammen die Gestalt einer Traube nachahmen, werden von dichten Netzen der feinsten Capillargefäfse umsponnen, und von weichem Zellstoff zusammengehalten. Die Zweige des Ausführungsganges vereinigen sich zu gröfseren Ästen, deren jeder Lappen der Drüse einen enthält; und welche wiederum den einfachen oder mehrfach vorhandenen Stamm des Ausführungsganges zusammensetzen. Dieser ist bei einigen Drüsen ganz in der Substanz desselben verborgen, bei anderen aber liegt er eine längere Strecke frei.

Der Bau der Glandulae acinosae ist daher dem der Glandulae aggregatae ähnlich, nur dafs bei ersteren anstatt der gröfseren Cryptae die bei Weitem kleineren und zahlreicheren Acini sich finden, und anstatt kurzer wenig verzweigter Ausführungsgänge, hier bedeutend längere, verhältnifsmäfsig engere und vielfach verästelte Ductus excretorii vorhanden sind.

Es gehören hieher die Thränendrüsen, die Mund- und
ch-Speicheldrüsen, die Leber und die Brüste oder Milch-
sen.

3. *Glandulae tubulosae*, röhrige Drüsen. In diesen sind
Hohlräume sehr lange, enge, gröfstentheils stark ge-
ndene und geschlängelte, dünnhäutige Röhren, *Tubuli*
anales s. Ductus *secretorii*, welche in ihrer ganzen Länge
selbe Weite von $^1/_{12}$‴ bis $^1/_{90}$‴ beibehalten, und blind
ndigt sind. Sie werden von weichem Zellstoff zusam-
ngehalten und zu Knäueln vereinigt, welche einzelne
theilungen oder Lappen der Drüsen bilden: in ihren
änden verbreitet sich ein enges Capillargefäfsnetz. Sie
einigen sich zu mehreren etwas weiteren Röhren und
lann in einzelnen Ausführungsgängen, welche zuletzt zu
em einfachen langen Ausführungsgang zusammenfliefsen.
iche Drüsen sind die Nieren und die Hoden.

Zu den Drüsen werden nicht selten einige andere Or-
ne gerechnet, welche mit ersteren allerdings in manchen
ziehungen übereinkommen; dennoch aber, nach Berück-
htigung ihres allgemeinen Baues, oder ihres Gewebes,
er ihrer physiologischen Bedeutung, entweder zu anderen
stemen gezählt, oder als Organe von ganz eigenthümlicher
sammensetzung und Function angesehen werden müssen.
iche Organe sind die Eierstöcke, welche Höhlungen im
neren und einen nur zu gewissen Zeiten mit dem Eier-
ock sich verbindenden Ausführungsgang besitzen: die
ngen, welche eine den acinösen Drüsen ähnliche Textur
rbieten: und die S. 25 und 29 aufgeführten Blut- und
mphgefäfsknoten.

Eingeweide.

Zu den *Eingeweiden, Viscera, Splanchna*, rechnet man
e nur einmalo der doppelt im Körper vorhandenen Organe,
ren jedes einen durchaus eigenthümlichen sehr zusam-
engesetzten Bau darbietet, und den Systemen, welche nur
eichartige in gröfserer Anzahl vorhandene Organe be-
eifen, nicht sich unterordnen läfst. Aufser dem Zellstoff,
efäfsen und Nerven tragen zu der Zusammensetzung eines
ngeweides noch andere zu verschiedenen Systemen gehö-

rende Theile bei, z. B. Knorpel, Häute verschiedener Art, Muskelfasern, Drüsen u. a. m., ja sogar Häute und andere Organe von ganz eigenthümlichem Gewebe (Hornhaut, Krystalllinse u. a.): und zwar in solchem Verhältnifs, dafs keiner dieser zusammensetzenden Theile den anderen an Masse oder physiologischer Wichtigkeit bedeutend überwiegt. Je nachdem wenigere oder mehrere verschiedenen Systemen angehörige Theile in die Zusammensetzung eines Eingeweides eingehen, erscheint der Bau desselben einfacher oder zusammengesetzter; die meisten stellen einen ungemein complicirten, aus sehr vielen einzelnen Organen gebildeten Apparat dar, von denen einzelne ihres Gleichen nicht haben, und keinem der organischen Systeme ohne Zwang sich unterordnen lassen. Nach dieser Bestimmung gehören zu den Eingeweiden:

1) die Sinneswerkzeuge,
2) die Stimm- und Sprachorgane,
3) die Respirationsorgane,
4) der Verdauungskanal,
5) die Geschlechtsorgane.

Bei mehreren Eingeweiden nennt man die innere weichere Substanz oder das eigentliche Gewebe derselben, im Gegensatz zu der bekleidenden Haut, das Parenchyma des Eingeweides: ein Ausdruck, welcher auch auf conglomerirte mit einer besonderen Haut überzogene Drüsen, und auf die Milz, angewandt wird.

Die Bezeichnung: Eingeweide der gröfseren Höhlen des Körpers, des Bauchs, der Brust, des Kopfes — begreift nicht allein eigentliche Eingeweide, sondern auch andere gewissen Systemen durchaus angehörende Organe, z. B. die Centralorgane des Gefäfs- und Nervensystems, conglomerirte Drüfen u. a. m.

Zweiter Theil.

---

pecielle Anatomie

des

erwachsenen menschlichen Körpers.

Allgemeine Betrachtung der äufseren Form des Körpers.

Der menschliche Körper zerfällt in drei Hauptabtheigen, den Kopf, Caput, den Stamm oder Rumpf, Truncus, d die Gliedmafsen, Extremitates.

Der Kopf besitzt eine sehr vollständige knöcherne Grundge, und besteht aus dem nach oben und hinten liegenden öfseren eiförmigen Schädel, Cranium, und dem nach un- und vorn liegenden kleineren unregelmäfsig viereckigen sicht, Facies. Der höchste Theil des Schädels, der Schei-, Vertex, trennt den Vorderkopf, Sinciput, vom Hinterpf, Occiput: diese Gegenden sind vom Haupthaar bedeckt, t Ausnahme der Stirn, Frons, welche den vordersten tersten Theil des Vorderkopfs bildet. An den Seiten des hädels bemerkt man die Schläfen, Tempora, deren hinrer Theil gleichfalls behaart ist; und die äufseren Ohren, uriculae. Die Grundfläche des Schädels, Basis cranii, nliefst sich an den Gesichtstheil des Kopfes und an den ils. Im Inneren enthält der Schädel die grofse das Hirn schliefsende Schädelhöhle, Cavitas cranii, und die inneren hörorgane.

Das Gesicht enthält in der Mitte die äufsere Nase, nsus, mit ihrer Wurzel, Radix nasi, dem Rücken, Dorsum si, den Nasenflügeln, Alae nasi, den Nasenlöchern, Nares, d zwischen letzteren eine Scheidewand, Septum narium obile. Unter der Nase liegt die Mundgegend, Regio oris, elche die Ober- und Unterlippe, Labium superius und ferius, und zwischen beiden den Mund oder die Mundalte, Os s. Orificium oris, enthält: auf jeder Seite wird e Mundgegend von den Wangen- und Backengegenden rch eine vom Nasenflügel herablaufende Furche, Sulcus solabialis, abgegränzt; und von dem unter ihr liegenden inn, Mentum, durch eine gebogene Queerfurche, Sulcus entolabialis, getrennt. Zu beiden Seiten der Nasenwurzel gen die Augengegenden, Regiones oculares, mit dem oberen

und unteren Augenliede, Palpebra superior et inferior, und der Augenliedspalte, Fissura palpebrarum, in welcher der vordere Theil des Augapfels, Bulbus oculi, sichtbar wird: eine jede Augengegend wird von der Stirn durch die Augenbraue, Supercilium, geschieden; und unterwärts durch eine unter dem unteren Augenliede schräg gegen die Wange hinabsteigende breite Furche, Sulcus infrapalpebralis, begränzt. Auf die Augengegenden folgen nach unten und aufsen die Wangen, Genae, und die Backen, Buccae. Unter dem Kinn und den Backen liegt die Unterkinn- oder Unterkiefergegend, Regio submentalis s. submaxillaris, welche an den Hals sich schliefst; und hinter dieser, unter dem Ohre, die stark vertiefte Unterohrgegend, Regio subauricularis. Das Gesicht enthält vier Höhlen, die beiden Augenhöhlen, Orbitae, die Nasenhöhle, Cavum nasi, welche durch die Nasenscheidewand, Septum nasi, in zwei Seitenhälften getheilt ist; und die Mundhöhle, Cavum oris.

Der Stamm zerfällt in den Hals, Collum, die Brust, Thorax s. Pectus, und den Bauch oder Unterleib, Abdomen s. Venter. Die gemeinschaftliche Grundlage dieser drei Abtheilungen ist die Wirbelsäule oder der Rückgrat, Columna vertebralis, welche den Kanal für das Rückenmark, Canalis spinalis, in sich schliefst. Der Hals schliefst sich an die Schädelgrunddfläche und an das Gesicht: an seiner vorderen Fläche bemerkt man eine vom Kehlkopf gebildete Hervorragung, den sog. Adamsapfel, Protuberantia laryngea, und die unter ihr liegende Kehlgrube, Jugulum: an den Seitenflächen die, unterwärts von den hervorragenden Schlüsselbeinen begrenzten, Oberschlüsselgruben, Fossae supraclaviculares. Die hintere gewölbte Seite des Halses wird der Nacken, Cervix s. Nucha, genannt. Im Inneren enthält der Hals die Höhle des Kehlkopfes, Cavum laryngis, die des Schlundkopfes, Cavum pharyngis, und den oberen Theil der Luftröhre, Trachea, und des Schlundes oder der Speiseröhre, Oesophagus.

Die Grundlage der Brust ist ein vorzüglich von den Rippen, der Wirbelsäule und dem Brustbein gebildeter Käfig, welcher die geräumige, Herz und Lungen enthaltende Brusthöhle, Cavum thoracis, einschliefst: diese wird durch das Zwerchfell, Diaphragma, von der Bauchhöhle geschieden

der vorderen Seite der Brust bemerkt man in der Mitte
Brustbeingegend, Regio sternalis; seitwärts die Gegen-
der Brüste (Mammae), Regiones mammillares: und
ischen den letzteren und den Schlüsselbeinen die flachen
terschlüsselgruben, Fossae infraclaviculares. Die Seiten-
chen der Brust oder die Rippengegenden, Regiones costa-
, sind stark gewölbt: hinten bemerkt man die Schulter-
ttgegenden, Regiones scapulares, und zwischen diesen in
Mitte den Rücken, Dorsum. Die Gränze zwischen dem
cken und dem Nacken wird durch den stärker hervor-
enden siebenten Halswirbel, Vertebra prominens, be-
chnet.

Der Bauch zerfällt in einen oberen und unteren Theil,
den eigentlichen Bauch und das Becken, Pelvis; diese
rden von der unteren Hälfte der Wirbelsäule, den Hüft-
er Beckenknochen, und von Muskeln und Fascien zusam-
ngesetzt, und enthalten eine zusammenhangende sehr
ofse Höhle, die Bauch- und Beckenhöhle, Cavum abdomi-
et pelvis, welche den Digestions- und Harnabsonderungs-
parat, und einen Theil der Geschlechtsorgane, in sich
liefst. Die vordere Fläche des Bauchs ist gewölbt: in
er Mitte bemerkt man unmittelbar unter dem Brustbein
flache sog. Herzgrube, Scrobiculus cordis; weiter ab-
rts eine vertiefte krause Narbe, den Nabel, Umbilicus;
iz unten eine mit krausen Haaren besetzte Hervorragung,
Schamberg, Mons pubis s. Mons Veneris; und unter
sem die äufseren Geschlechtsorgane. Die Seitenwände
Bauchs zeigen oberwärts eine schwache Wölbung, wel-
von den untersten Rippen herrührt: die Mitte ist ver
ft; unterwärts ragen die oberen Ränder der Beckenkno-
en oder die Hüftbeinkämme, Cristae ossium ilium, her-
r, und unter diesen die gewölbten Hüften, Coxae. Die
nterseite des Bauchs ist durch die Biegungen der Wirbel-
ule oberwärts vertieft, unterwärts gewölbt. Letztere
wölbte dreieckige Gegend nennt man das Kreuz, Regio
cralis; seitwärts wird sie vom Gesäfs oder den Hinter-
cken, Nates s. Clunes, begränzt, und endigt nach unten
der tiefen Gesäfsspalte, Rima clunium, in welcher der
ter, Anus, sich findet. Den Raum zwischen dem After

und den äufseren Geschlechtstheilen nennt man das Mittelfleisch oder den Damm, Perinaeum.

Theilt man die Wände des Bauchs künstlich durch zwei Linien, welche in der Höhe der letzten Rippen und der Hüftbeinkämme horizontal um den Bauch gezogen werden: so erhält man drei Abtheilungen, deren jede in Unterabtheilungen zerfällt. Die obere Abtheilung ist die Oberbauchgegend, Regio epigastrica; sie enthält in der Mitte die Magengegend, Regio gastrica (auch Regio epigastrica im engeren Sinne genannt), und oberhalb dieser die Herzgrube, Scrobiculus cordis; neben der Magengegend liegen die gewölbten Unterrippengegenden, Hypochondria s. Regiones hypochondriacae, welche hinten an den Rücken, oben an die Regiones costales gränzen. Die mittlere Abtheilung, die Mittelbauchgegend, Regio mesogastrica, enthält in der Mitte die Nabelgegend, Regio umbilicalis; neben dieser die concaven Darmgegenden, Regiones iliacae; hinter den letzteren bis zur Mittellinie der Hinterseite des Stammes die Lendengegenden, Regiones lumbares. Die untere Abtheilung, die dreieckige stark gewölbte Unterbauchgegend, Regio hypogastrica, reicht bis zum Schamberg herab, woselbst die Schamgegend, Regio pubis anhebt: die vertieften schräg gerichteten Gegenden der Schenkelbuge, neben der Regio hypogastrica und pubis, werden die Weichen oder Leisten, Regiones inguinales, genannt; an diese grenzen nach aufsen die äufseren Hüftgegenden, Regiones coxarum, an welche mehr hinterwärts die Nates und endlich die Regio sacralis sich schliefsen.

Die oberen Extremitäten oder Brustglieder, Extremitates superiores s. thoracicae, schliefsen sich durch die Schlüsselbeine und Schulterblattgegenden an den Thorax an. Ihr erhabenster Theil ist die Achsel oder Schulter, Axilla, deren oberes äufseres Ende von der Schulterhöhe, Acromion gebildet wird; an die Achsel schliefst sich der rundliche Oberarm, Brachium; unter der Achsel zwischen dem Oberarm und Thorax liegt die Achselgrube, Fossa axillaris. Durch den Ellenbogen, Cubitus, hängt der Vorderarm, Antibrachium, mit dem Oberarm zusammen; dieser ist oberwärts dicker und rundlich, unterwärts dünner und platter. An den Vorderarm gränzt die Hand, Manus, vermittels der schmaleren Handwurzel oder Wrist, Carpus; auf dies

gt die Mittelhand, Metacarpus, von welcher die fünf
ger, Digiti manus, strahlenförmig auslaufen. Diese
rden benannt oder vom Daumen an gezählt: 1) der Dau-
n, Pollex; 2) der Zeigefinger, Index; 3) der Mittel-
ger, Digitus medius; 4) der Ringfinger, Digitus annu-
is; 5) der Ohrfinger, Digitus auricularis. — An dem
t vorwärts gerichteten Daumen herabhangenden Arme
terscheidet man die innere und äufsere, vordere und hin-
e Seite, Latus internum, externum, anterius s. radiale,
terius s. ulnare: an der Hand den gewölbten Hand-
cken, Dorsum manus, die flach vertiefte Hohlhand oder
ndteller, Vola manus s. Palma; den vorderen Rand, Margo
dialis; und den hinteren Rand, Margo ulnaris: — an
n Fingern die Rücken- und Hohlhandfläche, Superficies
rsalis und volaris, den vorderen und hinteren Rand,
rgo radialis und ulnaris. Das obere Ende aller Theile
Armes und der Hand ist gegen die Achsel, das untere
gen die Fingerspitzen hin gerichtet.

Die unteren Extremitäten oder Bauchglieder, Extremi-
es inferiores s. abdominales, enthalten oberwärts die
ften, Coxae, welche an den Bauch sich schliefsen, und
ihm die äufseren Hüft- und Gesäfsgegenden, Regiones
arnm et clunium, bilden. Der obere Rand jeder Hüft-
end wird von dem Hüftbeinkamm, Crista ossis ilium,
ildet; ihr hervorragendster Punkt liegt tiefer, und ent-
t den grofsen Schenkelhöcker oder Rollhügel, Trochanter
jor. Auf die Hüfte folgt der rundliche, oben dickere,
en dünnere, Oberschenkel, Femur, an dessen vorderer
che oberwärts ein Theil der Regio inguinalis liegt: seine
tere Fläche wird vom Gesäfs durch eine gebogene Queer-
che, Sulcus infra nates, abgegränzt. Das Knie, Genu,
welchem man vorn die hervorragende Kniescheibe, Pa-
a, hinten die Kniekehle, Poples s. Fossa poplitea, be-
rkt, verbindet den Unterschenkel, Crus, mit dem Ober-
enkel. Der Unterschenkel enthält nach oben und hinten
dickere gewölbte Wade, Sura; nach unten wird er be-
chtlich dünner, und zeigt zwei seitliche Hervorragun-
n, den äufseren und inneren Knöchel, Malleolus externus
internus. Der Fufs, Pes, zerfällt in die Fufswurzel,
rsus, den Mittelfufs, Metatarsus, und die Zehen, Digiti

pedis. Man unterscheidet den Fufsrücken, Dorsum pedis, die Fufssohle, Planta; den inneren und äufseren Fufsrand, Margo pedis internus et externus. Den hintersten schmalsten Theil der Fufswurzel nennt man die Ferse, Calx; nach vorn wird der Fufs allmählig breiter, und endigt mit den Zehen, welche vom inneren Fufsrande an abgezählt werden: die erste ist die grofse Zehe, Hallux s. Hallex.

Der menschliche Körper ist sehr symmetrisch gebauet. Am vollkommensten spricht sich die seitliche Symmetrie aus, weniger die zwischen der oberen und unteren Körperhälfte, aber nur wenig zwischen der vorderen und hinteren Körperfläche. Die meisten Organe sind nämlich paarweise vorhanden, und liegen einander gegenüber zur rechten und linken Seite der von oben nach unten fallenden Mittellinie; die unpaaren aber liegen, mit wenigen Ausnahmen, in dieser Mittellinie, und bestehen aus zwei einander völlig ähnlichen und verschmolzenen Seitenhälften. Diese seitliche Symmetrie zeigt sich zwar äufserlich am Deutlichsten; indefs findet sie sich auch im Innern, und zwar am vollkommensten im Knochen-, Knorpel-, Muskel- und Nervensystem: nur einzelne wenige in der Brust- und Bauchhöhle enthaltene Organe weichen von dieser allgemeinen Regel ab, indem entweder ihre beiden Hälften einander nicht völlig gleich sind, oder indem sie nicht in der Mittellinie liegen. Die Symmetrie zwischen oberer und unterer Körperhälfte erscheint am Stamme nur in einzelnen Beziehungen; ist dagegen an den Extremitäten ziemlich vollkommen, indem die Grundformen der oberen und unteren Extremitäten im Ganzen, so wie in den einzelnen Abtheilungen, einander entsprechen: Schulter = Hüfte: Oberarm = Oberschenkel: Vorderarm = Unterschenkel: Hand = Fufs u. s. w.

Die Mittellinie des Körpers fällt vom Scheitel an durch die Basis cranii, hinter dem Gesicht, vor der Wirbelsäule durch den vorderen Theil des Mittelfleisches, zwischen den unteren Extremitäten herab, und endigt zwischen den Füfsen unterhalb der Knöchel. Der gröfsere Theil des Körpers liegt daher vor dieser Mittellinie.

Die Länge oder Höhe des erwachsenen und wohlgebil-
ten Körpers beträgt im Mittel zwischen 4½ und 5½ Pa-
ser Fufs; und zwar ist der männliche Körper der Regel
ich um 3 bis 6 Zoll länger als der weibliche. Eine ge-
uere Angabe der Dimensionen, so wie sie an wohlgebil-
ten Menschen von nordteutscher Abstammung, von mitt-
rer Gröfse und einem Alter von 20 bis 40 Jahren, durch-
hnittlich gefunden worden, giebt die folgende Tabelle. In
eser ist die senkrechte Richtung von oben nach unten als
öhe, der horizontale Queerdurchmesser von der rechten
ch der linken Seite als Breite, und die Dimension von
rn nach hinten als Dicke bezeichnet. Da wo die Entfer-
ng zwischen Stellen von gröfserem Umfange und nicht
harf bestimmten Gränzen angegeben worden, ist die Mitte
eser Stellen oder ihr hervorragendster Punkt zu verstehen.

	Männlich.	Weiblich.
	Zolle.	
öhe des ganzen Körpers	64	60
K o p f.		
öhe des ganzen Kopfes, Vorderseite	8	7½
„ „ „ „ „ Hinterseite	5¼	5
ängendm. des Schädels von der Stirn zum Hinterhaupt	7½	7
reite des Schädels	6	5¾
orizontaler Umfang des Schädels	22½	21
öhe des Gesichts von der Nasenwurzel zum Kinn	4¼	4
reite zwischen den Wangen	4¼	3¾
„ vor den Ohren	5½	4¾
icke von der Nasenspitze zum Ohr	4	4
H a l s.		
öhe der Vorderseite des Halses	3½	3½
„ des Nackens	4	4
reite des Halses	4	3¾
icke „ „	4	3¾
mfang	12½	12
B r u s t.		
öhe der Regio sternalis	7	6½
„ „ Seitenwand der Brust	12½	11¾
reite zwischen den Schulterhöhen (Acromia) .	15½	12¾

	Männlich.	Weiblich.
	Zolle.	
Breite der Regio sternalis u. mammillares zusammen in drr Höhe der Brustwarzen	10½	10¼
„ zwischen den Achselgruben	9½	8¾
„ „ „ „ Regiones costales	10½	10
Höhe des Rückens von der Vertebra prominens abwärts	11	11
Breite des Rückens und der Schulterblattgegenden zusammen . . .	12½	11¾
Breite des Rückens oben	4½	4
„ „ „ „ unten	6	5¾
Höhe jeder Schulterblattgegend	8	6¾
Breite „ „ „ „ „ oben	4	3¾
„ „ „ „ „ „ unten	2	2
Dicke der Brust zwischen Reg. sternalis u. dorsalis	7	6¾
„ „ „ „ „ „ mammillaris u. scapularis	7½	8½
„ der Regio costalis	7	6¾
Umfang um die Regio mammillares u. scapulares	32	34
„ „ „ „ costales	31	29
B a u c h.		
Höhe der vorderen Wand	11½	12½
„ von der Herzgrube zum Nabel	6½	6½
„ „ dem Nabel zum Schamberg	5	6
„ der Regiones iliacae	2½	3
„ „ „ „ lumbares	6	6½
„ „ Kreuzgegend bis zum Anfang der Gesäfsspalte	4	3½
Breite zwischen den Reg. iliacae	10	10
„ „ „ „ Hüftbeinkämmen	11	11
„ „ „ „ Hüftbeinstacheln	9	9½
„ jeder Regio lumbaris	3	3
„ der Kreuzgegend, oben zwischen den hinteren Enden der Hüftbeinkämme	2½	3
Dicke des Bauchs zwischen Nabel- und Lendengegend	6½	7½
„ zwischen Schamberg u. Kreuz am Anfange der Gesäfsspalte . . .	5½	6
Diagonale zwischen Schamberg und oberen Ende der Kreuzgegend . .	7	7½
„ „ „ „ „ „ „ Mitte der Kreuzgegend	6	6½
Umfang des Bauchs um die Regiones iliacae . .	26	27
„ „ „ „ „ Hüftbeinkämme . .	30	31

	Männlich.	Weiblich.
	Zolle.	
Obere Extremität.		
nge des Oberarms	12	11
eite „ „ „	3 1/2	3 1/4
cke „ „ „	3 1/4	3
nfang „ „	10 1/2	9 1/2
eite zwischen beiden Oberarmen unterhalb der Schulterhöhen . . .	17 1/2	14
nge des Vorderarms	10	9
eite „ „ „ am oberen Ende desselben	3 1/2	3
cke „ „ „ „ „ „ „ „	3	2 3/4
nfang „ „ „ „ „ „ „	10	9
eite desselben am unteren Ende	2 1/2	2 1/4
cke „ „ „ „ „ „	2	1 3/4
nfang „ „ „ „ „	7	6 1/2
nge der Hand	7 1/4	6 1/2
eite des Handgelenks	2 1/4	2
cke „ „ „ „	1 3/4	1 1/2
nfang „ „ „	6 3/4	5 3/4
eite der Mittelhand	4	3 1/2
cke „ „ „	1 1/6	1
Untere Extremität.		
he der Hüft- und Gesäfsgegend zusammen .	9	8
eite zwischen den Trochanteren	12	12 1/4
nfang um die Trochanteren	33	34
nge des Oberschenkels von der Inguinalgegend zum Knie	17 1/2	14 3/4
„ „ „ von dem Hüftbeinkamm „	21 1/2	18 3/4
„ „ „ „ Trochanter „ „	16	13 3/4
eite des Oberschenkels an seinem oberen Ende	6	5 2/3
cke „ „ „ „ „ „ „ „	6	5 2/3
nfang „ „ „ „ „ „ „	19	18
eite „ „ „ „ in seiner Mitte . . .	5 1/4	5
cke „ „ „ „ „ „ „ . .	5 1/4	5
nfang „ „ „ „ „ „ . . .	16 1/2	15 1/2
eite „ „ „ „ an seinem unteren Ende	4	3 3/4
cke „ „ „ „ „ „ „	4 1/6	4
nfang „ „ „ „ „ „ „	12 3/4	12
eite des Knies	3 3/4	3 1/2
cke „ „	4	3 3/4
nfang „	12 1/2	11 3/4
nge des Unterschenkels vom Knie zur Ferse .	18	15 1/4
„ „ „ „ „ „ zum Fufsgelenk	15 3/4	13 1/4
eite „ „ „ „ unter dem Knie . . .	3 1/2	3 1/4
nfang „ „ „ „ „ „ . . .	11 1/4	10 1/4

	Männlich.	Weiblich.
	Zolle.	
Breite und Dicke der Wade	$4\frac{1}{3}$	4
Umfang der Wade	$13\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{2}$
Umfang oberhalb der Knöchel	8	$7\frac{1}{2}$
Breite der Knöchel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{3}$
Länge des Fufses von der Ferse zu den Zehen .	$9\frac{1}{2}$	$8\frac{1}{2}$
Breite des Fufsgelenks	2	2
Höhe der Fufswurzel	$2\frac{1}{4}$	2
Breite des Mittelfufses	4	$3\frac{1}{2}$
Dicke „ „ „	2	$1\frac{1}{2}$

Die Oberfläche des ganzen Körpers wird auf 15 Quadratfufs geschätzt. Das Gewicht ist noch häufigeren individuellen Verschiedenheiten unterworfen, als die Dimensionen, und wechselt zwischen 100 und 200 Pfund: und zwar beträgt das mittlere Gewicht, bei den oben angenommenen Höhen von 64 und 60 Zoll, ungefähr 150 Pfund für den männlichen, und 130 Pfund für den weiblichen Körper.

Erstes Buch.

---

o n d e n K n o c h e n

und

i h r e n V e r b i n d u n g e n.

on den Knochen und ihren Verbindungen.
Osteologia et Syndesmologia.

Die Knochenlehre, Osteologia, betrachtet die einzelnen ochen, vorzüglich rücksichtlich ihrer Configuration und ge, und zwar im frischen Zustande, mit Beinhaut, Mark, d den Nath- und Gelenkknorpeln, wenn diese besondere enthümlichkeiten darbieten. Die Bänderlehre, Syndes- logia, betrachtet die Faserknorpel der Symphyses, die bra glenoidea und Zwischenknorpel, die Synovial- und erkapseln, und die accessorischen Bänder der Gelenke; o die vorzüglichsten Verbindungsmittel, durch welche die ochen zum Skelet vereinigt werden.

Das Skelet zerfällt in den Kopf mit 28, den Stamm mit die oberen Extremitäten mit 74, und die unteren Extre- täten mit 72 Knochen. Unter diesen sind 96 Knochen- are in die rechte und linke Hälfte vertheilt, und 33 un- are, in der Mittellinie des Skelets liegende Knochen: über- upt also 225 Knochen vorhanden. Es enthalten

Schädel	1 Grundbein, Os basilare
7 Knochen:	2 Schläfebeine, Ossa temporum
	1 Stirnbein, Os frontis
	2 Scheitelbeine, Ossa parietalia
	1 Siebbein, Os ethmoideum;
Gehörorgane	2 Hämmer, Mallei
6 Knochen:	2 Ambosse, Incudes
	2 Steigbügel, Stapedes;
Gesicht	2 Oberkieferbeine, O. maxillaria super.
15.	2 Gaumenbeine, Ossa palatina
	2 Wangenbeine, Ossa zygomatica
	2 Nasenbeine, Ossa nasi
	2 Thränenbeine, Ossa lacrymalia
	2 Untere Muscheln, Conchae inferiores
	1 Pflugscharbein, Vomer
	1 Unterkiefer, Maxilla inferior
	1 Zungenbein, Os hyoides;

die Wirbelsäule	24	Wirbel, Vertebrae
	1	Kreuzbein, Os sacrum
26.	1	Steifsbein, Os coccygis;
der Brustkasten	1	Brustbein, Sternum
25.	24	Rippen, Costae;
die Schultern	2	Schlüsselbeine, Claviculae
4.	2	Schulterblätter, Scapulae;
die Oberarme	2	Oberarmbeine, Ossa brachii;
2.		
die Vorderarme	2	Ellenbogenröhren, Ulnae
4.	2	Speichen, Radii;
die Handwurzeln	2	Kahnbeine, Ossa navicularia
16.	2	Mondbeine, Ossa lunata
	2	dreieckige Beine, Ossa triquetra
	2	Erbsenbeine, Ossa pisiformia
	2	grofse vieleckige B. O. multangula maj.
	2	kleine vieleckige B. O. multangula min.
	2	Kopfbeine, Ossa capitata
	2	Hakenbeine, Ossa hamata;
die Mittelhände	10	Mittelhandbeine, Ossa metacarpi;
10.		
die Finger	28	Fingerglieder, Phalanges digitorum
38.	10	Sesambeine, Ossa sesamoidea manus;
die Hüften	2	Hüftknochen, Ossa coxarum;
2.		
die Oberschenkel	2	Oberschenkelbeine, Ossa femoris;
2.		
die Unterschenkel	2	Schienbeine, Tibiae
6.	2	Kniescheiben, Patellae
	2	Wadenbeine, Fibulae;
die Fufswurzel	2	Sprungbeine, Tali
16.	2	Fersenbeine, Calcanei
	2	Kahnbeine, Ossa navicularia
	2	Würfelbeine, Ossa cuboidea
	6	Keilbeine, Ossa cuneiformia
	2	Sesambeine, Ossa sesamoidea tarsi
der Mittelfufs	10	Mittelfufsknochen, Ossa metatarsi;
10.		
die Zehen	28	Zehenglieder, Phalanges digitorum pedis
36.	8	Sesambeine, Ossa sesam. digitor. pedis.

Zählt man die einzelnen Stücke, aus welchen das Zun-, Brust- und Steifsbein bestehen, als besondere Kno-n, und rechnet man die Zähne zu den Knochen: so hält das Skelet 266, und mit überzähligen Sesambeinen ch mehrere Knochen.

Schädelknochen, Ossa cranii.

Die sieben Schädelknochen sind ganz oder grofsentheils tt und stark gekrümmt, aus zwei Tafeln gebildet; von lchen die innere, Tabula interna s. vitrea, dünner, härter l spröder ist, und an vielen Stellen Gefäfsfurchen, *Sulci ingei*, kleine rundliche Eindrücke, *Impressiones digitatae*, l längliche Erhabenheiten, *Iuga cerebralia*, zeigt. Die ischen beiden Tafeln liegende Diploë enthält stellenweise tte breite Kanäle für Venen, *Canales diploici*, deren Aus-ge rundliche Löcher in einer oder beiden Tafeln sind, *issaria diploica* genannt; — und dünnflüssiges röthliches rk. Die Beinhaut, welche die äufsere Fläche dieser ochen überzieht, wird *Pericranium* genannt: die innere iche aber wird nicht von eigentlicher Beinhaut, sondern n der harten Hirnhaut bekleidet. Die durchgängig unbe-gliche Verbindung der Schädelknochen unter einander schieht meistens durch Suturen, seltener durch Harmonien.

Os basilare, Grundbein,

det den gröfsten Theil der Grundfläche des Schädels, rbindet sich unbeweglich mit allen Schädel- und vielen sichtsknochen, und überdies den Schädel mit dem Stamme rch ein Gelenk. Es zerfällt in ein vorderes Stück, Keil-in; und ein hinteres, Hinterhauptsbein.

I. Os sphenoideum, Keilbein,

alaeforme s. vespiforme: ist von unregelmäfsiger Gestalt, d enthält ein mittleres Stück oder Körper, *Corpus*, von lchem nach oben, nach den Seiten und nach unten an-hnliche Fortsätze, die sog. Flügel, *Alae*, ausgehen.

1. Der *Körper* ist würfelförmig, besteht aus dünnen Wänden, welche zwei ansehnliche durch eine Scheidewand trennte Keilbeinhöhlen, *Sinus sphenoidales*, einschliefsen. ie *obere Fläche* des Körpers zeigt eine längliche, queer-

laufende Vertiefung, der Sattel, *Sella turcica* s. Ephippium, welche vorn und hinten von knopf- oder zapfenförmigen Fortsätzen, Processus clinoidei s. inclinati, umgeben wird. Hinterwärts wird sie nämlich von einer kleinen Wand, der sog. Sattellehne, begränzt, auf welcher zwei Knöpfe oder rückwärts gerichtete Spitzen, *Processus clinoidei posteriores*, hervorstehen; dicht vor der Sella liegen die sehr kleinen *Processus clinoidei medii;* weiter nach vorn und aufsen erheben sich die gröfseren *Processus clinoidei anteriores* mit zwei Wurzeln, welche das ansehnliche elliptische, nach vorn und aufsen gerichtete Sehnervenloch, *Foramen opticum*, zwischen sich lassen. Die Proc. clinoidei anteriores gehen nach aufsen und vorn in die schmalen, platten, gekrümmten und zugespitzten Säbelfortsätze, *Processus ensiformes*, über; deren hinterer Rand scharf, der vordere aber, so wie überhaupt der vordere Rand der oberen Fläche des Körpers, gezahnt ist. Die Proc. clinoidei anteriores mit dem Foramen opticum und die Proc. ensiformes bilden zusammen die sog. oberen Flügel, *Alae superiores.* — Die *Seitenfläche* des Körpers ist an ihrem oberen Theile mit einer flachen breiten Furche, *Sulcus caroticus*, versehen; unterwärts fliefst sie mit der Ala magna und dem Proc. pterygoideus zusammen. — Die *vordere Fläche* wird in der Mitte durch die *Crista sphenoidalis* getheilt, und hat an jeder Seite eine unregelmäfsige Öffnung, welche in die Sinus sphenoidales führen: vor diesen Öffnungen liegen nach vorn und innen convexe Knochenblättchen, *Cornua sphenoidalia*, Keilbeinhörner, welche diese Öffnungen zum Theil verschliefsen. — Die *untere Fläche* ist an den Seiten gewölbt, in der Mitte läuft eine Vertiefung, aus deren vorderem Ende ein spitziges Knochenblatt, *Rostrum sphenoidale*, hervorspringt, welches mit der Crista sphenoidalis zusammenhängt, und deren unteres Ende bildet. — Die *hintere* viereckige rauhe *Fläche* hängt mit dem Hinterhauptsbeine zusammen.

2. Die *Alae magnae* s. laterales, grofse Keilbeinflügel gehen von dem unteren Theile der Seitenfläche des Körpers ab; sind anfangs schmal, und werden von einem runden nach vorn gerichteten Loche, *Foramen rotundum*, durchbohrt. Indem sie breiter werden, wenden sie sich theils nach hinten, theils nach vorn, aufsen und oben. Der hin-

; Theil ist dreieckig und platt: seine obere Fläche zeigt
ke Impressiones digitatae und Iuga cerebralia; die un-
; ist rauh, und endigt mit einer Spitze, *Spina angularis*,
welcher öfters kleine Knochenblätter, Alae parvae In-
ssiae, sitzen: aufserdem enthält es zwei nach unten ge-
ıtete Löcher; nämlich an seinem inneren Rande das
fsere *Foramen ovale*, welches durch eine Furche mit
ı vor ihm liegenden For. rotundum zusammenhängt; und
ter nach hinten, in der Spina angularis selbst, das klei-
e *Foramen spinosum*. Der äufsere Rand dieses hintern
ils ist breit und gezackt. — Der vordere auf- und
wärts gekrümmte Theil der Ala magna ist dreiseitig:
e äufsere Fläche, *Superficies temporalis*, ist glatt, aus-
öhlt, bildet den vorderen Theil der Schläfengrube, und hat
ein Loch als Ausgang eines Canalis diploicus: die in-
e, *Superf. cerebralis*, hat merkliche Impr. digit. und Iuga
ebr.: die vordere innere, *Superf. orbitalis*, ist eben und
tenförmig, und bildet den hinteren Theil der äufseren
ınd der Augenhöhle; ihr unterer und hinterer Rand sind
erundet; der letztere läuft 1‴ bis $1\frac{1}{2}$‴ vom Proc. en-
rmis entfernt mit diesem parallel, und bildet mit ihm
längliche Keilbeinspalte, *Fissura sphenoidalis* s. *orbitalis*
erior, welche unten und hinten breiter ist, und schmaler
h oben und aufsen verläuft. Der vordere und der sehr
ite obere Rand der Ala magna sind gezackt: der hintere
ıd theils gezackt, theils breit und von der äufseren Fläche
zugeschärft: dagegen die obere Ecke der Ala magna
der inneren Fläche her zugeschärft ist.

3. *Processus pterygoidei*, Flügelfortsätze, s. Alae infe-
res s. palatinae, steigen vom Körper herab, und sind
zwei Blätter gespalten, *Laminae* s. alae *pterygoideae*;
se Spaltung wird unterwärts vollständig durch eine Spalte,
sura pterygoidea, oberwärts nur an der hinteren Fläche
Fortsatzes durch eine Grube, *Fossa pterygoidea*, bewirkt.
Lamina externa ist breiter, aber kürzer und dünner,
l endigt nach hinten mit einem scharfen Rande; die *La-
ıa interna* ist dicker, schmaler, und endigt unterwärts
einem nach hinten und aufsen gebogenen stumpfen Ha-
ı, *Hamulus pterygoideus*. Über die äufsere Fläche und
teren Rand der Lamina interna läuft eine breite flache

Furche, *Sulcus Tubae Eustachii*, von dem oberen Theile der Fossa pterygoidea nach unten und innen herab: und von der Wurzel der Lamina interna ragt ein platter dreieckiger Fortsatz, *Processus ad Vomerem* s. vaginalis, nach innen gegen das Rostrum sphenoidale hin. Über die vordere Fläche des Proc. pterygoideus, da wo beide Laminae zusammenhangen, läuft eine flache Furche, *Sulcus pterygopalatinus*, nach unten herab.

Die gemeinschaftliche Verbindungsstelle des Körpers, der Ala magna und des Proc. pterygoideus wird von einem 7‴ langen horizontallaufenden Kanal, *Canalis Vidianus* s. pterygoideus, durchbohrt, dessen vordere Öffnung weiter als die hintere ist.

II. Os occipitis, Hinterhauptsbein.

Ein gröfstentheils platter Knochen, liegt in der Basis des Schädels und am Hinterhaupte; und enthält in seinem abhängigsten Theile das sehr grofse eiförmige Hinterhauptsloch, *Foramen magnum occipitale.* Das Knochenstück vor diesem Loche nennt man Pars basilaris, die zu beiden Seiten des Lochs Partes condyloideae, und das grofse platte Stück hinter und über demselben Pars occipitalis.

1. *Pars basilaris*, Grundstück, ist ein kurzer, dicker, beinahe würfelförmiger Zapfen, dessen hinterer dünnerer Rand den vorderen Umfang des For. magnum occipitale bildet, und seitwärts in die Partes condyloideae übergeht. Die vordere rauhe Fläche ist mit der hinteren des Keilbeinkörpers verschmolzen; die untere ist rauh und mit einer Leiste, *Crista basilaris*, versehen: die Seitenflächen sind rauh. Die obere Fläche bildet mit den Proc. clinoidei posteriores des Keilbeins eine, von diesen bis zum For. magnum schräg nach hinten herablaufende, etwas ausgehöhlte Fläche, *Clivus*; und an jeder Seite derselben eine flache Furche, *Sulcus basilaris.*

2. *Partes condyloideae* s. jugulares, Gelenktheile, hängen durch ihre vorderen dickeren Enden mit der Pars basilaris, durch die hinteren mit der Pars occipitalis zusammen. An der unteren Fläche jeder Pars condyl. liegt der niedrige längliche *Processus condyloideus* mit convexer überknorpelter Fläche: hinter demselben eine Grube, *Fossa*

idyloidea mit einem engen kurzen Kanale, *Foramen con-loideum posterius;* vor demselben das weite *Foramen con-loideum anterius.* Auf der oberen Fläche ragt das länglich ndliche *Tuberculum jugulare* s. Processus anonymus hervor, ter welchem das For. condyloideum anterius schräg von iten nach aufsen und vorn läuft. Der innere Rand der rs condyloidea bildet den seitlichen Umfang des For. mag-m. Der äufsere Rand zeigt vorne und neben dem Tu-rculum jugulare einen tiefen glatten Einschnitt, *Incisura ularis;* und hinter dieser eine stumpfe Spitze, *Spina s. c. jugularis,* welcher oberwärts von einer tiefen Furche, *cus jugularis,* umkreiset wird. Der hintere längere Theil äufseren Randes, *Margo mastoideus,* ist concav und kig: und begränzt zugleich den vorderen Theil der Pars ipitalis.

3. *Pars occipitalis,* Hinterhauptsstück, ist platt und ieckig. In der Mitte der äufseren Fläche ragt eine Er-enheit hervor, *Protuberantia occipitalis externa,* von wel-r eine erhabene Linie, *Crista occipitalis externa,* nach n und unten zum For. magnum — zwei andere rauhe ge-immte, *Lineae semicirculares superiores,* aber seitwärts en die Margines mastoidei — herablaufen. Denselben Lauf men die kürzeren, mehr nach vorn und unten liegenden eae *semicirculares inferiores,* welche von der Crista occip. erna ausgehen. — Die innere Fläche zeigt in der Mitte *Protuberantia occipitalis interna,* von welcher vier Li-n, *Lineae cruciatae,* auslaufen. Die obere und die Sei-linien sind mit breiten Furchen versehen: auf der Linea c. superior zeigt sich der Sulcus longitudinalis, auf den neae cruc. transversae die Sulci transversi: die untere, *sta occipitalis interna* genannt, ist schärfer; zuweilen ft eine Furche neben ihr hin. Durch die Lineae crucia-werden vier Gruben, *Fossae occipitales, superiores* und *eriores,* abgetheilt, von denen die unteren geräumiger d. In den Gruben, vorzüglich in den unteren, ist der ochen dünn; in der Mitte, woselbst beide Protuberanzen gen, aber $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{4}$″ dick. Der Rand des oberen und teren Theils der Pars occipitalis, *Margo lambdoideus,* ist regelmäfsig ausgeschweift, gezackt, und läuft nach oben eine Ecke aus.

Ossa temporum, Schläfebeine,

bilden einen Theil der Grundfläche und Seitenwände des Schädels, und füllen den Raum zwischen dem Keil- und Hinterhauptsbeine aus.

Das Os temporum hat eine unregelmäfsige Gestalt, und zerfällt in drei Theile, welche in der Mitte des Knochens zusammenfliefsen. In der Mitte der äufseren Fläche zeigt sich eine weite ovale, von einem gezackten Rande begränzte Öffnung, *Porus acusticus externus*, d. i. der Eingang des weiten kurzen knöchernen äufseren Gehörganges, Meatus auditorius externus osseus. Der Theil des Schläfebeins oberhalb und vor dem Porus acust. ext. wird Pars squamosa, der Theil hinter demselben Pars mastoidea genannt; und der Theil, welcher sich zwischen beiden nach innen und vorn in die Basis cranii erstreckt, ist die Pyramis oder Pars petrosa.

I. Pars squamosa s. Squama, der Schuppentheil, die Schuppe, liegt in der Seitenwand des Schädels, ist platt, und von einem bogenförmigen Rande begränzt, welcher nach vorn und unten breit und gezackt, oberwärts aber breit, flach, und von der inneren Fläche her zugeschärft ist. Der gezackte Rand verbindet sich mit dem äufseren Rande des hinteren dreieckigen Stückes der Ala magna oss. sphenoidei, der vordere Theil des zugeschärften Randes aber legt sich über den hinteren Rand des aufsteigenden Stücks der Ala magna. Die innere Fläche der Schuppe zeigt Impressiones digit. und Iuga cerebr. und einen sehr tiefen Sulcus meningeus. Die äufsere Fläche ist leicht convex und glatt: an ihrem unteren Ende erhebt sich eine längliche Hervorragung, welche in den starken platten nach vorn und aufsen gekrümmten Jochfortsatz, *Processus zygomaticus*, übergeht, welcher mit einem gezackten Rande endigt. Unter dieser Wurzel des Proc. zygomaticus liegt eine tiefe längliche queer gerichtete, überknorpelte Grube, *Cavitas glenoidea*; diese wird vorne von einem dünn überknorpelten Höcker, *Tuberculum articulare*, begrenzt, welcher mit der Wurzel des Proc. zygomaticus zusammenfliefst.

II. Pars mastoidea, Zitzentheil, ist das hintere, dickere, unregelmäfsig geformte Stück des Schläfebeins, nach hinten und oben mit einem gezackten Rande endigend, welcher

t dem Margo mastoideus oss. occipitis zur *Sutura mastoi-*
z sich verbindet: nach vorn hängt er mit der Schuppe
d Pyramide, nach unten nur mit letzterer zusammen.
on seiner äufseren und unteren Fläche ragt der starke
uhe kegelförmige Zitzenfortsatz, *Processus mastoideus*
mammillaris, hervor, welcher im Innern eine grofse Menge
sehnlicher Zellen, *Cellulae mastoideae*, enthält: an seiner
neren Seite findet sich ein tiefer Einschnitt, *Incisura ma-*
idea; und hinter und über ihm ein oder mehrere Löcher,
ramina mastoidea. An der inneren Fläche der Pars mast.
ift eine breite tiefe Furche, *Fossa sigmoidea* s. Sulcus
nsversus, mit den inneren Öffnungen der Foramina ma-
idea.

III. Pyramis s. *Pars petrosa* s. Os petrosum, Pyramide
er Felsentheil, liegt in der Basis cranii: ihre rauhe,
umpfe, nach vorn und innen gerichtete Spitze wird mit
r Seitenfläche des Pars basilaris oss. occip. durch Faser-
orpel vereinigt; ihre breitere schräg abgeschnittene Basis
gt nach aufsen und hinten, und verschmilzt mit der Pars
uamosa und mastoidea, so dafs nur die Stelle des Porus
ust. externus frei bleibt. Die Pyramide ist dreiseitig, ihre
ei Flächen liegen nach unten, nach oben, und nach hin-
n; und werden durch den vorderen, hinteren, und oberen
inkel begränzt.

1. *Superficies inferior* ist breit, sehr uneben und rauh:
ch vorn wird sie theils durch eine Spalte mit mehreren
einen Löchern, *Fissura Glaseri*, von der Cavitas glenoidea
r Pars squamosa getrennt; theils von dem vorderen Win-
l, *Angulus anterior*, begränzt. Dieser Winkel verbindet
h mit dem inneren Rande des hinteren dreieckigen Theils
r Ala magna oss. sphen., so dafs die Spina angularis sich
die Ecke zwischen diesem Winkel und dem vorderen
nde der Pars squamosa einschiebt. In dieser Ecke liegt
ne unregelmäfsige Öffnung, welche in das Innere der Py-
mide führt, und durch ein Knochenblatt getheilt wird;
e untere weitere Abtheilung gehört der Tuba Eustachii,
e obere dem Sulcus muscularis an. (s. Gehörorgan.) Nach
nten wird die untere Fläche von dem hinteren Winkel,
igulus posterior, begränzt, welcher mit einem flachen
usschnitte, *Incisura jugularis*, versehen ist, und mit dem

äufseren Rande der Pars condyloidea oss. occip. sich also verbindet, dafs die Incisurae jugulares beider Knochen zusammentreffen, und das unregelmäfsige ansehnliche Drossel-Loch bilden, *Foramen jugulare* s. lacerum, welches in eine vordere engere, und hintere weitere Abtheilung zerfällt. — An der Superf. inferior selbst bemerkt man unterhalb des Porus acust. externus eine flach concave Fläche, welche die vordere Wand und den Boden des Meatus audit. ext. bildet, und unterwärts in eine ansehnliche Zacke ausläuft: von der letzteren steigt der dünne rundliche spitzige Griffelfortsatz, *Processus styloideus*, nach unten, vorn und innen herab, welcher von unbestimmter Länge, und oft aus mehreren durch Knorpel oder Ligamente verbundenen Stücken zusammengesetzt ist. Zwischen dem Proc. styloideus und der Incisura mastoidea liegt das *Foramen stylomastoideum*, d. i. der Ausgang des durch die Pyramide laufenden *Canalis Fallopii*. Neben der Incisura jugularis zeigt sich eine tiefe glatte Grube, *Fossa jugularis*, welche oft ein sehr kleines Loch enthält; und weiter nach vorn ein weites ovales Loch, *Foramen caroticum externum*, d. i. der Eingang des Canalis caroticus. Neben der Fossa jugularis, sehr nahe am hinteren Winkel, sieht man eine kleinere trichterförmige Öffnung, *Apertura aquaeductus cochleae;* und zwischen Fossa jugul. und For. carot. ext. ein Grübchen mit einem engen Loche, *Fossula petrosa*. Der übrige Theil der unteren Fläche ist rauh.

2. *Superficies superior* ist zugleich schräg nach vorn gerichtet, breit, schwach gewölbt, glatt, mit Impr. dig. und Juga cerebr. (und einer vom Canalis semicircularis superior herrührenden Erhabenheit) versehen. Nach vorn und aufsen wird sie theils durch den Angulus anterior von der unteren Fläche getrennt, theils geht sie unter einem rechten Winkel in die innere Fläche der Pars squamosa über; von der hinteren Fläche wird sie durch den oberen Winkel der Pyramide, *Angulus superior*, geschieden, auf welchem eine Furche, *Sulcus petrosus superior*, verläuft. Unweit der Spitze der Pyramide liegt eine weite längliche unregelmäfsige Öffnung, *Foramen caroticum internum*, d. i. der Ausgang des kurzen weiten *Canalis caroticus*, welcher in nach vorn gekrümmter Richtung die Pyramide durchbohrt. Weiter nach

ſsen und hinten findet sich eine Spalte, *Hiatus canalis llopii* s. Fissura petrosa superficialis, die in den Can. llopii führt, und mit dem For. caroticum internum durch ıe Rinne zusammenhängt.

3. *Superficies posterior* ist die längste und schmalste iche: vom Angulus sup. und post. begränzt, und nach ſsen und hinten an die Pars mastoidea stoſsend. Sie ist inahe senkrecht gerichtet; mit einer länglichrunden Öffnung, *rus acusticus internus*, versehen, deren Umfang glatt ab- rundet ist, und welche zu dem inneren Gehörgange, eatus auditorius internus, führt. Weiter nach aufsen und ıten liegt eine enge Spalte, *Apertura aquaeductus vestibuli*, n welcher eine Rinne zur Incisura jugularis herabläuft.

Im Inneren der aus sehr harter und gröſstentheils com- cter Knochensubstanz gebildeten Pyramide liegen mehrere öhlen und Kanäle, welche dem Gehörorgane angehören, e Gehörknöchelchen enthalten; und zu welchen die mei- ın der an den äufseren Flächen bemerkten Öffnungen füh- a. S. Gehörorgan.

Os frontis, Stirnbein.

Ein platter muschelförmiger Knochen, bildet vorzüglich s Sinciput, und zerfällt in vier Theile, Pars frontalis, bitales, und nasalis.

1. *Pars frontalis* s. coronalis, Stirntheil, ist das obere öfsere Stück des Knochens, welches in der Stirngegend gt. Auf seiner äufseren convexen glatten Fläche ragt ch. unten an jeder Seite eine längliche gebogene Erha- nheit hervor, *Arcus superciliaris*, Augenbrauenbogen; und er diesem der rundliche Stirnhöcker, *Tuber frontale*; der atte Raum zwischen den Arcus superciliares und den ıbera frontalia ist die *Glabella*. An den Seiten läuft eine uhe gekrümmte Linie, *Linea semicircularis*. Die innere ncave und in der Gegend der Tubera frontalia stärker rtiefte Fläche wird in der Mitte durch einen scharfen amm getheilt, *Crista* s. Spina *frontalis interna*, welcher ıten am höchsten ist, und im Heraufsteigen in eine flache ırche, *Sulcus longitudinalis*, sich verliert. Oberwärts und itwärts wird die Pars frontalis von einem gezackten ınde, *Margo coronalis*, begränzt, welcher mit den Scheitel-

beinen, und seitwärts, woselbst er sehr breit wird, auch mit den Alae magnae oss. sphen., sich vereinigt.

2. *Partes orbitales*, Augenhöhlentheile, liegen horizontal in dem vorderen Theile der Basis cranii, sind dünn und ungleichseitig viereckig. Eine jede verbindet sich mit der Pars frontalis unter einem rechten Winkel vermittelst des gebogenen abgerundeten Ober-Augenhöhlenrandes, *Margo supraorbitalis;* dieser liegt unmittelbar unter dem Arcus superciliaris, und läuft nach aufsen in den kurzen gezackten *Processus zygomaticus* aus: sein inneres Ende aber geht in die Pars nasalis über, und ist mit einem Einschnitte, *Incisura supraorbitalis*, und öfters auch mit einem mehr nach aufsen liegenden Loche, *Foramen supraorbitale*, (wenigstens mit einem von beiden), versehen. — Die untere Fläche der Pars orbitalis ist concav und glatt: hinter dem Proc. zygomaticus liegt eine flache Grube, *Fossa glandularis;* und hinter der Incis. supraorbitalis, jedoch etwas mehr nach innen hin, ein Grübchen, *Fovea trochlearis*, aus welcher oft ein kleiner Stachel, *Spina trochlearis*, hervorragt. — Die obere Fläche zeigt sehr tiefe Impr. digit. und starke Juga cerebr. — Der kurze gezackte hintere Rand verbindet sich mit dem Proc. ensiformis; der äufsere kurze breite und dreieckige Rand mit dem oberen Rande der Ala magna; an dem inneren längeren Rande weichen die beiden Tafeln des Knochens aus einander, und bilden kleine Zellen; auch ist dieser Rand mit zwei Furchen versehen, welche mit dem Siebbein die *Foramina ethmoidea, anterius* und *posterius*, bilden.

3. *Pars nasalis* s. Proc. nasalis, der Nasentheil, ein kurzer dicker Zapfen, liegt in der Mitte des Stirnbeins unter der Glabella, verbindet die Partes orbitales untereinander und mit der Pars frontalis, und schliefst von vorne den Zwischenraum beider Partes orbitales, *Incisura ethmoidalis* genannt. Er zeigt vorne einen rauhen halbkreisförmigen gezackten Ausschnitt, *Incisura nasalis*, aus deren Mitte der rauhe aufwärts gebogene Nasenstachel, *Spina nasalis* s. frontalis externa, hervorragt. Hinter dieser, dicht unter dem Anfang der Crista frontalis interna, liegt ein kleines Loch, *Foramen coecum*, oder anstatt dessen nur eine Rinne: und zu beiden Seiten die unregelmäfsigen Öff-

ngen der doppelten Stirnhöhlen, *Sinus frontales*, deren heidewand gewöhnlich durchlöchert ist: sie sind durch 2 — 3‴ von einander abstehenden Tafeln des Stirn- d Nasentheils gebildet; und reichen zuweilen weit nach en in die Glabella und Arcus superciliares bis zu den ıbera frontalia hin, und rückwärts in die Partes orbitales.

Häufig ist das Stirnbein durch eine senkrecht in der ittellinie laufende Stirnnath, *Sutura frontalis*, in zwei llkommen gleiche Hälften getheilt.

Ossa parietalia, Scheitelbeine.

s. Ossa bregmatis s. verticis, Scheitel- oder Seitenwand- ine; viereckige platte muschelförmige Knochen; bilden n Scheitel und zum Theil die Seitenwand des Schädels. e *äufsere Fläche* zeigt in der Mitte eine Hervorragung, *ıber parietale*, und ist überhaupt convex; vorzüglich in r oberen Hälfte, welche von der unteren mehr flachen ırch die rauhe gebogene *Linea semicircularis* geschieden ird. Die *innere Fläche* zeigt Impress. dig. und Juga cerebr. ıd ansehnliche baumförmige Sulci meningei. — *Ränder:* r obere, *Margo sagittalis*, hat lange Zacken, und verbin- t beide Scheitelbeine, vermittelst der Pfeilnath, *Sutura gittalis*, mit einander: unter ihm, an der inneren Fläche s Knochens, läuft eine flache breite Furche, *Sulcus longi- dinalis;* in welcher ein Emissarium diploicum, *Foramen rietale* genannt, den ganzen Knochen, oder nur eine sei- r Tafeln, durchdringt. Der vordere mit kurzen Zähnen rsehene Rand, *Margo coronalis*, vereinigt sich mit dem largo coron. oss. frontis zur Kranznath, *Sutura coronalis;* r hintere ausgeschweifte und zackige Rand, *Margo lamb- ıideus*, mit dem Margo lambd. oss. occipitis zur Lambda- ıth, *Sutura lambdoidea:* und der untere, *Margo temporalis*, t breit, von der äufseren Seite her zugeschärft, wird von em bogenförmigen Rande der Pars squamosa oss. tempo- ım und dem oberen Ende der Ala magna oss. sphen. be- eckt, und bildet mit ihnen die Schuppennath, *Sutura squa- osa.* — *Winkel:* der vordere obere, *Angulus frontalis*, in er Mitte der Sutura coronalis, stofst mit dem Stirnbein usammen; der obere hintere, *Angulus occipitalis*, mit der beren Spitze der Pars occipitalis des Hinterhauptsbeins;

der untere vordere, *Angulus sphenoidalis*, mit der oberen Ecke der Ala magna; der untere hintere, *Angulus mastoideus*, mit dem oberen Rande der Pars mastoidea oss. temporum. Am Angulus sphenoidalis befindet sich an der inneren Fläche der tiefste Sulcus meningeus, welcher zuweilen in einer kurzen Strecke ein wirklicher Kanal ist: am Angulus mastoideus geht über die innere Fläche eine breite flache Rinne, *Sulcus transversus*, hinweg.

Os ethmoideum, Siebbein,

s. O. cribriforme, hat eine beinahe würfelförmige Gestalt; liegt in der Mitte des vorderen Theils der Basis cranii; ragt tief zwischen die Gesichtsknochen herab, und ist mit den meisten derselben verbunden, so dafs es mehr dem Gesicht als dem Schädel angehört. Es zerfällt in einen mittleren Theil und zwei Seitentheile, Labyrinthe genannt.

1. Der mittlere Theil besteht aus zwei Knochenplatten, der Lamina cribrosa und perpendicularis. Die *Lamina cribrosa*, Siebplatte, ist länglich viereckig, und liegt horizontal in der Incisura ethmoidalis oss. frontis; hinterwärts ist sie mit dem vorderen Rande der oberen Fläche des Keilbeins verbunden. Auf dem vorderen Theile ihrer oberen Fläche erhebt sich ein länglicher platter gewöhnlich hohler Fortsatz, *Crista galli*, der Hahnenkamm; dieser ist vorn höher als hinten, und stöfst nach vorn an die Pars nasalis und Crista frontalis interna des Stirnbeins: zuweilen vermittelst zwei kleiner Spitzen, Hamuli frontales, welche zur Bildung des Foramen coecum beitragen. Zahlreiche kleine Löcher, *Foramina cribrosa*, welche zum Theil kurze Kanäle bilden, durchbohren die Lamina cribrosa, und liegen zu jeder Seite der Crista galli in zwei Reihen, einer äufseren und inneren. Flache Furchen am Seitenrande der Lamina cribrosa stofsen mit den Sulci ethmoidei am inneren Rande der Pars orbitalis oss. frontis zusammen zur Bildung der *Foramina ethmoidea;* deren gewöhnlich zwei, ein weiteres vorderes und ein engeres hinteres, vorhanden sind. — Die *Lamina perpendicularis* ist ungleichseitig viereckig, gröfser und dicker als die Lam. cribrosa, und liegt senkrecht und frei zwischen den beiden Labyrinthen; ihr oberer Rand ist mit der unteren Fläche der Lamina cribosa verschmolzen,

l enthält kleine Furchen und Kanäle: Fortsetzungen der
amina cribrosa. Ihr vorderer Rand verbindet sich mit
Spina nasalis oss. frontis und mit den Nasenbeinen, der
itere mit der Crista und Rostrum sphenoidale, der untere
t dem Vomer und dem Knorpel der Nasenscheidewand.

2. Jeder *Labyrinthus* hängt nur mit dem Seitenrande
Lamina cribrosa zusammen; hat eine länglich viereckige
stalt, und bestehet aus einer Menge zarter Knochenblätt-
n, welche die geräumigen und zahlreichen *Siebbeinzellen*,
llulae ethmoidales, zwischen sich lassen. Man unterschei-
Cellulae ethmoidales anteriores, mediae, und posteriores:
hängen sämmtlich unter einander zusammen, und höh-
den ganzen Labyrinth aus; sie sind grofsentheils offen,
l werden von den benachbarten Knochen, mit welchen
Siebbein sich verbindet, geschlossen: oberwärts stofsen
nämlich mit den Zellen am inneren Rande der Pars
bitalis oss. frontis zusammen; hinterwärts mit dem Kör-
und Cornua sphenoidalia des Keilbeins, und dem Gau-
nbeine; vorne mit der Pars nasalis oss. frontis, dem
erkiefer und Thränenbein. Nach unten, aufsen und vorn
t aus den Zellen ein gekrümmtes gezacktes Blatt hervor,
ocessus uncinatus. — Die *äufsere* Wand des Labyrinths
ein länglich viereckiges glattes dünnes Blatt, *Lamina*
pyracea, welches die Cell. ethm. mediae und posteriores
n Aufsen deckt; dieses verbindet sich hinterwärts mit
n Keilbeinkörper, oberwärts mit dem innern Rande der
rs. orbit. oss. frontis, wodurch es an der Bildung der
r. ethmoidea Theil nimmt; nach vorn und unten aber
t dem Thränen- und Oberkieferbein. — Die *innere*
and des Labyrinths, welche von innen alle Zellen
liefst, ist senkrecht gerichtet, parallel der Lamina per-
ndicularis und 2‴ von ihr entfernt; dünn, rauh, voll
iner Löcher; und theilt sich nach hinten in zwei über
nander liegende, von vorn nach hinten sich erstreckende,
bogene Blätter, die *Muscheln*, *Conchae* s. ossa turbinata.
s obere dieser Blätter, *Concha superior* s. Morgagniana,
ere Muschel, ist kürzer und schmaler; das untere,
ncha media, mittlere Muschel, ist länger, breiter, stärker
bogen: beide sind von lockerem schwammigen Bau, lö-
erig, nach aufsen concav, nach innen gegen die Lamina

perpendicularis hin convex; und ihr freier Rand, welcher bei der Concha media dick ist, nach unten gerichtet. Eine längliche Vertiefung trennt beide Muscheln, und führt unterhalb der obern Muschel zu den Cellulae ethmoidales mediae und posteriores; die längliche Höhlung unter der Concha media aber zu einem gebogenen Gange, welcher durch die Cellulae ethm. anteriores herabsteigt, und in welchen diese Zellen und der Sinus frontalis sich öffnen. — Zuweilen findet sich über der Concha superior noch ein kleines freies Knochenblatt, Concha Santoriniana.

Gesichtsknochen. Ossa faciei.

Von den 15 Gesichtsknochen gehören zum Oberkiefer 6 Knochenpaare, nämlich die Ossa maxillaria superiora, palatina, zygomatica, nasi, lacrymalia, und Conchae inferiores; und ein unpaarer Knochen, Vomer: alle diese hangen unter einander und mit den Schädelknochen unbeweglich durch Suturen oder Harmonien zusammen. Der Unterkiefer enthält zwei unpaare bewegliche Knochen, Maxilla inferior und Os hyoides. Sie bilden, gröfstentheils im Verein mit den Schädelknochen, die knöcherne Grundlage der Augenhöhlen, der Nasen- und Mundhöhle, die Schläfengruben und die Fossae pterygopalatinae.

Ossa maxillaria superiora, Oberkieferbeine,

sind die beiden gröfsten in der Mitte des Oberkiefers und nach vorn liegenden Knochen, an welche die übrigen Knochen des Oberkiefers sich anlegen. Ein jeder bestehet aus einem mittleren Theil oder Körper, und aus vier Fortsätzen, Processus nasalis, zygomaticus, alveolaris und palatinus; von denen erstere beide von dem oberen Theil des Körpers, letztere beide von dem unteren, ausgehen.

1. Der *Körper* hat die Gestalt eines Keils, dessen breiter Theil nach hinten liegt. 1) Seine obere Fläche, *Superficies orbitalis* s. Planum orbitale, ist dreieckig, schräg nach aufsen und vorn gerichtet, und bildet den Boden der Augenhöhle. Ihr innerer längster und leicht gezackter Rand vereinigt sich mit dem Thränenbein und dem unteren Rande der Lamina papyracea: der vordere ist nach innen abgerundet und bildet zum Theil den unteren Augenhöhlenrand,

rgo infraorbitalis; nach aufsen aber breiter und gezackt: äufsere Rand ist abgerundet, läuft schräg nach hinten, allel mit dem unteren Rande der Superficies orbitalis e magnae oss. sphenoidei, und bildet mit ihm die Keil-nkieferspalte, *Fissura sphenomaxillaris* s. *orbitalis inferior.* ter der Superficies orbitalis läuft der Unteraugenhöhlen-nal, *Canalis infraorbitalis*, von hinten nach vorn: dieser innt am äufseren Rande, also in der Fissura spheno-ixillaris, als ein knöcherner Halbkanal, welcher aber ober-rts durch Faserknorpelmasse und Beinhaut geschlossen d. 2) Die hintere Fläche ist rauh und gewölbt, bildet *Tuber maxillare*, in welchem sich zwei bis drei kleine cher, *Foramina maxillaria superiora*, finden. 3) Die ge-lbte äufsere Fläche, *Superficies facialis,* fliefst hinterwärts dem Tuber maxillare zusammen, und endigt vorn mit em scharfen Rande: man bemerkt an ihr das Unteraugen-lenloch, *Foramen infraorbitale*, d. i. der Ausgang des nalis infraorbitalis: und unter diesem Loch eine Grube, *ea maxillaris.* Zwischen den Tafeln dieser Fläche laufen e Kanäle oder Halbkanäle, *Canales alveolares posteriores*, *lius* und *anterior*, welche von den Foramina maxillaria eriora und dem Canalis infraorbitalis herabsteigen und vereinigen. 4) Die innere ebene Fläche, *Superficies alis*, der Seitenwand der Nasenhöhle angehörend, hat e grofse unregelmäfsige Öffnung, welche in die weite erkieferhöhle, *Sinus maxillaris* s. Antrum Highmori, führt; se Höhle nimmt vorzüglich das Tuber maxillare und den ocessus zygomaticus ein, wird nach aufsen von der Su-f. facialis begränzt, und ist zuweilen durch eine Scheide-nd getheilt. Vor dieser Öffnung steigt ein weiter Halb-nal, *Sulcus lacrymalis,* herab; und noch weiter nach n läuft eine erhabene Linie, *Crista turbinalis*, in queerer htung. 5) Die untere Fläche ist mit dem Proc. palatinus l alveolaris verschmolzen.

2. *Processus nasalis* s. frontalis, Nasenfortsatz, ragt der Superf. orbitalis in die Höhe, ist platt; sein obe-schmaleres gezacktes Ende legt sich neben der Spina salis ossis frontis und vor dem Labyrinth des Siebbeins den gezackten Rand der Pars nasalis oss. frontis. Die sere Fläche ist glatt, voll Foramina nutritia; die innere

hat eine queere Linie, *Crista ethmoidalis*, an welche sich das vordere Ende der Concha media befestigt. Der vordere Rand ist dünn und uneben; der hintere breit und mit einer breiten tiefen Furche, *Sulcus lacrymalis*, versehen, welche etwas nach aufsen und hinten gebogen zur Superf. nasalis herabsteigt: der innere scharfe Rand dieses Sulcus wird *Crista lacrymalis* genannt.

3. *Processus zygomaticus*, Jochfortsatz, ragt zwischen der Superf. orbitalis und facialis nach aufsen hervor; ist kurz und dick, dreiseitig, hohl, indem er die Wände des Sinus maxillaris bilden hilft; und endigt mit einer dreieckigen stark gezackten Fläche.

4. *Processus alveolaris* s. dentalis, Zahnzellenfortsatz, steigt vom Körper herab und bildet den untersten Theil des Knochens; ist länglich, platt, aber dick, gebogen, nach aufsen convex, nach innen concav. Sein unterer breiter freier Rand, *Limbus alveolaris*, ist mit acht tiefen Zahnzellen *Alveoli*, versehen, welche durch Scheidewände von einander getrennt sind, eine weite nach unten gerichtete Öffnung haben, und gegen ihren Boden sich verengern; und von vorn nach hinten abgezählt werden. Der Boden der drei ersten Zahnzellen ist ein einfaches Grübchen; die vierte und fünfte haben gewöhnlich zwei, die sechste bis achte drei bis vier Grübchen in ihrem Boden: jedes Grübchen ist mit einem engen Loche versehen, welche zu den Canale alveolares führen. Der dritte Alveolus ist der tiefste, der sechste gewöhnlich der weiteste; die Böden des vierten bis achten liegen unmittelbar unter dem Sinus maxillaris, nur durch ein sehr dünnes zuweilen fehlendes Knochenblatt von ihm geschieden. Die äufsere Fläche des Proc. alveolaris zeigt längliche Erhabenheiten, *Juga alveolaria*, welche die Zahnzellen bezeichnen; die innere ist rauh; das hintere Ende fliefst mit dem Tuber maxillare zusammen; das vordere ist gezackt, und hilft beide Oberkieferbeine verbinden.

5. *Processus palatinus*, Gaumenfortsatz, ist platt und beinahe dreieckig, hinten breiter als vorn, ragt horizontal nach innen; sein vorderes Ende ist mit dem Proc. alveolaris, sein äufserer Rand mit der Superf. nasalis des Körpers verschmolzen. Die obere Fläche ist glatt und concav; die untere concave aber rauhe Fläche geht allmählig in die in

e Fläche des Proc. alveolaris über. Der hintere leicht
ackte Rand ist kurz; der innere länger, mit zahlreichen
inen Zacken besetzt, und sehr breit, indem er nach
n in einen scharfen Kamm, *Crista nasalis*, ausläuft, des-
vorderes spitziges Ende *Spina nasalis anterior* genannt
d. Durch den vorderen Theil dieses Randes läuft eine
ne, welche auf der oberen Fläche dicht an der Crista
einem kleinen Loche ihren Anfang nimmt, schräg nach
n herab.

Beide Oberkieferbeine werden mit einander vereinigt,
em die gezackten inneren Ränder der Proc. palatini zur
lung der Gaumennath, *Sutura palatina*, in einander grei-
, wobei ihre Cristae und Spinae zu einer unpaaren Cri-
nasalis und Spina nasalis anterior, und ihre Rinnen zu
em Kanale zusammenstofsen. Dieser 5‴ lange *Canalis*
isivus hat einen doppelten Eingang an jeder Seite der
sta nasalis, und eine weitere untere vordere Mündung,
amen incisivum s. palatinum anterius, im vorderen Ende
Sutura palatina.

Ossa palatina, Gaumenbeine,

d gröfstentheils platte und zarte Knochen, welche hinter den
erkieferbeinen und vor den Proc. pterygoidei oss. sphe-
dei liegen. Ein jedes zerfällt in die Pars palatina und nasalis.

1. *Pars palatina* s. horizontalis, der Gaumen- oder ho-
ontale Theil, ist dem Proc. palatinus des Oberkieferbeins,
ter welchem er liegt, sehr ähnlich. Seine obere Fläche
glatt und ausgehöhlt, die untere rauh; der vordere Rand
gezackt, und verbindet sich mit dem hinteren Rande des
c. palatinus oss. maxillaris superioris; der hintere Rand
dünn und glatt; der innere sehr breite und zackige
nd stöfst mit demselben Rande des anderen Gaumenbeins
ammen; wodurch das hintere Ende der Sutura palatina
l der Crista nasalis, welche nach hinten in die *Spina*
alis posterior s. palatina ausläuft, gebildet, und das eine
umenbein mit dem andern verbunden wird; der äufsere
nd geht unter einem rechten Winkel in die Pars nasalis
er. Vom hinteren Ende des äufseren Randes ragt der
ramidenfortsatz, *Processus pyramidalis*, nach aufsen und
ten: dieser ist dreiseitig, und der dickste Theil des

Knochens; seine hintere Fläche liegt zwischen den Laminae proc. pterygoidei, füllt die Fissura pterygoidea aus, und hilft die Fossa pterygoidea bilden; die äufsere Fläche legt sich an die innere Fläche des Oberkieferbeins oberhalb des achten Alveolus; die untere freie nach dem Gaumen gerichtete Fläche zeigt drei Löcher, *Foramina palatina posteriora*; von welchen das vordere weiteste oft vom Oberkieferbein mit gebildet wird, das hintere den Proc. pyramidalis senkrecht durchbohrt, und das äufsere kleinste zuweilen fehlt.

2. *Pars nasalis* s. adscendens s. perpendicularis, der Nasen- oder aufsteigende Theil, ist ein dünnes Knochenblatt, welches von dem äufseren Rande der Pars palatina an senkrecht in die Höhe steigt, und den hinteren Theil der Seitenwand der Nasenhöhle bildet. Seine innere Fläche ist mit zwei queerlaufenden scharfen Linien versehen; die untere ist die *Crista turbinalis*, die obere kürzere die *Crista ethmoidalis;* an letztere legt sich das hintere Ende der Concha media, an erstere die Concha inferior. Die äufsere Fläche liegt gröfstentheils sehr genau an der Superficies nasalis oss. maxillaris superioris, und verengert von hinten her die Öffnung des Sinus maxillaris; nur nach hinten bleibt eine glatte, von oben nach unten und vorn gegen den Proc. pyramidalis hin laufende, Furche frei, *Sulcus pterygopalatinus;* dieser Sulcus liegt nahe am hinteren Rande der Pars nasalis, welcher mit der vorderen Fläche des Proc. pterygoideus sich verbindet: so dafs die Sulci pterygopalatini des Gaumenbeins und des Proc. pterygoideus mit einander, und mit dem hinteren inneren Winkel des Corpus oss. maxillaris superioris, zusammenstofsen. Auf diese Weise wird der Flügelgaumenkanal, *Canalis pterygopalatinus*, gebildet, welcher in seinem oberen Theile von aufsen durch Beinhaut verschlossen wird, unterwärts in die Foramina palatina posteriora des Proc. pyramidalis übergeht, im Allgemeinen eine Richtung von oben nach unten und vorn hat, 10‴ lang, und ziemlich weit ist. — Am oberen Ende der Pars nasalis ragen zwei durch einen tiefen Einschnitt getrennte Fortsätze hervor. Der vordere gröfsere ist der *Processus orbitalis;* er ruhet auf einem dünneren Halse; seine innere Fläche ist ausgehöhlt, und stöfst mit den Cellulae ethmoi

es posteriores zusammen; die äufsere Fläche ist glatt, l bildet den hinteren Theil des Bodens und der inneren and der Augenhöhle; seine Ränder legen sich vorne an Superfic. orbitalis oss. maxillaris superioris und an die nina papyracea oss. ethmoidei, hinten aber an die vor- e Fläche des Keilbeinkörpers. Der hintere Fortsatz, *cessus sphenoidalis*, ein dünnes gekrümmtes Knochen- ttchen, liegt glatt an der unteren Fläche des Keilbein- pers. Der Einschnitt zwischen beiden, Incisura spheno- atina, wird oberwärts durch das Cornu sphenoidale ge- lossen, und dadurch zu einem ansehnlichen ovalen Loche, *amen sphenopalatinum.*

Ossa zygomatica, Wangenbeine,

ugalia s. malaria, Jochbeine; platte starke Knochen, lie- am äufseren und oberen Theile des Gesichts, und bestim- n die Gestalt der Wangen. Ein jedes bestehet aus zwei tten Knochenstücken, der *Pars orbitalis* und *Pars facialis,* lche vorn durch einen abgerundeten concaven Rand, *rgo orbitalis,* mit einander verbunden sind, und hinten ch eine gemeinschaftliche concave Fläche, *Superficies poralis*, zusammenfliefsen. Der ganze Knochen wird einem doppelten engen Kanal, *Canalis zygomaticus*, chbohrt. Die Pars orbitalis, Augenhöhlenstück, ist drei- ig, nach innen und hinten gerichtet, bildet den vorderen eil der äufseren Wand der Augenhöhle, und verbindet h durch gezackte Ränder mit der Pars orbitalis ossis frontis l der Superf. orbitalis alae magnae oss. sphenoidei. Auf er der Augenhöhle zugewandten Fläche, Superf. orbitalis, gt sich der einfache oder doppelte Eingang des Canalis gomaticus, *Foramen zygomaticum orbitale.* — Die Pars ialis, Wangenstück, ist viereckig; auf ihrer äufseren deren schwachen convexen Fläche, Superf. facialis, zeigt h ein kleines Loch, *Foramen zygomaticum faciale,* d. i. Ausgang des Canalis zygomaticus. — Die Superf. tem- ralis bildet die vordere Wand der Schläfengrube; auf befindet sich ein zweiter Ausgang des Canalis zygoma- us, *Foramen zygomaticum temporale.* — Drei gezackte rtsätze gehen vom Wangenbeine aus: der obere Stirn- tsatz, *Processus frontalis*, ist das obere Ende des Margo

orbitalis, vereinigt sich mit dem Processus zygomaticus oss. frontis. Der untere vordere Kieferfortsatz, *Processus maxillaris*, ist das untere Ende des Margo orbitalis, und verbindet sich (nebst einer dreieckigen gezackten, hinter und über ihm liegenden, an die Superf. temporalis gränzenden Fläche) mit dem Proc. zygomaticus des Oberkieferbeins. Der äufsere Schläfenfortsatz, *Processus temporalis*, ist die hintere äufsere Ecke der Pars facialis, und vereinigt sich mit dem Proc. zygomaticus oss. temporum, wodurch der starke Jochbogen, *Arcus zygomaticus* s. Iugum, erwächst; welcher von vorn nach hinten und aufsen gerichtet, und an seinem vorderen, von der Pars facialis oss. zygom. gebildeten, Theile beträchtlich breiter und stärker ist, als an dem hinteren, vom Proc. zygom. oss. temporum gebildeten Theile.

Ossa nasi, Nasenbeine,

s. nasalia; kleine aber starke, länglich viereckige Knochen, die an ihrem oberen Ende dicker und schmaler, am unteren breiter und dünner sind; liegen in der Mitte des Gesichts unterhalb der Stirn, und bilden die Nasenwurzel und den oberen Theil des Nasenrückens. Durch den inneren Rand, welcher oberwärts sehr breit ist, vereinigen sich beide Nasenbeine mit einander; durch den äufseren Rand mit dem vorderen Rande des Proc. nasalis des Oberkieferbeins: das obere Ende ist eine kleine viereckige zackige Fläche, welche in die gezackte Incisura nasalis der Pars nasalis oss. frontis eingreift: der untere dünne scharfe gezackte Rand vereinigt sich mit den Knorpeln der äufseren Nase. Die vordere Fläche ist glatt und leicht convex; die hintere ruhet oberwärts und neben dem inneren Rande auf der Spina nasalis oss. frontis und dem vorderen Rande der Lamina perpendicularis oss. ethmoidei.

Ossa lacrymalia, Thränenbeine,

s. unguis, Nagelbeine, die kleinsten Gesichtsknochen, von der Gröfse eines Fingernagels; länglich viereckig, platt und dünn; bilden den vorderen Theil der inneren Wand der Augenhöhle. Der obere Rand des Thränenbeins verbindet sich mit dem inneren Rande der Pars orbitalis oss. frontis, der hintere Rand mit dem vorderen der Lamina papyracea

. ethmoidei; der untere Rand mit dem inneren der Su-
:f. orbitalis des Oberkieferbeins; und der vordere Rand
t der Crista lacrymalis am hinteren Rande des Proc. na-
is des Oberkieferbeins. Die innere etwas vertiefte Fläche
; Thränenbeins legt sich an den vorderen Theil des La-
rinths, und deckt von aufsen die Cellulae ethmoidales
teriores: die äufsere Fläche wird in zwei ungleiche
lften getheilt durch einen von oben nach unten laufenden
mm, *Crista lacrymalis*, dessen unteres gebogenes Ende,
mulus lacrymalis, in den Winkel zwischen Proc. nasalis
l Superf. orbitalis des Oberkieferbeins sich befestigt.
hintere Hälfte der äufseren Fläche ist glatt; die klei-
e Hälfte vor der Crista lacrymalis ist zu einer flachen
iten Rinne, *Sulcus lacrymalis*, ausgehöhlt: diese stöfst
t dem Sulcus lacrymalis am Proc. nasalis des Oberkiefer-
ns zusammen, und bildet mit ihm die längliche Thrä-
nsackgrube, *Fossa lacrymalis*, welche unten in den wei-
kurzen Nasenthränenkanal oder Nasenkanal, *Canalis*
olacrymalis s. *nasalis*, übergeht.

Conchae inferiores, untere Muscheln,

Conchae infimae, s. *Ossa turbinata* s. *spongiosa inferiora*,
tere gewundene oder schwammige Knochen, sind länglich
tt, muschelförmig gebogen, von lockerem schwammigen
u und voll kleiner Löcher; liegen an der Seitenwand
Nasenhöhle. Die innere Fläche ist convex gegen die
senscheidewand, die äufsere concav gegen die Superf.
salis des Oberkieferbeins und Pars nasalis des Gaumen-
ns gerichtet. Der untere breite Rand hängt frei herab;
r obere Rand ist vorne und hinten an die Crista turbinalis
s Oberkiefer- und Gaumenbeins geheftet; von seinem
ttleren Theile aber gehen drei dünne platte Fortsätze
s: 1) *Processus maxillaris* biegt sich nach unten, heftet
h an den unteren Umfang der Öffnung des Sinus maxil-
is, und verengert diese Öffnung; 2) *Processus ethmoidalis*
igt in die Höhe und verbindet sich mit dem Proc. unci-
tus des Siebbeins; 3) *Processus lacrymalis* steigt nach vorn
s zum unteren Rande des Thränenbeins in die Höhe, legt
h von innen und hinten an den Sulcus lacrymalis des

Proc. nasalis oss. maxill. superioris, und hilft dadurch den Canalis nasolacrymalis bilden.

Vomer, Pflugscharbein.

Ein platter rautenförmiger Knochen, liegt senkrecht in der Mittellinie der Nasenhöhle, jedoch meistens nach einer Seite hin etwas ausgebogen; und bildet den unteren hinteren Theil der Nasenscheidewand. Sein oberer kürzester und breitester Rand spaltet sich in zwei Blätter, *Alae vomeris*, welche an die Processus ad vomerem der Proc. pterygoidei sich schliefsen, und eine längliche Vertiefung, *Incisura vomeris,* zwischen sich lassen, in welche das Rostrum sphenoidale sich legt. Der hintere Rand ist kurz, dünn und glatt, und steht frei; der vordere längste ist gezackt, und verbindet sich mit dem unteren Rande der Lamina perpendicularis des Siebbeins, und mit dem Knorpel der Nasenscheidewand. Der untere gezackte scharfe Rand ruhet auf der Crista nasalis der Oberkiefer- und Gaumenbeine.

Maxilla inferior, Unterkiefer,

s. Os maxillare inferius, s. *Mandibula,* Unterkinnlade, ist der gröfste Knochen des Gesichts, bildet das untere Drittheil desselben; von dichter fester Textur; bestehet aus einem bogenförmigen mittleren Theile, *Corpus,* und zwei platten von den Enden des Corpus in die Höhe steigenden Stücken, *Rami.*

1. Der Körper ist von der Mitte an auf jeder Seite nach hinten gebogen, wird unterwärts von einem breiten abgerundeten Rande, *Basis,* begränzt, oberwärts aber von dem schmaleren Zahnzellenrande, *Limbus alveolaris:* dieser ist mit sechszehn *Alveoli* versehen; welche, von der Mitte an gezählt, an beiden Seiten einander völlig gleich, und denen des Oberkiefers, hinsichtlich der Anordnung, Gestalt und Tiefe, höchst ähnlich sind. In der Mitte der äufserer Fläche ragt eine längliche, unterwärts breitere Erhabenheit hervor, *Protuberantia* s. Crista *mentalis externa,* welche die knöcherne Grundlage des Kinns ist. Neben derselben zeigt sich auf jeder Seite unter dem fünften Alveolus ein Loch, *Foramen mentale* s. maxillare anterius, und eine er

)ene Linie, *Linea obliqua externa*, welche unterhalb des r. mentale anfängt, und schräg gegen den Ramus nach en und hinten läuft. — In der Mitte der hinteren oder ieren Fläche ragt ein einfacher oder doppelter kurzer ichel hervor, *Spina mentalis interna;* und auf jeder Seite ie schräg zum Ramus aufsteigende Linie, *Linea obliqua erna.*

2. Die *Äste,* Rami, steigen von den hinteren Enden Körpers schräg nach hinten in die Höhe. Unterwärts jeder Ramus mit dem Körper verschmolzen; sein vorer dünnerer Rand geht von der Linea obliqua externa l vom letzten Alveolus aus, sein hinterer längerer Rand r von dem hinteren Ende der Basis, mit welchem er en rauhen stumpfen Winkel, *Angulus maxillae inferioris*, det. Vom oberen Ende des Ramus ragen zwei Fortsätze vor, welche durch einen weiten Ausschnitt, *Incisura ilunaris* s. sigmoidea, von einander geschieden werden. r vordere, *Processus coronoideus*, Kronenfortsatz, ist eine tte stumpfe Zacke: der hintere, *Processus condyloideus*, lenkfortsatz, ist plattgedrückt, queer gerichtet; seine ere halbcylindrische Fläche überknorpelt: er ruhet auf em dünneren Halse, *Collum processus condyloidei*, auf sen vorderer Fläche eine flache Grube, *Fovea proc. conloidei*, sich befindet. Die äufsere Fläche des Ramus ist h; an der inneren zeigt sich unterhalb der Incisura seilunaris ein langgespaltenes Loch, *Foramen maxillare posrius*, von dessen hinterem Umfange eine Furche, *Sulcus lohyoideus*, herabsteigt. Das For. maxillare posterius rt in den Unterkieferkanal, *Canalis maxillaris* s. alveois inferior: dieser weite Kanal läuft nach vorn, nahe erhalb der Basis, unter den Alveoli, der inneren Fläche Körpers näher, als der äufseren; öffnet sich durch kleine cher in die hinteren Alveoli; mündet durch das Foramen ntale nach aufsen; setzt sich aber von hier aus, in mehe engere Kanälchen gespalten, bis zu den vorderen Alli fort.

Kiefergelenk, Articulatio maxillaris.

Der Unterkiefer verbindet sich mit dem Schläfebein rch eine beschränkte Arthrodie, welche eine freiere Be-

wegung der Kinnlade abwärts und aufwärts, aber eine beschränktere Verschiebung vorwärts, rückwärts und seitwärts gestattet. Der Proc. condyloideus ruhet in der Cavitas glenoidea oss. temporum, tritt aber bei starker Bewegung abwärts und vorwärts auf das Tuberculum articulare. Zwischen beiden Knochen liegt ein Zwischenknorpel von der Gestalt einer ovalen an den Rändern dickeren Scheibe. Zwei Synovialkapseln, von denen die obere vom Umfange der Cavitas glenoidea und des Tuberculum articulare herabkommt, die untere vom Collum proc. condyloidei heraufsteigt, verwachsen mit den Rändern und Flächen des Zwischenknorpels und der Gelenkknorpel; so dafs das Kiefergelenk eine doppelte, obere und untere, durch den Zwischenknorpel getrennte Gelenkhöhle enthält. Die Synovialkapseln werden von einer unvollständigen Faserkapsel umgeben, welche nach vorn und innen sehr schwach, hinten und aufsen aber stärker ist: das stärkste Bündel der Faserkapsel, welches von der Wurzel des Proc. zygomaticus des Schläfebeins zum Collum proc. condyloidei herabsteigt, wird *Ligamentum maxillare externum* genannt. Das platte, dünne und schlaffe, länglich viereckige *Ligamentum maxillare internum* s. laterale entspringt von der Spina angularis oss. sphenoidei, und heftet sich an den Umfang des Foramen maxillare posterius, steigt in einiger Entfernung vom Gelenke an der inneren Seite desselben herab, trägt aber wenig zur Befestigung der Knochen bei.

Os hyoides, Zungenbein,

s. Os hyoideum, ein kleiner Knochen, von der Gestalt eines U oder *v*, liegt unter dem Unterkiefer, zwischen Muskeln und aufser unmittelbarer Berührung mit anderen Knochen. Es besteht aus fünf einzelnen beweglich verbundenen Stücken; der Basis und den grofsen und kleinen Hörnern. Die *Basis* oder das mittlere Zungenbein ist länglich platt, liegt in queerer Richtung in der Mitte; die vordere schräg nach oben gerichtete Fläche ist convex und rauh; die hintere ist schräg nach unten gewendet, stark ausgehöhlt und ziemlich glatt. Am rechten und linken Ende der Basis befinden sich kleine Gelenkflächen zur Verbindung mit den Hörnern. Die grofsen oder Seiten-Hörner, *Cornua majora*

lateralia, seitliche Zungenbeine, sind horizontal nach
ten gerichtet; platt gedrückt, dünner aber länger als
Basis: sie endigen hinten mit einem zugespitzten
öpfchen. Die kleinen oder oberen Hörner, *Cornua mi-*
a s. superiora s. Corpora triticea, obere Zungenbeine,
hen an jedem Ende der Basis schräg aufwärts und nach
ten: sie sind rundlich zugespitzt, meistens nur 2 bis 3‴,
weilen $1\frac{1}{2}$″ lang. Die grofsen Hörner sind durch straffe
pselbänder, die kleinen durch schlaffere Kapseln, mit
Basis vereinigt. Das ganze Zungenbein ist sehr beweg-
h und wird vorzüglich durch Muskeln in seiner Lage
halten. Mit der Basis cranii und dem Unterkiefer wird
durch das *Ligamentum stylomylohyoideum* s. stylomaxillare
stylohyoideum, verbunden: ein dünnes schlaffes Band,
lches vom Proc. styloideus zum Angulus maxillae infe-
ris und zum Cornu minus herabsteigt, aber in das tiefe
tt der Fascia cervicalis eingewebt ist.

Allgemeine Betrachtung des knöchernen Kopfes.

Der *Schädel* hat überhaupt eine eiförmige Gestalt mit
was abgeplatteter Basis; seine Knochen bilden die dün-
n Wände der grofsen Schädelhöhle, welche vorne am
ersten, hinterwärts jenseits der Mitte am weitesten ist,
d am hinteren Ende sich wiederum verengert. Man un-
scheidet an ihm das Schädelgewölbe, die Seitenwände,
d die Grundfläche.

Äufsere Schädelfläche.

Das Schädelgewölbe, *Fornix cranii*, ist stark convex
d gröfstentheils glatt und regelmäfsig; schliefst sich durch
nen vorderen Theil, die Stirn, an das Gesicht; es reicht
n der Nasenwurzel und den Augenhöhlen rückwärts bis
r Protuberantia occipitalis externa und den Lineae semi-
rculares superiores oss. occipitis, seitwärts bis zu den
neae semicirculares der Stirn- und Scheitelbeine, welche
m Proc. zygomaticus oss. frontis bis gegen den Proc.
astoideus hin sich erstrecken. Man bemerkt auf ihm, von
rn nach hinten, in der Stirngegend die Glabella, neben

dieser die Arcus superciliares, unter welchen die Incisurae und Foramina supraorbitalia liegen: über den Arcus supraciliares ragen die Tubera frontalia hervor. Zwischen der Stirn- und Scheitelgegend läuft die Sutura coronalis; und von der Mitte derselben geht die Sutura sagittalis rückwärts durch die Scheitelgegend, neben welcher, hinter dem Scheitel selbst, die For. parietalia sich zeigen. Vom hinteren Ende der Sutura sagittalis, woselbst das Schädelgewölbe etwas eingedrückt und platt erscheint, läuft die Sutura lambdoidea zu beiden Seiten bis zu den Suturae mastoideae herab. In diesen Näthen, vorzüglich in der Sutura lambdoidea, finden sich häufig einzelne kleine getrennte und zwischen den eigentlichen Kopfknochen eingeklemmte Knochenstücke, von rundlich drei- oder viereckiger Gestalt mit zackigen Rändern: *Ossicula suturarum* s. Wormiana s. triquetra, Nathknochen: sie gehen durch die ganze Dicke der Knochen; oder bestehen, wenn sie klein sind, nur aus der äufseren Tafel; sie deuten eine unvollkommene Ausbildung der Näthe an. Ist eine Sutura frontalis vorhanden, so bildet diese mit der Sutura sagittalis und coronalis ein Kreuz auf dem Vorderkopfe (Caput cruciatum).

Die Seitenwände des Schädels, *Plana semicircularia*, steigen, zuweilen beinahe senkrecht, von den Lineae semicirculares herab; immer sind sie weniger convex als das Schädelgewölbe. Nach unten und hinten zeigt sich die Wurzel des Proc. zygomaticus oss. temporum, der Porus acusticus externus und die äufsere Fläche des Proc. mastoideus: nach unten und vorn geht das Planum semicirculare in die weite Schläfengrube, *Fossa temporalis*, über, deren Boden von der Superficies temporalis alae magnae oss. sphenoidei und der äufseren Fläche der Pars squamosa oss. temporum gebildet wird; ihre vordere Wand besteht aus der Pars orbitalis oss. zygomatici; nach aufsen wird sie vom Arcus zygomaticus begränzt; nach unten, vorn und innen geht sie in die Fossa pterygopalatina über. Auf dem Boden der Fossa temporalis bemerkt man das Ende der Sutura coronalis, die Verbindung der Ala magna oss. sphen. mit der Pars squamosa oss. temp., und die gebogene Schuppennath, *Sutura squamosa*, welche die Ala magna und Pars squamosa mit dem Angulus sphenoidalis und Margo tempo-

is des Scheitelbeins vereinigt: oft findet sich ein Emis-
ium diploicum in oder neben der Sutura squamosa. An
r vorderen Wand der Schläfegrube stofsen der Proc.
gomaticus oss. frontis und der Proc. frontalis oss. zygom.
sammen; und mündet hier der Canalis zygomaticus durch
s Foramen zygom. temporale aus.

Die Grundfläche, *Basis cranii,* ist wenig gewölbt und
ur unregelmäfsig. In der Mitte ihres hinteren breiteren
heils liegt das Foramen magnum occipitale; hinter dem-
ben die Crista occipitalis externa und die Lineae semi-
rculares inferiores und superiores oss. occipitis. Neben
m Foramen magnum zeigen sich die Processus condyloi-
i; hinter ihnen, auf jeder Seite, die Fossa condyloidea
t dem Foramen condyloideum posterius; weiter nach
fsen die Sutura mastoidea, Foramen mastoideum, Incisura
stoidea, und die innere Fläche und Spitze des Proc. ma-
oideus. Vor dem Proc. condyloideus liegt das Foramen
ndyl. anterius; neben diesem nach aufsen das Foramen
gulare (welches auf der rechten Seite gewöhnlich weiter
, als auf der linken), und die Fossa jugularis; vor die-
r die Apertura aquaeductus cochleae, die Fossula petrosa
d das Foramen caroticum externum: noch weiter nach
fsen der Proc. styloideus, und hinter demselben das For.
ylomastoideum. — Vor dem For. magnum occ. liegt die
rs basilaris oss. occipitis, und zwischen dieser und der
itze der Pyramide des Schläfebeins eine weite unregel-
äfsige Öffnung, *Fissura petrobasilaris* s. For. lacerum ante-
us, welche durch Faserknorpelmasse, *Fibrocartilagobasilaris*,
e hier einen Theil des Bodens des Canalis caroticus bildet,
rschlossen wird. Weiter nach aufsen bemerkt man die
ordere Mündung der Pars ossea tubae Eustachii und die
pina angularis oss. sphenoidei; in und vor derselben das
oramen spinosum und ovale. An der äufseren Seite der
pina angularis und des Proc. styloideus liegt eine tiefe
rube, durch welche die Fissura Glaseri läuft; der hintere
heil dieser Grube ist der Boden des äufseren Gehörgan-
es; der vordere äufsere die Cavitas glenoidea oss. tempo-
um, welche vorne durch das Tuberculum articulare und
ie Wurzel des Proc. zygomaticus begränzt, und überhaupt
om Proc. condyloideus maxillae inferioris ausgefüllt wird.

— Vor der Pars basilaris oss. occip. erblickt man in der Mitte die untere Fläche des Corpus oss. sphen. mit den die Alae vomeris einschliefsenden Processus ad vomerem: neben diesen ragt auf jeder Seite der Proc. pterygoideus herab, auf dessen hinterer Fläche man den Sulcus tubae Eustachii, und unter diesem die Fossa pterygoidea bemerkt: zwischen der Lamina externa proc. pterygoidei und dem Hamulus pterygoideus schiebt sich der Proc. pyramidalis des Gaumenbeins ein. Nach aufsen vom Proc. pterygoideus liegt die untere Fläche der Ala magna, welche in die Fossa temporalis und Fossa pterygopalatina übergeht. — Der übrige vordere Theil der Basis cranii, welcher von den Partes orbitales und nasalis oss. frontis und der Lamina cribosa oss. ethmoidei gebildet wird, ist durch die Knochen des Gesichts verdeckt.

Innere Schädelfläche, Wände der Schädelhöhle, Cavitas cranii.

Das Gewölbe erstreckt sich von der Vereinigung der Partes orbitales und frontalis des Stirnbeins bis zur Protuberantia occip. interna und den Lineae cruciatae transversae oss. occip.; oberhalb der letzteren zeigen sich die Fossae occipitales superiores. In der Mittellinie bemerkt man vorn die Crista frontalis interna; am oberen Ende derselben beginnt der Sulcus longitudinalis, welcher unter der Sutura sagittalis, woselbst die Foramina parietalia in ihm sich münden, hinläuft; alsdann auf der Linea cruc. superior oss. occip. bis zur Protuberantia occip. interna herabsteigt, und hier meistens nach der rechten Seite sich wendet. Die Suturen erscheinen weniger zackig, als auf der äufseren Fläche; man sieht zahlreiche Foramina nutritia und Emissaria diploica, und flache Sulci meningei. Das Gewölbe geht unmerklich in die Seitenwände über, an welchen flache Impressiones digitatae und Juga cerebralia, und wenige aber tiefere Sulci meningei, vorzüglich an der Ala magna, der Squama und Os parietale, sichtbar sind.

Die Basis ist sehr ungleich, hinten bei weitem tiefer und breiter als vorn, und zerfällt in drei Abtheilungen oder Schädelgruben.

1. Die vordere Schädelgrube wird vorn und seitrts von der Vereinigung der Partes orbitales und frontalis Stirnbeins, hinten von dem scharfen Rande der Proc. siformes begränzt. Sie enthält in der vertieften Mitte, vorn nach hinten, das Foramen coecum, die Crista li und die Lamina cribrosa oss. ethmoidei mit den For. brosa und ethmoidea: seitwärts wird sie von den Partes oitales oss. frontis gebildet, ist gewölbt, und voll annlicher Impressiones und Juga.

2. Die mittlere Schädelgrube enthält in der Mitte die ramina optica, die Proc. clinoidei medii und die Sella cica, umgeben und überragt von den Proc. clinoidei eriores und posteriores. Seitwärts zeigen sich zwei tiee nach aufsen und hinten sich erweiternde Gruben, lche von den Alae magnae und oberen Flächen der Pyniden gebildet, und vorn durch die Proc. ensiformes, tten durch die oberen Winkel der Pyramiden, nach aun durch das Zusammenstofsen der Schuppen und Pyralden der Schläfebeine begrenzt werden. In jeder dieser t ansehnlichen Impressiones und Iuga versehenen Gruben gt, dicht neben der Sella turcica, das Ende des Canalis oticus, welches unterwärts vom Fibrocartilago basilaris chlossen wird und die hintere Mündung des Canalis Vidias enthält: und der vom Foramen caroticum internum aufsteigende Sulcus caroticus. Weiter nach aufsen zeigt h eine Reihe von Öffnungen: nahe unter dem Proc. enormis liegt nämlich die Fissura orbitalis superior; dann gen nach hinten das Foramen rotundum, ovale, spinosum, d der Hiatus canalis Fallopii. Von dem For. spinosum ft ein tiefer Sulcus meningeus vorwärts und abwärts.

3. Die hintere Schädelgrube ist die tiefste und geräugste. In der Mitte steigt der Clivus von den Proc. clioidei posteriores bis zu dem horizontal liegenden For. agnum occipitale herab, neben welchem die Proc. anomi und die For. condyloidea anteriora und posteriora gen. Die Seiten der hinteren Schädelgrube werden vorne n den senkrecht herabsteigenden hinteren Flächen der ramiden der Schläfebeine gebildet, an welchen der Porus usticus internus, und weiter nach hinten die Apertura naeductus vestibuli sich zeigen: da wo diese Fläche mit

der Pars basilaris und condyloidea oss. occip. zusammenstöfst, bemerkt man den Sulcus petrosus inferior und das For. jugulare. Weiter nach hinten liegen die Fossae occipitales inferiores, durch die Crista occip. interna von einander getrennt, und durch die Sulci transversi begränzt. Die Sulci transversi laufen auf jeder Seite von der Protuberantia occip. interna aus über die Linea cruciata transversa, den Angulus mastoideus oss. parietalis, in der Fossa sigmoidea an der inneren Fläche der Pars mastoidea oss. temporum, woselbst sie das For. mastoideum enthalten; in dem Sulcus jugularis oss. occipitis: und endigen im For. jugulare.

Die Dicke der Schädelwände ist sehr verschieden; am beträchtlichsten ist sie an den Pyramiden und Proc. mastoidei der Schläfebeine, an den Protuberantiae und Lineae cruciatae oss. occip., und an den Arcus superciliares und längs der Crista frontalis interna. Die dünnsten Stellen sind die Partes orbitales oss. frontis, die Lamina cribrosa, der untere Theil der Pars squamosa oss. temp. und die Fossae occip. inferiores. Am Gewölbe und dem oberen Theile der Seitenwände beträgt die Dicke gewöhnlich 2 bis 3 Lin. Daher sind auch die äufseren Durchmesser des Schädels und die inneren Durchmesser der Schädelhöhle sehr verschieden.

Äufsere Durchmesser.	Männlich	Weiblich
Längen-Dm. zwischen Glabella und Protuber. occ. externa	7″ 3‴	6″ 6‴
Vorderer Queer-Dm. zwischen den Alae magnae	4″ 6‴	4″ 2‴
Hinterer Queer-Dm. zwischen den Tubera parietalia	5″ 9‴	5″ 3‴
Höhe zwischen For. magnum und dem Scheitel	5″	4″10‴
Innere Durchmesser.		
Unterer Längen-Dm. zwischen For. coecum und Protub. occip. int.	5″ 6‴	5″
Oberer Längen-Dm. zwischen den Mitten der Crista front. int. und Lin. cruc. sup. oss. occip.	6″ 3‴	5″ 8‴
Queer-Dm. zwischen den Vereinigungen der Pyramiden und Schuppen	4″ 3‴	4″
Höhe	4″ 6‴	4″ 5‴

Die häufigen Abweichungen von diesen mittleren Di-
nsionen rühren von einer mehr breiten rundlichen, oder
hr länglich-schmalen Form des Schädels her.

Am *Gesicht*, von *vorn* betrachtet, bemerkt man in der
itte dicht unter der Glabella die Nasenwurzel; unter ihr
e vordere Öffnung der Nasenhöhle, *Apertura pyriformis*,
t der Spina nasalis anterior; weiter abwärts die Öffnung
r Mundhöhle, von veränderlicher Weite, zwischen den
mbi alveolares beider Kiefer; und endlich die Crista
ntalis externa. Seitwärts sieht man neben der Nasen-
rzel die Augenhöhle, unter dieser das For. infraorbi-
e, die Fovea maxillaris, und weiter nach aufsen den
rderen breiteren, vom Wangenbein gebildeten, Theil des
cus zygomaticus mit dem For. zygomat. faciale; und
ben dem Kinn das For. mentale. — Betrachtet man das
sicht *von der Seite*, so bemerkt man vorzüglich den Ar-
s zygomaticus und den ganzen Ramus maxillae inferioris:
r Proc. coronoideus tritt zwischen Jochbogen und Ober-
efer in den unteren Theil der Schläfengrube. An der
ite des Oberkiefers, unterhalb der Schläfengrube und
m Proc. coronoideus verdeckt, bemerkt man das Tuber
xillare mit den For. maxillaria superiora, seine Ver-
ndung mit der Lamina ext. proc. pterygoidei; und weiter
ch oben die Fossa pterygopalatina. — Die obere Fläche
s Gesichts wird durch den Schädel verdeckt; an der un-
ren und hinteren sieht man zwischen dem Zungenbein
d der Basis maxillae inferioris bis zum knöchernen Gau-
n und den hinteren Nasenöffnungen hin.

	Männlich	Weiblich
Höhe (Länge) des Gesichts von der Nasen-wurzel bis zum Kinn	4″ 4″	4″
Breite zwischen den Wangenbeinen . . .	4″	3″10″
- - - Jochbogen	5″	4″ 9‴
- - - Rami maxill. inferioris	3″ 9‴	3″ 5″
Entfernung des Kinns vom Scheitel . . .	9″	8″ 3‴

Augenhöhlen.

Die Augenhöhlen, *Orbitae*, haben eine vierseitig pyra-
idalische Gestalt, und erstrecken sich von ihren weiten

vorderen Öffnungen an convergirend nach hinten und innen (so dafs ihre Axen auf der Sella turcica zusammentreffen) indem sie in ihrem hinteren Theile beträchtlich enger werden: am geräumigsten sind sie 3‴ hinter ihrer vorderen Öffnung, woselbst sie 15‴ Höhe und Breite haben: ihre Tiefe von vorn nach hinten beträgt 1″ 9‴. Die vordere Öffnung jeder Augenhöhle wird durch die Augenhöhlenränder, Margines orbitales, begrenzt: der obere, *Margo supraorbitalis,* bestehet aus dem Margo supraorbit. und Proc. zygom. des Stirnbeins; der untere, *Margo infraorbitalis,* wird vom Oberkieferbein und dem Proc. maxillaris oss. zygomatici gebildet; der äufsere, *Margo orbitalis externus,* vom Margo orbitalis oss. zygom.; der innere sehr flache, *Margo orbitalis internus,* vom Proc. nasalis des Oberkieferbeins. Die vier Wände der Augenhöhle gehen meistens unter abgerundeten Winkeln in einander über. Die obere Wand, Dach oder Gewölbe, *Lacunar orbitae,* ist die Pars orbitalis oss. frontis, concav und glatt; nach vorn und innen mit der Fovea trochlearis, nach vorn und aufsen mit der Fossa glandularis versehen. Die untere Wand oder der Boden, *Pavimentum orbitae,* wird vorn von der Superficies orbitalis des Oberkieferbeins und einem faserknorpeligen Blatt, welches den hinteren Theil des Canalis infraorbitalis bedeckt, hinten aber von dem Proc. orbitalis oss. palatini gebildet: vorne hängt sie mit der äufseren Wand zusammen; wird aber hinterwärts durch die *Fissura orbitalis inferior* von dieser getrennt; diese Spalte fliefst in der Tiefe der Augenhöhle mit der Fissura orbitalis superior zusammen, ist indessen gröfstentheils durch Beinhaut und Faserknorpelmasse geschlossen. Die äufsere Wand, *Paries externa orbitae,* ist aus der Pars orbitalis oss. zygomatici und der weiter nach hinten liegenden Superficies orbitalis alae magnae oss. sphen. zusammengesetzt. Auf ihr zeigt sich nach vorn das *For. zygomaticum orbitale;* hinten wird sie durch die Fissura orbitalis inferior von der unteren Wand, durch die *Fissura orbitalis superior* von der oberen Wand getrennt. Die innere Wand, *Paries interna orbitae,* ist die längste, und erstreckt sich fast gerade nach hinten, nicht schräg, wie die übrigen Wände; sie wird vom Os lacrymale, der Lamina papyracea oss. ethmoidei

d dem Körper des Keilbeins gebildet: hier findet man mittelbar hinter dem Margo orbit. internus die *Fossa rymalis*, welche nach unten in den Canalis nasolacryma- übergehet; und weiter hinten an der Vereinigung mit r oberen Wand das *Foramen ethmoideum anterius* und *po- rius*, von denen das vordere auf die obere Fläche der mina cribrosa, das hintere in die Cellulae ethmoidales irt; endlich ganz hinten sieht man das *For. opticum.*

Die Augenhöhle steht in Verbindung:

mit der Schädelhöhle durch das For. opticum, die Fiss. orbit. superior und das For. ethm. anterius,

mit der Nasenhöhle durch den Canalis nasolacrymalis und die For. ethmoidea,

mit der Fossa pterygopalatina durch die Fiss. orbitalis inferior,

mit der Schläfengrube und Wangengegend durch den Canalis zygomaticus.

Die dünnere Beinhaut, welche die Augenhöhle bekleit, wird Periorbita genannt.

Nasenhöhle.

Die Nasenhöhle, *Cavum nasi* s. nares internae, nimmt n unteren und mittleren Theil des Oberkiefers ein, und rfällt in die eigentliche Nasenhöhle und ihre *Nebenhöhlen.* tztere umgeben die Nasenhöhle von oben und von den iten: es sind die Sinus frontales und Cellulae ethmoidales teriores und mediae (oben und vorn); die Sinus sphe- idales und Cellulae ethmoidales posteriores (oben und hin- n) und die Sinus maxillares (zu beiden Seiten). Die rdere Wand der eigentlichen Nasenhöhle ist unvollstän- g, wird nur oberwärts durch die Ossa nasi gebildet; nter diesen liegt die nach unten sich erweiternde vordere asenöffnung, *Apertura pyriformis*; begränzt von den Na- nbeinen, den vorderen Rändern der Proc. nasales und örper der Oberkieferbeine, und unterwärts auch von der pina nasalis anterior. Anstatt einer hinteren Wand finden ch zwei länglich viereckige hintere Nasenöffnungen, *Choa- ae,* welche unten vom hinteren Rande der Pars palatina er Gaumenbeine, nach aufsen von der Lamina interna roc. pterygoidei, oberwärts vom Körper des Keilbeins und

den Alae vomeris begränzt, und durch den hinteren Rand des Vomer und die Spina nasalis posterior von einander getrennt werden. Der *Boden* der Nasenhöhle, 1″ 6‴ lang, 14‴ breit, von den Proc. palatini der Oberkieferbeine und Partes palatinae der Gaumenbeine gebildet, ist zu beiden Seiten glatt und vertieft; in der Mitte läuft die Crista nasalis, neben deren vorderen Ende auf jeder Seite ein Eingang zum Canalis incisivus sich zeigt. Der obere Theil der Nasenhöhle wird durch die Labyrinthe des Siebbeins beträchtlich verengert, und von der Lamina cribrosa bedeckt, welche die *obere Wand* bildet, und 1″ 9‴ vom Boden entfernt ist. Die *Seitenwände* sind von vorn nach hinten in der Mitte 2″ 3‴ lang; und werden von der Superf. nasalis oss. maxillaris superioris, von der Pars nasalis oss. palatini, von der inneren Wand des Labyrinthus oss. ethmoidei, und von der Concha inferior gebildet. Die Conchae ragen von diesen Wänden frei in die Nasenhöhle hinab, und bilden auf jeder Seite drei längliche von vorn nach hinten gerichtete Gruben, die *Nasengänge*, *Meatus narium*. Der *Meatus narium superior* zwischen Concha superior und media oss. ethmoidei, am hinteren oberen Theile der Seitenwand, ist der engste und kürzeste; in ihm öffnen sich die Cellulae ethmoidales post. und mediae, und die Sinus sphenoidales: an seinem hinteren Ende liegt das Foramen sphenopalatinum. Der *Meatus narium medius* zwischen Concha media und inferior ist der längste; in seiner Mitte liegt die (durch das Gaumenbein, den Proc. maxillaris und ethmoidalis conchae inferioris und den Proc. uncinatus oss. ethmoidei sehr verengerte) Öffnung des Sinus maxillaris. Der *Meatus narium inferior* zwischen Concha inferior und dem Boden der Nasenhöhle ist der geräumigste: an seinem vorderen Ende öffnet sich der *Canalis nasolacrymalis* s. nasalis. Die vordere und äufsere Wand dieses, aus der Fossa lacrymalis orbitae herabsteigenden, kurzen weiten Kanals wird von Sulcus lacrymalis proc. nasalis des Oberkieferbeins gebildet; die innere und hintere sehr dünne Wand, durch welche er vom Meatus narium medius geschieden wird, vom Os lacrymale und Proc. lacrymalis conchae inferioris. Seine Richtung von der Fossa lacrymalis an geht von oben nach unten und von vorn nach hinten; anfänglich biegt er

auch etwas nach aufsen und alsdann nach innen: die fernung vom unteren Ende der Fossa lacrymalis bis zum len der Nasenhöhle beträgt 15‴. — Durch die Mitte Nasenhöhle läuft von oben nach unten die knöcherne enscheidewand, *Septum narium osseum*, welche nach der en oder anderen Seite etwas ausgebogen ist, und daher Nasenhöhle in zwei nicht völlig gleiche Hälften theilt. oberer Theil ist die Lamina perpendicularis oss. eth- dei, ihr unterer hinterer Theil der Vomer; vorn reicht nicht bis zur Apertura pyriformis, sondern zeigt eine winkelige Lücke, welche von dem Cartilago septi narium gefüllt wird. Oberwärts ist sie mit der hinteren Fläche Nasenbeine, der Spina nasalis oss. frontis und der La- a cribrosa oss. ethm., und der Crista, Rostrum und c. ad Vomerem des Keilbeins verbunden; unterwärts et sie auf der Crista nasalis des Bodens der Nasenhöhle. Die Nasenhöhle ist durch die Apertura pyriformis ge- die Vorderseite des Gesichts, und durch die Choanae en die Basis Cranii hin, weit offen, und steht aufserdem Verbindung:

mit der Schädelhöhle durch die For. cribrosa,
mit der Augenhöhle durch die For. ethmoidea und den Canalis nasolacrymalis,
mit der Fossa pterygopalatina durch das For. sphenopa- latinum,
mit der Mundhöhle durch den Canalis incisivus.

Mundhöhle.

Die Mundhöhle, *Cavum oris*, ist die weiteste aber sehr vollständig begränzte Höhle des knöchernen Gesichts. e obere Wand oder Dach ist der *harte knöcherne Gau-*, *Palatum durum* s. *osseum;* länglich viereckig, vorne maler und etwas abgerundet; gebildet von den rauhen eren Flächen der Proc. palatini der Oberkieferbeine und Partes palatinae und Proc. pyramidales der Gaumen- ne. In der Mitte des Gaumens läuft die Sutura palatina, deren vorderem Ende der Ausgang des Canalis incisivus, For. palatinum anterius, sich zeigt: am hinteren äu- ren Ende des Gaumens öffnen sich auf jeder Seite die ei bis drei For. palatina posteriora (ein vorderes weiteres,

ein hinteres, und ein äufseres sehr enges). — Die vorderen und Seitenwände der Mundhöhle werden von den Limbi alveolares der Oberkieferbeine und dem ganzen Körper des Unterkiefers gebildet: nach unten und nach hinten, woselbst sie an die Choanae und Basis cranii grenzt, ist sie bis auf den Raum, welchen das Zungenbein einnimmt, völlig offen. Ihre Weite ist, wegen der Beweglichkeit des Unterkiefers, sehr veränderlich.

Fossa pterygopalatina.

Die *Flügelgaumengrube, Fossa pterygopalatina* s. sphenomaxillaris, liegt an jeder Seite des Kopfs zwischen dem oberen hinteren Theile des Gesichts und der Basis cranii; hinter der Augenhöhle, nach aufsen von der Nasenhöhle, über der Mundhöhle. Sie ist eng und von pyramidalischer Gestalt, oben weiter als unten; nach aufsen ist sie offen und geht in die Schläfengrube über; hinten wird sie von der vorderen Fläche des Proc. pterygoideus, nach innen von der Pars nasalis oss. palatini, nach vorn von dem hinteren Rande des Corpus oss. maxill. superioris, begränzt. Nach oben und vorn steht sie durch die Fissura orbitalis inferior mit der Augenhöhle, durch den Canalis infraorbitalis mit der vorderen Gesichtsfläche, in Verbindung. An ihrer inneren Wand liegt das in die Nasenhöhle führende For. sphenopalatinum. Ihre hintere Wand enthält das For. rotundum und die vordere Mündung des Canalis Vidianus, durch welche sie mit der Schädelhöhle und dem Canalis caroticus in Verbindung steht. Nach unten geht sie allmählig in den Canalis pterygopalatinus über, aus welchem feine Kanäle zwischen der Pars nasalis oss. palatini und der Superf. nasalis des Oberkieferbeins in die Nasenhöhle dringen; und welcher endlich in die Mundhöhle durch die For. palatina posteriora ausmündet.

Knochen der Wirbelsäule.

Die Wirbelsäule, *Columna vertebralis* s. spinalis s. Spina dorsi, das Rückgrat, wird von 26 einzelnen über einander liegenden Knochen gebildet; reicht von der Basis cranii bis zum unteren Ende des Stammes herab; und zerfällt, nach

Gegenden des Stammes, in vier Abtheilungen: den
stheil, Pars cervicalis columnae vertebralis, den Brust-
r Rückentheil, Pars thoracica s. dorsalis, den Lenden-
r Bauchtheil, Pars lumbaris s. abdominalis, und den
euz- oder Beckentheil, Pars sacralis. Erstere drei Theile
rden von 24 Wirbeln oder sog. wahren Wirbelbeinen,
tebrae verae, zusammengesetzt; letztgenannter vom Kreuz-
Steifsbeine, deren einzelne Stücke man falsche Wir-
Vertebrae spuriae, nennt.

Vertebrae, Wirbel.

Sie haben eine ringförmige Gestalt, und bestehen aus
vorderen dicken Körper, *Corpus vertebrae*, und dem
teren zackigen Bogen, *Arcus;* zwischen beiden bleibt
weite Öffnung, *Apertura spinalis* s. For. medullae spi-
s, Rückenmarksloch.

Die vordere und Seitenflächen des *Körpers* sind gewölbt;
hintere, welche den vorderen Umfang der Apertura
nalis bildet, ist schwach concav; übrigens sind sie sämmt-
glatt und mit vielen kleinen Ernährungslöchern ver-
en. Die obere und untere Fläche, durch welche die
irbel mit einander sich verbinden, sind rauher, und ent-
ler eben oder schwach vertieft. Der Körper besteht
nur aus spongiöser von einer sehr dünnen Rinde um-
ener Knochensubstanz.

Der mit dickerer Rinde versehene *Bogen* geht an jeder
e vermittelst einer dünneren Wurzel vom Körper aus,
d nach hinten breiter und platter, und besteht hier
fstentheils aus sieben an einander gränzenden Fortsätzen.
h hinten, dem Körper gegenüber, ragt der Dornfort-
, *Processus spinosus* s. Spina, hervor; zu beiden Seiten
Queerfortsätze, *Processus transversi;* nach oben und
en die Gelenk- oder schrägen Fortsätze, *Processus arti-
ires* s. *obliqui*, *superiores* und *inferiores:* die oberen sind auf
er hinteren, die unteren auf der vorderen Fläche über-
rpelt. Zwischen den Proc. obliqui und dem hinteren
fange des Körpers, über und unter den Wurzeln des
gens, liegen Ausschnitte, *Incisurae vertebrales*, von denen
untere der tiefste ist, und welche durch die Vereini-

gung je zweier Wirbel die Zwischenwirbellöcher, *Foramina intervertebralia*, bilden.

Im Allgemeinen nehmen die Wirbel von oben nach unten an Gröfse zu und verändern ihre Gestalt; aber sehr allmählig: so dafs zwei benachbarte Wirbel einander sehr ähnlich, zwei entfernte aber sehr verschieden sind.

Die *sieben Halswirbel*, *Vertebrae colli* s. cervicales, haben einen niedrigen Körper, dessen Umfang bei den oberen rundlich viereckig, bei den unteren bohnenförmig ist. Die Verbindungsflächen, vorzüglich die obere, sind concav-convex, die Apertura spinalis verhältnifsmäfsig weit und dreieckig; die Proc. obliqui stehen sehr schräg, und ihre Gelenkflächen sind eben; die Proc. spinosi sind meistens in zwei Zacken gespalten. Ein charakteristisches Merkmal sämmtlicher Halswirbel sind die kurzen platten, von einem Loche, *Foramen transversarium*, durchbohrten Proc. transversi, welche überdies auf ihrer oberen Fläche ausgehöhlt, und mit einem vorderen und hinteren kleinen Höcker versehen sind.

Brust- oder *Rückenwirbel*, *Vertebrae thoracis* s. *dorsi*, *zwölf* an der Zahl; die Körper der oberen haben einen bohnenförmigen, die der mittleren einen theils herzförmigen, theils halbkreisförmigen Umfang; die der unteren einen bohnenförmigen Umfang; die Verbindungsflächen sind bei allen eben: die Apertura spinalis ist eng und rundlich: die Proc. obliqui stellen sich vom ersten an bis zum zwölften immer mehr gerade aufwärts und abwärts; ihre Gelenkflächen sind eben; die Proc. spinosi sind lang, dreiseitig, spitzig und nach unten gerichtet. Die Proc. transversi sind lang und dick, nach hinten gerichtet, und endigen mit einem stumpfen Knopfe, auf dessen vorderen oberen Umfange eine vertiefte Gelenkfläche sich zeigt, welche aber am eilften und zwölften Wirbel (zuweilen auch am zehnten) fehlt. Alle Rückenwirbel aber haben am hinteren Ende der Seitenfläche der Körper, vor den Wurzeln der Bogen, kleine Gelenkflächen, *Superficies articulares laterales:* an den 10 oberen Wirbeln finden sich an jeder Seite zwei, eine gröfsere am oberen, und eine kleinere am unteren Rande des Körpers, welche mit denen der benachbarten Wirbel zu

menstofsen; an dem eilften und zwölften Brustwirbel let sich an jeder Seite nur eine solche Gelenkfläche.

Die *fünf Lendenwirbel*, *Vertebrae lumbares* s. lumborum lumbales, sind gröfser als die Hals- und Brustwirbel; en höhere und breitere Körper von bohnenförmigem r ovalem Umfange und mit ebenen Verbindungsflächen: dreieckige Apertura spinalis ist verhältnifsmäfsig eng: Proc. obliqui stehen beinahe senkrecht; die Gelenkfläche oberen ist concav und nach innen gerichtet, die der eren convex und nach aufsen gekehrt: die Proc. transsi sind dünn und platt; die Proc. spinosi stehen fast ade nach hinten, sind breit und platt, und endigen mit em wulstigen Rande. Die Lendenwirbel sind weder mit em For. transversarium, noch mit einer Superf. articuis lateralis versehen. —

Einzelne Wirbel haben eine merkwürdig eigenthümhe Gestalt.

Der *erste Halswirbel*, *Atlas*, der Träger, hat keinen rper, sondern anstatt desselben einen kurzen platten Bo-, *Arcus anterior*, auf dessen vorderer Fläche ein Höcker, *berculum anterius*, auf der hinteren aber eine flach verfte Gelenkfläche liegt. Der hintere Bogen, *Arcus posteor*, ist dünner, rundlich, und zeigt statt eines Proc. spius eine schwache, oft doppelte, Hervorragung, *Tuberum posterius*. Zwischen dem Arcus anterior und poster finden sich die dickeren Seitenmassen, *Massae laterales*, welchen die weit hinausragenden Proc. transversi betigt sind, und hinter welchen die Incisurae vertebrales gen. Jede Seitenmasse hat eine längliche concave obere lenkfläche, und eine rundliche sehr schwach concave une, welche die Stellen der Proc. obliqui vertreten. Zwien dem Arcus anterior und den Massae laterales bleibt e viereckige Öffnung, welche nach hinten in die dreiige Apertura spinalis übergeht.

Der *zweite Halswirbel*, *Epistropheus* s. Axis, der Dreher, im Allgemeinen wie die übrigen Halswirbel gebildet; n Körper auf der Vorderfläche mit einem länglichen Vorrung versehen; sein Bogen sehrstark. Von der oberen Fläche s Körpersragt aber der dicke rundliche stumpfspitzige Zahntsatz, *Processus odontoideus* s. dens, empor, welcher auf

der vorderen und hinteren Fläche überknorpelt ist. Neben diesem Fortsatz liegen zwei rundliche schwach convexe nach oben und aufsen gerichtete Gelenkflächen, anstatt der fehlenden Proc. obliqui superiores.

Der siebente Halswirbel (auch *Vertebra prominens* genannt) hat längere Queerfortsätze mit sehr engen For. transversaria, von denen zuweilen ein längerer plattspitziger Fortsatz (Rudiment einer Rippe) ausgeht. Der sehr lange Proc. spinosus ist nicht gespalten. Am unteren Rande des Körpers findet sich gewöhnlich eine Superf. articularis lateralis.

Der zwölfte Rückenwirbel ist dem ersten Lendenwirbel sehr ähnlich; sein Proc. spinosus breit; die Queerfortsätze sehr kurz und rückwärts gerichtet; die Gelenkfläche der Proc. obliqui inferiores schwach convex. Die Superf. artic. lateralis liegt fast in der Mitte der Seitenfläche des Körpers.

Os sacrum, Kreuzbein,

s. Os clunium s. latum, Heiligbein, liegt unmittelbar unter dem fünften Lendenwirbel; ist der stärkste und breiteste Knochen der Wirbelsäule, und besteht eigentlich aus fünf zusammengeflossenen Wirbeln, *Vertebrae spuriae ossis sacri.* Es hat eine dreieckige gebogene Gestalt, ist in seinem oberen Theile breiter und dicker, und enthält einen von oben nach unten sich verengernden Kanal, *Canalis sacralis.* Die obere Fläche, *Basis*, zeigt in ihrer Mitte eine ovale Verbindungsfläche mit dem fünften Lendenwirbel; hinter derselben den dreieckigen Eingang des Canalis sacralis; neben diesem ragen zwei vollkommen ausgebildete Processus obliqui superiores mit concaven rückwärts gerichteten Gelenkflächen hervor, und weiter nach aufsen zwei unvollkommene Proc. transversi spurii; vor den Proc. obliqui liegen Incisurae vertebrales. — Die vordere Fläche ist concav, vorzüglich in ihrer unteren Hälfte: in der Mitte zeigen sich vier queerlaufende Linien, *Lineae transversae*, an den Stellen, woselbst die Körper der fünf falschen Wirbel mit einander verschmolzen sind; an beiden Seiten liegen vier weite Löcher, *Foramina sacralia anteriora*, welche von oben nach unten enger werden, nach aufsen in flache Rinnen übergehen, und in den Canalis sacralis führen. — Die hintere

che ist convex und sehr ungleich und rauh, indem fünf hen von Erhabenheiten von oben nach unten laufen: nlich die Reihe der Proc. spinosi spurii in der Mitte; en diesen die der Proc. obliqui spurii, und weiter nach sen die Reihen der Proc. transversi spurii. Zwischen den letztgenannten Reihen liegen die *Foramina sacralia teriora*, vier auf jeder Seite, welche in den Canalis sa-lis dringen, aber auch in die For. sacralia anteriora rgehen, so dafs der Knochen in seiner ganzen Dicke den Löchern durchbohrt wird. Am unteren Ende der teren Fläche zeigt sich eine breite dreieckige Rinne, ... der Ausgang des Canalis sacralis, welcher seitwärts den untersten stärker hervorragenden Proc. obliqui rii, den sogen. *Cornua sacralia*, begränzt wird. — Die enränder sind oberwärts breit, und bilden eine Sförmig r ohrförmig gebogene Verbindungsfläche, *Superficies auularis*; nach unten werden sie dünner, und vertiefen sich einem Ausschnitt unter dem letzten Proc. transversus rius, *Incisura sacrococcygea*, welche die Stelle eines fünf- For. sacrale vertritt, und mit diesen Löchern in der-en Reihe liegt. — Die stumpfe untere Spitze des Kreuz-is, Apex oss. sacri, trägt eine ovale Fläche zur Verbin-g mit dem Steifsbein.

Os coccygis, Steifsbein,

kkuksbein, Schwanzbein; der unterste und kleinste Kno-n der Wirbelsäule, ist dreieckig, an der vorderen Fläche wach ausgehöhlt, und besteht aus vier, selten fünf, ein-nen leichten schwammigen Knochenstücken, Steifsbein-bel, *Vertebrae spuriae ossis coccygis*. Der erste dieser chen Wirbel ist der breiteste, gränzt oberwärts ver-telst einer ovalen Fläche an die Spitze des Kreuzbeins, ist unterwärts durch eine kleinere convexe Fläche mit n zweiten falschen Wirbel durch eine Schicht weichen erknorpels verbunden: von der hinteren Fläche ragen ei *Cornua coccygea* aufwärts und den Cornua sacralia gegen; seitwärts stehen zwei Proc. transversi spurii her-, welche die Incisura sacrococcygea nach unten begrän-. — Die folgenden Vertebrae spuriae nehmen allmäh-an Gröfse ab; der zweite ist breiter und dem ersten

ähnlich; mit diesem, und gewöhnlich auch mit dem dritten, durch eine Faserknorpelschicht verbunden; dagegen der rundlich viereckige dritte und vierte falsche Wirbel durch Knochenmasse mit einander verschmolzen sind.

Varietät. Sehr oft ist die erste Vertebra spuria des Steifsbeins mit der fünften des Kreuzbeins in der Mitte, an den Proc. transversi und den Cornua, durch Knochensubstanz verschmolzen: alsdann erscheint das Steifsbein kürzer, nur drei falsche Wirbel enthaltend; dagegen das Kreuzbein länger, aus sechs Wirbeln bestehend, und von fünf vollkommenen Foramina sacralia durchbohrt, von denen aber das fünfte nicht in den Canalis sacralis dringt.

Verbindungen der Wirbel.

I. Die Verbindung der einzelnen Wirbel geschieht, vom zweiten Halswirbel an bis zum Kreuzbein, durch Symphysis zwischen den Körpern, durch straffe Gelenke zwischen den Proc. obliqui inferiores des höherliegenden Wirbels und den Proc. obliqui superiores des tieferliegenden Wirbels, und durch Bänder, welche zwischen den Bogen und übrigen Fortsätzen ausgespannt sind.

1. *Fibrocartilagines intervertebrales* s. Ligamenta intervertebralia, Zwischenwirbelknorpel, sind faserknorpelige Scheiben, welche zwischen der unteren und oberen Verbindungsfläche zweier Körper liegen, mit diesen Flächen unmittelbar und äufserst fest vereinigt sind. Sie bestehen aus concentrischen Ringen senkrechter und schräg einander durchkreuzender Sehnenfaserbündel; diese Ringe lassen nach dem Umfange hin engere Räume, in der Mitte eine weitere Höhlung, zwischen sich, welche sämmtlich von weicher gallertähnlicher Knorpelsubstanz ausgefüllt werden. Durch ihre Stärke bei grofser Elasticität sind sie das vorzüglichste Verbindungsmittel der Wirbel. Sie haben einen etwas gröfseren Umfang als die Verbindungsflächen, ragen daher zwischen den Wirbelkörpern etwas hervor; sind in der Mitte am höchsten, und meistens vorn höher als hinten (hinten ungefähr halb so hoch als in der Mitte); zwischen den Halswirbeln haben sie in ihrer Mitte eine Höhe von 2‴ bis 2½‴; zwischen den oberen Brustwirbeln von 1‴ bis 2‴; zwischen den unteren Brustwir-

in von 2‴ bis 2½‴; zwischen den Lendenwirbeln von
½‴ bis 5‴. Es sind überhaupt 23 solcher Zwischenwir-
lknorpel vorhanden; der erste liegt zwischen dem zwei-
n und dritten Halswirbel, der letzte zwischen dem fünften
ndenwirbel und dem Kreuzbein.

2. *Ligamenta capsularia* s. articularia, schlaffe Syno-
alkapseln mit dünnen Faserkapseln, an die Ränder der
oc. obliqui geheftet, schliefsen die engen Gelenkhöhlen
ischen diesen Fortsätzen ein.

3. *Ligamenta intercruralia* s. subflava, gelbliche Bänder
ischen den Bögen je zweier Wirbel ausgespannt; sind
k und stark, an den Lendenwirbeln höher als an den
cken- und Halswirbeln; bestehen aus elastischen Fasern,
d daher von matter gelblicher Farbe, sehr ausdehnbar
d elastisch; hangen aber weniger fest mit den Knochen
sammen, als die Faserbänder.

4. *Ligamenta interspinalia* s. Membranae interspinales,
nne platte Bänder zwischen den Proc. spinosi zweier Wir-
l; sie sind am stärksten und breitesten zwischen den Len-
nwirbeln, am schwächsten zwischen den Halswirbeln.

5. *Ligamenta intertransversaria*, dünne rundlich platte
nder zwischen den Queerfortsätzen, vorzüglich der Len-
nwirbel und Rückenwirbel; an den Halswirbeln sind sie
regelmäfsig, zuweilen doppelt, überhaupt schwach und
t fehlend.

III. *Gemeinschaftliche Bänder der Wirbelsäule.*

1. *Ligamentum longitudinale anterius* s. Fascia long.
terior, läuft an der vorderen und den Seitenflächen der
Wirbelsäule herab; fängt am Tuberculum anterius atlantis
s ein schmaler dicker Streifen an; wird im Herabsteigen
eiter, so dafs man einen stärkeren mittleren, und zwei
hwächere seitliche Streifen an ihm unterscheiden kann;
id verliert sich sehr verdünnt auf der vorderen Fläche
es Kreuzbeins. Es verbindet sich vorzüglich fest mit den
ändern der Cartilagines intervertebrales, ist aber hier
inner, als auf den vorderen und Seitenflächen der Wir-
elkörper selbst.

2. *Ligamentum longitudinale posterius* s. Fascia long.
osterior, liegt an der hinteren Seite der Wirbelkörper im

Canalis spinalis. Es beginnt am dritten Halswirbel, wird im Herabsteigen schmaler und endigt im Canalis sacralis. Am hinteren Rande eines jeden Cartil. intervertebralis breitet es sich etwas aus, und wird schmaler an der hinteren Fläche des Wirbelkörpers.

3. *Ligamentum nuchae*, das Nackenband, ein dünner sehniger Streifen, welcher von der Protuberantia occip. externa anfangend an die Proc. spinosi aller Halswirbel sich befestigt, zugleich aber mit der Fascia muscularis des Nakkens (Fascia nuchae) zusammenhängt.

4. *Ligamentum apicum*, Spitzenband, ist stärker und länger, plattrundlich; beginnt am Proc. spinosus des siebenten Halswirbels, woselbst es mit dem Lig. nuchae zusammenhängt; und geht brückenförmig über die Spitzen sämmtlicher Proc. spinosi der Brust- und Lendenwirbel, zwischen diesen Fortsätzen mit den Ligamenta interspinalia zusammenfliefsend; endigt an den Proc. spinosi spurii oss. sacri.

III. Verbindung zwischen Kreuz- und Steifsbein.

Weiche nachgiebige Faserknorpelscheiben vereinigen die Spitze des Kreuzbeins und die zwei bis drei obersten Vertebrae spuriae des Steifsbeins mit einander; häufig verknöchern einige dieser Faserknorpel, selten aber alle; so dafs zwischen dem Kreuz- und Steifsbein, oder zwischen dem ersten und zweiten Steifsbeinwirbel, eine ziemlich bewegliche *Symphysis sacrococcygea* bleibt. Aufserdem finden sich hier mehrere Bänder:

1. *Ligamentum sacrococcygeum anterius*, dreieckig oder aus zwei convergirenden Streifen bestehend, geht von der vorderen Fläche der Spitze des Kreuzbeins zu der des ersten Steifsbeinwirbels herab.

2. *Ligamenta sacrococcygea lateralia*, gehen vom Seitenrande des Kreuzbeins zum Proc. transversus spurius des ersten Steifsbeinwirbels, begränzen nach aufsen die Incisura sacrococcygea, wodurch diese ein enges Loch zwischen Knochen und Bändern wird.

3. *Ligamentum sacrococcygeum posterius*, ein starkes viereckiges Band, zwischen den Cornua sacralia und coccygea und der hinteren Fläche des ersten Steifsbeinwirbels ausgespannt: verschliefst das untere Ende des Canalis sacralis.

t aber auf jeder Seite zwei kleine Öffnungen unter dem
nu sacrale und coccygeum.

V. Verbindung zwischen Os occipitis, Atlas und Epistropheus.

Diese geschieht durch mehrere mit starken accessori-
en Bändern versehene Gelenke, welche man oft unter
i gemeinschaftlichen Namen *Kopfgelenk, Articulatio ca-
s*, begreift: das Hinterhauptsbein ist in den Atlas durch
i Ginglymi eingelenkt, und der Atlas mit dem Epistro-
us durch ein Drehgelenk vereinigt, wobei der letztere
ruhende, der Atlas aber der drehbare Knochen ist.

1. Die Proc. condyloidei des Hinterhauptbeins ruhen
den oberen Gelenkflächen der Massae laterales atlantis,
werden mit ihnen durch weite schlaffe *Ligamenta cap-
ria* verbunden. Die Räume zwischen den Bogen des
as und dem Umfange des For. magnum werden durch die
ichen elastischen *Ligamenta obturatoria atlantis* ausge-
t: das Lig. obtur. anterius ist in der Mitte sehr stark,
den Seiten dünner, geht von der Pars basilaris oss. oc-
zum Tuberculum anterius atlantis, woselbst es mit
i Lig. longit. anterius zusammenhängt; das breitere
nere Lig. obtur. posterius reicht vom hinteren Umfange
For. magnum zum Arcus posterior atlantis.

2. Die unteren Gelenkflächen der Massae laterales at-
as ruhen auf den oberen Gelenkflächen des Epistropheus,
nen auf ihnen vorwärts und rückwärts gleiten, und
den durch weite schlaffe Kapselbänder verbunden; der
us anterior des Atlas aber durch das Lig. longitudinale
erius, der Arcus posterior durch ein Lig. intercrurale,
den Körper und Bogen des Epistropheus befestigt. —
Proc. odontoideus ragt in den viereckigen Raum zwi-
en den Seitenmassen und vorderen Bogen des Atlas hin-
: seine vordere Fläche liegt genau an der Gelenkfläche
Arcus anterior atlantis, und beide werden hier von ei-
dünnen schlaffen Kapsel umgeben: vorzüglich aber durch
Ligamentum cruciatum s. transversum atlantis an einan-
befestigt. Der mittlere queerlaufende Theil dieses Ban-
geht hinter dem Proc. odontoideus von einer Seiten-
se des Atlas zur anderen; da, wo er die hintere leicht

überknorpelte Fläche des Proc. odontoideus berührt, ist er vorzüglich breit, dick, faserknorpelig, an jenen Fortsatz durch eine Synovialkapsel geheftet; und bildet mit dem vorderen Bogen des Atlas einen vollständigen Ring um den Proc. odontoideus. Von diesem dickeren Queertheil gehen zwei Schenkel nach oben und unten; der untere dickere spitzige setzt sich an die hintere Fläche des Körpers des zweiten Halswirbels; der obere breitere dünnere an den vorderen Umfang des For. magnum occipitale.

3. Der Proc. odontoideus verbindet sich mit dem Os occipitis durch das Lig. suspensorium und die Lig. alaria. Das *Ligamentum suspensorium dentis* ist länglich viereckig; und geht, zwischen dem Lig. obturatorium anterius und dem oberen Schenkel des Lig. cruciatum, von der Spitze des Proc. odontoideus zum vorderen Umfange des For. magnum. Die *Ligamenta alaria* s. lateralia dentis entspringen von den Seiten des Proc. odontoideus, gehen aufwärts und auswärts und befestigen sich an die inneren Flächen der Proc. condyloidei oss. occipitis. Sie sind kurz, rundlich, und sehr stark; halten vorzüglich den Kopf mit den ersten Halswirbeln zusammen, und verhüten eine zu starke Drehung des Kopfs.

4. *Apparatus ligamentosus vertebrarum colli* ist ein plattes länglich viereckiges starkes Band, welches hinterwärts das Lig. cruciatum und den Proc. odontoideus mit seinen Bändern bedeckt. Es beginnt am unteren Ende des Clivus, verwächst mit dem oberen Schenkel des Lig. cruciatum und der hinter ihm liegenden Dura mater; steigt durch das For. magnum und den inneren Raum des Atlas und Epistropheus bis zum dritten Halswirbel herab, und verliert sich hier in den unteren Schenkel des Lig. cruciatum und in das Lig. longitudinale posterius.

Allgemeine Betrachtung der Wirbelsäule.

Sie ist von ungleicher Dicke und Breite; ihr dickster Theil wird von den Lendenwirbeln, ihr breitester Theil vom Kreuzbein gebildet; oberhalb desselben wird sie allmählig schmaler bis zum fünften Rückenwirbel hinauf; von hier an wird sie wiederum breiter, und verschmälert sich dann wieder bis zu dem sehr breiten Atlas hinauf. Unterhalb des Kreuzbeins läuft sie spitzig zu.

Sie liegt in der Mitte zwischen beiden Seitenhälften, r zugleich in der hinteren Hälfte des Stammes, hinter senkrechten Mittellinie des Körpers, welche vom Schei- durch die Pars basilaris oss. occip. herabfällt; so dafs mit ihrer vorderen Fläche diese Linie zwischen dem ten und fünften Halswirbel nur berührt, und zwischen zweiten und vierten Lendenwirbel etwas über sie her- tritt. Zwischen diesen Punkten macht sie schlangen- nig mehrere Biegungen nach hinten; und ist am Atlas , am vierten Brustwirbel 1″, an der Mitte des Kreuz- is 3″, und an der Spitze des Steifsbeins 2″ 8‴ von der tellinie entfernt. Häufig ist sie auch in ihrem Brust- le kaum merklich nach der rechten Seite hingebogen. — e Länge ist in beiden Geschlechtern fast gleich, und rägt in senkrechter Richtung, ohne Rücksicht auf die immungen, ungefähr $^2/_5$ der Länge des ganzen Körpers; t man den Biegungen, so mifst der Halstheil etwa $4^1/_2$″, Brusttheil $11^1/_2$″, der Lendentheil 7″, und der Kreuz- il $5^1/_2$″. Von diesen Dimensionen kommen auf die Car- gines intervertebrales am Halstheile 1″, am Brusttheile ″, an dem Lendentheile beinahe 2″.

Die *vordere Fläche* der Wirbelsäule ist convex und we- ihrer Bekleidung durch das Lig. longitudinale anterius nlich glatt; nur die Vereinigungsstelle des fünften Len- wirbels mit dem Kreuzbein ragt nach unten und vorn as hervor, und wird daher *Promontorium,* der Vorberg, annt. Unterhalb desselben sieht man die beiden Reihen For. sacralia anteriora, fünf in jeder Reihe, mit Ein- lufs der Incisurae sacrococcygeae.

Die *Seitenflächen* sind nach vorn glatt und eben; wei- rückwärts bemerkt man die Queerfortsätze, und zwi- en zwei und zwei Wirbeln die weiten, oft durch un- elmäfsige Ligamente in eine vordere und hintere Öffnung heilten, *Foramina intervertebralia.* Es finden sich 25 sol- r Löcher, acht engere am Halstheile, zwölf am Brust- ile, und fünf sehr weite am Lendentheile: das oberste gt zwischen Hinterhauptsbein und Atlas, hinter dem Proc. dyloideus und der Massa lateralis; das unterste zwischen n fünften Lendenwirbel und dem Kreuzbein. Am Rücken- l Lendentheile liegen sie vor den Queerfortsätzen; die

engeren Halslöcher aber zwischen diesen Fortsätzen, und werden von dem Canalis vertebralis verdeckt. Der *Canalis vertebralis* wird auf jeder Seite durch die über einander liegenden For. transversaria der sechs oberen Halswirbel (das des siebenten ist gewöhnlich durch Beinhaut verschlossen) und die unvollständigen Lig. intertransversaria colli gebildet: er läuft bis zum dritten Halswirbel ziemlich senkrecht in die Höhe, biegt sich aber im Epistropheus und vorzüglich im Atlas, stark nach aufsen. — An jeder Seitenfläche des Brusttheils sieht man zehn flache *Foveae costales;* welche von den Superficies articulares laterales je zweier Wirbel und dem Rande des zwischenliegenden Cartilago intervertebralis gebildet werden; die oberste liegt zwischen dem siebenten Halswirbel und ersten Brustwirbel, die zehnte zwischen dem neunten und zehnten Brustwirbel; auf diese folgen noch zwei flach convexe Gelenkflächen, welche den beiden letzten Brustwirbeln, einem jeden besonders, angehören.

An der *hinteren Fläche* der Wirbelsäule bemerkt man in der Mitte eine ansehnliche Erhabenheit, die von den Proc. spinosi und den Lig. interspinalia und Lig. apicum gebildet wird; diese ragt am siebenten Halswirbel, den oberen Brustwirbeln und den unteren Lendenwirbeln am stärksten hervor, und am wenigsten auf dem Kreuzbeine. Zu beiden Seiten laufen die Reihen der Proc. obliqui und transversi, und bilden mit jener Reihe der Dornfortsätze zwei Rinnen, Sulci posteriores columnae vertebralis, welche an den Rückenwirbeln am breitesten, an den Lendenwirbeln am engsten sind. Am Kreuztheile sieht man zu beiden Seiten die vier durch Bandstreifen sehr verengerten For. sacralia posteriora.

Der *Canalis spinalis* s. Theca vertebralis, Rückenmarkskanal, Rückgratshöhle, folgt den Biegungen der Wirbelsäule, und wird von den Körpern und Bogen der Wirbel und dem Kreuzbein, von den Cartilagines intervertebrales, dem Apparatus ligamentosus vertebrarum colli, dem Lig. longitudinale posterius und den Lig. intercruralia gebildet. Er ist im Allgemeinen dreieckig, mifst von vorn nach hinten im Halstheile 6‴, im Brust- und Lendentheile 7‴; sein Queerdurchmesser beträgt in den Halswirbeln 9‴, in

übrigen Wirbeln 7‴; im Kreuzbeine verengert er sich
h unten beträchtlich. Oben steht er durch das For.
gnum occipitale mit der Schädelhöhle in Verbindung,
wärts öffnet er sich durch die For. intervertebralia, und
Kreuztheile durch die nach vorn und hinten sich ver-
gernden For. sacralia. Seine untere Öffnung zwischen
Cornua sacralia und coccygea ist durch das Lig. sacro-
cygeum posterius fest verschlossen; jedoch finden sich
h hier, nahe unter jenen Cornua, zwei kleine Öffnun-
auf jeder Seite: so dafs der ganze Canalis spinalis mit
er rechten und linken Reihe von 31 Öffnungen versehen ist.
Obgleich die einzelnen Wirbel nur durch Symphysis
Amphiarthrosis verbunden sind, so ist doch die ganze
rbelsäule sehr beweglich; sie kann nach vorn und nach
den Seiten gebogen, nach hinten gestreckt (aufgerichtet)
rückwärts gebogen, auch um ihre Längenaxe gedrehet
den. Die ausgedehntesten Bewegungen finden am obe-
Ende der Wirbelsäule statt; hier ist das Hinterhaupt
ch einen Ginglymus in den Atlas eingelenkt, welcher
ht allein eine Beugung und Streckung des Kopfes (wobei
Gesicht sich senkt und erhebt), sondern auch eine sehr
inge Seitwärtsneigung gestattet: und zwischen Atlas und
stropheus besteht ein Drehgelenk, vermittelst dessen der
pf mit dem Atlas seitwärts gedrehet wird. Eine ausge-
ntere Seitwärtsneigung und Drehung des Kopfes, so wie
e stärkere Vor- und Rückwärtsneigung desselben, ge-
ieht aber durch die Bewegungen der Halswirbel; welche
rhaupt, was Beugung, Streckung und Drehung betrifft,
veglicher sind, als alle übrigen: nur der Epistropheus auf
n dritten Halswirbel kann sehr wenig vorwärts und rück-
rts bewegt werden. Die Beweglichkeit der Rückenwir-
ist, wegen der geringen Höhe der Cartilagines inter-
tebrales zur Höhe der Wirbel selbst, bedeutend gerin-
; indessen können die unteren ziemlich stark gedrehet
rden. Bei den Lendenwirbeln findet keine Drehung
tt; dagegen können sie nach allen Seiten hin gebogen
rden, am stärksten zwischen dem zwölften Brustwirbel
d dem ersten und zweiten Lendenwirbel, und zwischen
n vierten und fünften Lendenwirbel und Kreuzbein. —
unteren Ende der Wirbelsäule gestattet die Verbindung

zwischen Kreuzbein und Steifsbein und den einzelnen Wirbeln des letzteren eine passive Bewegung nach hinten, so dafs die nach unten und vorn gerichtete Spitze des Steifsbeins senkrecht nach unten und selbst etwas nach hinten mit Leichtigkeit gedrängt werden kann: eine Bewegung, welche zuweilen schon gegen das zwanzigste Jahr, und im höheren Alter äufserst häufig, durch Verschmelzung der Vertebrae spuriae des Steifsbeins mit einander und dem Kreuzbein, sehr beschränkt oder gänzlich aufgehoben wird.

Knochen des Brustkastens, Ossa thoracis.

Der Brustkasten wird von den zwölf Brustwirbeln (S. 146.), dem Brustbein und den Rippen zusammengesetzt.

Sternum, Brustbein,

s. Os pectoris, liegt in der vorderen Seite des Stammes in der Mittellinie, dem dritten bis neunten Brustwirbel gegenüber, schräg von oben nach unten und vorn gerichtet. Es ist länglich, platt, der Länge nach etwas gebogen, von schwammigem Bau mit dünner Rinde; und besteht aus drei Stücken, welche im vollkommenen Zustande durch Synchondrose vereinigt sind, häufig aber zusammenschmelzen.

Das obere Stück, *Manubrium*, der Handgriff, ist oberwärts breiter und dicker, wird nach unten schmaler; seine vordere Fläche ist leicht convex, die hintere schwach concav. Das Mittelstück, *Corpus* s. Mucro, ist das längste, in der Mitte am breitesten, oben und unten schmaler; es hat glatte Flächen. Das untere Stück, *Processus xiphoides* s. ensiformis, der Schwerdtfortsatz, ist kurz, dünn und schmal, gröfstentheils knorpelig (daher zuweilen Schwerdtknorpel genannt), oft in zwei Spitzen von ungleicher Gröfse gespalten; zuweilen auch von einem Loche durchbohrt.

Der obere Rand des Manubrium zeigt drei flache Einschnitte; der mittlere ist die *Incisura semilunaris;* die beiden seitlichen breiteren und überknorpelten sind die *Incisurae claviculares.* Jeder Seitenrand des Brustbeins ist mit sieben kleineren überknorpelten Einschnitten versehen, *Incisurae costales* s. sinus costales; von welchen die unteren flacher sind und näher beisammen liegen. Die erste liegt

Seitenrande des Manubriums dicht unter der Incisura
icularis; die zweite an der Stelle der Vereinigung des
ıubrium mit dem Corpus, und beiden angehörig; die
:te bis sechste am Mittelstücke; und die siebente an der
·einigungsstelle des letzteren mit dem Proc. xiphoides.
sechste und siebente fliefsen oft in einander, so dafs
an kurzen Brustbeinen nur sechs solcher Ausschnitte
en. Das Sternum wird von einer starken, aus breiten
deln gewebten, locker befestigten Beinhaut umgeben,
sog. *Membrana propria sterni.*

Costae, Rippen.

Zwölf Paare sehr länglicher platter stark gebogener
chen, welche am seitlichen Umfange des Brustkastens
r einander liegen, durch ihre hinteren Extremitäten an
Brustwirbel, durch die vorderen Enden an das Sternum
stigt sind, und von oben nach unten abgezählt werden.

An der hinteren Extremität einer jeden Rippe sieht man
z am Ende ein Gelenkköpfchen oder Knöpfchen, *Capi-
m costae*; auf dieses folgt ein dünneres Stück, der Rip-
hals, *Collum costae*, welcher mit einem nach hinten ge-
ıteten und mit einer convexen Gelenkfläche versehenen
ker, *Tuberculum costae*, endigt. Indem die hintere Ex-
nität in das Mittelstück übergeht, bildet sie einen nach
en gerichteten stumpfen Winkel, *Angulus costae*. —
Mittelstück, *Corpus*, ist gebogen und platt, der obere
ıd abgerundet, der untere scharf; die äufsere und in-
e Fläche glatt. Eine Furche, *Sulcus costalis*, fängt unter
ı Tuberculum an, läuft über die innere Fläche des Mit-
tücks, dicht am unteren Rande, und verliert sich all-
ılig an der vorderen Extremität. — Die vordere Extre-
ät ist dünner, aber etwas breiter, als das Mittelstück,
d indessen am Ende wiederum dicker, und endigt mit
er ovalen rauhen Vertiefung, in welche der Rippen-
rpel fest und unbeweglich sich einfügt. Der Rippen-
rpel, *Cartilago costalis*, hat im Allgemeinen dieselbe
stalt und Länge, wie die vordere Extremität, ist ein
längerter Gelenkknorpel, indessen gröfstentheils von Pe-
hondrium überzogen: er verbindet jede Rippe mit dem

Brustbein, oder mit dem Knorpel der nächsten höher liegenden Rippe. —

Die oberen Rippen sind stärker gebogen, die unteren mehr gerade; im Allgemeinen laufen sie vom Capitulum bis zum Angulus rückwärts und abwärts, biegen sich alsdann stark nach aufsen, unten und vorn; und steigen mit ihren vorderen Extremitäten und Knorpeln wieder nach oben und innen herauf: so dafs der obere Rand jeder Rippe stark concav, der untere stark convex erscheint. Die erste Rippe ist in ihrer ganzen Länge stark abwärts gerichtet: die folgenden steigen vorzüglich mit ihren hinteren Extremitäten stark abwärts, und ihr Mittelstück liegt mehr horizontal, besonders bei den drei letzten Rippen; das vordere Ende und der Knorpel krümmen sich zwar aufwärts, gelangen jedoch nie zur Höhe der hinteren Extremitäten; so liegt z. B. der Knorpel der vierten Rippe dem Capitulum der siebenten gegenüber. Von der ersten bis zur sechsten nehmen sie an Länge zu, von der neunten an wiederum ab; so dafs die erste und nächst dieser die zwölfte Rippe die kürzesten, die sechste, siebente und achte aber die längsten sind. — Die erste, zweite und dritte Rippe haben rundliche Köpfe mit flach convexen Gelenkflächen; die vierte bis zehnte aber breite Capitula mit einer gröfseren concaven unteren und einer flachen oberen kleineren Gelenkfläche, welche durch eine kleine Erhabenheit, *Crista capituli*, geschieden werden. Die Köpfe der eilften und zwölften haben nur eine einfache flach concave Gelenkfläche. Der Rippenhals ist an den oberen vier Rippen, vorzüglich an der ersten, dünn und lang im Verhältnifs zur Länge der ganzen Rippe; wird aber an den folgenden allmählig breiter und verhältnifsmäfsig beträchtlich kürzer, so dafs an der eilften Rippe das Collum kaum bemerkbar ist, und an der zwölften gänzlich fehlt. Das Tuberculum ist an den ersten Rippen am stärksten entwickelt; an der eilften und zwölften sehr schwach, und nicht mit einer Gelenkfläche versehen. Die Anguli fehlen an der ersten eilften und zwölften Rippe gänzlich, und sind am stärksten an der fünften bis neunten. — Die äufsere Fläche des Mittelstücks ist zugleich bei den obersten Rippen stark nach oben, bei den untersten nach unten gewendet; die Flächen

dritten bis siebenten Rippe aber beinahe senkrecht ge-
htet. — Die sieben ersten Rippen befestigen sich mit
en Knorpeln in den Incisurae costales sterni, und heifsen
ier wahre Rippen, *Costae verae* s. *sternales;* der Knorpel
ersten ist der kürzeste, die der folgenden nehmen an
ge zu, und haben ein stumpf zugespitztes vorderes Ende.
fünf unteren Rippen stehen nicht unmittelbar mit dem
stbeine in Verbindung, daher sie falsche Rippen, *Costae*
riae s. *asternales* genannt werden: sondern der achte
penknorpel legt sich mit seinem abgeplatteten Ende an
unteren Rand des siebenten, der neunte an den achten;
zehnte reicht gemeiniglich nicht völlig bis zu dem
nten hinauf; der eilfte und zwölfte sind kurz, dünn
spitzig, und stehen, ohne die übrigen und einander zu
ühren, frei zwischen den Bauchmuskeln.

Verbindungen der Rippen.

1. *Articulatio costo-vertebralis*, Rippengelenk. Die Köpf-
n der zehn obersten Rippen liegen in den mit einer
ken Knorpelschicht überzogenen Foveae costales des Brust-
ils der Wirbelsäule (p. 156.), stehen daher jedes mit
ei Wirbeln und einem Cartilago intervertebralis in Ver-
lung; die Köpfchen der eilften und zwölften liegen aber
an den Superficies articulares laterales der beiden letz-
Brustwirbel. Sie werden hier von dünnen Synovial-
seln, welche an der ersten und den beiden letzten Rippen
ach, an den übrigen doppelt (eine obere und untere)
handen sind, umgeben; und vorzüglich durch ein auf
vorderen Fläche des Gelenks strahlenförmig ausgebrei-
s Faserband, *Ligamentum capituli costae anterius* s. ra-
um, befestigt. Von den Cristae capitulorum der zwei-
bis zehnten Rippe geht noch ein rundlich plattes Band,
capituli costae interarticulare, zwischen den beiden
ovialkapseln zum Cartilago intervertebralis.

2. Die Hälse der Rippen laufen vor dem Proc. trans-
sus des unteren der beiden Wirbel, mit welchen das
bitulum sich vereinigt, hin; und die Tubercula der zehn
ren Rippen sind in die Gelenkflächen dieser Fortsätze
gelenkt. Dieses Rippenhöcker-Gelenk, *Articulatio costo-*
nsversaria, wird gesichert durch eine Synovialkapsel;

durch das viereckige *Ligamentum costo-transversarium poste-rius* s. externum s. Lig. tuberculi, welches hinter dem Ge-lenke von der Spitze des Proc. transversus zum Tuberculum costae geht: und durch das kurze breite und starke horizontale *Ligamentum costo-transversarium intermedium*, welches von der vorderen Fläche des Proc. transversus zur hinteren Fläche des Collum, oder bei den beiden untersten Rippen zum Tuberculum, geht. — Aufserdem steigen von dem *oberhalb* des Rippenhalses liegenden Proc. transversus zwei Rippenhalsbänder herab: das vordere, *Ligamentum colli costae internum* s. transversarium internum, entspringt vom unteren Rande des Proc. transversus und setzt sich an den oberen Rand des Rippenhalses, ist rautenförmig und stark, fehlt nur an der zwölften Rippe: das hintere, *Liga-mentum colli costae externum*, steigt von der Wurzel des Queerfortsatzes zur hinteren Fläche des Rippenhalses, nahe am Capitulum, herab; ist dreieckig, schwach, und fehlt an der ersten, eilften und zwölften Rippe. Aufser diesen Bändern finden sich öfters hier noch andere von unbestimm-ter Zahl, Gestalt und Richtung, Lig. accessoria costarum genannt.

Beide Gelenke sind Arthrodien, welche einander um so mehr beschränken, je weiter sie von einander entfernt liegen: daher gestatten sie den acht obersten Rippen kaum eine andere Bewegung, als nach oben und unten. Die Gelenke der ersten Rippe sind die lockersten und ge-statten die gröfste Bewegung; jedoch scheint die Bewegung einer Rippe um so ausgedehnter, je länger sie ist. Die vier unteren Rippen können wegen der geringeren Entfernung ihrer Capitula und Tubercula auch merklich nach hinten bewegt werden.

3. Die erste Rippe ist mit dem Sternum durch Syn-chondrose verbunden, indem ihr Knorpel mit der ersten Incisura costalis verschmolzen ist. Die folgenden sechs Rippenknorpel sind in den Incisurae costales durch Syno-vialkapseln und vordere und hintere strahlenförmige Faser-bänder, *Ligamenta sternocostalia radiata*, befestigt, welche letztere in die Membrana sterni übergehen: der zweite bis fünfte Knorpel werden auch noch an ihrer Spitze durch ein *Ligamentum interarticulare* zwischen doppelten Synovial-

seln in der Tiefe der Incisura costalis festgehalten. Die ührungsstellen des fünften bis neunten Knorpels werden rdiefs von dünnen Synovialkapseln umhüllt, der zehnte penknorpel mit dem neunten aber nur durch einen Sehstreifen verbunden. Zwischen dem dritten bis zehnten rpel sind glänzende Faserbündel, *Ligamenta coruscantia itentia* ausgespannt, welche indessen den Intercostalkeln angehören. Vom siebenten Rippenknorpel geht ein tes Band zum Schwerdtfortsatz, *Ligamentum costoxideum.*

Die Brustbeinrippengelenke der zweiten bis sechsten e, *Articulationes sternocostales*, sind an sich straffe Ge-e, deren Beweglichkeit aber durch die Länge der Rip-knorpel beträchtlich erhöhet wird.

Allgemeine Betrachtung des Thorax.

Der knöcherne Thorax hat eine ungefähr kegelförmige alt, ist unten breiter als oben. Seine vordere Wand l vom Brustbein und den Knorpeln der wahren Rippen ldet, ist etwas gewölbt, steigt schräg nach vorn herab, ist beträchtlich kürzer als die anderen Wände. Die ere Wand wird von dem Brusttheil der Wirbelsäule den hinteren Extremitäten der Rippen, bis zu ihren keln hin, gebildet: in der Mitte springt sie stark con- nach vorn in die Höhle des Thorax hervor, seitwärts weicht sie abgeplattet nach hinten: in der Richtung oben nach unten ist sie nach hinten gewölbt. Die Seiände sind die längsten und stark gewölbt; sie werden den Mittelstücken, den vorderen Extremitäten und rpeln der Rippen gebildet, welche eilf längliche schmale me, *Interstitia intercostalia*, zwischen sich lassen. Diese schenrippenräume erstrecken sich auch bis in die hin- Wand, und am obern Theile des Thorax auch in die lere Wand; ihre Länge richtet sich nach der verschieen Länge der Rippen; vorne sind sie breiter als hinten; beiden obersten und beiden untersten sind die breite-, aber kürzesten. Oben und unten ist der Thorax of-; diese Öffnungen liegen wegen der Kürze der vorderen nd schräg; die obere wird von dem Faserknorpel zwi-

schen siebentem Halswirbel und erstem Brustwirbel, von den oberen Rändern der ersten Rippen und des Manubrium sterni begränzt, und ist bedeutend enger als die untere, welche vom zwölften Brustwirbel, dem zwölften Rippenpaare, den Knorpeln der falschen Rippen, und dem zwischen diesen Knorpeln frei hervorragenden Proc. xiphoides eingefafst wird.

Der Thorax ist in verschiedenen Körpern von sehr ungleicher Weite und Gestalt, hinsichtlich der stärkeren oder geringeren Wölbung seiner Wände; und kann wegen der Gelenkverbindungen der Rippen, der Elasticität ihrer Knorpel, und der Synchondrosen der einzelnen Stücke des Brustbeins, beträchtlich erweitert werden. Zu dem Ende wird zuerst die an ihrem hinteren Ende sehr bewegliche erste Rippe und das an ihrem Knorpel befestigte Manubrium sterni in die Höhe gezogen; sodann werden alle folgenden Rippen, eine nach der anderen, aufwärts und nach aufsen gezogen, wodurch der untere Rand der zweiten bis zehnten stärker nach aufsen sich wendet, eine jede Rippe einen gröfseren Bogen um die Höhle des Thorax beschreibt und der ganze Brustbeinkörper mit dem Schwerdtfortsatz durch die Rippenknorpel nach vorn und oben gehoben wird. In ruhiger Lage nach mäfsiger Exspiration steht die Incisura semilunaris sterni dem Faserknorpel zwischen den zweiten und dritten Brustwirbel, der Schwerdtfortsatz dem neunten Brustwirbel gegenüber. Die Länge der vorderen Wand beträgt 6″ bis 7″, die der hinteren ungefähr 11″, die der Seitenwand etwa 12″. Die *inneren* Dimensionen der Höhle des Thorax betragen ungefähr:

	Zolle.
zwischen Incis. semil. u. dem 1n Brustwirbel	2″ bis 2¼
„ Proc. xiphoid. „ 12n „ „	5½″ - 7″
„ der Mitte des Sternum und dem 6n Brustwirbel	4½″ - 5½
„ Knorpel der 4n und Winkel der 7n Rippe	6″ - 7½
Queer-Dm. zwischen dem 1n Rippenpaare	3½″ - 4″
„ „ „ 6n „ „	7½″ - 8½
„ „ „ 12n „ „	6½″ - 8″
Horizontaler Umfang in der Mitte der Höhe	24″ - 28″

Knochen der oberen Extremitäten, Ossa extremitatum superiorum.

Die Knochen der rechten und linken Extremität sind nder völlig gleich gebildet; jedoch die der rechten häu- etwas stärker.

A. Schulter.

Clavicula, Schlüsselbein.

Ein kurzer, aber starker, Sförmig gekrümmter Röh- knochen, welcher queer und von vorn nach hinten ge- ntet vor und über der ersten Rippe liegt, und über die tenwand des Thorax hinausragt. Sein Mittelstück, *Cor-* , ist dreiseitig mit abgerundeten Winkeln; gegen das dere Ende hin stark nach vorn gebogen, und gegen das tere Ende hin stark nach hinten gekrümmt. Die vor- e oder innere Extremität, *Extremitas sternalis*, ist dick, big; mit einer abgerundet dreieckigen Gelenkfläche, und er nach unten gegen die erste Rippe gewendeten Rauhig- t, *Tuberositas claviculae*, versehen. Die hintere äufsere remität, *Extremitas acromialis*, s. scapularis, ist plattge- ickt, breiter als das Mittelstück, etwas nach vorn ge- htet, auf der unteren Fläche und an den Rändern rauh; l endigt mit einer kleinen ebenen ovalen Gelenkfläche.

Scapula, Schulterblatt,

Omoplata, ein grofser platter dünner dreieckiger Kno- n; liegt an der hinteren Wand des Thorax, bei ruhi- Haltung mit seinem äufseren Rande und Winkel etwas r diese hinausragend; mit seinem inneren Rande 1 bis 2″ der Wirbelsäule entfernt; und von der zweiten bis zur benten oder achten Rippe abwärts sich erstreckend. Der nere Rand, die s. g. *Basis scapulae*, ist länger als der fsere oder vordere, *Margo anterior*; letzterer ist aber di- er und mit zwei erhabenen Linien, Labium anterius und sterius versehen; der obere Rand, *Margo superior* s. Co- scapulae, ist kurz, scharf, und hat an seinem äufseren de einen Einschnitt, *Incisura scapularis*, über welchen dünnes plattes Band, *Ligamentum transversum scapulae*,

ausgespannt ist. Der obere Winkel des Schulterblatts, *Angulus superior*, ist dünn und spitzig, der untere, *Angulus inferior*, dick und abgerundet; der äufsere oder vordere ist dick, kolbig, und enthält den Gelenktheil des Knochens.

Die vordere Fläche des Schulterblatts, *Superficies anterior* s. *costalis*, ist concav, vorzüglich an ihrem oberen Theile, und wird hier *Fossa subscapularis* genannt; aufserdem enthält sie schräglaufende erhabene Linien und flache längliche Vertiefungen. Die hintere Fläche, *Superficies posterior* s. *dorsalis*, ist convex; an ihrem oberen Drittheile erhebt sich ein nach hinten und oben hervorstehendes Knochenstück, die Schultergräte, *Spina scapulae*, welche neben der Basis scapulae niedrig, hinter dem vorderen Winkel des Schulterblatts aber beträchtlich höher und mit einem concaven Rande versehen ist: an dem nach hinten gerichteten freien Rande der Spina unterscheidet man ein Labium superius und inferius. Die Flächen der Spina sind nach oben und unten gewandt: ihr äufseres Ende geht in einen platten starken Fortsatz über, *Acromion scapulae*, die Schulterhöhe. Das Acromion bildet den äufsersten erhabensten Theil des Schulterblatts, krümmt sich hinter dem vordern Winkel nach oben und aufsen; seine obere Fläche ist rauh, die untere glatt; an seinem inneren Rande liegt eine flache ovale Gelenkfläche, *Superficies articularis acromii*. Die kleinere Abtheilung der hinteren Fläche oberhalb der Spina wird *Fossa supraspinata* genannt; die gröfsere unterhalb der Spina ist die *Fossa infraspinata*.

Am vorderen Winkel des Schulterblatts liegt die *Cavitas glenoidea scapulae*; eiförmig, unten breiter als oben; mit ihrer flachen Höhlung nach aufsen gerichtet; sie ruhet auf einem dünneren Knochentheile, *Collum scapulae*: ihr Rand wird von einem faserknorpeligen Ringe, *Labrum glenoideum scapulae*, umgeben, durch welchen sie erweitert und vertieft wird. Über die Cavitas glenoidea ragen das Acromion und ein anderer Fortsatz hinaus: der Rabenschnabelfortsatz, *Processus coracoideus;* er ist rauh, stark gekrümmt, 1″ lang; entspringt zwischen dem oberen Ende der Cavitas glenoidea und der Incisura scapulae, und biegt sich nach vorne über die Cavitas glenoidea hin; liegt etwas niedriger und weiter nach innen, als das Acromion, einen Zoll

it von dem letztern entfernt. Zwischen dem Acromion
l dem Processus coracoideus ist ein plattes dreieckiges
ıd ausgespannt, *Ligamentum coraco-acromiale* s. triangu-
e scapulae: es entspringt breit vom Processus coracoideus,
tet sich zugespitzt an das Ende des Acromion, und bil-
mit beiden Fortsätzen eine Art von Gewölbe über der
vitas glenoidea.

Die Ligg. coraco-acromiale und transversum werden auch
Ligg. propria transversa scapulae, anterius und poste-
s, bezeichnet.

Verbindungen der Schulterknochen.

I. Articulatio sternoclavicularis, Brustbeinschlüsselgelenk,
e ziemlich freie Arthrodie. Die Gelenkfläche der Ex-
mitas sternalis claviculae liegt an der Incisura clavicu-
is sterni, und zwischen beiden ein scheibenförmiger an
ı Rändern dickerer Zwischenknorpel. Diese Theile wer-
ı umgeben von einer doppelten Synovialkapsel und einer
ır starken Faserkapsel, *Lig. sternoclaviculare*, welche an
oberen und vorderen Seite des Gelenks vorzüglich dick
. — Das unpaare *Ligamentum interclaviculare* läuft queer
ı einem Schlüsselbeine zum anderen über die Incisura
nilunaris sterni, an welche es gleichfalls geheftet ist, hin-
er; verbindet also beide Schlüsselbeine unter einander und
t dem Brustbein; es ist plattrundlich, leicht gekrümmt,
d stärker bald schwächer; zuweilen steigt von seiner
tte eine kleine Verlängerung zur hinteren Fläche des Ma-
brium sterni herab, so dafs das Band eine T förmige Ge-
lt erhält. — Zwischen der Tuberositas claviculae, und
r äufseren Fläche des Knorpels und der vorderen Extre-
tät der ersten Rippe, ist das sehr starke aus mehreren
ırägen Faserlagen bestehende *Ligamentum rhomboides cla-
ulae* s. costoclaviculare ausgespannt.

II. Articulatio acromioclavicularis, Schlüssel-Schulter-
ttgelenk, eine Amphiarthrosis. Die Gelenkfläche der
tremitas acromialis claviculae berührt die Superficies
ticularis acromii, und wird befestigt durch eine kleine
novialkapsel und eine Faserkapsel, welche an der unteren
ite des Gelenks schwach, an der oberen sehr stark ist,
d *Ligamentum acromioclaviculare* s. claviculae acromiale

genannt wird. Selten findet sich auch in diesem Gelenke ein Zwischenknorpel. — Zwischen der oberen Fläche des Proc. coracoideus und der unteren rauhen Fläche der Extremitas acromialis claviculae, welche $\frac{1}{2}''$ oberhalb jenes Fortsatzes queer hinläuft, ist das starke von unten nach oben gerichtete *Ligamentum coraco-acromiale* ausgespannt, dessen vorderer plattviereckiger Theil *Lig. trapezoides*, und dessen hinterer dreieckiger oberwärts breiterer Theil *Lig. conoides* genannt wird. Hier findet sich oft zwischen beiden Knochenstücken ein kleiner Schleimbeutel.

B. Oberarm.

Os brachii, Oberarmbein,

s. Os. humeri, auch schlechthin der Humerus genannt, ist nach dem Oberschenkelbein und Schienbein der stärkste Röhrenknochen des Skelets. Das Mittelstück ist dreiseitig, vorzüglich gegen das untere Ende hin, woselbst ein äufserer zugleich etwas nach vorn gerichteter Winkel, ein innerer etwas hinterwärts gerichteter Winkel, und ein flacherer vorderer Winkel hervorspringen. Die hintere Fläche des Mittelstücks ist am breitesten: am oberen Drittheil des Mittelstücks bemerkt man eine flache rauhe Stelle zwischen dem vorderen und äufseren Winkel: und gewöhnlich etwas weiter unterhalb ein ansehnliches Foramen nutritium, welches in die geräumige Markhöhle führt.

Die obere Extremität besteht vorzüglich aus einem dicken rundlichen Kopfe, *Caput oss. brachii*, welcher auf einem dünneren cylindrischen Halse, *Collum*, aufsitzt. An der inneren oberen Seite des Kopfs liegt eine grofse halbkugelförmige Gelenkfläche; an der äufseren und unteren Seite aber zwei rauhe Höcker, *Tuberculum majus et minus*. Das Tuberculum minus liegt weiter nach vorn; das bei weitem gröfsere Tuberculum majus mehr nach aufsen und hinten, und ist mit drei Facetten oder flachen Eindrücken, Impressiones musculares, versehen. Von dem Tuberculum minus und vom vorderen Ende des Tuberculum majus laufen erhabene Linien, Spinae tuberculorum, über den Hals gegen das Mittelstück hinab; die *Spina tuberculi majoris* endigt in dem vorderen, die *Spina tuberculi minoris* in dem inneren

inkel des Mittelstücks. Zwischen den Tubercula und en Spinae erstreckt sich eine von oben nach unten fende, in ihrem oberen Theile überknorpelte Rinne, *cus intertubercularis* s. Semicanalis oss. brachii.

Die untere Extremität ist breiter, aber dünner, als die re: man bemerkt an ihr zwei rauhe Knorren, Condyli, l den zwischen beiden herabragenden überknorpelten enkfortsatz, Proc. cubitalis. Der kleinere etwas nach n gerichtete *Condylus externus* s. extensorius ist das Ende äufseren Winkels; der stärkere etwas nach hinten ge-ndete *Condylus internus* s. flexorius das Ende des inneren nkels. Der *Processus cubitalis* besteht aus einer grofsen *chlea*, welche dem Condylus internus näher liegt, und er kleineren rundlichen Erhabenheit, *Capitulum* s. Emi-tia capitata, welche neben dem Condylus externus, aber auf der vorderen Fläche der unteren Extremität sicht-ist. Auf dieser vorderen Fläche zeigen sich zwei Gru-; die tiefere *Fovea anterior major* unmittelbar oberhalb Trochlea, und die flachere *Fovea anterior minor* über n Capitulum. An der hinteren Fläche findet man ober-b der Trochlea eine weitere und tiefere Grube, *Fossa terior* s. Sinus maximus. Alle diese Gruben sind nicht rknorpelt. Zwischen der Fovea anterior minor und der sa posterior ist der Knochen sehr dünn.

Die Verbindung zwischen dem Schulterblatt und dem erarmbein, *das Schultergelenk*, *Articulatio humeri*, ist die este Arthrodie des Körpers, indem das Os brachii nicht in nach allen Richtungen sehr weit bewegt, sondern auch seine Axe gerollt werden kann. Die grofse Gelenkfläche Kopfs ruhet in der kleineren Cavitas glenoidea des Schul-blatts, ohne von dieser umfafst zu werden: beide Kno-ntheile werden von dem weiten und schlaffen *Ligamentum sulare humeri* umfafst, welches oberwärts an das Collum pulae und das Labrum glenoideum, unterwärts an das llum oss. brachii und die Tubercula geheftet ist, und ickenförmig über den oberen Theil des Sulcus inter-ercularis hingespannt ist. Es wird verstärkt durch das wache Ligamentum accessorium humeri, welches vom c. coracoideus und dem Lig. coraco-acromiale zum Tu-culum majus herabsteigt: es ist aber so schlaff, dafs es

für sich allein, ohne Unterstützung der an die Tubercula sich inserirenden Muskeln, den Kopf des Oberarmbeins nicht in Berührung mit der Cavitas glenoidea erhalten kann.

C. Vorderarm.

Ulna, Ellenbogenröhre,

s. *Cubitus* s. Focile majus, ist ein langer leicht gebogener Röhrenknochen, welcher an seinem oberen Ende beträchtlich dicker ist, als am unteren. Er liegt im hinteren Theile des Vorderarms. Sein dreiseitiges Mittelstück bietet eine schmalere hintere, und zwei breitere innere und äufsere Flächen dar; der innere und äufsere Winkel sind abgerundet; der vordere Winkel, *Crista ulnae*, ist scharf und gegen den Radius hingerichtet. Die dicke obere Extremität enthält an ihrer hinteren äufseren Seite einen starken hakenförmig gekrümmten Fortsatz, *Olecranon* s. Proc. anconaeus, dessen hintere Seite rauh, dessen vordere concave Seite aber überknorpelt ist. Mehr nach vorn und unten liegt der kürzere und schwächere Kronenfortsatz, *Processus coronoideus*, mit hinterer überknorpelter und innerer rauher Fläche. Zwischen beiden Fortsätzen, und ihnen grofsentheils angehörig, zeigt sich die tiefe überknorpelte *Incisura semilunaris major* s. Cavitas sigmoidea major, und neben dieser, an der vorderen Seite des Proc. coronoideus, die kleinere gleichfalls überknorpelte *Incisura semilunaris minor* s. Cavitas sigmoidea minor. Unterhalb des Proc. coronoideus findet sich eine breite rauhe Hervorragung, *Tuberositas ulnae*. — Die untere Extremität enthält einen kleinen runden Kopf, *Capitulum ulnae*, dessen untere Fläche und vorderer Umfang überknorpelt sind: an der hinteren Seite ragt ein kurzer rundlich zugespitzter Fortsatz, *Processus styloideus*, herab.

Radius, Speiche,

s. Focile minus, ist der Ulna ähnlich, aber um $^3/_4$″ kürzer, und an seinem unteren Ende dicker, als am oberen; er liegt im vorderen Theile des Vorderarms. An seinem dreiseitigen Mittelstück liegt die schmalste, von dem abgerundeten inneren und äufseren Winkel eingefafste, Fläche nach vorn; der schärfste Winkel, *Crista radii*, nach hinten gegen die

ıa hin. An der oberen Extremität findet sich ein runder pf, *Capitulum radii*, mit einer vertieften Gelenkfläche, l einem kreisförmigen überknorpelten Umfange, *Circumentia articularis*. Der Kopf sitzt auf einem dünneren cydrischen Halse, *Collum radii;* am unteren Ende desselben, ch innen und hinten gegen die Ulna hin, zeigt sich eine ıite rundliche Erhabenheit, *Tuberositas radii*. Die dicke ere Extremität ist an ihrer inneren Seite concav und tt, an der äufseren und vorderen durch zwei kleine Erenheiten, *Eminentiae radii,* in drei flache Rinnen getheilt. endigt mit einer länglich dreieckigen flachen Gelenkbe, *Cavitas glenoidea radii,* welche in eine vordere dreiige und hintere viereckige Facette getheilt ist; an dem deren Ende dieser Gelenkgrube ragt der kurze breite mpfspitzige *Processus styloideus* herab; und an ihrem teren Ende zeigt sich ein überknorpelter gegen die Ulna gerichteter Ausschnitt, *Incisura semilunaris radii.*

Verbindungen der Vorderarmknochen. Der Raum zwien dem Radius und der Ulna, *Interstitium interosseum ibrachii,* wird gröfstentheils durch das starke glatte von hreren Löchern durchbohrte *Ligamentum interosseum anrachii* ausgefüllt: dieses ist an die Cristae radii et ulnae eftet, reicht nach oben beinahe bis zur Tuberositas radii, lche etwas tiefer als die Tuberositas ulnae liegt, hinauf: h unten füllt es auch den Raum zwischen den unteren remitäten beider Knochen aus. Aufserdem steigt ein mlich dünnes rundes Band, *Ligamentum cubitoradiale teres* bliquum s. Chorda transversalis, sehr schräg von der berositas ulnae zur Tuberositas radii herab.

Die oberen und unteren Extremitäten des Radius und Ulna werden durch Drehgelenke, *Articulatio cubitoralis superior et inferior,* vereinigt. Bei dem ersteren ruhet Capitulum radii mit seiner Circumferentia articularis in Incisura semilunaris minor ulnae, wird von einer Syvialkapsel umhüllt, welche bis zum Anfang des Collum lii herabsteigt; und sehr genau von einem starken 3‴ eiten ringförmigen Bande, *Ligamentum annulare radii,* geben, welches an die Enden der Incisura semilunaris nor ulnae sich heftet, und oberwärts mit den Bändern eigentlichen Ellenbogengelenks sich verwebt. Bei der

Articulatio cubitoradialis inferior umfafst die Incisura semilunaris radii den vorderen Umfang des Capitulum ulnae; und werden beide Knochentheile hier von einem verhältnifsmäfsig weiten schlaffen Kapselbande, *Ligamentum capsulare sacciforme* s. membrana sacciformis, umgeben. Bei der Drehung des Radius (Pronation und Supination) bleibt die Ulna ruhen, und das um seine Axe sich drehende Capitulum radii unverrückt in dem von dem Lig. annulare und der Incisura semilunaris minor ulnae gebildeten Ringe: die ganze untere Extremität des Radius rollt dagegen in einem beinahe halben Kreise um das Capitulum ulnae. Hängt der Arm mit vorwärts gerichtetem Radius herab, so wird bei der Pronatio der Radius nach innen, der Handrücken nach vorn gewendet; bei der Supinatio aber der Radius nach aufsen und die Hohlhand nach vorn gekehrt. Ist aber der Ellenbogen halbgebogen, der Radius nach oben, und die Finger nach vorn gerichtet: so drehet sich bei der Pronatio der Radius nach innen, und der Handrücken nach oben, bei der Supination dagegen der Radius nach aufsen, und die Hohlhand nach oben. Bei starker Pro- und Supination wird auch der Oberarm im Schultergelenk nach innen oder aufsen um seine Axe gerollt.

Die Verbindung beider Vorderarmknochen mit dem Oberarmbeine ist das *Ellenbogengelenk*, *Articulatio cubiti*: ein Ginglymus. Die Incisura semilunaris major ulnae umfafst die Trochlea ossis brachii, die vertiefte Gelenkfläche des Capitulum radii steht mit dem Capitulum ossis brachii in Berührung: bei starker Streckung des Vorderarms tritt das Olecranon in die Fossa posterior oss. brachii, bei starker Beugung dagegen der Proc. coronoideus und die Circumferentia articularis des Radius in die Fovea anterior major und minor. Das Kapselband, *Lig. capsulare cubiti*, ist ziemlich weit, entspringt vom Proc. cubitalis, und schliefst auch die Fossa posterior und Foveae anteriores ein; die Synovialkapsel hängt mit der Synovialkapsel der Articulatio cubitoradialis superior ununterbrochen zusammen, und bildet mit dieser nur eine Höhle: die Faserkapsel ist hinten und an den Seiten schwächer, an der vorderen Seite aber stärker, und enthält aufser kürzeren geraden Faserbündeln einen stärkeren schrägen Streifen, welcher in das Lig

ıulare radii übergeht, *Lig. artic. cubiti anterius.* Zu beiden ten des Gelenks finden sich starke mit der Faserkapsel verchsene dreiekige Seitenbänder: das *Lig. laterale internum ic. cubiti* s. brachiocubitale geht vom Condylus internus . brachii zum inneren hinteren Umfang der Incisura selunaris minor ulnae herab; das *Lig. laterale externum ic. cubiti* s. brachioradiale entspringt vom Condylus exnus oss. brachii, und verliert sich im Lig. annulare radii.

D. Hand.

Ossa carpi, Handwurzelknochen.

Die Handwurzel enthält acht kleine unregelmäfsig geltete kurze Knochen, welche im Allgemeinen an ihren rsal- und Volarflächen rauh sind, aber an ihren oberen d unteren oder Brachial- und Digitalflächen, und meins auch an ihren vorderen und hinteren oder Radial- d Ulnarseiten, mit glatten dünn überknorpelten Gelenkchen versehen sind. Sie liegen in zwei horizontalen Rei-a, *Ordo superior et inferior ossium carpi.*

Die erste oder obere Reihe enthält, von der Radialseite gezählt:

1. *Os naviculare* s. scaphoideum, Schiff- oder Kahnbein, t einer oberen convexen, einer unteren concaven, und ıer unteren vorderen schwächer convexen Gelenkfläche: d einer kleinen flachen Gelenkfläche an der Ulnarseite; f der Volarfläche steht eine Rauhigkeit hervor, *Tuberositas s. navicularis.*

2. *Os lunatum* s. semilunare, Mondbein; halbmondförg; mit einer oberen convexen, einer unteren sehr conven, und einer vorderen und hinteren flachen Gelenkfläche.

3. *Os triquetrum* s. triangulare, dreiseitiges Bein, von eiseitig pyramidalischer Gestalt: es besitzt eine sehr kleine nvexe obere, und eine concav-convexe untere Gelenkfläche: ne desgleichen flache an der Radialseite: die Ulnarseite ist ıuh: es zeichnet sich durch eine flache rundliche Gelenkiche an der Volarseite aus.

4. *Os pisiforme* s. subrotundum, Erbsenbein, der kleinste nochen der Handwurzel, mit einer einzigen flachrunden elenkfläche an seiner Dorsalseite.

Die zweite oder untere Reihe enthält:

1. *Os multangulum majus* s. trapezium, grofses vieleckiges Bein, mit einer oberen schwach concaven, einer unteren concav-convexen, und einer länglichen concaven Gelenkfläche an der Ulnarseite; auf der Volarfläche steht eine längliche Erhabenheit, *Tuberositas*, hervor, und an der Ulnarseite derselben läuft eine Furche, *Sulcus*.

2. *Os multangulum minus* s. trapezoides, kleines vieleckiges Bein, mit schwach concaver oberer, länglicher concav-convexer unterer, und länglicher convexer vorderer Gelenkfläche: die Dorsalfläche ist die gröfste seiner Flächen und rauh.

3. *Os capitatum* s. magnum, Kopfbein, das gröfste von allen; hat nach oben einen rundlichen gröfstentheils überknorpelten Kopf, *Caput*, eine beinahe flache dreieckige untere Gelenkfläche; auch die kleine Radialseite und die längere ebene Ulnarseite sind überknorpelt, die Volarseite aber rauh hervorragend: *Tuberositas ossis capitati* genannt.

4. *Os hamatum* s. unciforme s. cuneiforme, Hakenbein, ist nach dem Os capitatum das gröfste, und keilförmig, sein schmaler Rand nach oben gerichtet: die ansehnlichste von diesem oberen Rande und der Ulnarseite gebildete Gelenkfläche ist convex-concav, die gröfstentheils überknorpelte Radialfläche eben, die untere Gelenkfläche concav-convex. Auf der Volarfläche ragt ein platter gekrümmter Fortsatz, *Uncus* s. Proc. uncinatus, oder zuweilen nur eine längliche Rauhigkeit, hervor.

Die erste Reihe bildet durch das Zusammentreten ihrer drei ersten Knochen einen gegen den Vorderarm stark gekrümmten Bogen, mit einer oberen und zwei unteren Gelenkflächen. Die obere ist länglich und stark convex, wird vorzüglich vom Os naviculare und lunatum, zum geringeren Theile auch vom Os triquetrum gebildet: die ersteren beiden Knochen stehen mit der Cavitas glenoidea radii, der letztere mit dem Capitulum ulnae in Verbindung. An der unteren Seite der ersten Reihe zeigt sich nach vorn oder nach der Radialseite hin die längliche convexe Gelenkfläche, welche dem Os naviculare angehört, und den Ossa multangula zur Anlage dient: in der Mitte liegt eine längliche sehr concave Gelenkfläche zur Aufnahme des Os capitatum

l hamatum. Die Dorsalfläche dieser Reihe ist rauh und vex, die Volarfläche ist rauh und concav; auf der letzen ragt die Tuberositas oss. navicularis, und das Os pirme hervor, welches nur mit dem Os triquetrum sich bindet, und an der Bildung der drei grofsen Gelenkchen keinen Antheil nimmt. — Die zweite Reihe ist überpt gröfser als die erste. Sie bildet nach oben gegen die te Reihe hin zwei Gelenkflächen: die mehr nach vorn ende ist länglich concav, wird von den oberen Flächen ler Ossa multangula gebildet, und ruhet auf dem Os naulare: die in der Mitte und mehr nach hinten liegende enkfläche wird von dem Kopfe des Os capitatum und n oberen Rande und der Ulnarfläche des Os hamatum ildet, und von der gröfseren concaven unteren Gelenkhe der ersten Reihe aufgenommen. Nach unten gegen Mittelhand hin bildet die zweite Reihe eine abgesonderte cav-convexe Gelenkfläche für das Os metacarpi pollicis, lche nur dem Os multangulum majus angehört; und eine ammenhangende Reihe kleiner, concav-convexer und flar, durch erhabene Linien von einander abgegränzter enkflächen zur Verbindung mit den übrigen Mittelhandchen. An der Volarfläche sieht man die Tuberositas und Sulcus oss. multanguli majoris, die Tuberositas oss. catti, und den Uncus ossis hamati. —

Der ganze Carpus hat eine unregelmäfsig viereckige talt, ist oberwärts schmaler, unterwärts breiter; der lial- und Ulnarrand sind kurz, die Dorsalfläche rauh . convex; die Volarfläche fast noch mehr rauh und mit ei länglichen Erhabenheiten, Eminentiae carpi, versehen: *Eminentia carpi radialis* besteht aus den Tuberositates Os naviculare und multangulum majus; die höhere *Eminentia carpi ulnaris* aus dem Os pisiforme und dem Uncus s hamati. Durch diese Anordnung erscheint der Carpus k gewölbt.

Die Verbindung der ersten und zweiten Reihe, *Articulo binorum ordinum ossium carpi*, ist ein beschränkter nglymus, welcher eine geringe Drehung gestattet: die eren und oberen Enden beider Reihen werden von einer en Synovialkapsel umgeben, welche von fibrösen *Ligamenta volaria, dorsalia, laterale radiale* und *laterale ulnare*

verstärkt wird: alle diese Bänder hangen mit den des eigentlichen Handgelenks zusammen: und die Synovialkapsel bildet auch Verlängerungen, Nebenkapseln, für die überknorpelten Berührungsflächen der einzelnen Knochen beider Reihen. Die einzelnen Knochen jeder Reihe werden zu Amphiarthrosen vereinigt durch kurze starke *Ligamenta carpi interossea*, welche tief zwischen den Knochen liegen, zwei in jeder Reihe; durch platte queerlaufende *Ligg. carpi volaria*, zwei in der ersten, drei in der zweiten Reihe; und durch ähnliche stärkere *Ligg. carpi dorsalia* von gleicher Anzahl. Aufserdem wird das mehr bewegliche Os pisiforme mit dem Os triquetrum nur durch eine schlaffe Synovialkapsel verbunden, aber durch zwei kurze starke Bänder an die Wurzel und die Spitze des Uncus oss. hamati geheftet.

Das *Handgelenk*, *Articulatio carpi*, eine beschränkte Arthrodie, ist die Verbindung der convexen, vom Os naviculare, lunatum und triquetrum gebildeten, oberen Gelenkfläche der ersten Reihe mit der Cavitas glenoidea radii und dem Capitulum ulnae. Indessen berührt das Os triquetrum das Capitulum ulnae nicht unmittelbar, sondern nur vermittelst eines dreieckigen Zwischenknorpels, *Fibrocartilago intermedia triangularis*, welcher mit der Membrana capsularis sacciformis verwachsen ist, mit seiner Spitze durch ein Bändchen, Lig. subcruentum, an die Spitze des Proc. styloideus ulnae, und mit seinem breiten Ende an den hinteren Rand der Incisura semilunaris radii geheftet ist: und daher nicht allein die Gelenkfläche des Capitulum ulnae vervollständigt, sondern auch zur Verbindung beider Vorderarmknochen beiträgt. Das Kapselband des Handgelenks, *Lig. capsulare articulationis carpi*, besteht aus einer weiten schlaffen Synovialkapsel und einer strafferen Faserkapsel. Erstere ist an den Umfang der Cavitas glenoidea radii, an den Fibrocartilago triangularis und an den Proc. styloideus ulnae geheftet, steht mit der Membrana capsularis sacciformis in Verbindung, bildet nach innen Ligg. mucosa, und heftet sich an das Os naviculare, lunatum und triquetrum. Die Faserkapsel besteht aus mehreren senkrechten, wagerechten und schrägen Schichten, Lacerti adscitii genannt, unter welchen folgende durch Stärke und Breite sich aus-

hnen: 1) auf der Volarfläche das *Ligamentum accesso-*
obliquum, vom Proc. styloideus und dem Volarrande der
itas glenoidea des Radius zum Os naviculare, lunatum
triquetrum herabsteigend: und das *Lig. accessorium rec-*
, vom vorigen bedeckt, geht vom Fibrocartilago trian-
aris zum Os lunatum und triquetrum. 2) auf der Dor-
läche das *Ligamentum rhomboides carpi*, welches vom
salrande der Cavitas glenoidea radii zum Os lunatum
triquetrum geht. 3) an den Rändern des Handgelenks
Lig. laterale carpi radiale zwischen Proc. styloideus
ii und Os naviculare; und das *Lig. laterale carpi ulnare*
schen Proc. styloideus ulnae und dem Os triquetrum. —
serdem wird das Handgelenk durch das Lig. carpi dor-
und das, zwischen den Eminentiae carpi ausgespannte,
. carpi volare proprium verstärkt. (S. Muskellehre.)

Ossa metacarpi, Mittelhandknochen.

Fünf kleine etwas gebogene Röhrenknochen, welche
erhalb des Carpus, und mit ihren unteren Enden diver-
end, neben einander liegen. Das Mittelstück dieser
ochen ist dreiseitig; zwei Winkel liegen nach der Ra-
- und Ulnarseite hin, der dritte schärfste nach der
arseite. Die Dorsalseite ist der Länge nach schwach
vex, die nach vorn und hinten etwas schräg gerichteten
arflächen und der Volarwinkel aber schwach concav.
obere und untere Extremität dieser Knochen ist be-
chtlich dicker; die erstere, *Basis ossis metacarpi*, ist
ieckig oder viereckig, und an ihrem Ende mit einer
fseren Gelenkfläche, und meistens auch an der Radial-
Ulnarseite mit einer kleinen einfachen, oder durch ein
ibchen getheilten Gelenkfläche versehen: die Dorsal- und
arflächen sind rauh. Die untere Extremität bildet einen
of, *Capitulum ossis metacarpi*, welcher eine stark convexe
enkfläche besitzt, und von der Radial- und Ulnarseite her
ttgedrückt erscheint, daselbst auch mit Grübchen versehen ist.

1. *Os metacarpi pollicis* s. primum ist platter und kürzer
die übrigen, aber bedeutend stärker; seine Basis hat
e concav-convexe Gelenkfläche, aber keine seitliche Ge-
kflächen: sein Capitulum ist breiter und weniger convex,
das der anderen Mittelhandbeine.

2. *Os metacarpi indicis* s. secundum ist das längste: die obere Gelenkfläche der Basis besteht aus drei überknorpelten Flächen, einer mittleren concaven und zwei kleineren seitlichen flachen, welche von der mittleren durch scharfe Ränder getrennt werden. Aufserdem hat die Basis nur an der Ulnarseite eine kleine Gelenkfläche.

3. *Os metac. digiti medii* s. tertium ist fast eben so lang als das zweite, die Gelenkfläche der Basis ist viereckig und flach concav; die Gelenkfläche an der Radialseite concav, die an der Ulnarseite durch ein Grübchen getheilt. An der Dorsalfläche der Basis ragt eine kurze breite Zacke nach oben.

4. *Os metac. dig. annularis* s. quartum ist kürzer und dünner als das dritte; seine schmale Basis hat eine schmale fast halbmondförmige ebene obere Gelenkfläche; die an der Radialseite ist durch ein Grübchen getheilt, die an der Ulnarseite einfach.

5. *Os metac. dig. auricularis* s. quintum, wenig kürzer als das vierte; die obere Gelenkfläche seiner Basis ist concav-convex; an der Radialseite ist eine flache überknorpelte Fläche, an der Ulnarseite aber eine rauhe *Tuberositas* vorhanden.

Das Mittelhandbein des Daumens steht von den übrigen entfernter, schräg nach vorn gerichtet; die vier folgenden berühren einander mit ihren Bases, und divergiren so, dafs die Capitula ¼″ von einander entfernt stehen. Die vier Räume zwischen den Mittelhandbeinen werden *Interstitia interossea metacarpi* genannt: das erste zwischen dem Daumen und Zeigefinger ist das breiteste. Die Mittelhand überhaupt ist ungleichseitig viereckig, oben beträchtlich schmaler als unten; und ihr Rücken ist stark convex.

Verbindungen. Das Os metacarpi pollicis geht mit dem Os multangulum majus eine Arthrodie ein, welche durch eine Kapsel, und ein Ligamentum volare, dorsale, laterale radiale und laterale ulnare befestigt wird. Die übrigen vier sind an ihren Bases mit der zweiten Reihe der Handwurzelknochen und unter einander durch Amphiarthrosen vereinigt: das zweite Os metacarpi verbindet sich vorzüglich mit dem Os multangulum minus, aber auch mit dem Os multangulum majus und Os capitatum; das dritte mit

n Os capitatum, das vierte mit dem Os capitatum und natum, und das fünfte mit dem Os hamatum, aber so, 's es dieses vermittelst seiner Tuberositas bedeutend über- gt. Die Verbindung geschieht durch Kapseln, welche t einander und mit den Kapseln der zweiten Reihe der ndwurzelknochen zusammengränzen: und durch mehrere krechte uud schräge *Ligg. ossium carpi et metacarpi, dor- ia* und *volaria*. Vom Os pisiforme läuft ein eigenes star rundliches Band zur Tuberositas oss. metac. quinti. n der Basis des einen Mittelknochens zu der des anderen ffen in queerer Richtung die *Ligg. baseos metacarpi*, vier rsalia, aber nur drei volaria, da hier das zwischen den ttelhandknochen des Daumens und Zeigefingers fehlt. — rischen den Köpfen des zweiten bis fünften Mittelhand- ns sind drei platte starke *Ligg. capitulorum ossium meta- pi* brückenförmig ausgespannt, welche auf den Volar- chen der Köpfchen zusammenfliefsen, und eine stärkere tfernung der Knochen von einander verhüten.

Phalanges digitorum manus, Fingerglieder.

Die Finger enthalten 14 längliche etwas plattgedrückte l leicht gebogene Knochen, Phalanges s. internodia, welchen der Daumen zwei, jeder der übrigen ger aber drei besitzt. Das erste Glied, *Phalanx ma*, ist das längste; seine Dorsalfläche convex, die Vo- fläche flach und der Länge nach concav: beide werden rch einen Radial- und Ulnarrand abgegränzt. Das obere kere Ende besitzt eine rundliche concave Gelenkfläche, sich mit dem Capitulum oss. metacarpi verbindet: das tere eine Trochlea, und an der Radial- und Ulnarseite Grübchen. Die längste der ersten Phalangen gehört m Zeigefinger an, die kürzeste dem Daumen; diese ist er stärker als die nur wenig längere des kleinen Fingers d mit einer vorzüglich stark ausgewirkten Trochlea ver- ien.

Das zweite Glied, *Phalanx secunda*, ist dem ersten ähn- h, aber kürzer und verhältnifsmäfsig breiter; an seiner eren Extremität zeigt sich eine Gelenkfläche, aus zwei rch eine erhabene Mittellinie getrennten Grübchen be-

stehend, welche auf die Trochlea des ersten Gliedes pafst: die untere Extremität besitzt eine wenig vertiefte Trochlea, und Grübchen an der Radial- und Ulnarseite. Dieses Glied fehlt dem Daumen.

Das dritte oder Nagelglied, *Phalanx tertia* s.*unguicularis*, ist das kürzeste; sein oberes Ende breit und mit einer der Trochlea des zweiten Gliedes anpassenden Gelenkfläche versehen: das untere Ende ist abgerundet und mit einem auf der Volarfläche hervorspringenden rauhen Höcker, *Tuberositas unguicularis*, versehen. Das Nagelglied des Daumens ist bei Weitem das gröfste; das des Ohrfingers das kleinste.

Fingergelenke, *Articulationes digitorum*: das erste zwischen Mittelhandbein und dem ersten Gliede, das zweite zwischen erstem und zweitem, und das dritte zwischen zweitem und dritten Gliede. Das erste Fingergelenk ist bei dem Zeigefinger, Mittel-, Ring- und Ohrfinger eine Arthrodie, welche aber keine Drehung gestattet; am Daumen dagegen ein Ginglymus; alle zweiten und dritten Fingergelenke sind Ginglymi. An jedem dieser 14 Gelenke findet sich eine ziemlich schlaffe Synovialkapsel; zwei starke *Ligg. lateralia, radiale et ulnare,* welche in dem seitlichen Grübchen der unteren Enden der Mittelhandknochen und der ersten und zweiten Phalanx, und an die rauhen Seiten der oberen Extremitäten der Phalangen befestigt sind: — und ein dickes länglich viereckiges öfters faserknorpeliges *Lig. transversum volare*, welches in queerer Richtung an der Volarseite der Gelenke liegt. An den Seitenrändern der Nagelglieder laufen dünne sehnige Streifen, Ligg. unguicularia, Nagelbänder, welche diese Ränder ebenen, und die Flächen vergröfsern.

Ossa sesamoidea manus, Sesambeine der Hand.

An der Volarfläche einiger Fingergelenke sind kleine plattrunde Sesambeine von der Gröfse einer Linse oder halben Erbse vorhanden, und theils mit den Gelenkbändern, namentlich dem Lig. transversum volare, theils mit den über diese hinlaufenden Sehnen verwebt. Zwei gröfsere und durch einen Faserknorpelstreifen verbundene finden

am ersten Gelenk des Daumens, und eins am zweiten; viertes und fünftes am ersten Gelenk des Zeigefingers des Ohrfingers. Selten sind mehrere vorhanden; zuen fehlen die letzteren, oder sind nur Sesamfaserknorpel.

Knochen der unteren Extremitäten, Ossa extremitatum inferiorum.

A. Hüfte.

Ossa coxarum, Hüftbeine,

ssa innominata s. pelvis lateralia, Seitenbeckenknochen, zwei ansehnliche gröfstentheils platte Knochen, welche beiden Seiten des Kreuztheils der Wirbelsäule liegen, demselben das Becken bilden; und den Schulterknoder oberen Extremitäten entsprechen.

Jedes Hüftbein zerfällt in ein oberes Stück, das *Darmbein* er Hüftbein im engeren Sinne), *Os ilium;* ein unteres ck, *Sitzbein, Os ischii,* und ein vorderes Stück, *Scham-*, *Os pubis.* Der gemeinschaftliche Vereinigungspunkt er drei Theile ist die *Pfanne*, *Acetabulum* s. Cavitas loidea, eine weite runde tiefe Grube an der äufseren e des Hüftknochens. Diese wird von einem erhabenen de, *Supercilium acetabuli,* begränzt, welcher aber nach n und unten durch einen weiten Ausschnitt, *Incisura acetuli,* unterbrochen wird. In der Tiefe des Acetabulum t eine rauhe tiefere Grube, *Fossa acetabuli,* welche nach n und unten gegen die Incisura hin sich erstreckt; der lere, obere und hintere Umfang der Pfanne wird dan von einer stark gekrümmten glatten überknorpelten he eingenommen, *Superficies lunata* genannt. Der *Boden* Acetabulum ist in der Fossa acetabuli ziemlich dünn, ler Superficies lunata dicker: an der inneren Seite des tbeins bildet dieser Boden eine etwas schräg herabsteide ebene Fläche. Vor dem Acetabulum, aber tiefer, t ein grofses Loch, Foramen obturatum s. ovale.

Os ilium, Darmbein. Der untere dickere Theil desselbildet ungefähr die obere Hälfte der Pfanne; der obere il ist platt, an seinen Rändern dicker, in der Mitte ner, schräg nach aufsen gerichtet, und macht überhaupt

den gröfsten und erhabensten weit nach hinten sich erstreckenden Theil des ganzen Hüftknochens aus. Seine äufsere Fläche ist ziemlich glatt, vorn leicht convex, hinten wenig vertieft, und in der Mitte mit einer bogenförmigen nach oben convexen schwachen Linie, *Linea arcuata externa* ossis ilium, versehen. An der inneren Fläche unterscheidet man drei Abtheilungen: die vordere obere gröfsere ist glatt und concav, *Fossa iliaca* genannt: die untere kleinste ebene bildet den obern Theil des Bodens der Pfanne, und wird von der oberen durch eine gebogene schräg von hinten nach vorn herabsteigende Linie, *Linea arcuata interna*, abgegränzt: die hintere Abtheilung ist uneben, enthält nach vorn eine längliche gekrümmte, vorn convexe Fläche, ungefähr von der Gestalt eines Ohrs, oder eines umgekehrten S; *Superficies auricularis ossis ilium* genannt, und der Superf. auricularis ossis sacri ganz ähnlich: der Theil der inneren Fläche hinter der Superficies auricularis ist sehr rauh, und wird *Tuberositas* ossis ilium genannt. Ränder: der obere Rand oder *Hüftbeinkamm*, oder Darmbeinkamm, *Crista ossis ilium*, ist der längste und breiteste, convex; an seinem vorderen Theile nach aufsen, an seinem hinteren Theile nach innen gebogen: man unterscheidet an ihm die äufsere und innere Lefze und die Mittellinie, *Labium externum et internum* und *Linea intermedia* cristae oss. ilium. Nach vorn endigt er mit dem stumpfen rauhen vorderen oberen Hüft- oder Darmbeinstachel, *Spina anterior superior* ossis ilium: hier fängt der dünnere herabsteigende vordere Rand an, welcher flach ausgeschweift ist, daher *Incisura semilunaris* genannt wird, und oberhalb der Pfanne mit der plattgedrückten *Spina anterior inferior* endigt. Das hintere Ende der Crista ist die *Spina posterior superior;* unterhalb dieser steigt der concave, nur 1″ lange, hintere Rand herab, und endigt mit der *Spina posterior inferior*, welche zugleich das hintere Ende der Superficies auricularis bezeichnet. Der untere horizontale Rand geht in den hinteren Rand des Sitzbeins über, und bildet den gröfsten Theil eines tiefen Ausschnitts, der Incisura ischiadica superior.

Os ischii s. coxendicis, *Sitzbein*. Sein oberer dicker dreiseitiger Theil, *Corpus*, bildet das hintere untere Stück der Pfanne; am hinteren Rande desselben steht der platte

vas nach innen gerichtete Sitzbeinstachel, *Spina ischii*, vor. Von hier an geht der ziemlich dicke absteigende des Sitzbeins, *Ramus descendens ossis ischii*, abwärts, endigt unterwärts mit dem dicken rauhen Sitzknorren, *ber ischii*. Zwei Ausschnitte zeigen sich am hinteren nde des vereinigten Darm- und Sitzbeins; der obere ifsere sehr tiefe, *Incisura ischiadica superior* s. major s. ca, liegt zwischen der Spina posterior inferior ossis m und der Spina ischii; der untere kleinere und fla- re, *Incisura ischiadica inferior* s. minor, am hinteren nde des Ramus descendens oss. ischii, zwischen Spina Tuber ischii. Vom Tuber an geht der dünnere auf- gende Sitzbeinast, *Ramus adscendens oss. ischii*, schräg wärts und vorwärts: seine äufsere Fläche ist eben, die ere convex; der vordere Rand ist breit und abgerundet, hintere scharf, und bildet mit dem vorderen Rande Ramus descendens oss. pubis den unteren Umfang des amen ovale.

Os pubis s. pectinis, *Schambein* oder Schoofsbein. Sein seres hinteres dickeres Stück, *Corpus*, bildet den vor- en Theil der Pfanne: auf der oberen vorderen Fläche selben, unmittelbar vor der Pfanne, zeigt sich eine läng- he Rauhigkeit, *Tuberculum iliopectineum*. Von hier an ft der horizontale Schambeinast, *Ramus horizontalis ossis bis*, nach innen und vorn. Dieser ist anfänglich dicker, seiner Mitte aber dünner, und überhaupt dreiseitig: hintere Fläche flach, die obere dreieckig und etwas vex, die untere concav: der untere Winkel bildet den ren Umfang des Foramen ovale; der vordere abgerun- e Winkel läuft an dem inneren Ende des horizontalen es in den kleinen rundlichen Schambeinhöcker, *Tuber- um pubis*, aus: der obere Rand dieses Astes aber bildet scharfen Schambeinkamm, *Crista* s. *Pecten pubis*, wel- er am Tuberculum iliopectineum mit der Linea arcuata erna ossis ilium zusammenfliefst, vorne hinter dem Tu- rculum pubis endigt, und im frischen Zustande durch en platten sehnigen Streifen, *Ligamentum cristae pubis*, ch erhöhet wird. Das vordere innere Ende des Ramus rizontalis wird breiter und platter; seine vordere Fläche schwach concav, die hintere convex: nach innen endigt

er mit einer schräg nach vorn gewandten länglichen Verbindungsfläche, *Superficies symphyseos pubis*, welche schwach convex, und oberwärts breiter als unten ist. Hier geht der Ramus horizontalis in den dünneren kürzeren absteigenden Ast, *Ramus descendens ossis pubis*, über, welcher ganz wie der Ramus adscendens ossis ischii geformt ist; demselben entgegen nach unten und hinten sich wendet, und mit ihm in einer schwachen rauhen Linie zusammenfliefst: er bildet den vorderen Umfang des Foramen ovale.

Das vom Os ischii und Os pubis gebildete Hüftbeinloch, *Foramen obturatum s. ovale*, ist das gröfste Loch am Skelet, unten enger, oben weiter, und viel mehr dreieckig als oval; sein Umfang ist gröfstentheils scharf, und nur am oberen äufseren Winkel unter dem Tuberculum iliopectineum mit einer breiten abgerundeten Furche versehen, welche von hinten, nämlich von der inneren Fläche des Hüftbeins her, nach vorn und innen gerichtet ist. Es wird von dem an seinen Umfang gehefteten dünnen hautähnlichen Verstopfungsbande, *Ligamentum obturatorium* s. Membrana obturatoria, verschlossen, mit Ausnahme des äufseren oberen Winkels; woselbst eine ansehnliche Lücke, und jene Furche offen bleibt.

Verbindungen der Hüftbeine.

Die Ossa coxarum vereinigen sich mit den Seitenrändern des Kreuzbeins durch die Kreuzdarmbeinfuge, *Symphysis sacroiliaca.* Zwischen den Superficies auriculares beider Knochen liegt eine dünne Faserknorpelschicht, welche an einigen Stellen nur sehr weiche gallertartige Knorpelsubstanz enthält. Diese schwache Verbindung wird aber durch eine grofse Anzahl von Bändern verstärkt: 1) *Ligamenta sacroiliaca vaga anteriora*, eine dünne Schicht kurzer platter queer und schräg laufender Bänder, welche von der oberen und vorderen Fläche des Kreuzbeins zur inneren Fläche des Darmbeins gehen. 2) *Ligamenta sacroiliaca vaga posteriora*; äufserst zahlreiche kurze queere und schräge Ligamente, welche die unregelmäfsige Vertiefung zwischen der hinteren Fläche des Kreuzbeins und der Tuberositas ossis ilium, hinter der Symphysis, gänzlich ausfüllen. 3) Aufserdem liegen hinter der Symphysis die längeren und

keren *Ligg. iliosacra postica, longum et breve* s. Ligg. vis postica: das erstere längere entspringt von der Spina terior superior, das letztere kürzere von der Spina posior inferior des Darmbeins, und wird vom ersteren zum eil bedeckt; beide befestigen sich an dem dritten und rten Proc. transversus spurius des Kreuzbeins. 4) Oberr der Symphysis liegt das doppelte *Ligamentum iliolumbale* s. Lig. pelvis anterius superius et inferius; es entspringt vom Proc. transversus des fünften Lendenwirbels, setzt sich mit seiner oberen Schicht an den hinteren eil der Crista ossis ilium; mit seiner unteren Schicht ftet es sich auf der oberen Fläche des Kreuzbeins und inneren des Darmbeins aus.

Der untere Theil des Kreuzbeins und das Steifsbein nen mit dem Os ischii durch zwei ansehnliche platte eckige Bänder in Verbindung: 1) *Ligamentum sacrotuberosum* s. tuberososacrum s. sacroischiadicum majus, entspringt breit und dünn von der Spina posterior inferior ilium, woselbst es mit dem Lig. iliosacrum posticum ve zusammenhängt, vorzüglich aber von dem Seitenrande Kreuzbeins und den beiden ersten Steifsbeinwirbeln; läuft räg nach vorn, aufsen und unten: wird stärker und maler; und befestigt sich am Tuber ischii; woselbst es derum breiter wird, und mit einem schmalen sichelförgen Fortsatze, *Ligamentum falciforme* genannt, am innen Rande des Tuber und des Ramus adscendens oss. ischii ligt. 2) *Ligamentum sacrospinosum* s. spinososacrum s. roischiadicum minus, ist kürzer und schwächer; entspringt vor dem Lig. sacrotuberosum vom Seitenrande des zten Kreuzbeinwirbels und der drei bis vier Steifsbeinbel; läuft auswärts, vorwärts und abwärts, wird schma, und setzt sich an die Spina ischii: indem es sich mit n Lig. sacrotuberosum kreuzt, verwebt es sich mit ihm.

Die *Symphysis pubis*, Schambeinfuge, vereinigt die vorren Enden der Rami horizontales beider Schambeine. wischen den Superficies symphyseos beider Knochen und t ihnen verwachsen, liegt ein prismatischer vorn wenigns ½" breiter Faserknorpel. Dieser besteht gröfstentheils s concentrischen fibrösen Ringen, welche in der Mitte en länglich ovalen mit Knorpelgallert ausgefüllten Raum

lassen, so dafs hier die Verbindung am schwächsten ist: die vordere Fläche des Faserknorpels besteht aus schrägen gekreuzten Faserbündeln; die hintere schmalere ragt in der Mittellinie über die hinteren Flächen der Knochen etwas hinaus. An dem oberen breiten Rande der Symphysis, dem Scheitel der Schambeinfuge, läuft eine queere Faserschicht, *Ligamentum arcuatum superius*, von veränderlicher Stärke, von dem einen Tuberculum pubis zum anderen. Der untere schärfere Rand der Symphysis wird von dem starken dreieckigen *Ligamentum arcuatum inferius* gebildet, welches bogenförmig von dem Ramus descendens des einen Schambeins zu dem des anderen läuft, und oberwärts mit dem Faserknorpel verschmilzt.

Das Becken, Pelvis.

Das Becken ist ein von den Ossa coxarum, dem Os sacrum und Os coccygis, dem fünften Lendenwirbel, und den vereinigenden Bändern, und Faserknorpeln gebildeter hohler Körper, welcher in das grofse oder obere, und das kleine oder untere oder eigentliche Becken zerfällt.

Das *grofse Becken, Pelvis major* s. superior, hat ungefähr die Gestalt einer länglichen queerliegenden flachen Schale, und wird von den Ossa ilium, der oberen Fläche des Kreuzbeins, dem fünften Lendenwirbel und den Ligg. iliolumbalia zusammengesetzt. Es bildet den unteren Theil der hinteren Wand und Seitenwände der Bauchhöhle, ist nach vorn und oben weit offen, geht nach unten in das kleine Becken über, und ist beträchtlich breiter als dieses. In weiblichen Körpern ist es niedriger, flacher und breiter.

Das *kleine Becken, Pelvis minor* s. inferior, ist eine kurze, weite, nach hinten gebogene, oben und unten offene Höhle, deren hintere Wand höher als die Seitenwände und die sehr niedrige vordere Wand ist. Seine obere Öffnung, der *Beckeneingang, Apertura pelvis superior*, durch welche es mit dem grofsen Becken und der Bauchhöhle in Verbindung steht, wird begränzt durch die *Linea terminalis* s. *innominata*, gebildet vom Promontorium, den abgerundeten Winkeln zwischen der oberen und vorderen Fläche des Kreuzbeins, den Lineae arcuatae ossium ilium, den Cristae

is, und dem oberen Rande der Symphysis pubis. Diese h oben und vorn gerichtete Öffnung hat in weiblichen ken die Gestalt eines queerliegenden Ovals, mit einer wachen von dem vorspringenden Promontorium gebilde- Einbiegung am hinteren Umfange: in männlichen Becken t sie eine mehr herzförmige Gestalt und ein stärker vorragendes Promontorium.

Der mittlere Theil des Beckens ist die *Beckenhöhle*, der tlere Beckenraum, *Cavum pelvis* s. Apertura pelvis media. hintere längste Wand der Beckenhöhle ist concav, und d von den vorderen Flächen des Kreuz- und Steifsbeins den Ursprüngen der Ligg. sacrotuberosa und sacrospinosa ildet: — die Seitenwände von den Böden der Acetabula mittleren Theile der Hüftbeine, den Rami descendentes adscendentes der Sitzbeine, den hinteren Enden der ni horizontales der Schambeine, und den Ligg. obtura- ia: — die vordere sehr niedrige Wand von den vorde- Theilen der Schambeine und von der Symphysis pubis. ischen der hinteren und Seitenwand bleiben auf jeder te zwei weite Öffnungen: indem nämlich das Lig. sa- tuberosum hinter beiden Incisurae ischiadicae hinläuft, das Lig. sacrospinosum zwischen beiden Incisuren queer gespannt ist, wird die Incisura ischiadica superior zu em rundlich viereckigen, und die Incisura ischiadica rior zu einem ungleich dreiseitigen oder halb ovalen he. Mehr nach vorne zeigen sich an den Seitenwänden von den Ligg. obturatoria nicht ausgefüllten Lücken Foramina obturata. — Die Beckenhöhle ist oval, aber vorn nach hinten nur wenig länger als breit: ober- rts ist sie am geräumigsten; gegen den Ausgang hin engert sie sich, und zwar mehr im männlichen, als im iblichen Becken, indem in dem letzteren die Ossa ischii ar senkrecht und weniger convergirend herabsteigen, l das Os sacrum breiter und gleichförmiger gebogen ist.

Die untere Beckenöffnung, der *Beckenausgang, Apertu- pelvis inferior,* wird von der Spitze und den Seitenrän- n des Steifsbeins, den unteren Rändern der Ligg. sacro- nosa und sacrotuberosa, den Tubera und Rami adscen- ites der Ossa ischii, den Rami descendentes der Ossa bis, und dem Lig. arcuatum inferius begränzt. Hinten

in der Mitte ragt das Steifsbein in den Beckenausgang hinein; zwischen ihm und den Tubera ischii bilden die Ligg. sacrospinosa und sacrotuberosa auf jeder Seite einen weiten flachen Bogen: die Tubera ischii ragen weiter herab, als die übrigen Gränzen des Beckenausgangs. Vorne bilden die Rami adscendentes der Sizbeine und die Rami descendentes der Schambeine einen Winkel mit der Symphysis pubis, welcher durch das Lig. arcuatum inferius abgerundet wird: im männlichen Becken beträgt dieser Winkel, *Angulus ossium pubis,* im Durchschnitt 75°; im weiblichen aber 90° bis 100°, und hat wegen der kürzeren Sitzbeine, des weiteren Abstandes der Tubera ischii von einander, und der gröfseren Länge des Lig. arcuatum inferius, mehr die Gestalt eines Bogens, *Arcus ossium pubis.* Der Beckenausgang ist überhaupt der engste Theil des Beckens, kann aber durch das Zurückweichen des Os coccygis nach hinten erweitert werden, wodurch er eine abgerundet viereckige Gestalt erhält. Er ist schräg nach unten und hinten gerichtet.

Die Durchmesser des inneren Umfanges und die Höhe des weiblichen Beckens sind von denen des männlichen bedeutend verschieden. Im Allgemeinen ist das erstere breiter, niedriger und geräumiger. Im Beckeneingange sind vier Durchmesser, der gerade, queere, und die beiden schrägen, von besonderer Wichtigkeit. Der erstere, *Diameter anteroposterior* s. *conjugata,* reicht vom Promontorium zum oberen Rande der Symphysis; der queere, *Diameter transversa,* wird zwischen den Lineae arcuatae internae ossium ilium gezogen; und die schrägen, oder Deventers Durchmesser, *Diameter obliqua,* vom Tuberculum iliopectineum der einen, zur Symphysis sacroiliaca der anderen Seite. In der Beckenhöhle kommen besonders in Betracht der Diameter anteroposterior (Conjugata), von der Vereinigung des zweiten und dritten Kreuzbeinwirbels bis zur Mitte der hinteren Fläche der Symphysis pubis: und der vordere Queerdurchmesser zwischen den Böden der Acetabula. Im Beckenausgange bemerkt man zwei Durchmesser von vorn nach hinten (Conjugaten): der untere von der Spitze des Os coccygis zum unteren Rande des Lig. arcuatum inferius; der obere zwischen der Symphysis sacrococcygea und

tgenanntem Ligamente. Letztere Linie bezeichnet die gliche Erweiterung des Beckenausgangs durch Zurückchen des Steifsbeins: ist der erste Wirbel des Steifsis mit dem Kreuzbein verschmolzen (S. 150.), so ist die veiterung geringer; sie findet gar nicht Statt, wenn leich alle Wirbel des Steifsbeins fest mit einander vermolzen sind. Der Queerdurchmesser des Ausgangs liegt schen den inneren Rändern der Tubera ischii, und wird ch die Ligg. falciformia, jedoch nur unbedeutend, verzt.

Die Dimensionen des Beckens sind überhaupt zahlreiin Varietäten unterworfen: und namentlich werden die chmesser des weiblichen kleinen Beckens durch wiederte Geburten etwas gröfser, wegen der Nachgiebigkeit der id- und Faserknorpelverbindungen gegen allmählige altende Ausdehnung. Von diesen Verhältnissen, und nn nicht immer genau zwischen denselben Punkten l zwischen den innern Rändern und Flächen der dicke- Knochentheile (im Lichten der Beckenhöhle) gemessen rde, rühren die, mehr scheinbar als wesentlich, verschiedenen Angaben der Beckendurchmesser her. Die folde Tabelle giebt die Durchschnittszahlen einer grofsen zahl von Messungen an wohlgestalteten Becken wohlgechsener Körper. In zartgebaueten weiblichen Körpern einer Länge unter oder wenig über $4\frac{1}{2}$ Fufs werden Durchmesser des übrigens gut gestalteten Beckens istens um 2‴ bis 4‴ kürzer gefunden werden, als die belle sie angiebt.

Innere Dimensionen des Beckens.

Grofses Becken.	Männlich.	Weiblich.
eerdm. zwischen den Labia interna der Cristae oss. ilium .	9″ 6‴	9″ 6‴
” ” ” ” ” Spinae ant. sup. der Crist. oss. ilium .	9″	9″
stanz von der Crista oss. il. zur Mitte der Linea arcuata interna . .	3″ 3‴	3″ 9‴
” ” ” Spina ant. sup. oss. il. zur Mitte des oberen Randes der Symphysis pubis . .	5″ 3‴	5″ 6‴
” ” ” Spina ant. sup. zum Tuberc. iliopectineum	3″	3″

	Männlich.	Weiblich.
Distanz von dem Tuberc. iliopectineum zur Mitte des oberen Randes der Symph. pubis . . .	2″ 10‴	2″ 10‴
„ „ „ Tuberc. pubis zur Mitte des oberen Randes des Symph. pubis	1″	1″
Kleines Becken. Eingang.		
Conjugata vom Promontorium zum oberen Rande der Symph. pubis	4″ 3‴	4″
Queerdm. zwischen den Lineae arcuatae int. oss. ilium	5″	4″ 9‴
Schräger Dm. zwischen Tuberc. iliopect. und Symphysis sacroiliaca der anderen Seite	4″ 8‴	4″ 6‴
Umfang des Beckeneingangs	16″ 6‴	15″
Beckenhöhle.		
Diam. anteroposterior von der Vereinigung des 2. und 3. Kreuzbeinwirbels zur Mitte der hinteren Fläche der Symph. pubis	4″ 6‴	4″
Queerdm. vorderer, zwischen den Böden der Acetabula	4″ 3‴	4″
„ „ hinterer, zwischen den hinteren Rändern der Ossa ischii . . .	5″	4″ 6‴
„ „ zwischen den Spinae ischii . .	3″ 8‴	3″
Schräger Drm. von der Mitte des Lig. obturatorium zur Mitte der Incis. ischiadica superior der anderen Seite . .	4″ 6‴	4″ 6‴
Umfang	15″ 6‴	13″ 6‴
Beckenausgang.		
Diam. anteroposterior, unterer, von der Spitze des Steifsbeins zum Lig. arcuatum inferius	3″ 4‴	2″ 9‴
„ „ „ oberer, von d. Symph. sacrococcygea z. Lig. arcuatum inferius . (sehr veränderlich zwischen $3\frac{3}{4}$ und $4\frac{1}{2}$″)	4″ 3‴	3″ 6‴
Queerdm. zwischen dem Tubera ischii .	4″	3″
Schräger Dm. zwischen der Verein. des Ram. adsc. oss. ischii mit dem Ram. desc. oss. pubis, und der Mitte des Lig. sacrotuberosum der anderen Seite	4″	3″

	Männlich.	Weiblich.
ang	12″	10″ 6‴
„ bei zurückgedrängtem Steifsbeine	13″ 6‴	12″
anz vom Lig. arcuatum inferius zum Promontorium, (sog. Diagonalconjugata)	4″ 9‴	4″ 6‴
„ „ Lig. arcuatum inf. zur Symph. sacroiliaca	4″ 6‴	
„ „ Lig. arcuatum inf. zur Mitte der Linea arcuata int. . .	4″	
e der hinteren Wand, vom Promont. zur Spitze des Steifsbeins . .	4″ 9‴	5″ 3‴
„ Seitenwand, von der Linea arcuata int. zum Tuber ischii .	3″ 6‴	4″
„ Symphysis pubis	1″ 8‴	2″
ge des Kreuzbeins nach der Biegung seiner vorderen Fläche	4″ 4‴	5″
ite des Kreuzbeins oben	4″	4″
ge des Os coccygis	1″	1″ 2‴

Die *äufseren Dimensionen* sind bei Weitem veränderer als die innern. Die Höhe des ganzen Beckens vom er ischii zur Crista oss. ilium beträgt im männlichen per 8″, im weiblichen $7\frac{1}{4}$″. Im weiblichen Becken ägt der weiteste Abstand der Cristae oss. ilium unge- 11″; eine Linie zwischen der Vorderseite der Symph. is, nahe unterhalb des vorderen Randes desselben, und Spitze des Proc. spinosus des zweiten Lendenwirbels verlängerte Conjugata des Eingangs) mifst $8\frac{3}{4}$″: Linie vom ersteren Punkte bis zum Lig. apicum zwin dem Proc. spinosus des letzten Lendenwirbels und ersten Kreuzwirbels (Baudelocques Linie) mifst $6\frac{3}{4}$″, männlichen Becken $6\frac{1}{2}$″. Die Entfernung zwischen der te der vorderen Fläche der Symphysis pubis und dem ten Proc. spinosus spurius oss. sacri beträgt im weiben Becken 6″, im männlichen $5\frac{1}{2}$″: und die Distanz schen dem Lig. arcuatum inferius und der Symphysis rococcygea im weiblichen Becken $4\frac{1}{2}$″, im männlin 4″.

Der Beckeneingang und Ausgang stehen nicht horizon- und rechtwinkelig zur Mittellinie des Körpers, sondern de hinten höher als vorn, und sind daher schräg gerich-

Beim normal gestellten weiblichen Becken steht das

Promontorium 3″ und 6‴ bis 8‴ höher als der obere Rand der Symphysis pubis, und die Spitze der Os coccygis 6‴ bis 8‴ höher als der untere Rand des Lig. arcuatum inferius. Daher bildet die Conjugata des Beckeneingangs einen Winkel von 55° bis 60° mit der Horizontalebene, auf welcher der Körper steht: d. i. die Neigung des Beckens, *Inclinatio pelvis.* Eine rechtwinkelig mit der Conjugata durch deren Mitte in das Becken gezogene Linie (die Axe des Beckeneingangs) trifft auf das Ende des Steifsbeins, und bildet mit der senkrechten Mittellinie des ganzen Körpers einen Winkel von 55° bis 60°, mit der Horizontalebene aber einen Winkel von 35° bis 30°. Der untere Diameter anteroposterior (Conjugata) des Beckenausgangs bildet mit der Horizontalebene einen Winkel von 9° bis 12°; eine mit dem Mittelpunkt derselben unter rechten Winkeln sich schneidende Linie trifft auf das Promontorium. Der obere Diameter antero-posterior des Beckenausgangs ist unter einem Winkel von 20° gegen den Horizont geneigt.

Die Krümmung der Beckenhöhle, welche von der Concavität der vorderen Fläche des Kreuzbeins und der Richtung des Steifsbeins abhängt, läfst sich mit dem Abschnitt eines Kreises von $2\frac{1}{4}$ Halbmesser ungefähr vergleichen.

B. Oberschenkel.

Os femoris, Oberschenkelbein,

ist der längste und stärkste Röhrenknochen des Körpers, welcher von der Hüfte zum Knie schräg nach innen herabsteigt; so dafs beide Oberschenkelbeine mit ihren unteren Enden convergiren.

Das Mittelstück ist seiner Länge nach leicht nach vorn gebogen, dreiseitig, mit einer convexen vorderen, und zwei ebenen seitlichen und zugleich nach hinten gewandten Flächen: die Seitenwinkel sind abgerundet, der hintere Winkel aber springt als eine rauhe Linie stark hervor, *Linea aspera oss. femoris:* an dieser unterscheidet man zwei Lefzen, *Labium internum et externum*, welche in der Mitte der Linea aspera zusammenstofsen, gegen die obere und untere Extremität hin aber auseinander weichen. In der Mitte der Linea aspera findet sich ein grofses Foramen

tritium, welches in die sehr geräumige Markhöhle rt.

Die obere Extremität zeigt einen kugelförmigen Kopf, *put oss. femoris*, welcher an zwei Drittheilen seiner Ober- che überknorpelt ist, und nach innen und oben mit einer inen rauhen Grube, *Fovea capitis* oss. fem. versehen ist. r Kopf ruhet auf einem dünneren, von vorn nach hinten as platt gedrückten Halse, *Collum*, welcher schräg von n und innen nach unten und aufsen gerichtet ist; daher er einem stumpfen Winkel an das Mittelstück sich liefst, und daselbst von zwei starken rauhen Erhaben- en, den Rollhügeln, Trochanteres, umgeben wird. Der *chanter major* liegt am unteren äufseren Ende des Halses h aufsen, ist sehr breit und rauh, läuft nach oben und ten in eine stumpfe Spitze aus, hinter welcher eine be, *Fossa trochanterica*, sich befindet. Der *Trochanter or* liegt unterhalb des Halses mehr nach innen und hin- , etwas tiefer als der Trochanter major, ist länglich dlich, und glatter. Über die vordere und hintere Flä- der oberen Extremität laufen schräge Linien vom Tro- nter major zum Trochanter minor herab, *Lineae inter- hantericae, anterior et posterior;* erstere ist länger und wächer, letztere kürzer und erhabener. Von den Tro- nteren an beginnen die Labia der Linea aspera, das ium externum vom hinteren Rande des Trochanter or, das Labium internum vom Trochanter minor.

Die untere Extremität ist beträchtlich dicker als das telstück und die obere Extremität, und läuft in zwei ke Gelenkknorren aus, *Condylus oss. femoris internus et rnus;* von welchen der innere bei senkrecht gehaltenem telstück etwas tiefer herabzusteigen scheint, aber wegen schrägen Lage des Oberschenkelbeins mit dem äufseren rren in derselben Horizontalebene liegt. Beide Knorren l von den Seiten her etwas platt gedrückt, und an den enflächen rauh: die vordere, untere und hintere Fläche es Knorren bilden dagegen eine längliche stark convexe te überknorpelte Gelenkfläche. Vorne werden sie durch e flache überknorpelte Grube, *Fossa intercondyloidea erior* s. *Fossa patellae*, von einander getrennt; hinten r durch eine tiefere rauhe gegen die Kniekehle hin of-

fene Grube, *Fossa intercondyloidea posterior* s. *Fossa poplitea ossis femoris*, geschieden. Die Condyli nehmen oberwärts die unteren divergirenden Enden des Labium externum und internum der Linea aspera auf.

Die Verbindung des Oberschenkelbeins mit den Hüftknochen ist das *Hüftgelenk*, *Articulatio coxae*, eine freie Arthrodie, und zwar ein vollkommenes Nufsgelenk, welches nicht so ausgedehnte Bewegungen wie das Schultergelenk gestattet, aber bei Weitem fester gebauet ist. Der Kopf des Oberschenkelbeins liegt in der Pfanne, mit seiner überknorpelten Fläche die Superficies lunata acetabuli berührend, und wird in dieser Grube befestigt durch

1. das *Labrum cartilagineum acetabuli*, einen sehr starken 4‴ hohen faserknorpeligen Ring, welcher mit seiner breiten Basis auf dem Supercilium acetabuli festsitzt, und über die Incisura acetabuli brückenförmig hingespannt ist (dieser Theil des Ringes wird Lig. transversum acetabuli genannt). Der freie schärfere Rand des Labrum cartilagineum umgiebt den dünneren Theil des Caput oss. femoris, welcher an das Collum gränzt; ist enger als der mittlere Umfang des Kopfs, und schliefst denselben dadurch in die Pfanne ein.

2. *Ligamentum capsulare articulationis coxae.* Die Synovial- und Faserkapsel entspringen beide vom Supercilium und Labrum cartilagineum acetabuli, und steigen vorne bis zur Linea intertrochanterica anterior, hinten bis zur Mitte des Collum herab, woselbst die Faserkapsel in die Beinhaut übergeht, die Synovialkapsel aber aufwärts sich umschlägt, um das Collum, die Gelenkflächen, und das Lig. teres zu bekleiden. Auf solche Weise ist die ganze Vorderfläche und die Hälfte der hinteren Fläche des Collum oss. femoris in die Gelenkhöhle eingeschlossen. Die Faserkapsel ist sehr vollständig und äufserst stark, auf der vorderen Seite des Gelenks wenigstens 2‴ dick.

3. *Ligamentum teres* s. rotundum, ein kegelförmiges oder vielmehr dreiseitig pyramidalisches, 1″ langes Band, liegt innerhalb des Gelenks, entspringt breit in der Fossa acetabuli, und inserirt sich zugespitzt in der Fovea capitis oss. femoris. Wegen seiner Länge und geringen Stärke

gt es wenig zur Befestigung der Knochen bei, leitet aber Ernährungsgefäfse zum Caput oss. femoris.

Im Hüftgelenke wird nicht allein das Oberschenkelbein seinem Stützpunkt, dem Acetabulum, nach allen Seiten bewegt und gedrehet oder gerollt; sondern es kann h das Becken auf den festgestellten Oberschenkelbeinen kwärts und vorwärts gezogen oder gestreckt und ge-gt, auch seitwärts gebeugt und gedrehet werden: letz-es vorzüglich auf dem einen Oberschenkelbein allein. der Streckung des Beckens wird der Beckeneingang ır nach oben, bei der Beugung nach vorn mehr vor-rts gerichtet.

C. Unterschenkel.

Tibia, Schienbein,

nach dem Oberschenkelbein der stärkste und längste ırenknochen des Skelets, und beinahe vollkommen ge-e und senkrecht gerichtet. Das Mittelstück hat drei chen, welche durch drei Winkel scharf begränzt wer-. Die äufsere Fläche ist etwas ausgehöhlt, die hintere rwärts schwach convex, unterwärts flach, und enthält gröfste Foramen nutritium; die innere breiteste ist zu-ch schräg nach vorn gerichtet, glatt und convex. Der dere Winkel, *Crista tibiae*, springt am stärksten her-; der äufsere ist scharf, der innere abgerundet.

Die obere Extremität ist der dickste Theil des Kno-ns, und besteht aus zwei mit einander verschmolzenen enkknorren, *Condyli tibiae, internus et externus*: beide auf ihrer oberen Fläche mit einer flach vertieften Ge-rfläche von halbovaler Gestalt versehen, welche durch zwischen beiden hervorragende rauhe Erhabenheit, *nentia intercondyloidea* s. intermedia, von einander ge-eden werden: vor und hinter dieser meistens zackigen abenheit liegt ein flaches Grübchen. Am hinteren äu-en Umfange des Condylus externus zeigt sich eine klei-schräg nach unten gerichtete, ebene runde Gelenkfläche, *erficies articularis lateralis:* und an der vorderen Seite oberen Extremität, unterhalb der Eminentia intercon-oidea und am Anfange der Crista tibiae, ragt ein läng-

licher rauher Höcker, oder anstatt dessen eine Zacke hervor; d. i. die *Tuberositas* s. Spina tibiae.

Die untere Extremität ist dünner als die obere, und endigt mit einer länglich viereckigen queerliegenden Gelenkhöhle, *Cavitas glenoidea tibiae.* An der inneren Seite derselben ragt ein kurzer starker Fortsatz herab, der *innere Knöchel, Malleolus internus,* dessen innere Fläche convex und rauh ist; dagegen die äufsere gegen die Cavitas glenoidea gewandte Fläche glatt und überknorpelt ist, und den innersten Theil der Gelenkhöhle bildet. Hinter dem Malleolus internus läuft eine flache Furche, *Sulcus malleoli interni.* An der äufseren Seite der unteren Extremität zeigt sich ein länglicher Ausschnitt, *Incisura peronea* s. *fibularis.*

Patella, Kniescheibe,

s. Rotula, ein plattrundlicher schwammiger Knochen, dicker in der Mitte, dünner an den abgerundeten Rändern: liegt vor dem unteren Ende des Oberschenkelbeins und dem oberen Ende der Tibia, und bildet einen Anhang der letzteren. Die vordere Fläche der Kniescheibe ist convex, rauh und voll kleiner Löcher; die hintere gröfstentheils glatt, überknorpelt, und durch einen Vorsprung in zwei ungleiche Hälften getheilt, in eine gröfsere äufsere, und eine kleinere innere. Nach unten läuft die Kniescheibe in eine stumpfe etwas plattgedrückte Spitze aus, *Apex patellae.*

Die Kniescheibe hängt mit der Tibia durch das Kniescheibenband, *Ligamentum patellae,* zusammen. Es ist dieses das stärkste Faserband des Körpers, 2″ lang, 1″ breit und 3‴ dick; entspringt von der Apex patellae und der vorderen Fläche der Kniescheibe, und heftet sich, indem es im Herabsteigen etwas schmaler wird, an die Tuberositas tibiae, woselbst unter ihm ein Schleimbeutel liegt. Seine vordere Schicht gehört indessen den Caudae der Streckmuskeln des Unterschenkels an.

Fibula s. Perone, Wadenbein,

ist eben so lang als das Schienbein, an dessen äufserer und hinterer Seite es liegt, aber beträchtlich dünner und etwas nach aufsen und hinten gebogen. Das Mittelstück hat drei Flächen und Winkel, welche aber gewunden von oben nach

en laufen; der schärfste Winkel, *Crista fibula*, ist nach
n gerichtet. Die obere Extremität besteht gröfstentheils
einem rundlichen Kopf, *Capitulum fibulae*, an dessen
eren vorderen Umfange eine kleine ebene Gelenkfläche
t; an seinem äufseren Umfange erhebt er sich in eine
mpfe Spitze: der dünnere Theil unterhalb des Kopfs ist
Collum fibulae. Die untere Extremität, welche in der
isura peronea tibiae liegt, ragt mit ihrem unteren dicke-
Theile, dem *äufseren Knöchel, Malleolus externus*, noch
erhalb dieser Incisura herab: die äufsere Fläche des
lleolus externus ist rauh und convex, die innere, gegen
Cavitas glenoidea tibiae gewandte, eben und zum Theil
rknorpelt; nach unten endigt er mit einer stumpfen
tze, an deren hinteren und inneren Seite eine Grube
t: *Apex* und *Fovea malleoli externi*.

Die Tibia und Fibula werden in ihrer Lage neben ein-
er, wobei sie einen länglichen unterwärts schmaleren
m, *Interstitium interosseum cruris*, zwischen sich lassen,
nahe unbeweglich vereinigt. Zwischen dem Condylus
rnus tibiae und dem Capitulum fibulae, dessen Gelenk-
he an die Superficies articularis lateralis des ersteren
legt, besteht eine Amphiarthrosis, welche durch ein
aches Kapselband, *Ligamentum capituli fibulae*, vermittelt
d. Die Mittelstücke und zum Theil auch die Extremi-
n werden durch das *Ligamentum interosseum cruris* ver-
gt, welckes an den äufseren Winkel der Tibia und an
inneren Winkel und Fläche der Fibula geheftet ist,
rwärts breiter, unterwärts schmaler und stärker ist,
ganze Interstitium interosseum ausfüllt, jedoch unter
1 Condylus externus tibiae und dem Capitulum fibulae
e grofse Lücke enthält. Die untere Extremität der Fi-
a wird in der Incisura fibularis tibiae durch Syndes-
sis befestigt: zwei starke Bänder, *Ligamenta malleoli*
erni s. tibiae fibularia, *anterius et posterius*, in welchen
re und untere Bündel bemerkbar sind, gehen von dem
deren und hinteren Rande der Incisura fibularis zur vor-
en und hinteren Fläche des Malleolus externus; das letz-
e heftet sich aber auch an den hinteren Rand der Cavitas
noidea tibiae, und vergröfsert diese Gelenkhöhle. Ein
ttes Band, *Ligamentum malleoli externi superius*, ist im

unteren Ende des Interstitium interosseum ausgespannt, fliefst mit dem Lig. interosseum zusammen, ist aber beträchtlich stärker als dieses. Der Malleolus externus reicht beträchtlich weiter herab, als der Malleolus internus.

Die sehr feste Verbindung des Oberschenkelbeins mit der Tibia und Patella ist das *Kniegelenk, Articulatio genu*, welches von allen Gelenken den am meisten zusammengesetzten Bau darbietet. Zwischen dem Os femoris und der Tibia besteht ein Ginglymus, in welchem jedoch beide Knochen einer geringen Drehung um ihre Axe fähig sind: die convexen Gelenkflächen der Condyli oss. femoris ruhen auf den concaven Gelenkflächen der Condyli tibiae, und die Eminentia intercondyloidea der letzteren ragt in die Fossa intercondyloidea posterior ossis femoris hinauf. Die Patella liegt mit ihrer hinteren überknorpelten Fläche in der Fossa intercondyloidea anterior oss. femoris, und kann in derselben auf- und abgleiten. Folgende Organe vermitteln die Verbindung:

1. *Fibrocartilagines falciformes* s. semilunares, zwei Zwischengelenkknorpel von sichelförmiger Gestalt, 4‴ breit, mit einem äufseren 2‴ hohen Rande, und einem inneren concaven sehr scharfen Rande. Sie liegen auf dem Umfange der Gelenkflächen der Condyli tibiae, vergröfsern und vertiefen dieselben: sind mit ihren dünneren Enden in den Grübchen vor und hinter der Eminentia intercondyloidea befestigt, und aufserdem durch ein dünnes zwischen ihren vorderen Enden ausgespanntes Queerband, Lig. transversum, mit einander verbunden. Der innere dieser Faserknorpel ist etwas breiter und mehr halbmondförmig, der äufsere etwas kürzer und fast kreisförmig gekrümmt.

2. *Ligamenta cruciata genu*, die Kreuzbänder, sind sehr stark, halten das Oberschenkel- und Schienbein vorzüglich fest zusammen und hindern eine zu starke Beugung und Streckung. Sie bilden zwischen den Condyli oss. femoris die Figur eines X; das vordere, *Lig. cruciatum anterius*, entspringt vor der Eminentia intercondyloidea tibiae, zwischen den vorderen Enden der Fibrocartilagines falciformes, von welchen es einige Fasern aufnimmt; und steigt schräg nach oben, aufsen und hinten zur inneren Fläche des Condylus externus oss. femoris. Das längere und stärkere *Lig. cruciatum posterius* entspringt hinter der Eminentia in-

condyloidea, vereinigt sich mit dem hinteren Ende der rocartilago falciformis externa, läuft schräg nach oben, n und innen, uud befestigt sich mit einem breiteren bmondförmigen Rande an die äufsere Fläche des Condylus ernus oss. femoris.

3. *Ligamentum capsulare genu*, die aus einem weiten novialsack und einer nicht sehr starken noch vollständi- fibrösen Schicht bestehende *Kniekapsel*. Sie entspringt dem ganzen Umfange der unteren Extremität des Ober- enkelbeins, heftet sich an den oberen und die Seitenrän- der Kniescheibe und an die äufseren dickeren Ränder Fibrocartilagines falciformes, nicht aber an das Lig. ellae, hinter welchem sie liegt; und befestigt sich end- an den gröfsten oberen Umfang der oberen Extremität Tibia: schliefst also aufser den Gelenkflächen der Con- oss. femoris und Tibiae auch die Fossae intercondyloi- e des ersteren und die Eminentia intercondyloidea des teren, die hintere Fläche der Patella, soweit diese über- rpelt ist, die Fibrocartilagines falciformes und die Ligg. ciata ein. Die Synovialkapsel stellt nach oben und vorn en einfachen Sack dar, theilt sich aber unten in zwei en den Ligg. cruciata nach hinten sich erstreckende Säcke, durch diese Ligamente an ihrem vorderen und seitlichen fang von ihr bekleidet werden: auch überzieht sie die rocart. falciformes. Zu beiden Seiten der überknorpel- Fläche der Kniescheibe bildet sie zwei halbmondförmige ten, *Ligamenta alaria genu*, welche bis zu den vorderen len der Fibrocart. falciformes und des Lig. cruciatum erius herabsteigen, und sodann zu einer einfachen grö- en Falte, *Ligamentum mucosum genu*, sich vereinigen: se läuft rückwärts, und heftet sich in der Fossa inter- dyloidea oss. femoris an. Die Faserkapsel ist vorn und den Seiten, woselbst sie vom Lig. patellae, den Ligg. ralia und von Sehnen und Fascien bedeckt wird, schwä- r: an der hinteren Seite des Gelenks aber stärker, und hält hier einen stärkeren platten Streifen, *Ligamentum liteum* s. posticum genu, welcher vom Condylus externus femoris schräg nach innen herabsteigt, und unter dem ndylus internus tibiae an den inneren Rand der oberen remität dieses Knochens sich anheftet.

4. *Ligamenta lateralia genu*, stärkere oberflächliche Bänder zu beiden Seiten des Kniegelenks: das plattlängliche *Lig. laterale internum* geht vom Condylus internus oss. femoris zum Condylus internus tibiae und dem inneren Rande der oberen Extremität dieses Knochens, und ist genauer mit der Faserkapsel verwebt. Das *Lig. laterale externum* ist länglich rundlich, und läuft entfernter von der Kapsel, von dem Condylus externus oss. femoris zur stumpfen Spitze und hinteren Fläche des Capitulum fibulae: es zerfällt zuweilen in ein längeres stärkeres vorderes und ein hinteres kürzeres Bündel.

D. Fuſs.

Ossa tarsi, Fuſswurzelknochen.

Die Fuſswurzel, Tarsus, besteht aus sieben kurzen verschieden gestalteten schwammigen Knochen, welche beträchtlich gröſser als die Handwurzelknochen, aber nicht so regelmäſsig in zwei Reihen gelagert sind. Zu der ersten Reihe rechnet man gewöhnlich den Talus, Calcaneus, und das Os naviculare; zu der zweiten mit dem Mittelfuſs in unmittelbarer Verbindung stehenden Reihe die drei Ossa cuneiformia und das Os cuboideum.

1. *Talus* s. Astragalus, das Sprung- oder Knöchelbein, ist der oberste Knochen der Fuſswurzel, welcher sich unmittelbar an die Unterschenkelknochen schlieſst: und hat eine unregelmäſsig würfelförmige Gestalt. Die obere oder Dorsalfläche ist gröſstentheils von vorn nach hinten stark convex und überknorpelt, die äuſsere Seitenfläche ist dreieckig und überknorpelt, die innere nur an ihrem oberen Theile überknorpelt und unterwärts rauh. Die untere oder Plantarfläche ist gleichfalls überknorpelt, und wird durch eine tiefe rauhe Furche, *Sulcus tali*, in eine hintere gröſsere stark concave, und eine innere vordere flachere Gelenkfläche getheilt. Am hinteren Rande des Talus zeigt sich ein kleiner rauher Höcker und ein flacher Ausschnitt, *Tuberculum* und *Incisura tali;* nach vorn aber ein platter Kopf, *Caput tali*, auf einem kurzen rauhen Halse, *Collum tali*: ersterer ist mit einer länglichen queerliegenden, nach vorn gerichteten, stark convexen Gelenkfläche versehen.

2. *Calcaneus* s. Os calcis, das Fersenbein, ist der gröfste chen der Fufswurzel, und bildet den hintersten und rsten Theil derselben. Er ist länglich viereckig, an em hinteren Theile beträchtlich dicker, und bildet hier Ferse, Calx; er endigt hinten mit einer breiten rauhen he, *Tuberositas calcanei* genannt. Die Dorsalfläche ent- ungefähr in ihrer Mitte eine längliche convexe Gelenk- ie: neben dieser steht nach innen, die innere Fläche des chens überragend, ein platter Fortsatz hervor, *Processus alis calcanei* s. Sustentaculum tali, dessen obere Fläche knorpelt, und von der gröfseren oberen Gelenkfläche Calcaneus durch eine rauhe Rinne, *Sulcus calcanei*, ge- nt wird. Beide Gelenkflächen nehmen die untere Ge- fläche des Talus auf. Der vordere dünnere Theil des aneus endigt mit einer nach vorn gewandten unregel- isig viereckigen concav-convexen Gelenkfläche. Die Sei- lächen des Calcaneus sind glatter, die Plantarfläche ier.

3. *Os naviculare* s. scaphoideum, das Kahnbein, liegt dem Talus; enthält nach hinten eine längliche concave enkfläche zur Verbindung mit der Gelenkfläche des Caput

Die vordere stark convexe Fläche ist überknorpelt durch drei Linien in vier Facetten getheilt, welche von n nach aufsen an Gröfse abnehmen: die erste für das cuneiforme primum ist dreieckig und convex, die zweite das Os cuneiforme secundum dreieckig und flach; die te für das Os cuneiforme tertium ungleich viereckig; vierte mehr nach aufsen gewandte für das Os cuboideum eckig. Die Dorsal- und Plantarflächen sind rauh; an inneren Seite steht eine rauhe Erhabenheit hervor, *Tu- sitas oss. navicularis.*

4. 5. 6. *Ossa cuneiformia* s. sphenoidea tarsi, Keilbeine, an der Zahl, sind keilförmig, und werden vom inne- Fufsrande an gezählt. Das *Os cuneiforme primum* ist ansehnlichste; sein breiterer Theil liegt nach der Fufs- le hin, sein schmaler Rand nach dem Fufsrücken. Die ere rauhe Fläche ist convex, die äufsere concav, und an i Stellen nach oben und hinten überknorpelt, übrigens r rauh. Die hintere Fläche ist concav, dreieckig, über- rpelt; verbindet sich mit der ersten Facettte des Os

naviculare; die vordere Fläche ist eine flache halbmondförmige Gelenkfläche. Das *Os cuneiforme secundum* ist das kleinste: die Dorsalfläche ist breiter, und der scharfe Rand liegt nach der Fufssohle hin: die Seitenflächen sind theils rauh, theils überknorpelt zur Vereinigung mit dem Os cuneif. primum und tertium: die hintere und vordere Fläche sind dreieckig und überknorpelt; letztere verbindet sich mit der zweiten Facette des Os naviculare. Das *Os cuneiforme tertium* ist gröfser als das zweite, übrigens ihm völlig ähnlich gestaltet; es gränzt mit seiner hinteren Gelenkfläche an das Os naviculare, mit der inneren zum Theil überknorpelten an das Os cuneif. secundum; mit der äufseren gleichfalls zum Theil überknorpelten an das Os cuboideum.

7. *Os cuboideum*, Würfelbein, von unregelmäfsiger Würfelgestalt, liegt am äufseren Fufsrande vor dem Calcaneus, und steht mit ihm durch seine hintere concav-convexe Gelenkfläche in Verbindung. Die innere Fläche zeigt zwei an einandergränzende Gelenkflächen für das Os naviculare und Os cuneiforme tertium. Die Dorsalfläche liegt schräg nach aufsen; die rauhe Plantarfläche ist mit einer länglichen Erhabenheit und einer vor derselben laufenden Rinne, *Tuberositas* und *Sulcus ossis cuboidei*, versehen, welche von der äufseren niedrigen Fläche des Knochens an schräg nach innen und vorne sich erstrecken: an dem äufseren Ende der Tuberositas zeigt sich oft eine kleine überknorpelte Fläche. Die vordere Fläche des Os cuboideum ist länglich viereckig und enthält zwei flache nur durch eine schwache Linie getrennte Gelenkflächen.

Der ganze Tarsus wird von hinten nach vorn breiter und gewölbter; sein hinteres Ende ist die Tuberositas calcanei; das vordere Ende wird von den fünf nahe beisammen liegenden vorderen Gelenkflächen der Ossa cuneiformia und des Os cuboideum gebildet. Der äufsere Fufswurzelrand ist kürzer und schmaler; der innere länger und breiter, und steht höher als der äufsere; in der Nähe seines vorderen Randes ragt an ihm die Tuberositas oss. navicularis hervor. Die schmalere concave Plantarfläche ist sehr rauh und ungleich durch die unteren Ränder der Ossa cuneiformia und die Tuberositas und Sulcus oss. cuboïdei. Die convexe breitere Dorsalfläche enthält ungefähr in ihrer Mitte

convexe Gelenkfläche des Talus, durch welche der Fuſs dem Unterschenkel sich verbindet. Nach auſsen hin ist Dorsalfläche abhängig: zwischen Talus und Calcaneus t sich eine in eine längliche enge Höhle führende Ver-ng, welche von den Sulci des Talus und des Calcaneus ldet wird und bis zum inneren Fuſsrande sich erstreckt: der *Sinus tarsi.*

Die Knochen der Fuſswurzel verbinden sich mit ein-r durch die *Articulationes ossium tarsi*, deren jede ein-e nach den vereinigten Knochen benannt wird, z. B. culatio talo-calcanea, talo-naviculare, calcaneo-cuboidea w. Es sind Amphiarthrosen, von welchen die Artic. navicularis etwas freier als die übrigen ist: diese und Artic. calcaneo-cuboidea liegen fast in einer und der-n den Tarsus queer durchschneidenden Linie. Die ein-r zugewandten Gelenkflächen werden von straffen Sy-alkapseln umgeben, von welchen die zwischen dem Os culare und den Ossa cuneiformia den letztgenannten drei chen gemeinschaftlich ist: auſserdem werden aber alle e Knochen durch eine groſse Anzahl meistens starker kurzer Bänder zusammengehalten, welche man nach durch dieselben vereinigten Knochen, und nach ihrer e auf dem Rücken, in der Sohle, am äuſseren oder in-n Fuſsrande, oder zwischen den einander zugewandten hen der Knochen, bezeichnet.

1. Zwischen Talus und Calcaneus liegen vier *Ligamenta -calcanea*, ein *internum anterius*, ein *internum posterius*, *externum*, und ein *interosseum*, welches kurz aber sehr k ist, aus mehreren Bündeln besteht, und den Sinus i ausfüllt.

2. Zwischen Talus und Os naviculare liegt ein breites *talo-naviculare dorsale et internum.*

3. Zwischen Calcaneusund Os naviculare zwei *Ligg. cal-o-navicularia*, ein *dorsale* und ein stärkeres aus platten runden Bündeln bestehendes *plantare.*

4. Zwischen Calcaneus und Os cuboideum vier *Ligg. aneo-cuboidea*, ein *dorsale*, aus zwei bis drei Bündeln be-end, ein *externum* am äuſseren Fuſsrande, und ein *plan-*, welches von der unteren Fläche des Calcaneus zur erositas oss. cuboidei geht, und aus einer längeren ober-

flächlichen, und einer kürzeren tiefen Schicht besteht: die erstere reicht bis zur Basis des dritten und vierten Os metatarsi. Es ist das stärkste Ligament des Tarsus, und überhaupt eins der stärksten Bänder des Körpers.

5. Zwischen Os naviculare und Os cuboideum drei *Ligg. cubo-navicularia*, ein schräglaufendes *dorsale*, ein queerlaufendes *plantare*, und ein starkes *interosseum*.

6. Zwischen Os naviculare und den drei Ossa cuneiformia finden sich sechs *Ligg. cuneo-navicularia*, drei *dorsalia*, primum, secundum, tertium, von denen das erste breiteste auch an den inneren Fufsrand sich erstreckt; und drei *plantaria*.

7. Zwischen Os cuboideum und Os cuneiforme tertium sind drei *Ligg. cuneo-cuboidea* ausgespannt, ein *dorsale*, ein *plantare* und ein *interosseum*.

8. Zwischen dem ersten und zweiten und dritten Os cuneiforme finden sich *Ligg. ossium cuneiformium*, zwei *dorsalia*, zwei *plantaria*, und mehrere kleine *interossea*.

Die Verbindung zwischen dem Tarsus und dem Unterschenkel ist das *Fufsgelenk*, *Articulatio pedis*: sie wird nur durch den Talus vermittelt, welcher mit seiner oberen convexen Gelenkfläche in der Cavitas glenoidea tibiae liegt, und an seinen überknorpelten Seitenflächen von den beiden Malleoli genau eingeschlossen ist, wodurch ein sehr fester Ginglymus ensteht. An den Umfang der Gelenkflächen ist eine ziemlich straffe Synovialkapsel geheftet, welche vorne nur durch ein schmales, von der Tibia zum Halse des Talus schräg herablaufendes, Faserband verstärkt — hinten und zu beiden Seiten aber von starken Ligamenten umgeben wird. Von dem vorderen und hinteren Rande des Malleolus internus gehen queerlaufende Faserbündel zum inneren Rande des Talus; von dem unteren Rande dieses Knöchels aber steigt das *Ligamentum deltoides* s. laterale internum, ein ungleichseitig viereckiges, oben schmaleres unten breiteres starkes Band, zur Seitenfläche des Talus und zum Proc. lateralis calcanei herab. An der äufseren Seite des Gelenks laufen gleichfalls starke queere Bänder vom Malleolus externus zum Talus: das *Ligamentum tali fibulare anterius* vom vorderen Rande des äufseren Knöchels zur äufseren Fläche des Collum tali; und das stärkere aus zwei Schichten

hende *Lig. tali fibulare posterius*, welches vom hinte- Rande und aus der Fovea malleoli externi entspringt, zum Tuberculum tali geht. Zwischen diesen beiden lern entspringt das *Ligamentum triquetrum* s. fibulare nei spitzig und rundlich von der Spitze des Malleolus rnus, und breitet sich an der äufseren Fläche des Cal- us aus.

Ossa metatarsi, Mittelfufsknochen.

Der Mittelfufs enthält fünf cylindrische ihrer Länge leicht gebogene Knochen. Ihr Mittelstück ist dreisei- die Rückenfläche der Länge nach etwas convex, die nflächen schräg gerichtet; der schärfste Winkel sieht der Fufssohle hin, und ist der Länge nach etwas con- Die hintere dickere Extremität, *Basis*, ist dreiseitig, an ihrem hinteren Ende mit einer Gelenkfläche zur bindung mit den Fufswurzelknochen versehen: an den en zeigen sich kleine überknorpelte Flächen, und rauhe bchen und Höcker. Die vordere Extremität bildet ein gedrücktes *Capitulum* mit einer länglichen stark con- n Gelenkfläche, welches seitwärts mit kleinen Erhaben- en und Grübchen besetzt ist.

Der erste Mittelfufsknochen am inneren Fufsrande, der sen Zehe angehörig, *Os metatarsi hallucis* s. primum, kürzer aber beträchtlich dicker als die übrigen: seine s besitzt eine grofse concave halbmondförmige Gelenk- ne, welche mit dem Os cuneiforme primum articulirt; Capitulum ist dick und rundlich, und auch auf seiner tarfläche mit zwei kleinen flach convexen Gelenkflächen ehen. Das *Os metatarsi secundum* ist das längste, seine s verbindet sich durch eine dreieckige Gelenkfläche mit Os cuneiforme secundum, und wird seitwärts vom Os eiforme primum und tertium eingeschlossen. Das *Os tarsi tertium* verbindet sich durch die dreieckige Ge- fläche seiner Basis mit dem dritten Keilbein; die Basis *Os metatarsi quartum* durch eine viereckige Gelenkfläche dem Os cuboideum: das Os *metatarsi quintum* besitzt seiner Basis eine dreieckige Gelenkfläche zur Vereinigung dem Os cuboideum, und eine rauhe *Tuberositas*, welche äufseren Fufsrande über das Os cuboideum hinausragt,

und gemeinschaftlich mit dem Anfange des Sulcus und der Tuberositas oss. cuboidei an diesem Fufsrande einen tiefen, in jenen Sulcus übergehenden Einschnitt bildet.

Die Verbindungen der Ossa metatarsi mit den Ossa tarsi, *Articulationes ossium tarsi et metatarsi*, sind Amphiarthrosen, und werden durch Synovialkapseln, durch sechs *Ligg. tarsi et metatarsi dorsalia*, und sechs bis acht theils oberflächlichere theils tiefere *Ligg. tarsi et metatarsi plantaria* befestigt: die vom Os cuboideum entspringenden Bänder dieser Art sind gröfstentheils dem Os metatarsi quartum und quintum gemeinschaftlich: der zweite Mittelfufsknochen wird mit sämmtlichen drei Keilbeinen durch Bänder vereinigt. — Zwischen den Bases der einzelnen Ossa metatarsi, welche genau an einander gedrängt und gleichfalls durch Amphiarthrosen verbunden sind, finden sich Verlängerungen der den Ossa tarsi und metatarsi angehörigen Synovialkapseln, und die kurzen starken *Ligamenta baseos metatarsi*, vier dorsalia, drei plantaria (indem ein solches zwischen dem ersten und zweiten Mittelfufsknochen fehlt), und vier interossea. — Die Köpfchen der Mittelfufsknochen werden zusammengehalten durch die vier starken platten *Ligamenta capitulorum metatarsi*, welche brückenförmig von dem einen zum anderen gehen, und an der Plantarfläche der Köpfchen zusammenfliefsen.

Die Ossa metatarsi in ihren Verbindungen bilden ein breiteres Gewölbe als der Tarsus, dessen Höhlung gegen die Plantarseite hingerichtet ist, und lassen zwischen ihren Mittelstücken und Köpfchen die *vier Interstitia interossea metatarsi* übrig, von welchen das erste, zwischen dem ersten und zweiten Mittelfufsknochen, das breiteste ist.

Phalanges digitorum pedis, Zehenglieder.

Die Zehen enthalten 14 Phalanges, welche ganz so wie die Fingerglieder gestaltet und angeordnet sind (S. 179.): nur sind sie beträchtlich kürzer, vorzüglich die zweite Phalanx der zweiten bis fünften Zehe: und die Trochleae an den unteren Enden der ersten und zweiten Phalanx nicht so vollkommen ausgebildet. Die Glieder des Hallux, welchem das zweite fehlt, sind sehr beträchtlich länger und dicker, als alle übrigen; daher der Hallux selten kürzer,

g sogar länger, als die zweite Zehe ist: letztere ist bei ommener Ausbildung des Fufses die längste: nicht sel- indet man aber die Zehenglieder verkrüppelt.

Die Zehengelenke, *Articulationes digitorum pedis,* verhal- sich wie die Fingergelenke, nur dafs ihre Beweglichkeit s beschränkter ist: zwischen den Capitula ossium meta- und den kleinen Gelenkhöhlen an den hinteren Extre- ten der ersten Phalangen bestehen Arthrodien, von de- die des Hallux die freieste ist: die zweiten und dritten ngelenke sind Ginglymi. An allen finden sich Synovial- eln, zwei *Ligg. lateralia* und ein *Ligamentum transver- plantare.*

ssa sesamoidea pedis, Sesambeine des Fufses.

An jedem Fufse finden sich vier beständige Ossa sesa- ea, meistens von länglicher Gestalt und 2‴ bis 4‴ Länge, einer flach concaven überknorpelten Fläche versehen, he in die Höhle der nächstgelegenen Synovialkapsel des Schleimbeutels eingeschlossen ist. Zwei liegen an der tarfläche des Capitulum oss. metatarsi hallucis, ein drit- leineres am Ende des ersten Gliedes dieser Zehe; das e am äufseren Ende der Tuberositas ossis cuboidei. s findet sich ein fünftes an der inneren Fläche des Os iforme primum, und ein sechstes am inneren Ende des t tali.

---

erschied des weiblichen Skelets von dem männlichen.

Im Allgemeinen ist es kürzer und schwächer, indem einzelnen Knochen dünner, weniger eckig, zierlicher rmt, und auch die Ligamente dünner und nachgiebiger

Die geringere Gröfse des Skelets hängt vorzüglich von Kürze der unteren Extremitäten ab; da der Stamm un- r von gleicher Länge als der des männlichen, und daher Verhältnifs zum Kopfe und zu den Gliedern merklich er ist.

Im Einzelnen finden sich folgende Verschiedenheiten:

Der Schädel ist nur wenig kleiner, das Gesicht aber merklich kürzer und schmaler, als das männliche, daher der weibliche Schädel im Verhältnifs zum Gesicht gröfser ist. Seine Wände sind dünner, die Stirn schmaler und niedriger, die Sinus frontales und alle Löcher enger; die Augenhöhlen verhältnifsmäfsig gröfser, die Nasen- und Mundhöhle enger, das Kinn rundlicher, die Unterkinnlade und das Zungenbein bilden engere Bogen Der Rückenmarkskanal und die Foramina intervertebralia sind verhältnifsmäfsig weiter. Der Thorax ist kürzer und enger, vorzüglich in seinem oberen Theile; die Schlüsselbeine sind weniger gekrümmt, die Schultern stehen weniger von einander entfernt und niedriger, die Arme und Hände sind kürzer, letztere auch schmaler; und die Finger spitzer und feiner. Der Lendentheil der Wirbelsäule ist länger, das Kreuzbein breiter, mehr nach hinten gerichtet, und gleichförmiger gebogen. Die auffallendsten Verschiedenheiten finden sich am Becken; die Hüftbeine sind flacher und stehen verhältnifsmäfsig weiter auseinander, vorzüglich ihre Spinae anteriores superiores: das weibliche kleine Becken ist niedriger aber breiter als das männliche, alle Durchmesser des Eingangs, der Höhle und des Ausgangs, sind absolut gröfser; der obere Rand der Symphysis pubis liegt weiter nach vorn, die Schambeine bilden mit einander und der Symphysis pubis einen weiten Bogen (S. 187 ff.). Wegen der gröfseren Breite des Beckens stehen die Hüftgelenke und die Trochanteren, obgleich diese kleiner als die männlichen sind, weiter aus einander, und die stärker gebogenen aber kürzeren Oberschenkelbeine laufen schräger einwärts convergirend zum Knie herab; ihr Collum ist mehr queer gerichtet, und schliefst sich an das Mittelstück unter einem Winkel von 125°; in männlichen Körpern dagegen unter einem Winkel von 135°. Die Unterschenkel sind kürzer, die Füfse kürzer und schmaler.

Zweites Buch.

›n den Muskeln, Sehnen, Schleimbeuteln und Fascien.

...n den Muskeln, Sehnen, Schleimbeuteln und Fascien.

Die Muskellehre, Myologia, enthält die Beschreibung ...vieler einzelner dem Muskel-Sehnenfaser-Faserknorpel-...Synovialsystem angehöriger Organe: nämlich zunächst ... derjenigen soliden Muskeln, welche die Knochen und ...e an der Aufsenfläche des Körpers sichtbare weichere ...e bewegen, mit Ausschlufs der hohlen Muskeln und ...er soliden Muskeln, welche in die Construction sehr ...nmengesetzter Organe und Apparate wesentlich einge... (letztere werden im dritten Buche beschrieben). Sie ...chtet aber nicht allein den von Muskelfasern gebildeten ...l des Muskels, sondern auch die mit diesem so genau verbun...n Sehnen und Aponeurosen, dafs ein Muskel und seine ...e oder Aponeurose als ein Organ angesehen werden: ...rner die Synovialscheiden, welche gewisse Sehnen ein...n: — die Synovial- oder Schleimbeutel, die Sesam...knorpel, die Sesamknochen und die faserknorpeligen ...n, über welche viele Sehnen hingleiten: — und end...die Fasciae musculares, welche gröfseren Muskelpar...als befestigende Hülle dienen, innerhalb welcher sie ... ohne Veränderung ihrer Richtung zusammenziehen ...en; welche aufserdem aber einzelnen Muskeln Ur...sprungsstellen gewähren, und die Aponeurosen anderer ...keln in sich aufnehmen, und daher von diesen Mus... angespannt werden können.

...Die Hauptrücksichten, nach welchen die Muskeln, in ...in mit den aufgezählten, zu ihnen in naher Beziehung ...nden, aber anderen Systemen angehörigen, Organen ...chtet werden, sind ihre Lage, Gestalt, ihre Ursprungs... Insertionspunkte, ihre Richtung vom ersteren zum ...ren Punkte, und ihre Wirkung.

...Bei der sehr symmetrischen Anordnung des Muskel...ms sind die meisten Muskeln paarweise in beide Seiten...

hälften des Körpers vertheilt, und ein jeder dem der anderen Seite völlig gleich: nur dafs mehrere oder alle Muskeln der rechten Seite nicht selten etwas stärker sind, als die der linken. Die Zahl aller regelmäfsig vorhandenen durch Perimysium und Zellgewebe von einander abgegränzten, und eigene Namen führenden Muskelpaare beträgt in männlichen Körpern 315, in weiblichen 314, zu welchen oft noch überzählige Muskeln als Varietäten hinzukommen. Die unpaaren Muskeln, fünf beim männlichen, sechs beim weiblichen Geschlechte, liegen in der Mittellinie des Körpers, und bestehen aus zwei einander völlig gleich gebildeten und innig verschmolzenen Seitenhälften, und bewegen nicht sowohl Theile des Skelets, sondern vielmehr Organe von mehr zusammengesetzten Bau. Aufser ihnen hat man auch gewissen stärkeren Bündeln der Muskelhäute die Namen selbstständiger Muskeln beigelegt.

Die Bewegungen, deren das Skelet und seine einzelnen Abtheilungen fähig sind, und zu deren Hervorbringung der gröfsere Theil aller Muskelpaare bestimmt ist, sind sehr mannigfaltig. Man unterscheidet einfache und zusammengesetzte Bewegungen: bei den ersteren wird nur ein Theil nach einer Richtung durch einen oder wenige Muskeln bewegt; bei der letzteren werden dagegen mehrere Theile nach einer gemeinschaftlichen oder nach verschiedenen Richtungen hingezogen, wobei mehrere Muskeln zugleich thätig sind, und wodurch ausgedehntere Veränderungen der Lage und Gestalt des Körpers oder einzelner Gliedmafsen entstehen. Die meisten einfachen Bewegungen lassen sich auf Beugung, Streckung, Abziehen, Anziehen, und Rollen zurückführen. Bei der *Beugung, Flexio*, werden die Enden oder einzelne Abtheilungen des Stamms oder der Glieder einander genähert, also der Stamm oder die Glieder verkürzt: bei der *Streckung, Extensio*, wird dagegen die Körperabtheilung, an welcher die Bewegung Statt findet, verlängert, indem einzelne Theile nach der Längenrichtung von einander sich entfernen. Das *Abziehen, Abductio*, und *Anziehen, Adductio*, sind Bewegungen nach der Queerrichtung: bei der ersteren wird ein Theil von der Mittellinie des Körpers oder der einer Gliedmafse entfernt, bei der letzteren aber wiederum genähert. Bei dem *Rollen, Rotatio*,

rird ein Theil nach der einen oder anderen Richtung um eine Axe gedreht.

Die Benennungen der einzelnen Muskeln werden von en für die Betrachtung vorzüglich wichtigen Verhältnis- en entnommen, z. B.

von der Lage: Mm. superiores, inferiores, externi, interni, radiales, ulnares, u. s. w.

von der Richtung: Mm. obliqui, recti, circumflexi, u. s. w.

von der Gestalt u. Gröfse: Mm. longi, breves, vasti; rotundi, orbiculares, pyramidales, bicipites, u. s. w.

von dem Ursprunge und der Insertion: Mm. sternohyoidei, stylohyoidei, coracobrachiales, u. s. w.

von der Wirkung: Mm. flexores, extensores, abductores, adductores, levatores, sphincteres, u. s. w.

In der folgenden Beschreibung der einzelnen Muskeln verden diese nach der Ordnung der Körperabtheilungen und Gegenden, und ihrer oberflächlicheren und tieferen Schichten ufgeführt: von den paarweise vorhandenen Muskeln im- ner nur einer beschrieben, die unpaaren aber ausdrücklich ls solche bezeichnet.

Muskeln am Kopfe.

29 Paare, 2 unpaare Muskeln.

Auf dem Schädelgewölbe liegt eine dünne Fascia, Ga- ea aponeurotica capitis, an' deren hinteren und vorderen nde die Mm. occipitalis und frontalis sich befestigen. etzterer nimmt die Mitte der Stirn ein. Am unteren heile der Stirn und in der Augengegend vor der Augenhöhle iegt der M. corrugator supercilii und M. orbicularis pal- ebrarum; in der Augenhöhle selbst eigenthümliche Mus- keln der Augenlieder und des Augapfels.

Die Nase wird oberwärts, seitwärts und unterwärts, so dafs nur ihre Spitze frei bleibt, von den Nasenmuskeln um- geben: nämlich von den Mm. levator labii superioris alaeque nasi, pyramidalis nasi, compressor nasi, depressor alae nasi, und depressor septi mobilis. Weiter unten in der Mundgegend bildet der M. orbicularis oris eine Vereinigungsstelle der meisten Gesichtsmuskeln; oberhalb des M. orbicularis oris in der Augen- und Wangengegend liegen die Mm. levator labii superioris proprius, zygomatici, und levator anguli

oris: seitwärts in der Backengegend die Mm. risorius Santorini nnd buccinator; unter dem M. orbicularis oris in der Kinngegend die Mm. depressor anguli oris, depressor labii inferioris, und levator menti: — alle diese, mit Ausnahme des letztgenannten, laufen gegen die Mundspalte hin, und vermischen sich mit dem M. orbicularis oris. An der Seitenwand des Schädels, in der Schläfen- und Ohrgegend findet sich die starke Fascia temporalis; oberhalb, vor und hinter dem äufseren Ohre die Mm. auriculares superior, anterior und posteriores, oder attollens, anterior, und retrahentes auriculae; am Ohre selbst kleine eigenthümliche Muskeln desselben. Die Schläfengrube wird vom M. temporalis ausgefüllt. Der Raum zwischen dem Jochbogen, dem hinteren Theil beider Kiefer, und dem Proc. pterygoideus, wird von dem M. masseter, dem hinteren Theil des M. buccinator, und den Mm. pterygoidei ausgefüllt: erstere beide werden von der dünnen Fascia buccalis überzogen, letztere von dem Ramus maxillae inferioris verdeckt. Die Muskeln in der Regio submaxillaris an der unteren Seite des Gesichts und Schädels bis zum Hinterhaupt loch werden theils gemeiniglich zu den Halsmuskeln gerechnet, theils gehören sie der Zunge, dem Gaumen, Schlundkopf und dem inneren Gehörorgan eigenthümlich an: die Muskeln am hinteren Theile der Basis cranii werden mit den Nackenmuskeln betrachtet.

Galea aponeurotica capitis, die Sehnenhaube, eine breite dünne unpaar vorhandene Fascia, bedeckt das Schädelgewölbe, hängt fester mit dem Unterhautzellgewebe, aber nur locker mit dem Pericranium zusammen; sie erstreckt sich von den Tubera frontalia bis zum vorderen Theile des Hinterhaupts und heftet sich seitwärts an die Lineae semicirculares, woselbst sie mit den Fasciae temporales zusammenfliefst.

M. frontalis, Stirnmuskel: platt, dünn, unterwärts schmaler; entspringt von der Nasenwurzel, der Glabella und dem Arcus superciliaris, breitet sich über dem Tuber frontale aus, und geht in die Galea aponeurotica über.

M. occipitalis, Hinterhauptmuskel; dünn, platt, viereckig, breiter als lang; entspringt von der Linea semicir-

ularis sup. oss. occipitis, steigt aufwärts, und verliert sich ehnig in der Galea aponeurotica.

Beide spannen die Galea aponeurotica an, ziehen dieelbe und die Kopfhaut abwechselnd nach vorn und hinten; er Stirnmuskel runzelt die Stirnhaut mit Queerfalten. Der og. M. epicranius ist der M. frontalis und occipitalis mit er Galea aponeurotica vereint, als zweibäuchiger Muskel etrachtet, indem die Galea als Tendo intermedius angesehen wird.

M. orbicularis palpebrarum s. sphincter palpebrarum, ring- oder Schliefsmuskel der Augenlieder. Dünn, platt, und, scheibenförmig; liegt unter der Haut auf den Rändern der Augenhöhlen und in den Augenliedern, die Augenliedspalte umgebend. Entpringt vor der Fossa lacrymalis von der oberen und unteren Fläche des Lig. palpebrale internum, von der Pars nasalis oss. frontis und Proc. nasalis des Oberkieferbeins; und läuft oberhalb und unterhalb der Augenliedspalte gegen den äufseren Augenwinkel hin, woselbst seine Bündel durch Aneinanderlegen sich vereinigen. Man unterscheidet an ihm eine äufsere und innere Lage, stratum externum et internum; erstere liegt auf den Rändern der Augenhöhle, und besteht aus dickeren rötheren stark gekrümmten Bündeln; letztere liegt unmittelbar unter der Haut der Augenlieder selbst, und enthält dünnere blassere weniger gebogene Bündel: die beinahe geraden Fasern an den Augenliedrändern werden zuweilen M. ciliaris, Wimpermuskel, genannt. — Er schliefst die Augenliedspalte; bei starker Contraction runzelt er die Haut derselben, und übt gelinden Druck auf den Augapfel aus.

M. corrugator supercilii, Augenbrauenrunzler; länglich dreieckig oder viereckig und platt, liegt auf dem inneren Ende der Arcus superciliaris, vom M. frontalis bedeckt; entspringt von der Glabella; geht nach aufsen, und zwischen M. frontalis und orbicularis palpebrarum, mit welchen er zusammenhängt, in die Haut der Augenbraue über. Runzelt die Augenbraue und Stirn mit Längenfalten, zieht die Augenbraue etwas herab.

Über die Muskeln in der Augenhöhle s. die Beschreibung des Auges.

M. orbicularis s. sphincter oris, Ring- oder Schliefsmus-

kel des Mundes, umgiebt als ein unpaarer länglicher breiter Ring die Mundspalte, und liegt zwischen der äufseren und inneren Hautplatte der Lippen, mit der ersteren sehr genau verbunden. Seine innere tiefere Lage besteht aus regelmäfsig concentrischen halbovalen Fasern, und ist durch vier kleine Muskelbündel, *Mm. incisivi superiores et inferiores,* an die Juga alveolaria der zweiten Schneidezähne beider Seiten geheftet. Die Fasern der äufseren oberflächlichen Lage verschlingen sich vielfach mit den Enden der von allen Seiten her zur Mundspalte laufenden Muskeln. Er schliefst den Mund, spitzt ihn zu durch verhältnifsmäfsig stärkere Contraction der an den Mundwinkeln liegenden Fasern: vermittelst der Mm. incisivi drückt er die Lippen an die Zähne.

M. levator labii superioris alaequae nasi, Aufheber der Oberlippe und des Nasenflügels, liegt an der Seitenwand der Nase; entspringt schmaler und dicker von der Nasenwurzel, mit dem M. frontalis zusammenhängend; wird im Herabsteigen breiter, und spaltet sich in zwei platte Lagen: die innere geht an die Knorpel und die Haut des Nasenflügels, die äufsere an die Haut und das Muskelfleisch der Oberlippe. Zieht die Oberlippe und den Nasenflügel in die Höhe, letzteren auch nach aufsen, wodurch das Nasenloch erweitert wird.

M. compressor nasi s. triangularis, Zusammendrücker der Nase; platt, dreieckig, entspringt von der Superficies facialis oss. maxillaris superioris neben dem Nasenflügel, woselbst er von dem vorigen bedeckt wird, und oft mit ihm zusammenhängt; und geht oberhalb des Nasenflügels mit einer dünnen Aponeurose über die Seitenwand und den Rücken der Nase, woselbst er mit dem der anderen Seite zusammenfliefst. Drückt die Nase nieder und oberhalb der Nasenflügel etwas zusammen, erweitert dadurch die Nasenlöcher.

M. pyramidalis nasi s. procerus, Pyramidenmuskel der Nase, ein dünner von der Nasenwurzel bis zur Mitte des Nasenrückens herabsteigender Muskel; entspringt von der Nasenwurzel, geht in die Nasenhaut über, und zieht diese in die Höhe. Ist meistens mit dem M. frontalis und compressor nasi verwachsen, und fehlt häufig.

M. depressor alae nasi, Niederzieher des Nasenflügels; latt, länglich, viereckig, vom M. orbicularis oris und le- ator labii super. alaeque nasi bedeckt; mit dem über ihm iegenden M. compressor nasi verwachsen; entspringt vom ugum alveolare des Eckzahns, geht aufwärts und nach in- en an Haut und Knorpel des Nasenflügels; zieht diesen erab, und verengert das Nasenloch in queerer Richtung.

M. depressor septi mobilis narium s. nasalis labii inferio- is, Niederzieher der Nasenscheidewand; platt und drei- ckig, geht aus der oberflächlichen Lage des M. orbicula- is oris in der Oberlippe hervor, und steigt einwärts in ie Höhe zum unteren Rande der Nasenscheidewand: zieht iese und die Nasenspitze herab, verkürzt das Nasenloch.

M. levator labii superioris proprius, eigener Aufheber er Oberlippe; platt und ungleich viereckig, oben breiter ls unten: entspringt vom ganzen Margo infraorbitalis, woselbst er von der äufseren Lage des M. orbicularis pal- ebrarum bedeckt wird: steigt sodann herab, indem er vom äufseren Rande des M. levator labii super. alaeque nasi zum Theil bedeckt wird; und verliert sich in den M. orbicularis oris und an die Haut der Oberlippe: zieht diese in die Höhe.

M. zygomaticus minor, kleinerer Jochbeinmuskel: ein dünner länglich rundlicher Muskel, liegt neben dem vorigen nach aufsen; entspringt von der Superficies facialis ossis zygomatici und von den Fasern des unteren Randes des M. orbicularis palpebrarum, und steigt zur Haut der Oberlippe und zum M. orbicularis oris herab. Hebt die Oberlippe. Fehlt zuweilen.

M. zygomaticus major, gröfserer Jochbeinmuskel; läng- lich rund, ist stärker als der vorige und liegt weiter nach aufsen; entspringt von der äufseren Fläche des Jochbeins, vom M. orbicularis palpebrarum bedeckt; steigt schräg nach innen zum Mundwinkel herab, woselbst er mit dem M. or- bicularis oris und den Mm. levator und depressor anguli oris sich vereinigt. Zieht den Mundwinkel schräg nach aufsen in die Höhe.

M. levator anguli oris, Aufheber des Mundwinkels; platt länglich, entspringt aus der Fovea maxillaris, wird von den Mm. zygomatici und levator labii superioris be-

deckt, steigt senkrecht zum Mundwinkel herab, woselbst er in den M. orbicularis oris sich verliert. Zieht den Mundwinkel gerade in die Höhe.

M. risorius Santorini, Lachmuskel; platt, dünn, dreieckig; ist die längste der Zacken des Platysma myoides, welche über die Basis maxillae inferioris in das Gesicht heraufsteigen: ist mit seinem unteren breiteren Rande zwischen den Mm. masseter und depressor anguli oris an die Basis maxillae inferioris, und mit dem äufseren Rande an die Fascia parotideo-masseterica geheftet; steigt schräg zum Mundwinkel herauf, und verliert sich zugespitzt in der Haut desselben: zieht ihn nach aufsen, und bringt das Grübchen neben demselben beim Lachen zuwege.

M. depressor anguli oris s. triangularis menti, Herabzieher des Mundwinkels; platt und dreieckig; entspringt breit von der Basis und äufseren Fläche des Unterkiefers; steigt, das Foramen mentale bedeckend, aufwärts bis zum Mundwinkel, woselbst er, schmaler und dicker geworden, mit den Fasern des M. orbicularis oris, des risorius, levator anguli oris und zygomaticus major sich vermischt. Zieht den Mundwinkel herab.

M. depressor labii inferioris s. quadratus menti, Herabziehen der Unterlippe; platt, dünn, rautenförmig: sein hinterer Theil wird vom vorigen bedeckt: entspringt von der Basis maxillae inferioris, zwischen der Protuberantia mentalis externa und dem Foramen mentale; steigt schräg nach innen und vorn herauf, und vereinigt sich mit dem M. orbicularis oris in der Unterlippe: seine obere innere Ecke reicht über die Mittellinie des Kinnes hinüber, und kreuzt und vermischt sich mit derselben Ecke des Muskels der anderen Seite. Zieht die Unterlippe herab.

M. levator menti, Aufheber des Kinns, kurz, dick und kegelförmig; entspringt von dem vorigen bedeckt vom Jugum alveolare des unteren Eckzahns, läuft nach innen in dem Raume zwischen den beiden Mm. depressores labii inferioris zum Kinn herab, fliefst hier mit dem der anderen Seite zusammen, und geht in die Haut des Kinnes über, welche er aufhebt und runzelt.

Fascia buccalis, die Fascia der Backengegend, ist eine dünne zellulös fibröse in zwei Blätter gespaltene Fascia,

welche an der Seite des Gesichts über die oberflächlichen und tiefen Muskeln ausgebreitet ist. Ihr oberflächliches Blatt, *Fascia parotideo-masseterica*, bedeckt die Ohrspeicheldrüse (Glandula parotis) und den M. masseter; hängt oberwärts am Arcus zygomaticus mit der Fascia temporalis zusammen, hinterwärts mit den sehnigen und knorpeligen Theilen des äufseren Ohres, und unterwärts an der Basis und Angulus maxillae inferioris mit dem oberflächlichen Blatt der Fascia cervicalis: vorne biegt sie sich über den vorderen Rand des M. masseter nach innen, wickelt den Ductus Stenonianus ein, und vereinigt sich mit dem vorderen Theile des tiefen Blattes. — Das tiefe Blatt, *Fascia buccopharyngea*, wird vom M. masseter und pterygoideus internus bedeckt; ihr mittlerer Theil ist zwischen Hamulus pterygoideus und den hinteren Enden der Limbi alveolares, hinter den letzten Backenzähnen des Ober- und Unterkiefers, ausgespannt; ihr vorderer Theil überzieht sehr genau die äufsere Fläche des M. buccinator, fliefst mit der Fascia parotideo-masseterica zusammen, und verliert sich sehr verdünnt am Mundwinkel: ihr hinterer stärkerer und mehr fibröser Theil geht an der inneren Fläche des M. pterygoideus internus, woselbst sie durch das Lig. stylomaxillare (S. 81.) verstärkt wird, über die Seitenwand des Pharynx, verbindet sich oberwärts mit dem M. tensor veli palatini, durch welchen sie angespannt werden kann; und reicht bis zur Tuba Eustachii und der Wurzel des Proc. styloideus: unterwärts fliefst sie mit dem tiefen Blatt der Fascia cervicalis zusammen. Sie hilft die Seitenwand der Mundhöhle und des Pharynx bilden.

M. buccinator, Backen- oder Trompetermuskel; platt, ziemlich dünn, länglich viereckig, liegt zwischen dem Ober- und Unterkiefer in der Richtung von hinten nach vorn: sein vorderer Theil neben dem Mundwinkel liegt oberflächlicher, vom M. levator anguli oris, zygomaticus major, risorius und depressor anguli oris bedeckt: sein hinterer Theil aber tiefer vom M. masseter und einem dicken Fettklumpen verdeckt. Mit seinem hinteren Rande entspringt er von der Fascia buccopharyngea zwischen Hamulus pterygoideus und dem hinteren Ende des Limbus alveolaris des Unterkiefers; mit dem oberen Rande von der Aufsen-

fläche des Proc. alveolaris des Oberkieferbeins, mit seinem unteren Rande von der Linea obliqua externa maxillae inferioris: der vordere Rand geht in den M. orbicularis oris und die übrigen am Mundwinkel endigenden Muskeln über. Seine äufsere Fläche wird von der Fascia buccalis, seine innere Fläche von der Mundschleimhaut überzogen: etwas vor und oberhalb seines Mittelpunkts, neben dem dritten oberen Backenzahn, enthält er eine Spalte zum Durchgange des Ductus Stenonianus. Er zieht den Mundwinkel stark nach aufsen: bei gänzlicher oder theilweiser Schliefsung der Mundspalte aber drückt er die Backen an die Zahnreihen, verengert dadurch die Mundhöhle, und wirkt auf solche Weise beim Kauen, Schlingen, Pfeifen, Blasen, Ausspeien, Ausspritzen.

Fascia temporalis s. Aponeurosis temporalis, die Schläfenfascie, ist sehr stark, durchaus fibrös, aus einem oberflächlichen und tiefen Blatt gebildet, welche nur von Zellgewebe, Fett und Gefäfsen getrennt werden. Sie ist zwischen dem Arcus zygomaticus, dem Proc. zygomaticus ossis frontis und der ganzen Linea semicircularis der Seitenwand des Schädels ausgespannt, hängt an der letzteren mit der Galea aponeurotica capitis zusammen, und verschliefst die Schläfengrube nach aufsen vollständig.

M. auricularis superior s. attollens auriculae, oberer oder Aufhebemuskel des Ohrs, ein dünner platter Muskel, dessen oberer Rand bogenförmig sich krümmt: ist oberwärts breiter und dünner, unterwärts schmaler und dicker. Er liegt oberhalb des Ohrs auf der Fascia temporalis, entspringt von dieser und der Linea semicircularis, und heftet sich mit einer kurzen Sehne an die obere vordere (der Fossa triquetra entsprechende) Wölbung der hinteren Fläche des Ohrknorpels. Zieht das Ohr in die Höhe und nach vorn.

M. auricularis anterior s. attrahens auriculae, vorderer Ohrmuskel oder Anzieher des Ohrs; ein kleiner plattlänglicher Muskel, liegt über dem Arcus zygomaticus und unter dem vorigen: entspringt von der Fascia temporalis, und geht rückwärts zum vorderen Ende des Helix. Zieht das Ohr nach vorn.

Mm. auriculares posteriores s. retrahentes auriculae, hintere Ohrmuskeln, Rückwärtszieher; zwei bis drei kleine längliche Muskeln, hinter dem Ohre; entspringen von der äufseren Fläche der Pars mastoidea oss. temporum, nahe oberhalb des Proc. mastoideus, laufen horizontal nach vorn, und heften sich an der hinteren Fläche des Ohrs an die der Concha entsprechende Wölbung. Ziehen das Ohr rückwärts, vertiefen die Concha.

Die eigenen Muskeln des Ohrknorpels und der Gehörknöchelchen s. b. d. Gehörorgan.

M. temporalis s. crotaphites, Schläfemuskel, ist platt aber stark, in seinem oberen von einem bogenförmigen Rande umgebenen Theile breiter und dünner, unterwärts schmaler und dicker. Liegt am Planum semicirculare und in der Schläfengrube, von der Fascia temporalis und dem Arcus zygomaticus bedeckt. Entspringt von der Linea semicircularis, dem Planum semicirculare, der inneren und vorderen Wand der Fossa temporalis, und von der inneren Fläche der Fascia temporalis: die Fasern laufen convergirend herab, und vereinigen sich in einer kurzen starken Sehne, welche an den Proc. coronoideus maxillae inferioris sich heftet, denselben beinahe vollständig umgiebt, und an dessen vorderen Rande bis zum Ende der Linea obliqua externa hinabreicht. Er zieht den Unterkiefer herauf, nähert ihn dem Oberkiefer, wirkt beim Beifsen und Kauen.

M. masseter, Kaumuskel, ist länglich viereckig, kurz, dick und sehr stark; liegt vor dem Ohre zwischen Jochbogen und Unterkiefer, hinten von der Gland. parotis, unten vom oberen Rande des Platysma myoides, übrigens von der Fascia parotideo-masseterica bedeckt. Er besteht aus zwei Schichten, welche beide vom Jochbogen entspringen, und zwischen welchen zuweilen ein kleiner Schleimbeutel liegt. Die äufsere längere und breitere Schicht entspringt vom unteren Rande des vorderen und mittleren Theils des Arcus zygomaticus mit Sehnenbündeln, welche sich zackenförmig weit nach unten in den fleischigen Bauch erstrecken; läuft abwärts und etwas rückwärts, und heftet sich sehnig an die äufsere Fläche des Ramus, den hinteren Theil der Basis, und den Angulus maxillae inferioris. Die

innere kürzere Schicht kommt schräg vom hinteren Theile des unteren Randes und der inneren Fläche des Arcus zygomaticus, läuft abwärts und etwas vorwärts und heftet sich, theils sehnig, theils fleischig, an die äufsere Fläche des Ramus maxillae inferioris, unter der Incisura semilunaris, und oberhalb der äufseren Schicht, welche die untere Hälfte der inneren verdeckt. Zieht die Unterkinnlade in die Höhe, und zwar vermittelst der äufseren Schicht zugleich etwas nach vorn, vermittelst der inneren zugleich etwas nach hinten.

M. pterygoideus internus, innerer Flügelmuskel; länglich viereckig, dick und stark, jedoch schwächer als der M. masseter. Liegt an der inneren Seite des Ramus maxillae inferioris, entspringt mit Fleisch- und Sehnenfasern aus der ganzen Fossa pterygoidea, steigt schräg von oben und innen nach unten und aufsen, und etwas nach hinten herab; und heftet sich, mit starken Sehnenbündeln durchwachsen, an die innere Fläche des Ramus maxillae inferioris, nach oben bis zum Foramen maxillare posterius, nach unten und hinten bis zur Basis und zum Angulus dieses Knochens hin. Beide Mm. pterygoidei interni ziehen den Unterkiefer in die Höhe und nach vorn, einer allein nach der entgegengesetzten Seite hin.

M. pterygoideus externus, äufserer Flügelmuskel: kegelförmig, kleiner als der vorige und gröfstentheils fleischig; liegt vor dem oberen Theile des M. pterygoideus internus in der Richtung von innen nach aufsen und vorn nach hinten, und kreuzt sich in schräger Richtung mit dem M. pterygoideus internus. Entspringt breit und oft mit einer oberen und unteren getrennten Portion von der äufseren Fläche der Lamina externa proc. pterygoidei, vom Proc. pyramidalis oss. palatini, vom Tuber maxillare und der unteren Fläche der Ala magna oss. sphenoidei, und inserirt sich in der Fovea proc. condyloidei des Unterkiefers. Beide zusammen ziehen den Unterkiefer nach vorn, einer allein nach vorn und nach der entgegengesetzten Seite.

Die Muskeln der Regio submaxillaris und subauricularis s. bei den Halsmuskeln: die der Zunge und des Gaumens bei der Beschreibung der Mundhöhle.

Muskeln an der vorderen und den Seitenflächen des Halses.

26 Muskelpaare, ein unpaarer Muskel.

Sie zerfallen in eine oberflächliche und eine tiefe chicht. Erstere liegt theils oberhalb des Zungenbeins in er Regio submaxillaris und subauricularis; theils unterhalb des Zungenbeins, zwischen diesem und dem Brustein und den Knochen der Schulter, vor dem Kehlkopfe, chlundkopfe, der Luft- und Speiseröhre. Sie enthält auf der Seite zunächst unter den allgemeinen Bedeckungen as Platysma myoides oder den M. subcutaneus colli, und nter diesem den M. sternocleidomastoideus: beide bedecken einen grofsen Theil der übrigen Halsmuskeln. Oberhalb des Zungenbeins, zwischen diesem und dem Unterkiefer und der Basis cranii, finden sich die Mm. digastricus axillae inferioris, stylohyoideus, mylohyoideus und geniohyoideus, und ein grofser Theil der eigenthümlichen Zungen- und Schlundkopfmuskeln. Unterhalb des Zungenbeins, wischen diesem und dem Thorax und der Schulter, liegen die Mm. sternohyoideus, sternothyreoideus, thyreohyoideus nd omohyoideus; aufserdem die besonderen Muskeln des Kehlkopfs zwischen den einzelnen Knorpeln desselben, und ie in den Wänden des unteren Theiles des Schlundkopfs befindlichen Muskeln. — Die tiefe Schicht der Halsmuskeln liegt, von der oberflächlichen Schicht, dem Kehlkopf, Schlundkopf, der Luft- und Speiseröhre bedeckt, genau n der vorderen und Seitenfläche der Wirbelsäule, läfst ber die Mitte des Lig. longitudinale anterius unbedeckt, nd ist an die Wirbel, an die Basis cranii und an die obersten Rippen geheftet: sie enthält die Mm. rectus capitis anterior major und minor, longus colli, und scalenus anterior, medius und posticus.

Zwischen den Halsmuskeln zeigen sich auf jeder Seite zwei tiefere Muskelgruben. Die obere derselben, *Trigonum cervicale* genannt, ist dreieckig mit nach unten gerichteter Spitze: sie wird oberwärts vom hinteren Bauche des M. digastricus maxillae inferioris, vorn von dem oberen Bauche des M. omohyoideus, hinten von dem vorderen Rande des

M. sternocleidomastoideus begränzt; und ihr Boden vom Kehlkopf, Schlundkopf und den Mm. rectus capitis anterior major und longus colli gebildet. Die untere Grube, *Fossa supraclavicularis,* liegt weiter nach hinten und unten, und ist gleichfalls dreieckig, aber geräumiger und tiefer, wird indessen nach oben flacher: unterwärts wird sie von dem Schlüsselbein, vorn vom hinteren Rande des M. sternocleidomastoideus, hinten vom vorderen Rande des M. cucullaris begränzt; und ihr Boden von der ersten Rippe, den Mm. scaleni, weiter nach oben auch vom M. levator scapulae und splenius colli gebildet. Am mittleren unteren Theile der Vorderfläche des Halses zeigt sich eine dritte unpaare nach unten schmalere und tiefere Grube, *Jugulum*, welche seitwärts von den vorderen Rändern beider Mm. sternocleidomastoidei, unterwärts von dem Ligamentum interclaviculare, rückwärts von den Mm. sternohyoidei und sternothyreoidei begränzt wird.

Die Halsmuskeln werden nicht allein von einer schwach entwickelten Fascia superficialis überzogen, sondern noch genauer von einer eigenen fibröszelligen Muskelbinde, *Fascia cervicalis* s. colli, umhüllt, welche am unteren Theile des Halses stärker, und an den meisten Stellen in ein oberflächliches und ein tiefes Blatt gespalten ist. Diese Blätter sind am Zungenbein und am Larynx mit einander verwachsen, an anderen Stellen wiederum mehrfach gespalten, und bilden durch diese Anordnung um einzelne Muskeln vollständige Scheiden. Auf dem oberflächlichen Blatte liegt das Platysma myoides, an dessen Rändern und innerer Fläche dieses Blatt sich nach oben über das Trigonum cervicale, über die Mm. digastricus, mylohyoideus, die Glandula submaxillaris und die Basis maxillae inferioris bis in das Gesicht erstreckt, und mit der Fascia parotideo-masseterica zusammenfliefst, auch über die Aufsenflächen des M. sternocleidomastoideus bis in die Gegend hinter dem Ohre hinaufreicht: weiter unten überzieht es die Mm. sternohyoideus, sternothyreoideus, thyreohyoideus und den oberen Bauch des M. omohyoideus, wickelt den M. sternocleidomastoideus ein; ist zwischen dem hinteren Rande dieses Muskels und dem vorderen Rande des M. cucullaris ausgespannt, und bedeckt die Fossa supraclavicularis, und endigt

m Lig. interclaviculare und dem oberen Rande des Schlüs-
elbeins. — Das tiefe Blatt geht oberwärts auf dem Boden
es Trigonum cervicale, an der inneren Seite der durch
iese Grube laufenden grofsen Gefäfse, der Mm. digastricus
nd stylohyoideus und der Glandula submaxillaris, aber
enau an der äufseren Fläche des M. mylohyoideus, bis zur
inea obliqua interna maxillae inferioris hinauf, verbindet
ich mit dem Lig. stylomaxillare und stylohyoideum und
er Fascia buccopharyngea: unten reicht es bis zur ersten
ippe, überzieht die Mm. scaleni und überhaupt den Boden
er Fossa supraclavicularis; wickelt den unteren Bauch des
M. omohyoideus ein, an dessen Tendo intermedius es ge-
auer geheftet ist; geht an der inneren Seite des M. sterno-
leidomastoideus nach vorn und spaltet sich hier noch ein-
nal; und geht alsdann theils an der inneren Fläche des
M. sternothyreoideus vor der Schilddrüse und Luftröhre
is zur hinteren Fläche des Manubrium sterni und des er-
ten Rippenknorpels herab, woselbst es mit der Membrana
terni (nicht aber mit dem Herzbeutel) verschmilzt: theils
iberzieht es die Mm. rectus capitis anterior major und
ongus colli, und endigt im Lig. longitudinale anterius der
Wirbelsäule.

A. Oberflächliche Schicht.

Platysma myoides s. M. subcutaneus s. latissimus colli, die fleischige Platte oder Hautmuskel des Halses, ist ein länglich viereckiger platter sehr dünner Muskel an der Seitenfläche des Halses, welcher schräg vom Schlüsselbein bis in das Gesicht hinaufsteigt, und an seiner inneren Fläche mit dem oberflächlichen Blatte der Fascia cervicalis, an seiner äufseren Fläche mit der Fascia superficialis und dem Panniculus adiposus genau verbunden ist. Er entsteht mit zerstreueten Bündeln unterhalb des Schlüsselbeins in der Brust- und vorderen Schultergegend, steigt schräg aufwärts und einwärts über das Schlüsselbein an den Hals, dessen vordere Fläche aber nicht von ihm bedeckt wird, und über den Unterkiefer in das Gesicht hinauf; woselbst seine Bündel zackig sich zerstreuen, und den unteren Rand der Glandula parotis, der Mm. masseter, depressor anguli oris und depressor labii inferioris bedecken, und mit der Fascia

parotideo-masseterica und der Gesichtshaut sich verbinden. Die längste Zacke seines oberen Randes ist der M. risorius Santorini. (S. 218.) Seine obere innere Ecke in der Kinngegend berührt die des Muskels der anderen Seite und durchkreuzt sich oft mit ihr. Er runzelt die Haut des Halses, und spannt das oberflächliche Blatt der Fascia cervicalis und buccalis an.

M. sternocleidomastoideus, Kopfnicker; ein starker, langer, plattrundlicher, zweiköpfiger Muskel, liegt unterwärts mehr an der Vorderfläche, oberwärts mehr an der Seitenfläche des Halses, von dem oberflächlichen Blatte der Fascia cervicalis eingewickelt. Sein vorderer mehr oberflächlich liegender Kopf, Caput sternale s. M. sternomastoideus, entspringt sehnig von der Vorderfläche des Manubrium sterni, das Brustbeinschlüsselgelenk bedeckend; der hintere gleichfalls sehnige Kopf, Caput claviculare s. M. cleidomastoideus, von der Extremitas sternalis claviculae; beide vereinigen sich zu einem plattrunden Bauche, gewöhnlich in der Mitte des Halses, selten früher, zuweilen später. Dieser steigt an der Seite des Halses schräg nach hinten hinauf, und heftet sich mit einer kurzen starken platten Sehne an den ganzen äufseren Umfang des Proc. mastoideus. Beide Mm. sternocleidomastoidei beugen den Kopf gerade nach vorn; einer allein neigt den Kopf schräg nach vorn, das Gesicht nach der entgegengesetzten Seite wendend. Bei aufgerichtet fixirtem Kopfe zieht er das Brust- und Schlüsselbein aufwärts.

M. digastricus s. biventer maxillae inferioris, zweibäuchiger Kiefermuskel: läuft im Allgemeinen queer und etwas nach unten gebogen unter dem Unterkiefer. Der hintere längere Bauch ist länglich rundlich, entspringt aus der Incisura mastoidea, läuft schräg nach vorn und unten zum Zungenbein, und geht in einen dünnen runden Tendo intermedius über. Dieser wird durch einen von beiden Blättern der Fascia cervicalis gebildeten sehnigen Streifen, welcher oft ringförmig ist und einen kleinen Schleimbeutel enthält, an das Ende der Basis und Anfang des Cornu majus ossis hyoidei geheftet. Der vordere kürzere aber stärkere platte Bauch beginnt von dem Tendo intermedius und zum Theil von der Basis oss. hyoidei selbst, wird durch

lie hier stark entwickelte Fascia cervicalis mit dem der nderen Seite genau verbunden, und geht vorwärts und ufwärts zur Basis maxillae inferioris unter der Spina mentalis interna. — Er zieht die Unterkinnlade herab, wenn das Zungenbein durch die dasselbe herabziehenden Muskeln ixirt ist: im entgegengesetzten Falle zieht er das Zungenbein nach oben, und zwar mehr nach hinten oder nach vorn, je nachdem sein hinterer oder vorderer Bauch allein wirkt.

M. stylohyoideus, Griffelzungenbeinmuskel; dünn, länglich rundlich, läuft nahe oberhalb und vor dem hinteren Bauche des M. digastricus und beinahe parallel mit demselben: entspringt sehnig von der Mitte des Proc. styloideus, und inserirt sich an das Ende der Basis oder an das Cornu minus des Zungenbeins. Nahe vor seiner Insertion bildet er gemeiniglich eine Spalte, durch welche der Tendo intermedius des M. digastricus läuft: seltener geht der erstere an der inneren Seite der letzteren vorbei. Er zieht das Zungenbein aufwärts und rückwärts.

M. mylohyoideus, Kieferzungenbeinmuskel, ist breit und platt, wird zum Theil von dem vorderen Bauche des M. digastricus, über welchem er liegt, von unten her bedeckt, und füllt den Raum zwischen Unterkiefer und Zungenbein vorzüglich aus. Entspringt von der Linea obliqua interna maxillae inferioris, und zwar von der Spina mentalis interna an bis unterhalb des letzten Backenzahns: seine Fasern laufen convergirend, theils schräg, theils queer, zur Basis oss. hyoidei, an deren vorderer Fläche sie sich befestigen: die inneren Ränder beider Mm. mylohyoidei aber vereinigen sich mit einander durch einen sehnigen Streifen in der Mittellinie zwischen Kinn und Basis oss. hyoidei. — Er zieht das Zungenbein in die Höhe; oder, wenn dieses fixirt ist, die Unterkinnlade herab.

M. geniohyoideus, Kinnzungenbeinmuskel, ist länglich dreieckig und platt, liegt über dem M. mylohyoideus, durch welchen er von der unteren Seite her völlig verdeckt wird: entspringt sehnig von der Spina mentalis interna, und setzt sich mit einem breiteren Rande an die Vorderfläche der Basis oss. hyoidei. Zieht das Zungenbein nach vorn und oben, oder den Unterkiefer herab.

M. sternohyoideus, Brustzungenbeinmuskel; sehr länglich platt, liegt von allen Muskeln unterhalb des Zungenbeins am Meisten nach vorn, so dafs die inneren Ränder beider M. sternohyoidei einander beinahe berühren. Entspringt von der hinteren Fläche des Manubrium sterni, des Brustsbeinschlüsselgelenks, und zuweilen der des ersten Rippenknorpels; steigt aufwärts und etwas nach innen, und setzt sich verschmälert an den unteren Rand der Basis des Zungenbeins: zieht dasselbe herab.

M. sternothyreoideus, Brustbeinschildmuskel, ist breiter, dünner und kürzer als der vorige, von welchem er gröfstentheils bedeckt wird: entspringt breit von der hinteren Fläche des Manubrium sterni und ersten Rippenknorpels, steigt gerade aufwärts und wird schmaler, reicht mit seinem inneren Rande bis an die Mittellinie des Halses, so dafs er den der anderen Seite berührt: und setzt sich an die äufsere Fläche der Seitenplatte des Schildknorpels (Cartilago thyreoidea), welchen er herabzieht.

M. thyreohyoideus s. hyothyreoideus, Schildzungenbeinmuskel, ist länglich viereckig, platt, und gewissermafsen eine Fortsetzung des M. sternothyreoideus: er entsteht theils unmittelbar aus dem oberen Ende des letzteren, theils von der äufseren Fläche der Seitenplatte der Cartilago thyreoidea: und geht aufwärts zum unteren Rande der Basis und des Cornu majus des Zungenbeins.

Der M. sternothyreoideus allein zieht den Kehlkopf, der M. thyreohyoideus das Zungenbein herab, und nähert letzteres dem Schildknorpel: vereint ziehen sie den ganzen Kehlkopf und das Zungenbein abwärts. Ist das Zungenbein durch die dasselbe aufwärts ziehenden Muskeln der Regio submaxillaris fixirt, so zieht der M. thyreohyoideus allein den Kehlkopf aufwärts.

M. omohyoideus s. coracohyoideus s. costohyoideus, Schulterzungenbeinmuskel, ein langer schmaler platter zweibäuchiger Muskel. Der untere oder hintere Bauch entspringt vom oberen Rande des Schulterblatts, öfters auch vom Lig. transversum scapulae; vom M. cucullaris bedeckt; läuft durch die Fossa supraclavicularis, hinter und über dem Schlüsselbein und vor den Mm. scaleni, schräg nach vorn und oben; geht in den dünnen platten Tendo inter-

medius über, welcher vom M. sternocleidomastoideus bedeckt wird, mit diesem sich kreuzt, und mit beiden Blättern der Fascia cervicalis verwachsen ist. Vom vorderen Ende des Tendo intermedius, hinter dem vorderen Rande des M. sternocleidomastoideus, beginnt der kürzere obere oder vordere Bauch des Muskels, welcher schräg nach oben und vorn zur Basis oss. hyoidei aufsteigt; an deren unterem Rande, neben dem M. sternohyoideus nach aufsen, er sich inserirt, und den M. thyreohyoideus bedeckt. Er zieht das Zungenbein abwärts und rückwärts, und spannt die Fascia cervicalis an.

Öfters findet sich ein überzähliger kleiner plattrundlicher Muskel, *M. coracocervicalis*, welcher vor dem M. omohyoideus vom Proc. coracoideus entspringt, gebogen nach vorn und oben in die Fossa supraclavicularis, unterhalb des hinteren Bauches des M. omohyoideus, hinaufläuft; und sehnig in die Fascia cervicalis, welche er anspannt, sich verliert.

Die Muskeln des Kehl- und Schlundkopfs s. in der Beschreibung dieser Organe.

B. Tiefere Schicht.

M. rectus capitis anterior major, vorderer gerader Kopfmuskel: lang, schmal und dreieckig, an seinem unteren Ende sehr schmal und spitzig, am oberen Ende breiter und dicker. Liegt an der Vorderseite der Halswirbelsäule: entspringt mit vier sehnigen Zipfeln von den vorderen Höckern der Proc. transversi des dritten bis sechsten Halswirbels, erhält auch oft ein schmales Bündel von dem M. longus colli: steigt nach oben und etwas nach innen; und befestigt sich sehnig an die untere Fläche der Pars basilaris oss. occipitis. Beugt den Kopf nach vorn.

M. rectus capitis anterior minor, kleiner vorderer Kopfmuskel; kurz und viereckig, vom vorigen gröfstentheils bedeckt; entspringt von der vorderen Fläche der Seitenmasse und des Proc. transversus des Atlas, steigt vor dem Kopfgelenke etwas schräg nach innen herauf, und befestigt sich an die Pars basilaris des Hinterhauptbeins und den Fibrocartilago basilaris. Beugt den Kopf nach vorn.

M. longus colli, langer Halsmuskel; dünn, platt, sehr

länglich dreieckig, oben und unten spitzig: sein innerer Rand ist gerade und glatt, die äufseren Ränder gezackt. Liegt weiter nach innen als der M. rectus capitis anterior major, und wird von ihm zum Theil bedeckt; reicht in ziemlich gerader Richtung vom dritten Rückenwirbel bis zum Atlas hinauf. Der untere innere Theil des Muskels entspringt von den Körpern der drei obersten Rückenwirbel und drei untersten Halswirbel; schickt zwei fleischig-sehnige Zipfel nach aufsen an die vorderen Höcker der Proc. transversi des 7n und 6n Halswirbels, und befestigt sich mit vier Zipfeln an die Körper des dritten bis zweiten Halswirbels, von welchen der oberste zum Epistropheus gehende der stärkste ist. Der obere äufsere Theil des Muskels entspringt mit vier Zipfeln von den vorderen Höckern der Proc. transversi des sechsten bis dritten Halswirbels, läuft schräg nach oben und innen, fliefst mit dem gröfseren unteren Theil zusammen und verstärkt diesen, heftet sich aber vorzüglich an das Tuberculum anterius atlantis. Alle Zipfel sind dünn und sehnig. Er beugt die Halswirbel und dreht sie etwas, so dafs die Proc. transversi, an welche er geheftet ist, weiter nach vorn gelangen.

Mm. scaleni, Rippenhalter, sind die dreieckigen, unten breiteren, oben spitzigen Muskeln, welche von den beiden ersten Rippen zu den Halswirbeln aufsteigen, und entweder den Hals seitwärts und nach vorn beugen, oder die ersten Rippen in die Höhe ziehen und halten. Gewöhnlich finden sich drei solcher Muskeln, M. scalenus anterior, medius und posterior; nicht ganz selten aber auch zwei (oder mehrere) überzählige, nämlich zwischen dem vorderen und mittleren ein M. scalenus minimus, und zwischen dem mittleren und hinteren ein M. scalenus lateralis.

M. scalenus anterior, s. anticus s. primus, vorderer Rippenhalter: sehr länglich dreieckig, liegt vor und neben dem M. longus colli und rectus capitis anterior major, mehr nach aufsen als diese; entspringt sehnig vom oberen Rande und der vorderen Fläche der ersten Rippe (von der vorderen Extremität derselben), steigt aufwärts und rückwärts, und heftet sich mit drei Zipfeln an die vorderen Höcker der Proc. transversi des vierten bis sechsten Halswirbels.

M. scalenus medius s. secundus, mittlerer Rippenhalter: tärker als der vorige, liegt hinter ihm und mehr nach ufsen; entspringt breit vom oberen Rande und der äufse- en Fläche der ersten Rippe, und setzt sich mit sieben Zip- eln an die vorderen Höcker der Proc. transversi aller Halswirbel, hinter den Zipfeln der Mm. rectus cap. ante- ior major, longus colli und scalenus anterior.

M. scalenus posterior s. posticus s. tertius, hinterer Rippenhalter: ist der kleinste der drei Rippenhalter und liegt weiter nach hinten, gewöhnlich mit dem M. scalenus medius verwachsen: entspringt vom oberen Rande der zwei- en Rippe, und geht mit zwei bis drei Zipfeln an die Proc. ransversi des fünften bis siebenten Halswirbs.

Muskeln in der Nacken-, Rücken- und Lendengegend.

91 Paare.

Diese liegen in vier Schichten, Strata, über einander, welche aber nicht überall scharf von einander abgegränzt sind, und von der Oberfläche nach der Tiefe, oder von hinten nach vorn, an Breite abnehmen.

Die erste Schicht enthält den M. cucullaris und M. atissimus dorsi, zwei breite platte Muskeln, welche unmit- elbar oder mittelbar durch Fascien vom Kopfe und den Dornfortsätzen der ganzen Wirbelsäule entspringen, zu ler oberen Extremität gehen, und alle übrigen Rücken- nuskeln, die Schulterblätter und die hintere Wand des Thorax bedecken.

Die Muskeln der zweiten Schicht entspringen im All- gemeinen von den Dornfortsätzen, laufen meistens in quee- er Hauptrichtung, indessen mehr oder weniger schräg, nach oben oder unten gerichtet; und setzen sich an den Kopf, die Schultern und Rippen. Hieher gehören die Mm. rhomboideus, levator scapulae, splenius capitis, splenius colli, und die Mm. serrati postici, superior und inferior.

Die Muskeln der dritten Schicht laufen der Länge nach, theils mit der Wirbelsäule parallel, theils schräg, nach oben; und strecken die Wirbelsäule und den Kopf. Sie entspringen überhaupt von den Hüften und den unteren

Abtheilungen der Wirbelsäule, und setzen sich an die Rippen, an höher gelegene Wirbel, und an den Kopf: an den Wirbeln sind sie vorzugsweise an die Proc. transversi befestigt. Man zählt hier den M. sacrospinalis, welcher aus vier Abtheilungen, den Mm. sacrolumbalis und cervicalis adscendens, longissimus dorsi und transversalis cervicis, besteht: ferner die Mm. trachelomastoideus, und complexus et biventer; und von allen vorbenannten bedeckt die Mm. spinalis dorsi und semispinalis dorsi et colli.

Die vierte Schicht enthält einen längeren vielfach gespaltenen Muskel, und eine grofse Anzahl einzelner kleiner Muskeln, welche an jeder Seite den Sulcus posterior columnae vertebralis und die Zwischenräume zwischen den Fortsätzen der Wirbel, bis zum Epistropheus hinauf, vorzüglich ausfüllen: ersterer ist der M. multifidus spinae, letztere sind die Mm. interspinales und intertransversarii. Aufser diesen liegen in dem Raume zwischen Epistropheus und Os occipitis die kleinen Mm. recti capitis lateralis und posteriores, major und minor; und die Mm. obliqui capitis, superior und inferior. Vom Rückentheil der Wirbelsäule gehen die Mm. levatores costarum zu den Rippen.

Die Oberfläche der ersten Schicht wird überhaupt von der Fascia superficialis überzogen: aufserdem findet sich aber die sehr starke fibröse *Fascia lumbodorsalis* vor, welche vorzüglich die dritte Schicht einhüllt, und Ursprungsstellen für die erste und zweite Schicht abgiebt. Sie besteht aus einem hinteren, oberflächlichen, gröfseren und dickeren Blatte; und einem vorderen, tiefer zwischen den Muskeln liegenden, kleineren und schwächeren Blatte. Das *hintere Blatt* ist mit seinem unteren Ende und inneren Rande geheftet an die Processus spurii oss. sacri und die Ligamente auf der hinteren Fläche des Kreuzbeins bis zum Cornu coccygeum herab; an das Labium externum des hinteren Theils der Crista oss. ilium, und an die Proc. spinosi und Lig. apicum der Lenden- und zehn unteren Rückenwirbel: sein äufserer Rand ist theils zwischen der Crista oss. ilium und der zwölften Rippe, an der Gränze der Regio iliaca und lumbaris ausgespannt, theils heftet er sich an die Anguli costarum, und geht unter dem M. rhomboideus an die Basis scapulae und in die Fascien des Schulterblatts über: ober-

ärts reicht dieses Blatt bis zur hinteren Fläche des M. rratus posticus superior, mit dessen aponeurotischem Urrunge es verwächst und in die Fascia nuchae übergeht: in r Kreuz- und Lendengegend liegt es nahe unter der Haut id ist hier sehr stark; weiter nach oben wird es von den m. latissimus dorsi, cucullaris und rhomboideus bedeckt, id merklich dünner und durchsichtiger: es bekleidet geu die hintere Fläche des M. sacrospinalis. — Das *vorre Blatt* ist unten an das Labium internum cristae oss. ium und an das Lig. iliolumbale geheftet, mit dem innen Rande an die Proc. transversi der Lendenwirbel; reicht ich oben nur bis zur zwölften Rippe, und endigt zwischen eser und dem Proc. transversus des ersten Lendenwirbels it einem bogenförmigen Rande, *Arcus tendineus fasciae mbodorsalis* genannt: sein äufserer zwischen Hüftbeinkamm nd zwölfter Rippe ausgespannter Rand verwächst mit dem ufseren Rande des hinteren Blatts. Auf solche Weise bilet die Fascia lumbodorsalis mit den Knochen, an welche e befestigt ist, einen vollständigen ziemlich langen dreickigen Kanal, welcher in der Lenden- und Rückengegend ie dritte und vierte Schicht der Muskeln einschliefst.

In der Nackengegend liegt unter den Mm. cucullaris nd rhomboideus, zwischen diesen und der zweiten Schicht, ie einfache dünne *Fascia nuchae*, welche am vorderen ande des M. cucullaris in die Fascia cervicalis übergeht, i der Mitte des Nackens aber mit der der anderen Seite erwächst, an die Proc. spinosi der Halswirbel sich heftet, nd auf solche Weise das Lig. nuchae bildet.

Die Rücken- und Nackenmuskeln, vorzüglich die der ritten und vierten Schicht, sind häufigen Varietäten unerworfen, indem sie mit bald mehreren, bald wenigeren, Zipfeln entspringen oder sich anheften, daher einen gröseren oder geringeren Umfang haben, auch häufig mit den ächstgelegenen durch fleischige oder sehnige Zwischenündel sich vereinigen.

A. Erste Schicht.

M. cucullaris s. trapezius, Kappenmuskel: ist breit, latt und dünn, von ungleich dreieckiger Gestalt, liegt mit einem längsten Rande an der Wirbelsäule, mit dem der

anderen Seite zusammengränzend und vermittelst des Lig. nuchae verbunden, so dafs beide Muskeln ein ungleichseitiges Viereck (Trapezium) bilden, dessen unterer Winkel am unteren Ende des Rückens spitzig ist, die seitlichen Winkel an den Schultern stumpfer sind, der obere Winkel am Hinterkopf aber queer abgeschnitten erscheint. Er entspringt mit kurzen Sehnenfasern von der Linea semicircularis superior und der Protuberantia occipitalis externa des Hinterhauptbeins, vom Lig. nuchae und dem Lig. apicum bis zum zwölften Rückenwirbel herab: seine oberen Fasern steigen schräg nach aufsen herab, die unteren laufen aufwärts, und die mittleren queer — alle aber gegen die Schulter hin: woselbst der Muskel schmaler und dicker wird, und an das Labium superius der Spina scapulae, an den inneren Rand des Acromion, und an die obere Fläche der Extremitas acromialis claviculae sich inserirt. Er zieht das ganze Schulterblatt stark rückwärts gegen die Wirbelsäule hin; sein oberer Theil allein hebt dasselbe und das Schlüsselbein aufwärts, der untere Theil zieht das Schulterblatt herab: auch strecken beide Muskeln den Kopf.

M. latissimus dorsi, breiter Rückenmuskel; breit, dünn, dreieckig, liegt in der Lenden-, Rücken-, Rippen- und Schulterblattgegend, an seinem oberen inneren Theile von dem vorigen bedeckt. Entspringt von der äufseren Fläche des hinteren Blatts der Fascia lumbodorsalis bis zum achten oder bis zum fünften Rückenwirbel hinauf, und aufserdem mit drei bis vier Dentationen von den drei bis vier untersten Rippen: läuft schräg aufwärts und nach aufsen; wird schmaler und dicker, und geht in eine platte Sehne über, welche um den unteren Rand des M. teres major sich windet, woselbst zwischen beiden zuweilen ein Schleimbeutel liegt; sodann verwächst sie mit der Sehne des M. teres major, und heftet sich mit dieser gemeinschaftlich an die Spina tuberculi minoris oss. brachii (Schleimbeutel). Vermittelst eines dünnen Sehnenstreifens hängt er auch mit der Sehne des M. pectoralis major und mit der Fascia brachii zusammen. Zuweilen geht von seinem oberen Ende ein stärkeres Fleischbündel durch die untere Öffnung der Achselhöhle nach vorn, um sich mit dem M. pectoralis major zu vereinigen.

zieht den Oberarm nach innen (adducirt) und nach hin-
, legt ihn auf den Rücken.

B. Zweite Schicht.

M. rhomboideus, Rautenmuskel: platt, rautenförmig,
n M. cucullaris und latissimus dorsi unmittelbar bedeckt;
springt schräg von den Proc. spinosi der beiden letzten
ls- und vier ersten Rückenwirbel, läuft schräg nach
sen und unten, und inserirt sich an der Basis scapulae,
1 dem Anfange der Spina an bis zum Angulus inferior.
r obere Theil, welcher von den Halswirbeln kommt,
oft in seiner ganzen Länge von dem gröfseren unteren
eil getrennt, und werden beide Theile alsdann als M.
mboideus superior et inferior unterschieden. Er zieht
; Schulterblatt nach innen und hinten gegen die Wirbel-
ıle hin, und nach oben.

M. levator scapulae s. levator anguli scapulae, Schulter-
ttheber; länglich und rundlich; entspringt mit vier
rzen sehnigen Köpfen von den vier ersten Halswirbeln,
d zwar von den hinteren Höckern ihrer Proc. transversi;
igt nach unten und aufsen herab, und befestigt sich an
1 Angulus superior scapulae. Hebt in Gemeinschaft mit
1 Mm. cucullaris und rhomboideus das Schulterblatt in
: Höhe; für sich allein hebt er nur den oberen Winkel,
bei das Acromion und Schultergelenk herabsinkt. Ist
; Schulterblatt befestigt, so zieht er den Hals seitwärts.

M. serratus posticus superior, oberer hinterer Sägemus-
: platt, dünn, rautenförmig; vom M. rhomboideus be-
kt; entspringt mit diesem gemeinschaftlich, und ver-
ttelst einer kurzen Aponeurose, von den beiden untersten
ls- und beiden obersten Rückenwirbeln; steigt schräg
h aufsen und unten herab; und befestigt sich mit vier
ntationen an die zweite bis fünfte Rippe. Zieht diese
ppen nach hinten und oben, erweitert den Thorax beim
nathmen.

M. serratus posticus inferior, unterer hinterer Säge-
ıskel: breiter aber dünner als der vorige; entsteht mit
n M. latissimus dorsi gemeinschaftlich, und von diesem
leckt, vom hinteren Blatte der Fascia lumbodorsalis, in
icher Höhe mit den beiden letzten Rücken- und beiden

ersten Lendenwirbeln, geht auswärts und etwas nach oben zu den vier untersten Rippen, an deren untere Ränder er mit vier breiten fleischigen Zacken sich heftet. Zieht diese Rippen nach aufsen und unten, erweitert beim Einathmen den unteren Theil des Thorax.

M. splenius capitis, Bausch- oder Riemenmuskel des Kopfs: länglich viereckig und platt, aber ziemlich dick; entspringt von den Proc. spinosi des dritten Halswirbels und der folgenden bis zum zweiten Rückenwirbel herab, so dafs sein unteres Ende von den Mm. rhomboideus und serratus posticus superior bedeckt wird: steigt schräg nach oben und aufsen; und heftet sich, unmittelbar unter dem M. cucullaris, mit einem breiten halbmondförmigen sehnigen Rande an die Linea semicircularis superior oss. occipitis und die Pars mastoidea oss. temporum. Ist vorzüglich der Antagonist des M. sternocleidomastoideus: beide M. splenii ziehen den Kopf gerade rückwärts (strecken ihn) und erheben das Gesicht: einer allein zieht den Kopf schräg rückwärts und drehet ihn, so dafs das Gesicht nach oben und nach derjenigen Seite sieht, an welcher der Muskel wirkt.

M. splenius colli, Bausch- oder Riemenmuskel des Halses: sehr länglich, platt und schmal, bildet gewissermafsen den unteren Theil des vorigen; entspringt von den Proc. spinosi des dritten und vierten Rückenwirbels; läuft anfänglich genau am äufseren Rande des M. splenius capitis, windet sich aber in der Mitte des Halses um den äufseren Rand und die vordere Fläche des letzteren nach innen, und heftet sich mit zwei bis drei Zipfeln an die hinteren Höcker der Proc. transversi der zwei bis drei obersten Halswirbel. Zieht den Hals rückwärts und seitwärts und drehet den Atlas mit dem Kopfe; unterstützt also den M. splenius capitis.

C. Dritte Schicht.

M. sacrospinalis s. extensor dorsi communis s. opisthotenar, der gemeinschaftliche Rückgratstrecker, ist ein langer vom Kreuzbein bis zum Halse reichender Muskel, und besteht aus mehreren Abtheilungen, welche gewöhnlich als selbstständige Muskeln betrachtet werden. Seine beiden

ıpttheile sind die anfänglich zu einem gemeinschaftlichen
of und Bauch vereinigten Mm. sacrolumbalis und lon-
ıimus dorsi; jeder derselben hat an seinem oberen Ende
en Anhang, vermittelst dessen er zum Halse hinaufsteigt:
se sind der M. cervicalis adscendens, eine Fortsetzung
M. sacrolumbalis — und der M. transversalis cervicis,
e Fortsetzung des M. longissimus dorsi.

Der gemeinschaftliche dicke und starke Bauch der Mm.
rolumbalis und longissimus dorsi ist in der Fascia lum-
lorsalis wie in einer Scheide eingeschlossen, und entspringt
n Theil von den inneren Flächen ihrer Blätter, vorzüg-
ı aber von der hinteren Fläche des Kreuzbeins, von der
ista oss. ilium und den Proc. spinosi und transversi der
ndenwirbel. Nahe unterhalb der zwölften Rippe spaltet
sich in die genannten Muskeln, welche schmaler und
nner werdend, neben einander bis zum oberen Ende der
nterseite des Brustkastens hinaufreichen. — Der *M. sa-
olumbalis*, äufserer Rückgratstrecker, heftet sich alsdann
t einem stärkeren Fleischbündel an den unteren Rand
r zwölften Rippe, und mit eilf langen schmalen dünnen
hnen, Fasciculi externi m. sacrolumbalis genannt, an die
ıguli der übrigen eilf Rippen; zuweilen reicht auch eine
che Sehne an den Proc. transversus des siebenten Hals-
rbels hinauf. Vor diesen Sehnen und von ihnen bedeckt
gen kürzere fleischige Zacken, Fasciculi interni, welche
n den oberen Rändern der Rippen entspringen, und gro-
ntheils in die Fasciculi externi übergehen, und somit
rzüglich den oberen dünneren Theil des Muskels bilden.
e obersten fünf bis sechs von der sechsten oder fünften
s zur ersten Rippe entspringenden Fleischbündel vereini-
n sich aber zu einem länglichen Muskelbauch, *M. cervi-
lis adscendens* s. descendens, auf- oder absteigender Hals-
uskel genannt; welcher mit drei dünnen Sehnen an die
oc. transversi des sechsten bis vierten Halswirbels sich
festigt, und nach aufsen an den M. scalenus posticus, mit
elchem er oft verwachsen ist, gränzt. — Der *M. longis-
mus dorsi*, innerer Rückgratstrecker, längster Rücken-
uskel, spaltet sich im Aufsteigen in eine Menge kurzer
itziger fleischiger und sehniger Zipfel, Fasciculi externi
interni m. longissimi dorsi; von welchen die äufseren

an die hinteren Flächen und unteren Ränder der Rippen, (mit Ausnahme der zwei bis vier obersten), zwischen ihren Anguli und Tubercula, sich befestigen: die inneren aber an die Proc. transversi aller Rückenwirbel sich heften. Das obere Ende des M. longissimus dorsi geht ununterbrochen in den *M. transversalis cervicis,* Queermuskel des Nackens, über, welcher von den Proc. transversi der vier oberen Rückenwirbel und zwei letzten Halswirbel entspringt, und an die Queerfortsätze des fünften bis zweiten oder ersten Halswirbel sich heftet.

Der ganze M. sacrospinalis richtet die nach vorn gekrümmte Wirbelsäule auf, erhält sie gerade ausgestreckt, oder krümmt sie nach hinten: wirkt nur einer allein, so zieht er die Wirbelsäule nach seiner Seite hin. Die Mm. sacrolumbalis und longissimus dorsi wirken immer gemeinschaftlich: die Mm. cervicalis adscendens und transversalis cervicis können auch für sich allein auf den Hals wirken.

M. trachelomastoideus s. complexus minor, Halszitzenmuskel: länglich, dünn, schmal und platt; liegt an der inneren Seite des M. transversalis cervicis, und ist gewöhnlich mit ihm so genau verwachsen, dafs er eine Fortsetzung desselben bildet, welche bis zum Kopfe hinaufreicht. Er entspringt mit zwei bis acht dünnen Zipfeln, bald höher, bald tiefer, zwischen dem dritten Halswirbel und dritten Rückenwirbel, von den Proc. transversi und obliqui einiger oder aller dieser Wirbel; steigt nach oben und aufsen, wird dicker, und heftet sich mit einer starken Sehne an den hinteren Rand des Proc. mastoideus. Beide Mm. trachelomastoidei ziehen Hals und Kopf rückwärts; einer allein rückwärts und nach seiner Seite hin.

M. complexus et biventer cervicis s. complexus major: ein grofser platter, ziemlich dicker Muskel, welcher von allen Nackenmuskeln der dritten Schicht am weitesten nach innen liegt, und im Allgemeinen eine ungleich viereckige, längliche, nach unten gespitzte Gestalt hat. Er entspringt mit vielen einzelnen Zipfeln von den Proc. transversi, vom dritten Halswirbel an abwärts bis zum sechsten oder siebenten Rückenwirbel, und von den Proc. spinosi des letzten Hals- und ersten Rückenwirbels: steigt gerade aufwärts, und setzt sich mit einem convexen sehnigen Rande zwischen

Linea semicircularis superior und inferior oss. occipitis
. Sein innerer Theil, *M. biventer cervicis*, zweibäuchi-
Nackenmuskel, trennt sich schon am unteren Theile des
kens von dem äufseren Theile, dem *M. complexus*, durch-
htenem Nackenmuskel; und besteht aus einem unteren
l oberen fleischigen Bauche, welche durch einen schma-
n platten Tendo intermedius verbunden werden: zuwei-
hat er drei Bäuche und zwei Zwischensehnen. Auch
fleischige Bauch des M. complexus ist von mehreren
nenfaserbündeln durchwachsen. — Sie ziehen den Kopf
gerader Richtung und sehr kräftig rückwärts.

M. spinalis dorsi, Dornmuskel des Rückens: ein sehr
glicher, gröfstentheils aus einzelnen dünnen Sehnenstrei-
und wenigen Fleischbündeln bestehender Muskel, an den
tenflächen der Proc. spinosi liegend: entspringt von den
rnfortsätzen der zwei oberen Lenden- und drei unteren
ckenwirbel, geht am Proc. spinosus des neunten Rücken-
bels vorbei, und setzt sich an die Proc. spinosi des ach-
bis zweiten Rückenwirbels. Er ist nach aufsen mit dem
longissimus dorsi, nach vorn mit dem M. multifidus
nae sehr genau verwachsen, bildet dadurch den Übergang
der dritten zur vierten Schicht, und hilft die Wirbel-
le ausstrecken.

M. semispinalis dorsi et colli, Halbdornmuskel des Rü-
ns und Halses: länglich platt und zackig; von den Mm.
gissimus dorsi, complexus und biventer bedeckt, ist er
ischen den Queer- und Dornfortsätzen schräg ausgespannt:
oberer Theil, *M. semispinalis colli*, welcher spitzig am
istropheus endigt, ist etwas stärker als der untere Theil,
semispinalis dorsi, welcher mehr von Sehnenbündeln
rchzogen und mit dem M. spinalis dorsi verwachsen ist.
tspringt mit sehnigen Köpfen von den Proc. transversi
s ersten bis zehnten Rückenwirbels, und setzt sich an die
oc. transversi vom fünften Rückenwirbel an bis zum
eiten Halswirbel. Beide M. semispinales, dorsi et colli,
ecken den oberen Theil der Wirbelsäule; der rechte oder
ke allein beugt und dreht sie nach seiner Seite hin.

D. Vierte Schicht.

M. multifidus spinae, vielgespaltener Rückgratsmuskel: besteht aus einer grofsen Anzahl einzelner Muskelbündel, welche, von der hinteren Fläche des Kreuzbeins an bis zum Epistropheus hinauf, an die Queer- und Dornfortsätze geheftet sind: an den Kreuz- und Lendenwirbeln ist er am breitesten und dicksten, an den Rückenwirbeln am schmälsten. Die Bündel sind grofsentheils schräg, vorzüglich an den oberen Abtheilungen der Wirbelsäule, entspringen von den Proc. transversi, und laufen schräg aufwärts und nach innen, so dafs sie, von ihren Ursprüngen an, zwei Wirbel vorbeigehen, und erst an den Proc. spinosus des vierten Wirbels oberhalb ihres Ursprungs sich anheften. Sie strekken und drehen die Wirbelsäule.

Mm. interspinales, Zwischendornmuskeln: kleine Muskeln zwischen den Flächen und Rändern der Proc. spinosi genau an den Ligg. interspinalia liegend. An den Halswirbeln sind sie verhältnifsmäfsig stärker und fleischig, oft auch überzählig vorhanden: an den Rückenwirbeln sind sie sehr schwach, gröfstentheils sehnig, und fehlen oft an einer oder beiden Seiten: an den Lendenwirbeln sind sie stärker und theils fleischig theils sehnig. Sie strecken die Wirbelsäule.

Mm. intertransversarii, Zwischenqueermuskeln: kleine kurze Muskeln zwischen den Proc. transversi; an den Halswirbeln sind sie doppelt vorhanden als Mm. intertransversarii colli anteriores et posteriores: fehlen zwischen den Rückenwirbeln sehr häufig: sind zwischen den Lendenwirbeln am stärksten entwickelt. Krümmen die Wirbelsäule zur Seite.

M. rectus capitis lateralis, seitlicher gerader Kopfmuskel: kurz, platt viereckig, kann als der oberste M. intertransversarius angesehen werden: entspringt vom Proc. transversus atlantis, und heftet sich an die rauhe Stelle des Os occipitis hinter dem Foramen jugulare. Neigt den Kopf seitwärts.

M. rectus capitis posterior major, gröfserer hinterer Kopfmuskel: länglich dreieckig, entspringt vom Proc. spinosus epistrophei, steigt schräg nach oben und aufsen, un

ftet sich an die Mitte der Linea semicircularis oss. occi- is. Beide ziehen das Hinterhaupt rückwärts, strecken n Kopf; einer allein mit dem zugleich wirkenden M. liquus capitis inferior dreht den Kopf, wendet das Ge- ht nach seiner Seite.

M. rectus capitis posterior minor, kleinerer hinterer ge- der Kopfmuskel: vom vorigen zum Theil bedeckt, mehr ch vorn und innen liegend, kleiner und dreieckig; ent- ringt vom Tuberculum posterius atlantis, und setzt sich das innere Ende der Linea semicircularis inferior oss. cipitis. Streckt den Kopf.

M. obliquus capitis inferior s. major, unterer schräger pfmuskel: länglich viereckig und rundlich; liegt neben m M. rectus cap. posterior major nach aufsen; ent- ringt vom Proc. spinosus epistrophei, läuft schräg nach fsen und oben, und heftet sich an die hintere Fläche des oc. transversus atlantis. Dreht den Atlas und Kopf, endet das Gesicht nach seiner Seite.

M. obliquus capitis superior s. minor, oberer schräger pfmuskel: dreieckig; entspringt von der Spitze des oc. transversus atlantis, steigt schräg nach oben und in- n, und setzt sich an das äufsere Ende der Linea semicir- laris inferior oss. occipitis. Zieht das Hinterhaupt rück- irts, wirkt auch drehend dem vorigen entgegengesetzt.

Mm. levatores costarum breves, kurze Rippenheber: kurz d dreieckig, entspringen von den Spitzen der Proc. trans- rsi des siebenten Halswirbels und der Rückenwirbel, und tzen sich an den oberen Rand der zunächst tiefer liegen- n Rippen, zwischen ihren Tubercula und Anguli.

Mm. levatores costarum longi, lange Rippenheber: läng- h dreieckig, finden sich nur an den drei bis vier unter- n Rippen, und bedecken die kurzen Rippenheber: ent- ringen von den Proc. transversi, überspringen die zunächst efer liegende Rippe und heften sich an die auf jene fol- nde, und zwar weiter nach aufsen als die Mm. levatores stárum breves.

Die Mm. levatores costarum bilden eigentlich die hin- ren Enden der Mm. intercostales externi, mit welchen e meistens verwachsen sind: und heben die Rippen in die öhe.

Muskeln an der Brust.

27 Paare.

Diese bedecken in den Regiones sternalis, mammillares und costales die vordere und Seitenwände des Thorax, lassen nur die Mitte des Brustbeins frei, und verbinden theils die Schultern und Oberarme mit dem Thorax, theils füllen sie die Räume zwischen den Rippen aus. Zu den ersteren gehört auf jeder Seite der M. pectoralis major, welcher die anderen grofsentheils bedeckt; die Mm. subclavius, pectoralis minor und serratus anterior major: zu den letzteren die Mm. intercostales externi und interni. An der inneren Fläche der vorderen Wand des Thorax liegt nur ein einziger selbstständiger Muskel, der M. triangularis sterni.

Die äufsere Fläche der Mm. pectoralis major und serratus anterior major wird von der hier dünnen Fascia superficialis überzogen: aufser dieser findet sich aber am oberen Theile der vorderen Brustwand die stärkere *Fascia coracoclavicularis*. Diese beginnt am Schlüsselbeine und der ersten Rippe, hängt hier mit der Fascia cervicalis zusammen, wickelt den M. subclavius ein, und füllt die *Fossa infraclavicularis* aus, d. i. der dreieckige vertiefte Raum zwischen den Mm. pectoralis und deltoides, welcher unterhalb der Clavicula breiter ist, und von da aus in schräger Richtung gegen den Oberarm schmaler und flacher wird. In der Fossa infraclavicularis ist diese Fascia am stärksten, überzieht nach unten den M. pectoralis minor, erstreckt sich seitwärts zum Processus coracoideus, und steigt zu den Insertionen der Mm. pectoralis major und deltoides herab, woselbst sie in die Fascia brachialis sich verliert.

M. pectoralis major, grofser Brustmuskel: breit und platt, aber dick und stark, dreieckig; liegt im Allgemeinen queer vor der vorderen Wand des Thorax und vor der Achselhöhle. Er entspringt mit seinem inneren stark gekrümmten Rande von der vorderen Hälfte des Schlüsselbeins, der vorderen Fläche des Brustbeins und des zweiten bis siebenten Rippenknorpel, und hängt nach unten durch fleischige oder sehnige Zipfel mit der Fascia rect

lominis und dem M. obliquus externus abdominis zusam-
n. Sämmtliche Fasern laufen convergirend nach aufsen:
des oberen Theils des Muskels, der *Portio clavicularis*,
lche bis nahe vor der Insertion von dem mittleren Theil
trennt bleibt, gehen nach aufsen und unten: die Fasern
s mittleren und unteren Theils, der *Portio sternocostalis*,
d länger und gehen theils queer, theils nach oben und
fsen. Der obere Rand des Muskels ist schwach convex,
untere concav und breiter. In der Nähe des Ober-
ns wird der Muskel beträchtlich schmaler und dicker,
l geht in eine starke breite Sehne über, welche sich an
Spina tuberculi majoris befestigt, über den Sulcus in-
tubercularis hin mit der Sehne des M. latissimus dorsi
h verbindet, und viele Fasern zur Fascia brachialis
nickt. Er adducirt, in Gemeinschaft mit den Mm. latis-
mus dorsi und teres major, den Oberarm; für sich allein
ht er ihn nach innen und vorn, legt ihn vor den Tho-
x, und rollt ihn etwas nach innen, hilft also bei der
onation; spannt auch die Fascia brachialis an.

Zuweilen steht er vermittelst eines queer durch die
hselhöhle gehenden Fleischbündels mit dem M. latissi-
us dorsi in Verbindung, welches die Vasa axillaria zu-
mmendrücken kann. Zuweilen wird sein innerer Rand
n einem besonderen accessorischen länglichen Muskelbün-
l, M. sternalis, bedeckt, welches in die Fascia recta ab-
minis sich verliert.

M. subclavius, Unterschlüsselbeinmuskel. Ein kleiner
ttrunder halbgefiederter Muskel, vom Schlüsselbein und
r Portio clavicularis des vorigen bedeckt: entspringt von
r unteren Fläche des Schlüsselbeins, so dafs sein äufse-
s Ende an das Lig. coracoclaviculare gränzt; steigt nach
rn herab, und setzt sich mit einer zugespitzten plattrun-
n Sehne an den ersten Rippenknorpel. Zieht die Schul-
r herab und nach vorn; bei gehobener und befestigter
hulter hebt er die erste Rippe.

M. pectoralis minor s. serratus anterior minor, kleiner
ustmuskel: dreieckig, platt, vom M. pectoralis major
d deltoides bedeckt; entspringt in der Regio mammilla-
s von den äufseren Flächen und oberen Rändern der drit-
n bis fünften Rippe mit drei Dentationen; geht nach

oben und aufsen, wird schmaler, und heftet sich mit einer kurzen Sehne an die Spitze des Proc. coracoideus. Zieht die Schulter nach vorn herab; bei befestigter Schulter hebt er die Rippen, von welchen er entspringt.

M. serratus anterior major s. serratus anticus major, grofser vorderer Sägemuskel. Ein grofser platter ungleich viereckiger Muskel, dessen vorderer und unterer Rand länger als der obere und hintere sind: liegt an der Seitenwand des Thorax, vorne vom M. pectoralis major und minor, hinten vom M. latissimus dorsi und dem Schulterblatt, unten nur von der Haut bedeckt. Der vordere längste Rand ist convex und gezackt, und reicht unten weiter nach vorn als oben: dieser entspringt mit neun bis zehn fleischigen Zacken von der äufseren Fläche der acht bis neun obersten Rippen: die zweite und dritte Zacke kommen beide von der zweiten Rippe. Die Fasern des Muskels laufen in queerer Hauptrichtung convergirend um die Seitenwand des Thorax nach hinten, zwischen der hintern Wand des Brustkastens und dem M. subscapularis, und gehen in den kürzeren hinteren sehnigen Rand über, welcher sich an den unteren hinteren Winkel und die ganze Basis scapulae heftet. Er zieht das Schulterblatt, vorzüglich dessen unteren Winkel, nach vorn und unten: ist die Scapula durch die Mm. cucullaris, rhomboideus und levator scapulae in die Höhe gezogen, so zieht er die Rippen kräftig nach aufsen und oben, und erweitert den Thorax bei der Inspiration.

Mm. intercostales, Zwischenrippenmuskeln: kurze platte schräge Muskeln, welche die eilf Interstitia intercostalia ausfüllen, und die Rippen einander nähern.

Mm. intercostales externi entspringen von den äufseren Flächen der Rippen sehr nahe an ihren unteren Rändern, sind mit zahlreichen Sehnenfasern durchwebt, und steigen schräg nach vorn und unten zu den oberen Rändern der folgenden Rippen herab, und zwar vorzüglich schräg an ihrem hinteren Theile: sie reichen von den Tubercula der Rippen, woselbst sie mit den Mm. levatores costarum zusammenhängen, bis zu den äufseren Enden der Rippenknorpel: zwischen den letzteren werden sie von dünnen Aponeurosen, den sog. Ligg. coruscantia (S. 163.) ersetzt.

Mm. intercostales interni: kürzer und von den vorigen deckt: entspringen von den unteren Rändern und inne- n Flächen der Rippen, nach innen von den Sulci costales, elche Furchen daher zwischen beiden Intercostalmuskeln ch befinden): sodann steigen sie schräg in der Richtung ch unten und hinten zu den oberen Rändern der folgenden ppen herab, und kreuzen sich also mit den äufseren Zwi- henrippenmuskeln: sie erstrecken sich von den Anguli starum bis zum Brustbein. Zwischen den untersten Rippen erspringen einzelne Bündel dieser Muskeln die eine er andere Rippe, um sich an die zweite folgende zu ften.

Die Intercostalmuskeln wirken in der Regel als Inspi- tionsmuskeln, den Thorax erweiternd: indem vorläufig e erste Rippe durch die Mm. scaleni in die Höhe gezogen ird, und die folgenden Rippen dieser Bewegung durch die ntraction der Mm. intercostales folgen. Sind die unteren ppen befestigt, so ziehen diese Muskeln die oberen Rippen rab, und verengern den Thorax bei der Exspiration durch erkürzung und Abplattung seiner Seitenwände.

Mm. infracostales werden einzelne unbeständige Muskel- ndel genannt, welche an den inneren Flächen der Rippen, n der einen zur nächsten oder zweiten, sich erstrecken: kommen in ihrer Wirkung mit den Intercostalmuskeln erein.

M. triangularis sterni s. sternocostalis, dreieckiger Brust- inmuskel: ist platt und dünn: entspringt mit einer dünnen oneurose von der hinteren Fläche des Körpers des Brustbeins d des Cartilago xiphoides; steigt aufwärts und auswärts, d setzt sich mit fleischigen Zacken an die inneren Flächen s dritten bis sechsten Rippenknorpels. Zieht die Rippen bei r Exspiration herab: ist häufigen Varietäten unterworfen.

Muskeln der oberen Extremität.

Aufser den Brust-, Nacken- und Rückenmuskeln, welche den Schulterknochen und dem Oberarmbein laufen, be- tzt jede obere Extremität 49 zwischen ihren eigenen Kno- en liegende Muskeln, welche in die der Schulter, des berarms, des Vorderarms und der Hand zerfallen.

Die Muskeln an der Schulter gehen theils der Länge nach von dem Schlüsselbein und den Fortsätzen des Schulterblatts zum Oberarmbein herab: Mm. deltoides und M. coracobrachialis: — theils bedecken sie die hintere und vordere Fläche des Schulterblatts, und laufen in queerer Richtung zum Kopfe und Halse des Oberarmbeins: Mm. supraspinatus, infraspinatus, teres minor, teres major, und subscapularis. Sie heben den Arm, rollen ihn nach innen oder aufsen (welche Bewegungen an dem Vorderarme und der Hand durch Pronation oder Supination sich zu erkennen geben), und ziehen ihn rückwärts: die Mm. supraspinatus, infraspinatus, teres minor und subscapularis haben aber noch die besondere Function, bei den ausgedehnteren Bewegungen des Oberarms das Caput oss. brachii gegen die Cavitas glenoidea zu ziehen und festzuhalten, da dasselbe durch das schlaffe Kapselband nicht hinlänglich in Berührung mit diesem seinem Stützpunkte erhalten wird.

Die Muskeln am Oberarm laufen nach der Länge desselben zum Vorderarm herab, und zerfallen in eine vordere innere und hintere äufsere Lage: erstere enthält die Beuger des Vorderarms, M. biceps brachii und M. brachialis internus; letztere den Strecker desselben, M. triceps brachii.

Die Muskeln am Vorderarm laufen meistens der Länge nach, und sind theils für ihn selbst zur Hervorbringung der Pronation und Supination bestimmt; theils gehen sie zur Hand und den Fingern, und bewirken die Extension und Flexion, auch die Abduction und Adduction derselben. Sie sind in zwei grofsen Bündeln gesammelt, welche durch die Knochen des Vorderarms und das Lig. interosseum von einander geschieden werden: das innere Bündel, die Pronatoren und Flexoren enthaltend, welche meistens vom Condylus internus ossis brachii entspringen, liegt an der inneren und Ulnarseite des Vorderarms, der *Beugeseite*, *Latus flexorium*: — das äufsere Bündel, von den Supinatoren und Extensoren gebildet, welche gröfstentheils vom Condylus externus oss. brachii ihren Anfang nehmen, liegt an der äufseren und Radialseite des Vorderarms, *Streckseite*, *Latus extensorium*. Das innere Bündel enthält in seiner oberflächlichen Schicht, vom Radius nach der Ulna hin gezählt, die Mm. pronator rotundus, flexor carpi radialis, palmaris lon-

s, flexor communis digitorum sublimis und flexor carpi naris; in seiner tiefen Schicht die Mm. flexor pollicis ngus und flexor communis digitorum profundus; und von iden bedeckt nahe über dem Handgelenk den M. pronator adratus. — Die oberflächliche Schicht des äufseren Bün-ls besteht, vom Radius an gezählt, aus den Mm. supinator ngus, extensores carpi radiales, longus und brevis, extensor mmunis digitorum, extensor proprius digiti minimi, ex-nsor carpi radialis, und anconaeus: die tiefe Schicht ent-lt in der Gegend des Ellenbogengelenks den M. supinator evis, und von der Mitte der Länge des Vorderarms an e Mm. abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis d longus, und extensor indicis.

Die Hand enthält die Sehnen der Muskeln des Vorder-ms, welche sie selbst im Ganzen, und die Finger einzeln wegen; aufserdem aber noch besondere kleinere vorzüg-ch an der Volarfläche des Metacarpus angehäufte Finger-uskeln. Hier liegen in der Mitte die Mm. lumbricales nd interossei volares; nach dem Daumen hin ein ansehn-cheres Bündel, welches den sog. Daumenballen, Thenar ollicis, bildet, und aus den Mm. pollicis abductor brevis, pponens, flexor brevis und adductor besteht: diesem ge-nüber am Mittelhandbein des kleinen Fingers liegt ein hwächeres Bündel, der Ballen des kleinen Fingers, zu-mmengesetzt von den Mm. digiti minimi abductor, flexor evis und adductor, und oberflächlich bedeckt vom M. lmaris brevis. Auf dem Rücken der Mittelhand finden ch aufser den Sehnen der Fingerstrecker nur die Mm. terossei dorsales.

Die beiden ansehnlichsten Gruben zwischen den Muskeln r oberen Extremität sind die Achselhöhle und die Ellen-gengrube. *Die Achselhöhle, Fossa axillaris*, liegt unter r Schulter zwischen dem Oberarm und der Brust; sie hat ie Gestalt einer Pyramide, deren Basis die untere Öffnung er Grube ist, und vorn und hinten von den Rändern des I. pectoralis major, und der Mm. latissimus dorsi und teres ajor begränzt wird: ihre vordere Wand wird von den Im. pectoralis major, pectoralis minor, der Portio clavi-ularis des M. deltoides und der Fascia coracoclavicularis ebildet; die hintere Wand von der Fascia und M. subsca-

pularis, M. teres major und M. latissimus dorsi: die äufsere schmalste Wand von den Mm. coracobrachialis und biceps, dem Oberarmbein und Schultergelenk; die innere Wand vom M. serratus anterior major. Nach oben verengert sich die Achselhöhle, und steht mit der Fossa supraclavicularis vermittelst einer dreieckigen Öffnung zwischen dem M. subclavius, der Insertion des M. scalenus medius an der ersten Rippe, und dem Lig. coracoclaviculare, in Verbindung. — *Die Ellenbogengrube*, *Plica cubiti*, liegt an der inneren vorderen Seite des Ellenbogengelenks, ist weniger tief als die Achselhöhle, und von dreieckiger Gestalt mit nach unten gerichteter Spitze. Oberwärts wird sie von den Caudae der Mm. biceps und brachialis internus nur undeutlich begränzt: diese mit den Ursprüngen der Mm. flexores communes digitorum und der Insertion des M. supinator brevis bilden auch ihren Boden: nach aufsen wird sie vom M. supinator longus, nach innen vom M. pronator rotundus eingefafst.

Die Muskeln der oberen Extremität werden, aufser der Fascia superficialis, von einer zusammenhängenden sehnigen Binde eingeschlossen, welche stellenweise in mehrere Blätter gespalten und mit Öffnungen für die oberflächlichen Gefäfse und Nerven versehen ist: in der Schulterblattsgegend, am Vorderarm und an der Hohlhand, ist sie am stärksten entwickelt, und befestigt sich theils an die Knochen, theils fliefst sie mit den angränzenden Fascien des Stammes zusammen. Sie zerfällt in die Fascia brachialis, antibrachii, dorsalis manus, und palmaris.

Die *Fascia brachialis* beginnt in der vorderen Schultergegend am Acromion scapulae, ist aber auf dem M. deltoides sehr dünn, und wird erst am unteren Ende dieses Muskels durch Fasern, welche von seiner Sehne und der des M. pectoralis major herstammen, verstärkt. Unter dem vorderen Rande des M. deltoides hängt sie mit der Fascia coracoclavicularis zusammen, umwickelt die Sehne des M. pectoralis minor, den M. coracobrachialis und die Köpfe des M. biceps, und dringt an der vorderen und äufseren Wand der Achselhöhle bis zum Oberarmbein und der Kapsel des Schultergelenks. Am Schulterblatt bedeckt ihr hinteres an die Spina scapulae geheftetes Blatt, *Fascia supra-*

ıpularis genannt, den M. supraspinatus, den hinteren Rand
s M. deltoides, die Mm. infraspinatus, teres minor und
es major; ihr vorderes Blatt, *Fascia subscapularis*, über-
ht die vordere Fläche des M. subscapularis: beide Blätter
hen an der Basis scapulae mit dem hinteren Blatte der
scia lumbodorsalis in Verbindung; und erstrecken sich,
t den genannten Muskeln und der Sehne des M. latissimus
rsi, an der hinteren Wand der Achselhöhle, bis zur Kap-
des Schultergelenks und zum Oberarmbein. Zwischen
ı untèren Rändern der Mm. pectoralis major und latissi-
ıs dorsi ist ein dünneres von unregelmäfsigen Öffnungen
rchbrochenes Blatt der Fascia ausgespannt, welches die
tere Öffnung der Achselhöhle verschliefst. Von den In-
tionen der genannten Muskeln und vom langen Kopfe
s M. biceps an, steigt die Fascia brachialis zum Ellenbogen
rab, indem sie oben einerseits die Mm. biceps und bra-
ialis internus, andererseits den M. triceps einwickelt;
vischen diesen Muskellagen aber an den vorderen äufse-
n und inneren hinteren Winkel des Oberarmbeins sich
ftet, und dadurch die schmalen, dreieckigen, ziemlich
arken *Ligamenta intermuscularia brachii, internum* und *ex-
rnum*, bildet; welche sonach aus einem doppelten fibrösen
latt bestehen, am Condylus internus und externus oss.
achii endigen, und daselbst am breitesten sind. An der
neren Seite des Oberarms, unterhalb der Mitte desselben,
thält die Fascia eine gröfsere halbmondförmige Spalte
um Durchgange der Vena basilica).

Die *Fascia antibrachii* beginnt, mit der Fascia brachialis
unterbrochen zusammenhängend, am Ellenbogen, und er-
reckt sich von da an längs des ganzen Vorderarms, indem
e vorzüglich an den inneren Winkel des Radius und an
e hintere Fläche der Ulna befestigt ist. In der Plica cu-
ti liegt sie lockerer auf den unterliegenden Theilen; zu
iden Seiten derselben ist sie aber mit dem äufseren und
neren Muskelbündel genau verwachsen, bildet Scheide-
ände zwischen ihnen, und einzelne Scheiden für die mei-
en einzelnen Muskeln des Vorderarms. An der äufseren
eite des Ellenbogens sowohl als an der inneren, wird sie
on platten Faserstreifen verstärkt; der äufsere kommt von
er Sehne des M. triceps und geht an der äufseren Seite

des Vorderarms in die Fascia über; der innere, *Aponeurosis musculi bicipitis* genannt, ist, als ein schmaler aber starker Streifen über die innere Hälfte der Ellenbogengrube brückenförmig hingespannt, und geht in den, den M. pronator rotundus bedeckenden, Theil der Fascia über. Vermittelst dieser Streifen, vorzüglich vermittelst der Aponeurosis m. bicipitis, kann die Fascia von den Mm. biceps und triceps angespannt werden. Derjenige Theil der Fascia, welcher zwischen der Aponeurosis m. bicipitis und dem inneren Rande des M. supinator longus über die äufsere Hälfte der Plica cubiti sich hinspannt, ist sehr dünn, und von einer Öffnung für eine Vene durchbohrt. — Am unteren Ende des Vorderarms ist die Fascia antibrachii in mehrere tiefere und oberflächlichere Blätter, für die tiefen und oberflächlichen Muskelschichten gespalten, und geht am Handgelenk in die Fascien der Hand über, vermittelst zweier starker, aus queer und schräg laufenden Faserbündeln gewebten Streifen, der Ligg. carpi, dorsale und volare.

Das *Ligamentum carpi dorsale* s. armillare s. annulare posterius carpi, Handrückenband, liegt auf dem Rücken des Handgelenks, von dem Radialrande zum Ulnarrande schräg herabsteigend; es geht vom inneren Winkel der unteren Extremität des Radius und dessen Proc. styloideus, über den Rücken des Carpus, zum Proc. styloideus ulnae, dem Os triquetrum und Os pisiforme; ist durch Fortsätze seiner inneren Fläche an die Eminentiae radii, an das Capitulum ulnae, und die Knochen des Carpus geheftet, und bildet dadurch sechs einzelne, röhrenförmige, und von Synovialscheiden bekleidete Scheiden für die Sehnen der Streckmuskeln. Die erste dieser Scheiden, vom Radius an gezählt, enthält die Sehnen der Mm. abductor pollicis longus und extensor pollicis brevis: die zweite die Sehnen der Mm. extensor carpi radialis longus und brevis: die dritte schräg über die zweite hinlaufende schliefst die Sehne des M. extensor pollicis longus ein: die vierte geräumigste in der Mitte des Handgelenkrückens läfst die Sehnen der Mm. extensor communis digitorum und extensor proprius indicis hindurchgehen: die fünfte engste und oberflächlichste Scheide umfafst die Sehne des M. extensor proprius digiti minimi: und die sechste die des M. extensor carpi ulnaris.

Das *Ligamentum carpi volare* s. annulare anterius carpi, ohlhandband, besteht aus einer oberflächlichen dünneren chicht, dem *Lig. carpi volare commune*, welches an seinem adial- und Ulnarrande mit den Eminentiae carpi und dem ig. carpi dorsale zusammenhängt; und aus einer sehr star- en, tiefen, mit jener oberflächlicheren stellenweise ver- achsenen, 1″ breiten Schicht, dem *Lig. carpi volare pro- rium.* Dieses ist eine Fortsetzung des tiefen Blattes der ascia antibrachii, entspringt indessen auch mit besonderen sern von den Eminentiae carpi (S. 177.), zwischen wel- en es brückenförmig ausgespannt ist: es bildet mit der olarfläche des Handgelenks einen kurzen ovalen Kanal für e neun Sehnen der Mm. flexor pollicis longus und flexo- s digitorum communes.

Die Fascia antibrachii besitzt gemeinschaftlich mit der ascia palmaris einen Spannmuskel, den *M. palmaris longus*, ngen Hohlhandmuskel. Dieser ist der in der Mitte der eugeseite am oberflächlichsten liegende sehr längliche Mus- el: entspringt vom Condylus internus oss. brachii, und eht schon am oberen Drittheil des Vorderarms in eine nge platte dünne Sehne über, welche in das oberflächliche latt der Fascia antibrachii eingewickelt, und genau mit m und dem Lig. carpi commune verwachsen, über das ig. carpi volare proprium in die Hohlhand herabsteigt, nd in der Fascia palmaris sich ausbreitet; so dafs letztge- annte Fascia oft als die Aponeurose dieses Muskels, Apo- eurosis palmaris angesehen wird. Nicht selten fehlt dieser Muskel.

Die *Fascia palmaris* s. volaris s. Aponeurosis palmaris, ntsteht nicht allein aus der Ausbreitung des M. palmaris ngus, sondern auch mit besonderen Fasern vom Lig. carpi olare commune und proprium. Sie ist aus dicken glän- enden longitudinalen und transversalen Faserbündeln ge- ebt; auf dem Daumenballen und am Ulnarrande der Hand ünner, in der Mitte der Hohlhand aber sehr stark: dieser ittlere Theil ist am Handgelenke schmal, breitet sich aber m Ende der Mittelhand beträchtlich aus, und läuft mit ier, durch Queerfasern vereinigten, Zipfeln bis zum ersten liede des zweiten bis fünften Fingers, woselbst diese Zip- el in die Sehnenscheiden der Mm. flexores digitorum und

in die Ligg. capitulorum oss. metacarpi sich verlieren. Von ihrer äufseren Fläche gehen sehnige Fasern in die Haut der Hohlhand: von ihrem Ulnarrande aber entspringen vier bis fünf queerlaufende kleine Muskelbündel, *M. palmaris brevis* s. cutaneus, kurzer Hohlhandmuskel genannt, welche sich in die Haut des Ulnarrandes der Hand, in den Ulnarrand der Fascia dorsalis manus, und in den M. abductor digiti minimi verlieren; und die Fascia ihrer Breite nach anspannen. Nicht selten fehlt dieser Muskel, und ist beim Mangel des M. palmaris longus stärker entwickelt.

Fascia dorsalis manus ist sehr dünn, beginnt am unteren Rande des Lig. carpi dorsale, und verliert sich auf den ersten Fingergelenken in die Sehnen der Mm. extensores digitorum.

A. Muskeln an der Schulter.

M. deltoides s. deltoideus, s. levator humeri, Deltamuskel: bildet die dicke rundliche Fleischmasse der Schulter; ist dreieckig, oben breit, unten spitz; stark, in der Mitte dicker als an den Rändern. Entspringt von der Extremitas acromialis claviculae, von der Spitze und dem äufseren Rande des Acromion, und mit längeren Sehnenfasern vom Labium inferius spinae scapulae: sein Bauch besteht aus einzelnen, dicken, durch tiefe Furchen getrennten Bündeln, welche in die untere starke dreieckige Sehne zusammenlaufen; diese heftet sich, oberhalb der Mitte des Oberarmbeins, an die rauhe Stelle neben dem Ende der Spina tuberculi majoris, nach aufsen von der Insertion des M. pectoralis major. Der vordere Rand des Muskels bedeckt unmittelbar den unteren Theil der Portio clavicularis des M. pectoralis major, ist aber nahe unter dem Schlüsselbein $\frac{1}{2}''$ bis $1''$ von ihm entfernt; der dadurch gebildete dreieckige Zwischenraum ist die Mitte der Fossa infraclavicularis, und wird von der Fascia coracoclavicularis ausgefüllt. — Zwischen der inneren Fläche des Muskels und dem Tuberculum majus, nahe unter dem Acromion, liegt ein Schleimbeutel. — Er entfernt den Oberarm vom Stamm (abducirt), hebt ihn im Allgemeinen nach Aufsen in die Höhe, aber auch nach vorn und hinten; ist der Oberarm in aufgehobener Stellung befestigt, so hebt er die Schulter; ist jener

h unten befestigt, so zieht er die Schulter herab. Zu-
len hat er einen accessorischen Ursprung von der Basis
pulae.

M. coracobrachialis s. perforatus Casserii, Hakenmuskel:
glich plattrundlich, oben und unten spitzig und sehnig,
n vorigen und dem kurzen Kopfe des M. biceps, mit
chem er verwachsen ist, bedeckt: entspringt von der
tze des Proc. coracoideus, steigt in der Achselhöhle zwi-
en den Caudae des M. pectoralis major und latissimus
si bis oberhalb der Mitte des Oberarmbeins herab, und
tet sich an die innere Fläche und vorderen Rand der
na tuberculi minoris. Hebt den Oberarm nach vorn in
Höhe, hilft ihn auswärts rollen; oder entfernt durch
rabziehen des Proc. coracoideus den unteren Winkel und
Basis des Schulterblatts vom Thorax.

M. supraspinatus, Obergrätenmuskel. Dreieckig, vom
cucullaris bedeckt, füllt die Fossa supraspinata aus, und
springt von der ganzen Fläche der Fossa supraspinata
d von der Fascia suprascapularis, von welcher er überzo-
n wird: läuft dünner und sehnig unter dem Acromion
d Lig. coracoacromiale, mit dem Kapselbande des Schul-
gelenks verwachsen, zum Tuberculum majus oss. brachii,
dessen vordere Facette er sich heftet. Hebt das Oberarm-
n, rollt es nach aufsen, und befestigt dessen Kopf in der
vitas glenoidea. (S. 246.)

M. infraspinatus, Untergrätenmuskel: dreieckig und grö-
r als der vorige: liegt in der Fossa infraspinata, und
springt von dem ganzen Umfange dieser Grube — mit
snahme des unteren Winkels und vorderen Randes der
pula — und von der Fascia suprascapularis. Er läuft
t queeren und schräg aufsteigenden Fasern, vom hinteren
eile des M. deltoides bedeckt, zur mittleren Facette des
berculum majus oss. brachii, woselbst seine starke platte
hne, unter welcher ein Schleimbeutel liegt, sich anheftet,
d mit der Sehne des M. supraspinatus und der Kapsel
s Schultergelenks verwächst. Rollt den Oberarm nach
fsen, zieht ihn etwas herab, und befestigt seinen Kopf
der Cavitas glenoidea.

M. teres minor, kleiner runder Armmuskel. Länglich
ereckig, plattrundlich, liegt unter dem vorigen, und ist

an seinem Ursprunge, oft sogar in seiner ganzen Länge, mit ihm verwachsen, und vom M. deltoides bedeckt. Entspringt in der Fossa infraspinata, vom Labium posterius des vorderen Randes des Schulterblatts, und von der Fascia suprascapularis; läuft nach aufsen und oben, und befestigt sich, das Kapselband verstärkend, an der hinteren Facette des Tuberculum majus. Wirkt wie der vorige, vorzüglich beim Herabziehen.

M. teres major, grofser runder Armmuskel. Von ähnlicher Gestalt, aber gröfser als der vorige, unter welchem er liegt: entspringt, vom M. latissimus dorsi bedeckt, von der hinteren Fläche des Angulus inferior und dem Labium posterius des vorderen Randes des Schulterblatts, läuft in queerer wenig aufsteigender Richtung, und bildet eine platte Sehne, die mit der des M. latissimus dorsi sich vereinigend, an die Spina tuberculi minoris oss. brachii sich heftet (Schleimbeutel). Zieht den Oberarm an den Stamm, und rückwärts und abwärts; rollt ihn etwas nach innen.

M. subscapularis s. infrascapularis, Unterschulterblattmuskel. Platt und dreieckig: entspringt aus der Fossa subscapularis und von der Fascia subscapularis, die seine vordere Fläche überzieht, mit sieben bis neun in einander geschobenen Bündeln; läuft queer nach aufsen und etwas nach oben, zwischen dem Schulterblatt und dem M. serratus anterior major; unter dem Proc. coracoideus, woselbst ein Schleimbeutel; und hinter dem M. coracobrachialis und Caput breve m. bicipitis. Er heftet sich an das Tuberculum minus, indem seine starke Sehne durch eine Öffnung in der Faserkapsel des Schultergelenks dringt, und von der Synovialkapsel wie von einer Synovialscheide umgeben wird. Rollt den Oberarm nach innen, und adducirt ihn; hält auch das Caput oss. brachii mit der Cavitas glenoidea in Berührung.

B. Muskeln am Oberarm.

a. An der inneren vorderen Seite.

M. biceps brachii s. biceps flexor antibrachii, zweiköpfiger Armmuskel oder Beuger des Vorderarms: länglich rund, liegt an der vorderen inneren Seite des Oberarms gleich unter der Fascia brachialis. Sein kurzer Kopf, *Caput*

ve s. *M. coracoradialis*, entspringt plattsehnig und mit
n M. coracobrachialis verwachsen von der Spitze des
oc. coracoideus (Schleimbeutel): der lange mehr nach
sen liegende Kopf, *Caput longum* s. *M. glenoradialis*, eine
ge dünne plattrunde Sehne, kommt von der oberen Ecke
Cavitas glenoidea scapulae und vom Labrum glenoideum;
l geht gebogen über das Caput oss. brachii durch das
ultergelenk und durch den Sulcus intertubercularis her-
indem die Synovialkapsel eine Synovialscheide für ihn
det, und er durch die Vereinigung der Sehnen der Mm.
toralis major und latissimus dorsi noch genauer in jenem
cus befestigt wird. Beide Köpfe, von denen der kurze
her fleischig wird, als der lange, steigen gerade herab,
d vereinigen sich in der Mitte des Oberarms, oft aber
t nahe oberhalb der Ellenbogengrube, zu einem runden
glichen Bauche, welcher mit einer dünnen platten und
er plattrunden starken Sehne endigt. Die dünne platte
hne, *Aponeurosis m. bicipitis*, geht von der Oberfläche
s Muskels schräg nach innen und hinten über die Ellen-
gengrube hin zur Fascia antibrachii; die starke eigent-
he Sehne, *Tendo m. bicipitis*, dringt zwischen dem Capi-
lum radii und dem Proc. coronoideus ulnae in die Tiefe,
d heftet sich an die ganze Tuberositas radii, woselbst
ter ihr ein kleiner Schleimbeutel liegt. — Er beugt den
orderarm, hilft bei der Supination, spannt die Fascia anti-
achii, und befestigt durch seinen langen Kopf das Caput
s. brachii in der Gelenkhöhle. — Sehr oft findet sich ein
itter von der Mitte des Oberarmbeins entspringender
pf; selten ein abgesonderter accessorischer mehrköpfiger
ugemuskel des Vorderarms.

M. brachialis internus s. brachiaeus internus, innerer
mmuskel: länglich, breit und dick, von dem vorigen
ofsentheils bedeckt, nimmt den ganzen unteren Theil der
neren Seite des Oberarms ein. Entspringt von der ganzen
neren Fläche der unteren Hälfte des Oberarmbeins und
eider Ligg. intermuscularia, bis zum Ellenbogengelenk
erab; sein oberes Ende bildet zwei Zacken, welche die
sertion des M. deltoides umfassen, und von denen die
nere gewöhnlich mit dem M. coracobrachialis zusammen-
efst. Die starke kurze Sehne heftet sich an den Proc.

coronoideus und die Tuberositas ulnae. Beugt den Vorderarm. Zuweilen ist er tief herab gespalten; oder er erhält einen accessorischen Kopf.

b. An der hinteren äufseren Seite.

M. triceps brachii s. brachialis externus, dreiköpfiger Armmuskel: nimmt die ganze hintere äufsere Seite des Oberarms ein. Sein langer Kopf, *Caput longum m. tricipitis* s. *M. anconaeus longus*, ist plattrundlich, entspringt sehnig vom Labium anterius des vorderen Randes des Schulterblatts, zwischen M. teres major und minor, und läuft sich verdickend abwärts. Der äufsere oder grofse Kopf, *Caput externum* s. *M. anconaeus externus* s. magnus, entspringt nahe unter dem Tuberculum majus, von der äufseren Fläche des Oberarmbeins und dem Lig. intermusculare externum, bis zum Condylus externus herab; seine Fasern laufen schräg nach unten, innen und hinten; die untersten beinahe horizontal. Der innere Kopf, *Caput internum* s. *M. anconaeus internus* s. brevis, entspringt vom unteren Ende der Spina tuberculi minoris, von der äufseren Fläche des Oberarmbeins und dem Lig. intermusculare internum, bis zum Condylus internus; seine Fasern laufen schräg nach aufsen, vorn und unten. Alle drei Köpfe vereinigen sich in einer gemeinschaftlichen starken platten Sehne, welche in der Mitte des Oberarms anfängt, mitten zwischen den Köpfen und an ihrer hinteren Oberfläche herabläuft, Sehnenstreifen zur Fascia antibrachii schickt, und vorzüglich an dem Olecranon ulnae (woselbst ein Schleimbeutel) sich befestigt, aber auch in einer Strecke von $1\frac{1}{2}''$ unterhalb des Olecranon an die hintere Fläche und den äufseren Winkel der Ulna sich heftet. Streckt den Vorderarm, spannt die Fascia antibrachii.

C. Muskeln am Vorderarm.

a. An der äufseren und Radialseite.

M. supinator longus, langer Rückwärtsdreher: länglich, in der Mitte rundlich, an beiden Enden platt; entspringt vom äufseren Winkel des Oberarmbeins und vom Lig. intermusculare externum, oberhalb des Condylus externus, zwischen M. brachialis internus und Caput externum trici-

is: läuft, nur von der Fascia bedeckt, längs der vorde-
n Fläche und inneren Randes des Radius, und geht neben
r Mitte dieses Knochens in eine dünne platte Sehne über,
lche am inneren Winkel des Radius nahe oberhalb des
oc. styloideus sich inserirt. Rollt den Radius nach aufsen,
wirkt die Supination des Vorderarms und der Hand, hilft
n Vorderarm beugen.

M. extensor carpi radialis longus s. radialis externus
gus s. primus, langer äufserer Speichenmuskel; platt,
glich, liegt neben dem vorigen und läuft mit ihm paral-
; entspringt vom äufseren Winkel und Condylus exter-
s des Oberarmbeins, geht auf der vorderen und äufseren
che des Radius herab, und schon in der Mitte des Vorder-
ns in eine platte Sehne über, welche, von einer Synovial-
heide umgeben, durch die zweite Scheide des Lig. carpi
rsale läuft, und an die Basis oss. metacarpi indicis sich
ftet (Schleimbeutel). Streckt die Hand, zieht sie gegen
e Radialseite des Vorderarms (abducirt sie), hilft bei der
pination und Beugung des Vorderarms.

M. extensor carpi radialis brevis s. radialis externus
evis s. secundus, kurzer äufserer Speichenmuskel: von
rselben Gestalt, aber kürzer als der vorige, an dessen
narseite er liegt; entspringt vom Condylus externus oss.
achii und der Fascia antibrachii: die platte dünne Sehne
gt unter der Mitte des Vorderarms an, geht durch die
eite Scheide des Lig. carpi dorsale, und heftet sich an
e Basis oss. metacarpi tertii (Schleimbeutel). Wirkt wie
r vorige.

M. extensor digitorum communis, gemeinschaftlicher Fin-
rstrecker. Länglich, plattrund, oben spitzig, unten in
er Sehnen auslaufend; nimmt die Mitte der äufseren
äche des Vorderarms ein; entspringt sehnig und mit dem
rigen verwachsen vom Condylus externus oss. brachii
id der Fascia antibrachii, spaltet sich in der Mitte des
orderarms in vier Bäuche, welche bald in lange platte
hnen übergehen, von welchen die zweite die stärkste, die
erte die schwächste ist; und anfänglich von einer gemein-
haftlichen, später jede von einer besondern Synovialscheide
ngeben sind. Sie laufen durch die vierte Scheide des Lig.
rpi dorsale, weichen auf dem Carpus auseinander, werden

auf dem Metacarpus durch drei schräge sehnige Queerstreifen vereinigt, und befestigen sich auf der Rückenfläche des zweiten bis fünften Fingers. Eine jede dieser Sehnen bildet auf dem ersten Fingergliede eine breite dreieckige Aponeurose, welche die Rücken- und Seitenflächen der ersten Phalanx bedeckt, an diese durch kurzes Zellgewebe geheftet ist, und seitwärts mit den Sehnen der Mm. lumbricales und interossei sich vereinigt: alsdann spaltet sie sich in einen mittleren und zwei seitliche Schenkel: der erstere setzt sich an die obere Extremität der zweiten Phalanx; die beiden Seitenschenkel aber laufen convergirend über die zweite Phalanx, und heften sich vereinigt an die dritte Phalanx. Die Sehne überhaupt schützt und verstärkt die Kapselbänder der Fingergelenke. — Der Muskel streckt den zweiten bis fünften Finger, hilft auch bei der Streckung der ganzen Hand. Zuweilen fehlt die vierte Sehne gänzlich, oder sie geht nicht zum kleinen Finger, sondern zum Ringfinger, oder an beide letzte Finger, indem sie sich nochmals spaltet.

M. extensor digiti minimi proprius, eigener Strecker des kleinen Fingers. Länglich, dünn und rundlich, entspringt mit dem vorigen gemeinschaftlich, liegt an dessen Ulnarseite und ist anfänglich genau mit ihm verwachsen; geht am unteren Ende des Vorderarms in eine dünne rundliche Sehne über, welche durch die fünfte Scheide des Lig. carpi dorsale läuft, auf dem Handrücken aber mit der vierten Sehne des M. extensor digitorum communis, die für den kleinen Finger bestimmt ist, verschmilzt: zuweilen auch die dritte dem Ringfinger angehörige Sehne des M. extensor dig. communis verstärkt. Zuweilen fehlt er gänzlich. Streckt den kleinen Finger.

M. extensor carpi ulnaris, s. ulnaris externus, äufserer Ellenbogenmuskel. Länglich, rundlich eckig, liegt an der Ulnarseite der beiden vorigen, und ist mit ihnen verwachsen: entspringt sehnig vom Condylus externus oss. brachii und der Fascia antibrachii, wendet sich über das Capitulum radii, woselbst ein Schleimbeutel unter ihm liegt, nach hinten, und läuft alsdann auf der äufseren Fläche der Ulna herab: geht am unteren Drittheil des Vorderarms in eine starke Sehne über, welche von einer Synovialscheide umgeben durch die sechste Scheide des Lig. carpi dorsale läuft, und

die Tuberositas oss. metacarpi quinti sich heftet. Streckt
e Hand, und zieht sie gegen die Ulnarseite des Vorder-
ms, adducirt sie.

M. anconaeus s. anconaeus quartus s. parvus, Knorren-
skel; kurz, platt und dreieckig, liegt neben dem Kopf
s vorigen, und entspringt mit einer dünnen Sehne vom
ndylus externus oss. brachii; hängt durch seinen obe-
n Rand mit dem Caput externum m. tricipitis zusammen,
d heftet sich mit einem breiten kurzsehnigen Rande an
n äufseren Winkel und die äufsere Fläche der Ulna,
gs ihres oberen Viertheils. Streckt den Vorderarm.

M. supinator brevis, kurzer Rückwärtsdreher; platt,
ieckig, unten breiter als oben; vom M. supinator
gus und den Mm. extensores und anconaeus bedeckt;
springt vom Condylus externus oss. brachii, den Ligg.
chioradiale und annulare radii, und von der Stelle der
na zwischen der Incisura semilunaris minor und dem
ecranon: schlägt sich mit queerlaufenden und schräg
steigenden Fasern um das obere Ende des Radius, und
tet sich an den äufseren Rand der Tuberositas radii
d an die vordere und innere Fläche des Radius. Bewirkt
Supination des Vorderarms und der Hand. Ist oft in
en oberen und unteren Theil gespalten.

M. abductor pollicis longus, s. bicornis, langer Abzie-
des Daumens; platt länglich und ziemlich stark; ent-
ingt in der Mitte des Vorderarms von der Crista ul-
, dem Lig. interosseum und der äufseren Fläche des
lius, woselbst er vom M. extensor digitorum communis
l extensor longus pollicis bedeckt wird: biegt sich über
Sehnen der Mm. extensores carpi radiales und die
dere Fläche des Radius, nur von der Fascia antibrachii
leckt; und geht in eine platte Sehne über, welche an
vorderen Fläche des Proc. styloideus radii durch die
te Scheide des Lig. carpi dorsale läuft, und hier von ei-
Synovialscheide umhüllt wird. Sodann spaltet sich die
hne in drei Zipfel, von denen der stärkste an die Basis
metacarpi pollicis, der zweite an das Os multangulum
jus sich heftet; und der dritte in den M. abductor
llicis brevis, und den diesen Muskel bedeckenden Theil
Fascia palmaris übergeht. Abducirt den Daumen und

die ganze Hand, streckt das Os metacarpi pollicis, hilft bei der Supination.

M. extensor pollicis brevis, kurzer Daumenstrecker; platt länglich, dünn und schmal; hat dieselbe Richtung wie der vorige, an dessen Ulnarrande er liegt. Entspringt vom Lig. interosseum und der äufseren Fläche des Radius; seine dünne Sehne läuft mit der des M. abductor pollicis longus durch die erste Scheide des Lig. carpi dorsale (Synovialscheide) zum Daumen, und heftet sich an die Rückenfläche der ersten Phalanx desselben. Streckt und abducirt den Daumen.

M. extensor pollicis longus, langer Daumenstrecker: ist länger und stärker, bedeckt zum Theil den Ulnarrand des vorigen, und wird selbst bis zum Handgelenk hin vom M. extensor digitorum communis verborgen. Entspringt von der Crista ulnae und dem Lig. interosseum, geht am Handgelenke in eine lange, dünne, von einer Synovialscheide bekleidete Sehne über, welche schräg über die Sehnen der Mm. extensores carpi radiales, — aber weiter nach der Ulnarseite hin, als der M. extensor pollicis brevis — durch die dritte Scheide des Lig. carpi dorsale läuft, und auf dem Os. metacarpi pollicis mit der Sehne des kurzen Daumenstreckers verschmilzt; aber vorzüglich an das obere Ende des Nagelgliedes des Daumens sich befestigt. Streckt und abducirt den Daumen.

M. extensor indicis proprius s. indicator, eigener Strekker des Zeigefingers: sehr länglich, dünn, schmal und platt; liegt neben der Ulnarseite des vorigen und bedeckt den Kopf desselben: entspringt von der Crista und äufseren Fläche der Ulna, geht, vom M. extensor communis digitorum bedeckt, gerade abwärts: seine Sehne läuft mit den Sehnen des genannten Muskels durch die vierte Scheide des Lig. carpi dorsale, und verschmilzt vollkommen mit der ersten für den Zeigefinger bestimmten Sehne desselben. Streckt den Zeigefinger.

b. An der inneren und Ulnarseite.

M. pronator rotundus s. teres, runder Vorwärtsdreher: länglich rundlich, oben breiter, unten spitzig, ziemlich stark: entspringt vom Condylus internus oss. brachii, läuft

der inneren Seite der Ellenbogengrube, schräg nach ten und vorn, zur Mitte des Radius; und heftet sich t einer kurzen Sehne an die vordere Fläche desselben, eich unterhalb der Insertion des M. supinator brevis. llt den Radius nach innen, bewirkt die Pronation des orderarms und der Hand, hilft bei der Beugung des orderarms. Zuweilen doppelt vorhanden.

M. flexor carpi radialis s. radialis internus, innerer eichenmuskel: länglich, spindelförmig; entspringt vom ndylus internus oss. brachii und der Fascia antibrachii, it den Mm. pronator rotundus und flexor digitorum sub-nis verwachsen; läuft etwas schräg gegen die Radialseite h biegend nach unten; geht in der Mitte des Vorder-ms in eine starke platte Sehne über, welche unter dem g. carpi volare commune, an der Ulnarseite der Tube-sitas oss. navicularis und durch den Sulcus oss. multan-li majoris, durch eine eigene fibröse Scheide läuft, hier n einer Synovialscheide bekleidet wird, und an die Basis ss. metacarpi indicis sich heftet. Beugt und abducirt ie Hand, hilft bei der Pronation.

M. flexor carpi ulnaris s. ulnaris internus, innerer El-nbogenmuskel: länglich und halbgefiedert; liegt längs er inneren Seite der Ulna, von dem vorigen durch die Im. flexor digitorum communis sublimis und palmaris ngus getrennt. Entspringt vom Condylus internus oss. rachii, von der inneren Fläche des Olecranon, von der ascia antibrachii, und vermittelst dieser vom inneren Vinkel des Mittelstücks der Ulna bis zum unteren Ende ieses Knochens herab. Der Muskel bildet mit seiner vor-eren ausgehöhlten Fläche eine Rinne, welche den hinte-en Rand des M. flexor digitorum communis profundus und die Vasa ulnaria) aufnimmt. Seine Sehne beginnt in er Mitte des Vorderarms am vorderen Rande des Muskels nd heftet sich zuerst an das Os pisiforme (Schleimbeutel); eht aber auch in die von diesem Knochen zum Os hamatum nd zur Tuberositas oss. metacarpi quinti laufenden Bän-ler über, und gelangt vermittelst derselben bis zum Mit-elhandbein des kleinen Fingers. Beugt und adducirt die Hand.

M. flexor digitorum communis sublimis s. superficialis

s. perforatus, oberflächlicher Fingerbeuger: ist der breiteste und dickste Muskel der oberflächlichen Schicht, liegt in der Mitte des Vorderarms zwischen den Mm. flexores carpi radialis und ulnaris, ist mit beiden verwachsen und wird an seinem Ulnarrande vom letztgenannten, in der Mitte aber vom M. palmaris longus, zum Theil bedeckt. Entspringt vom Condylus internus oss. brachii, dem inneneren Rande des Proc. coronoideus ulnae, und der inneren Fläche des Radius; läuft gerade abwärts, wird schmaler, und spaltet sich am unteren Drittheil des Vorderarms in drei bis vier Bäuche, welche alsbald in vier lange schlanke Sehnen übergehen. Diese Sehnen gehen unter dem Lig. carpi volare proprium und sodann divergirend durch die Mittelhand, zum zweiten bis fünften Finger; die für den Mittelfinger ist gemeiniglich die stärkste. In dem ersten Fingergliede spaltet sich jede dieser Sehnen in zwei Schenkel, die sich mit ihren den Knochen zugewandten Rändern über dem zweiten Fingergelenke wieder vereinigen, und dadurch einen länglichen Spalt und eine Rinne bilden: endlich heftet sich die Sehne mit den zugespitzten Enden der beiden Schenkel an die Seitenränder der Volarfläche der zweiten Phalanx. Die durch den Spalt getrennten, aber in ihrer Mitte vereinigten Schenkel bilden die Figur eines X, Chiasma tendinosum Camperi genannt. Der Muskel beugt die zweite Phalanx des zweiten bis fünften Fingers.

M. flexor digitorum communis profundus s. perforans, tiefer Fingerbeuger: dem vorigen ähnlich, aber dicker, und von ihm und dem M. flexor carpi ulnaris verdeckt; entspringt vom Proc. coronoideus, der inneren Fläche und inneren Winkel der oberen zwei Drittheile der Ulna, und vom Lig. interosseum; spaltet sich in vier Bäuche und Sehnen, welche unter denen des M. flexor dig. com. sublimis, und unter dem Lig. carpi volare proprium, zum zweiten bis fünften Finger laufen: sie gehen durch die Spalten und Rinnen der Sehnen des M. flexor dig. sublimis; liegen daher auf dem zweiten Fingergliede oberflächlicher als jene; und heften sich an die dritte Phalanx. Der Muskel beugt das Nagelglied des zweiten bis fünften Fingers.

Vaginae tendinum mm. flexorum communium digitorum. e acht Sehnen beider Fingerbeuger werden schon ober- ib des Lig. carpi volare proprium von einer gemeinschaft- hen, aber durch Scheidewände getheilten, Synovialscheide ugehüllt, welche in vier besondere Scheiden für die zwei jedem Finger laufenden Sehnen übergeht; diese Schei- n begleiten die Sehnen bis zur dritten Phalanx, und bil- n am ersten und zweiten Gliede ein oder zwei Paare mmaler Falten, *Vincula vasculosa tendinum* s. tenacula s. gg. mucosa genannt, welche von den Phalangen aus in unmittelbare Bekleidung der Sehnen übergehen, und Gefäfse zu den letzteren leiten. Diese Synovialscheiden rden an jedem Finger von einer fibrösen Sehnenscheide deckt, welche aus einzelnen, durch Zwischenräume ge- nnten, sehnigen Streifen oder Bändern von meistens lbringförmiger Gestalt besteht, an die Volarfläche und inder der knöchernen Phalangen geheftet ist, und mit die- n eine enge und feste, aber nicht ganz vollständige Röhre ldet, die inwendig von der Synovialscheide bekleidet ird. Die stärksten und breitesten jener Bänder, *Ligamenta ginalia digitorum*, Scheidenbänder genannt, zwei an jedem nger, liegen in der Mitte der ersten und zweiten Pha- nx; die schwächeren und schmaleren Ringbänder, *Ligg. nularia*, drei an jedem Finger, liegen über den Fingerge- nken, und das erste hängt mit den Ligg. capitulorum oss. etacarpi und den Zipfeln der Fascia palmaris genau zu- mmen: beide Arten von Bändern sind gröfstentheils aus ueerfasern gewebt, und am ersten Fingergliede und ersten ngergelenke am stärksten entwickelt. Zwischen den igg. vaginalia und annularia liegen noch schräge einfache ler doppelte sich durchkreuzende schmale Streifen, *Ligg. bliqua* und *cruciata*, schräge und Kreuzbänder, welche am ritten, und oft auch am zweiten Gliede fehlen.

Wenn dem einen M. flexor com. digitorum eine Sehne hlt, so besitzt der andere meistens eine überzählige.

M. flexor pollicis longus, langer Daumenbeuger: läng- ch, platt, halbgefiedert; liegt an der Radialseite des M. exor dig. communis profundus; entspringt von der inne- en Fläche und dem inneren Winkel des ganzen Mittelstücks es Radius, und mit einem besonderen langen, schmalen,

gröfstentheils sehnigen Zipfel vom Proc. coronoideus ulnae. Die Sehne beginnt am Ulnarrande des Muskels, geht mit denen der Fingerbeuger unter dem Lig. carpi volare proprium hindurch, und zwischen den beiden Köpfen des M. flexor pollicis brevis zur zweiten Phalanx des Daumens, woselbst sie über das am zweiten Daumengelenke liegende Os. sesamoideum hinläuft. Die Synovialscheide der Sehne entsteht oberhalb des Lig. carpi volare proprium; an dem ersten Daumengliede wird die Sehne von einer fibrösen Scheide umgeben, welche ganz wie die Scheiden der Sehnen der Mm. flexores digitorum communes gebildet, aber kürzer als jene ist, nur zwei Ligg. annularia und ein Lig. vaginale enthält. — Beugt das zweite Daumenglied.

M. pronator quadratus, viereckiger Vorwärtsdreher: platt, viereckig, läuft queer über die innere Seite des Vorderarms, nahe oberhalb des Handgelenks, und genau auf den Knochen und dem Lig. interosseum; und wird von allen Beugern der Hand und langen Fingerbeugern bedeckt. Entspringt von der hinteren Fläche und dem inneren Winkel der Ulna, und inserirt sich an die innere Fläche und den inneren Winkel des Radius. Rollt den Radius nach innen, bewirkt die Pronation des Vorderarms und der Hand. Selten fehlt er; zuweilen zerfällt er in zwei Portionen.

D. Muskeln an der Hand.

Mm. lumbricales manus, Spulmuskeln der Hand: vier kleine längliche runde Muskeln in der Mitte der Hohlhand: entspringen von den Radialrändern der Sehnen des M. flexor digitorum communis profundus, zuweilen auch von den Ulnarrändern derselben: gehen über die Volarflächen der Ligg. capitulorum ossium metacarpi hin, an die Radialseiten der ersten Phalangen des zweiten bis fünften Fingers, und verlieren sich mit dünnen Sehnen in die Radialränder der dreieckigen Aponeurosen, welche die Sehnen des M. extensor dig. communis auf den Rücken der ersten Fingerglieder bilden (S. 258). Sie beugen das erste Glied des zweiten bis fünften Fingers; wenn sie aber gemeinschaftlich mit dem M. extensor dig. communis wirken, so helfen sie bei der Streckung des zweiten und dritten Gliedes.

M. abductor pollicis brevis, kurzer Abzieher des Daumens. Kurz, platt dreieckig; ist der äufserste und oberflächlichste Muskel des Daumenballens: entspringt von dem Lig. carpi proprium volare und der Tuberositas oss. multanguli majoris, heftet sich an die erste Phalanx des Daumens, das äufsere Os sesamoideum einwebend, und verbindet sich durch eine schmale Aponeurose mit den Sehnen der Mm. adductor pollicis longus und extensor pollicis brevis. Entfernt den Daumen von den übrigen Fingern.

M. opponens pollicis, Gegensteller des Daumens: dreieckig, kürzer und dicker als der vorige, von welchem er fast gänzlich bedeckt wird; hat denselben Ursprung und heftet sich an den Radialrand und das Capitulum ossis metacarpi pollicis. Zieht den Daumen nach innen und gegen den kleinen Finger hin, beugt sein Os metacarpi.

M. flexor pollicis brevis, kurzer Daumenbeuger: besteht aus zwei länglich dreieckigen Köpfen oder Portionen, und liegt weiter nach innen als die vorigen. Der äufsere oberflächliche Kopf, Caput externum (auch M. abductor pollicis brevis alter genannt), entspringt vom Radialende des Lig. carpi volare proprium, bedeckt den inneren Rand des M. opponens pollicis, und ist mit ihm und dem M. abductor pollicis brevis verwachsen. Der innere tiefere Kopf entspringt, von dem Lig. carpi volare proprium und den unter demselben hinlaufenden Sehnen bedeckt, vom Os multangulum minus, Os capitatum und Os hamatum, wird vom M. opponens bedeckt, und hängt mit dem M. adductor pollicis genau zusammen. Die beiden Köpfe vereinigen sich in der Tiefe, bleiben aber oberflächlich getrennt, und bilden eine Rinne für die Sehne des M. flexor pollicis longus: sie setzen sich an die erste Phalanx, indem sie das äufsere und innere Sesambein am ersten Daumengelenk umfassen. Der Muskel beugt das erste Daumenglied; der äufsere Kopf unterstützt den M. opponens, der innere den M. adductor pollicis.

M. adductor pollicis, Anzieher des Daumens: dreieckig und platt; entspringt breit vom Os capitatum und Os metacarpi tertium, und ist von dem inneren Kopfe des vorigen oft nicht zu trennen: läuft schräg und zugespitzt zum Daumen, und heftet sich an das innere Sesambein und die

erste Phalanx desselben. Zieht den Daumen gegen den Zeigefinger.

M. abductor digiti minimi, Abzieher des kleinen Fingers: länglich platt, der äufserste Muskel am Ulnarrande der Hand; entspringt vom Os pisiforme und Lig. carpi volare proprium, und verliert sich in die Aponeurose des M. extensor digiti minimi am Ulnarrande der ersten Phalanx. Entfernt den kleinen Finger vom Ringfinger.

M. flexor brevis digiti minimi, kurzer Beuger des kleinen Fingers: kleiner als der vorige, ihm ähnlich, und an seiner Radialseite liegend: entspringt vom Lig. carpi volare proprium und Proc. uncinatus oss. hamati, und vereinigt sich mit der Sehne des M. abductor digiti minimi. Beugt das erste Glied des kleinen Fingers, und abducirt ihn. Fehlt nicht selten.

M. adductor digiti minimi s. opponens dig. minimi, Anzieher des kleinen Fingers: dicker und kürzer als der vorige, entspringt weiter gegen die Mitte der Hand vom Lig. carpi volare proprium und Proc. uncinatus oss. hamati, und heftet sich an die Ulnarfläche und das Capitulum des fünften Mittelhandbeins. Zieht den kleinen Finger gegen den Daumen.

Mm. interossei volares s. interni, Zwischenknochenmuskeln der Hohlhand. Drei kleine platt längliche Muskeln, die in den Zwischenräumen der Mittelhandknochen, und zwar der Hohlhand näher, liegen: sie entspringen an den Seitenflächen der Ossa metacarpi, und gehen, neben den Capitula und an den Dorsalflächen der Ligg. capitulorum oss. metacarpi, zu den Seitenrändern der ersten Fingerglieder, woselbst sie sich in die Aponeurosen der Sehnen der Fingerstrecker verlieren. Der erste dieser Muskeln liegt an der Ulnarseite des Zeigefingers, der zweite und dritte an den Radialseiten des vierten und fünften Fingers: sie ziehen diese Finger gegen den Mittelfinger hin.

Mm. interossei dorsales s. externi s. bicipites, Zwischenknochenmuskeln des Handrückens: vier ähnliche Muskeln auf der Rückenfläche der Hand. Sie entspringen mit zwei Köpfen von den beiden Ossa metacarpi, zwischen welchen sie liegen, und verlieren sich in die Aponeurosen der Sehnen der Fingerstrecker auf dem ersten Fingergliede. Der

ite und dritte gehen an die Radial- und Ulnarseite des telfingers, der vierte an die Ulnarseite des Ringfingers. erste ist der stärkste, liegt zwischen Daumen und gefinger an der Rückenfläche des M. adductor pollicis, inserirt sich an der Radialseite der ersten Phalanx des gefingers: seine beiden Köpfe bleiben lange getrennt; er sein äufserer stärkerer Kopf, welcher vom Os metapi pollicis und Os multangulum majus kommt, oft als besonderer Abzieher des Zeigefingers, *M. abductor in-s*, betrachtet wird. — Der erste und vierte dieser skeln ziehen den Zeigefinger und Ringfinger vom Mitinger ab, der zweite zieht den Mittelfinger gegen den gefinger, der dritte gegen den Ringfinger.

Der Zeigefinger besitzt also einen M. interosseus vola- und einen M. i. dorsalis; der Mittelfinger zwei Mm. lorsales; der Ringfinger einen M. i. volaris und einen i. dorsalis; und der kleine Finger nur einen M. i. volaris.

Muskeln am Bauche.

6 Paare.

Sehr breite platte oder platt längliche Muskeln, welche n Raum zwischen dem unteren Rande des Thorax und n Becken ausfüllen, und auf diese Weise die lange vordere l die kürzeren Seitenwände der Bauchhöhle bilden, und meinschaftlich mit der Wirbelsäule die hintere Bauchwand ammensetzen.

In der Mitte der vorderen Bauchwand findet sich ein r starker sehniger Streifen, *die weifse Linie*, *Linea alba*, lche der Wirbelsäule gegenüber vom Proc. xiphoides zur mphysis pubis herabläuft. In der Regio epigastrica ist 4 bis 6‴, in der Nabelgegend aber 6 bis 8‴ breit; und r sind die Sehnenfasern derselben, welche die in frühen Lebensperioden vorhandene Öffnung, den Nabelring, geben, mit den Resten des Nabelstrangs und der äufseren ut verwachsen. Unterhalb des Nabels wird die Linea a beträchtlich schmaler, aber dicker, vereinigt sich ingst mit dem Lig. arcuatum superius und dem Faserknorl der Symphysis pubis, und wird hier an ihrer hinteren iche durch ein kurzes dreieckiges Band, *Ligamentum tri-*

angulare s. adminiculum *lineae albae*, verstärkt, welches breit vom oberen Rande der Symphysis pubis entspringt, und mit seiner Spitze in die Linea alba sich verliert. — Neben der Linea alba liegen zu beiden Seiten die Mm. recti abdominis, jeder in eine starke sehnige Scheide, Fascia recta abdominis, eingeschlossen, welche mit der Linea alba und den Aponeurosen der seitlichen Bauchmuskeln in unmittelbarer Verbindung steht, und einen eigenen kleinen Spannmuskel, M. pyramidalis, enthält. Die Seitenwand des Bauchs wird von drei platten seitlichen Bauchmuskeln, den Mm. abdominis obliquus externus, obliquus internus und transversus zusammengesetzt: diese laufen von den Rippen, der Fascia lumbodorsalis und der Crista ossis ilium aus zur Fascia recta hin, verbinden sich mit dieser durch breite Aponeurosen, und reichen nur vermittelst derselben bis zur Linea alba: nach unten vereinigen sie sich durch einen starken sehnigen Streifen, Arcus cruralis s. Lig. Fallopii s. Poupartii genannt, mit den Fascien der Hüft- und Schenkelmuskeln. Zu beiden Seiten der Wirbelsäule, den Mm. recti gegenüber, liegen die Mm. quadrati lumborum, und bilden mit den Lendenwirbeln die hintere Bauchwand, welche durch die Fasciae lumbodorsales und die Rückenmuskeln verstärkt wird. Die obere Wand der Bauchhöhle ist das Zwerchfell: unten geht die Bauchhöhle in die Beckenhöhle über, und wird durch die Muskeln des Dammes, insbesondere durch die Mm. levatores ani und die Fascia pelvis, und durch die Organe verschlossen, welche, von dieser Fascia und den genannten Muskeln umfafst, im Beckenausgange liegen.

Die äufsere Fläche der Fascia recta und der seitlichen Bauchmuskeln wird von der Fascia superficialis überzogen, welche in der Regio hypogastrica und inguinalis vorzüglich stark entwickelt und mit mehreren Bursae mucosae subcutaneae versehen ist, und von hier zum Oberschenkel ununterbrochen herabsteigt. An der inneren Fläche der Bauchwände liegt eine ähnliche dünne zellulös-fibröse Ausbreitung, die Fascia transversalis.

Die Bauchmuskeln bilden im Allgemeinen die nachgiebigen muskulös-sehnigen Wände der Bauchhöhle, welche durch ihre Contraction die Höhle nach mehreren Richtungen

engern, daher die Entleerung des Darmkanals, der Harn-
se und der Gebärmutter befördern; aufserdem ziehen sie
Brustkasten herab, näheren ihn dem Becken und ver-
ern ihn bei der Exspiration: und indem ihre Wirkung,
den Wänden des Thorax auf die Wirbelsäule sich fort-
zt, beugen sie die letztere nach vorn.

M. rectus abdominis, gerader Bauchmuskel. Sehr lang
l platt, oben breiter und dünner, unten schmaler und
ker: entspringt mit drei breiten fleischigen Zacken von
vorderen Flächen des fünften, sechsten und siebenten
ppenknorpels, des Proc. xiphoides, und vom Lig. costo-
hoideum, zuweilen auch noch vom achten Rippenknorpel;
gt nach aufsen mit dem M. obliquus externus, nach oben
t dem M. pectoralis durch einzelne Fleischbündel oder
nige Streifen zusammen; und steigt neben der Linea
a gerade abwärts. In diesem Laufe wird er durch kurze
ndines intermedii in mehrere Bäuche getheilt; jene Zwi-
ensehnen, *Inscriptiones tendineae* genannt, gehen in Ge-
lt schmaler Queerstreifen durch die ganze oder halbe
eite des Muskels. Gewöhnlich finden sich vier solcher
vischensehnen: die erste, 1″ unterhalb des Ursprungs,
ht meistens nur durch die innere Hälfte des Muskels; die
eite und dritte (letztere in der Höhe des Nabels) gehen
rch die ganze Breite desselben; die vierte unterhalb des
bels aber nur durch seinen äufseren Rand: sie sind vor-
glich auf der vorderen Fläche des Muskels sichtbar, und
rstärken ihn bedeutend durch Verkürzung seiner Fleisch-
sern. Das untere, beinahe spitzige, höchstens 1″ breite
de des Muskels spaltet sich in einen äufseren breiteren
d einen inneren schmaleren sehnigen Schenkel, *Crus ex-
rnum et internum:* ersterer setzt sich an den oberen Rand
r Symphysis pubis und des inneren Endes des Ramus
rizontalis ossis pubis; letzterer steigt bis zur Mitte der
rderen Fläche der Symphysis pubis herab, kreuzt sich
it dem der anderen Seite, und schickt einzelne Fasern zum
g. suspensorium penis.

Fascia recta abdominis s. recto-abdominalis, s. Vagina
. recti, gerade Bauchmuskelscheide, besteht aus einem
orderen und hinteren Blatte, welche die vordere und hin-
re Fläche des M. rectus abdominis überziehen, an ihren Sei-

tenränder sich vereinigen, und vermittelst dieser nach innen mit der Linea alba, nach aufsen mit den Aponeurosen der seitlichen Bauchmuskeln genau verbunden sind. Sie bestehen aus queeren und schrägen starken Schnenfasern, welche einander durchkreuzen. Das vordere Blatt beginnt dünn auf dem unteren Ende des Brustbeins und den untersten Bündeln des M. pectoralis major, und erhält vom letzteren ein als Spannmuskel wirkendes Fleischbündel: im Herabsteigen wird es schmaler und stärker, ist von den Fleischfasern des M. rectus durch Zellgewebe getrennt, mit den Inscriptiones tendineae aber genau verwachsen: und endigt an der vorderen Fläche der Symphysis pubis, woselbst es sich in zwei Blätter spaltet, die den M. pyramidalis einschliefsen. Das hintere im Allgemeinen schwächere Blatt beginnt an der hinteren Fläche der Rippenknorpel und des Proc. xiphoides, liegt lockerer an der hinteren Fläche des M. rectus, und reicht nur bis zur Mitte zwischen Nabel und Symphysis pubis, woselbst es mit einem bogenförmigen Rande, *Linea semicircularis Douglasii,* endigt.

M. pyramidalis abdominis, Pyramidenmuskel des Bauchs, ist länglich dreieckig, nur 2″ bis 2½″ lang, platt und schmal; liegt in dem vorderen Blatt der Fascia recta; entspringt vom oberen Rande der Symphysis pubis, steigt nahe an der Linea alba aufwärts, und verliert sich mit seiner Spitze in dem inneren Rande dieser Fascia, welcher mit der Linea alba verwachsen ist. Spannt die Fascia und die Linea alba an. Fehlt zuweilen.

M. obliquus externus abdominis s. oblique descendens, schräger äufserer oder absteigender Bauchmuskel: breit, platt, ungleich viereckig, vorn beträchtlich länger als hinten. Er entspringt mit seinem oberen schräg nach hinten herabsteigenden Rande von den äufseren Flächen der fünften bis zwölften Rippe vermittelst acht fleischiger Dentationen, welche sich zwischen die Dentationen des M. latissimus dorsi und die unteren Zacken des M. serratus anterior major einschieben: von diesen Ursprüngen an laufen die obersten Fleischfasern beinahe horizontal nach vorn, die übrigen schräg nach unten und vorn. Mit seinem hinteren kürzesten Rande gränzt der Muskel an den vorderen Rand des hinteren Blattes der Fascia lumbodorsalis, und

mit dieser gewöhnlich durch einige Sehnenstreifen ver-
den. Mit seinem unteren Rande heftet er sich an das
ium externum cristae oss. ilium, ungefähr von der Mitte
Crista an bis zur Spina anterior superior oss. ilium:
hier an bis zum Tuberculum pubis bildet er den Schen-
ogen. Der vordere längste Rand geht in eine starke aus
erfasern gebildete Aponeurose über, welche mit dem
deren Blatte der Fascia recta verschmilzt, und von dem
rpel der sechsten Rippe und dem Proc. xiphoides bis
oberen Rande der Symphysis pubis hinabreicht: das
re Drittheil dieser Aponeurose in der Regio hypogas-
a und inguinalis ist breiter und dreieckig; ihr unter-
plattes Faserbündel, *Crus internum s. superius annuli*
inalis anterioris genannt, steigt noch tiefer an der vor-
en Fläche der Symphysis pubis herab, durchkreuzt sich
dem der anderen Seite und den inneren Schenkeln der
. recti abdominis, und schickt Fasern zum Lig. suspen-
um penis.

Die vordere Abtheilung des unteren Randes des Muskels
in Gestalt eines platten starken Bandes, zwischen der
a anterior superior oss. ilium und dem Tuberculum pubis
der Crista pubis ausgespannt, und wird *Arcus cruralis* s.
. *Pouparti s. Fallopii s. inguinale externum*, *Schenkelbo-*
, *Poupart'sches oder Fallopisches Band, oder äufseres*
tenband genannt. — Der Schenkelbogen ist nur an drei
len an Knochen geheftet, nämlich an die Spina anterior
erior oss. ilium (d. i. die sog. *erste Insertion*), an das
erculum pubis (*zweite Insertion*), und an das innere
e der Crista pubis (*dritte Insertion*): verbindet sich
igens nur mit den Mm. obliquus internus und transver-
und mit Fascien (der Fascia transversalis, iliaca und
, und der Vagina vasorum cruralium): und bildet mit
vorderen Rande des Os ilium und dem Ramus hori-
talis oss. pubis, über welche er hingespannt ist, eine
gliche, queerliegende, geräumige Spalte, durch welche
Mm. psoas major und iliacus internus, die grofsen
enkelgefäfse, und mehrere Nerven gehen. Seine Rich-
g ist überhaupt von oben, aufsen und hinten nach unten,
en und vorn: er biegt sich aber in seiner äufseren
fte schwach convex nach unten, und in seiner inneren

Hälfte leicht concav nach oben. Seine äufsere Hälfte zwischen Spina anterior superior oss. ilium und Tuberculum iliopectineum ist ein rundlichplattes Sehnenbündel mit einem abwärts gerichteten einfachen Rande; je mehr er aber, vom Tuberculum iliopectineum an, der Symphysis pubis sich nähert, desto breiter wird er, und rollt sich nach hinten um: so dafs er eine horizontale Lage annimmt, — dafs er seinen einen umgeschlagenen und daher abgerundeten und stumpfen Rand nach vorn, den anderen scharfen Rand nach hinten richtet, — und dafs die eine ausgehöhlte, einen Halbkanal bildende Fläche nach oben gegen die Bauchhöhle, die andere gewölbte Fläche nach unten gegen den Oberschenkel sieht. Das Ende des vorderen stumpfen Randes befestigt sich sodann strahlenförmig am Tuberculum pubis, das Ende des hinteren scharfen Randes aber unter einem spitzigen Winkel an die Crista pubis; zwischen diesem Rande und der Crista pubis bleibt aber noch ein länglich dreieckiger offener Raum, der vom Lig. Gimbernati grofsentheils verschlossen wird.

Der Schenkelbogen hängt in dem gröfseren Theile seines Verlaufs mit dem unteren dreieckigen Theile der Aponeurose des M. obliquus externus ununterbrochen zusammen; und wird nur an seinem inneren Ende, in der Nähe seiner zweiten und dritten Insertion, durch eine Spalte von jener Aponeurose getrennt. Diese Spalte ist der *vordere oder äufsere Leistenring oder Bauchring*, *Annulus inguinalis anterior s. externus* s. *Annulus abdominalis*. Der vordere Leistenring ist von länglicher ungleich dreiseitiger Gestalt; sein unterer Rand oder Basis, 6‴ bis 8‴ lang, liegt horizontal über dem Tuberculum pubis, und wird von dem oberen Rande des inneren Endes des Ramus horizontalis oss. pubis, vom Tuberculum pubis, und von der zweiten und dritten Insertion des Schenkelbogens gebildet; der Mittelpunkt dieses Randes ist von der Mitte des oberen Randes der Symphysis pubis 15‴ entfernt. Sein innerer oberer 15‴ bis 18‴ langer Rand ist das unterste Bündel der Aponeurose, welches sich an die vordere Fläche der Symphysis pubis befestigt, das sog. *Crus internum annuli inguinalis anterioris* s. abdominalis (S. 271.); — der äufsere untere 12‴ bis 15‴ lange Rand ist das innere Ende des Schenkelbogens, wel-

s in dieser Beziehung auch *Crus externum annuli inguis anterioris* s. abdominalis genannt wird. Die Spitze r der obere äufsere Winkel des vorderen Leistenringes gt gegen das Os ilium hin, von dem Mittelpunkte des eren Randes 13‴ bis 16‴ entfernt, und wird durch ei- e Queerfasern abgerundet; auch hängt eine tiefere Schicht Fascia superficialis genauer an den Rändern fest, und let eine schwache Decke über den Leistenring. Der ttelpunkt des vorderen Leistenringes ist von der Mitte oberen Randes der Symphysis pubis 1½″ entfernt. In n vorderen Leistenringe liegt beim männlichen Geechte der Samenstrang, beim weiblichen aber, woselbst Spalte kürzer und schmaler, überhaupt enger ist, das de Mutterband.

M. obliquus internus abdominis s. oblique adscendens, räger innerer oder aufsteigender Bauchmuskel, ist platt l ungleich viereckig, wird vom vorigen vollständig bekt und durch eine dünne Zellgewebsschicht von ihm egränzt. Er entspringt mit seinem unteren und hinteren nde, und inserirt sich mit seinem oberen und vorderen nde. Der untere Rand entsteht von der Linea intermedia stae oss. ilium, von der Spina anterior superior oss. m, und von der hinteren Fläche und dem hinteren arfen Rande des Arcus cruralis: der hintere kurze Rand den vereinigten Blättern der Fascia lumbodorsalis. Von sen Ursprüngen an laufen die Fasern schräg nach vorn l oben. Die kürzeren von der Fascia lumbodorsalis nmenden steigen aufwärts, und befestigen sich mit drei schigen Zacken an die unteren Ränder der zwölften bis nten Rippe. Die längeren von der Crista oss. ilium sprungenen Fasern laufen divergirend sämmtlich vorwärts l gröfstentheils schräg aufwärts; die unteren vom Arcus ralis entspringenden kürzeren Fasern aber horizontal en die Fascia recta hin, und bleiben in der Inguinalend länger fleischig, als die des M. obliquus externus: diese Fasern gehen endlich in eine kurze breite Aponrose über. Diese ist oben an die hintere Fläche des nten und neunten Rippenknorpels geheftet; vorn aber angt sie in der vorderen Bauchwand zum äufseren Rande Fascia recta, spaltet sich bis zur Linea semicircularis

Douglasii herab in ein vorderes und hinteres Blatt, und geht vermittelst derselben in das vordere und hintere Blatt der Fascia recta über: unterhalb der Linea semicircularis Douglasii bis zur Symphysis pubis herab, verliert sie sich ungespalten nur in dem vorderen Blatte der Fascia recta. Der untere dünne Rand des Muskels in der Inguinalgegend ist nicht allein mit dem Schenkelbogen, von welchem er entspringt, verbunden, sondern auch mit dem unteren Rande des hinter ihm liegenden M. transversus abdominis genau verwachsen: der Theil desselben, welcher von dem hinteren scharfen Rande des Schenkelbogens und dessen dritter Insertion an der Crista pubis entspringt, ist aus Fleisch- und Sehnenfasern gemischt, und liegt unmittelbar hinter dem vorderen Leistenringe, so dafs eine Stelle desselben (die sog. Schenkelfläche des vorderen Leistenringes) zwischen den Schenkeln desselben sichtbar ist. In männlichen Körpern geht von dieser Stelle ein schwaches Muskelbündel ab und aus dem vorderen Leistenringe hervor, d. i. der innere Ursprung des M. cremaster: und weiter nach aufsen, 1″ von der Spitze des vorderen Leistenringes entfernt, löset sich ein ansehnlicheres Muskelbündel, der äufsere Ursprung des M. cremaster, von dem unteren Rande des M. obliquus internus ab und dringt aus dem Leistenringe hervor: beide Bündel vereinigen sich durch Verschlingung ihrer Fasern zu dem dünnen platten *M. cremaster*, welcher mit dem Samenstrange bis zum Hoden herabsteigt. In weiblichen Körpern gehen, anstatt des M. cremaster, nur einzelne schwache Muskelfasern an das runde Mutterband.

M. transversus abdominis, queerer Bauchmuskel. Vom vorigen bedeckt läuft er in queerer Richtung von den Rippen, aus der Lendengegend, vom Darmbein und vom Schenkelbogen gegen die Fascia recta hin. Er entspringt fleischig von der inneren Fläche der Knorpel der sechsten bis zwölften Rippe, aponeurotisch von der Vereinigung der beiden Blätter der Fascia lumbodorsalis, und theils sehnig theils fleischig vom Labium internum cristae ossis ilium und der hinteren Fläche und dem hinteren Rande des Arcus cruralis, woselbst er genau mit dem unteren Rande des M. obliquus internus verwachsen ist: oberwärts fliefst er mei-

is mit dem M. triangularis sterni und dem Zwerchfell ammen. Seine Fleischbündel endigen, früher als die M. obliquus internus, in einer von oben nach unten ablaufenden nach aufsen gekrümmten Linie, *Linea semiaris Spigelii;* und gehen in eine breite Aponeurose über, lche bis zur Linea semicircularis Douglasii in das hine Blatt der Fascia recta, und von da an bis zur Symsis pubis in das vordere Blatt dieser Fascia sich verliert. untere Rand schickt meistens einige Fasern zum äufseUrsprunge des M. cremaster. Hinter dem vorderen stenringe, woselbst er vom hinteren scharfen Rande des enkelbogens und dessen dritter Insertion an der Crista is entspringt, und mit dem M. obliquus externus verchsen ist, sind beide Muskeln sehr dünn und kurzfaserig.

M. quadratus lumborum, viereckiger Lendenmuskel; längi viereckig, platt aber dick, unten breiter als oben, gt unmittelbar vor dem vorderen Blatte der Fascia lumlorsalis neben den Lendenwirbeln, mit welchen er die tere Bauchwand bildet. Entspringt vom Labium intern cristae oss. ilium, vom Lig. iliolumbale, und vom c. transversus des fünften Lendenwirbels; erhält auch Aufsteigen verstärkende Bündel von den Queerfortsätzen übrigen Lendenwirbel: befestigt sich vermittelst einer starker Zipfel an die unteren Ränder der Queersätze des vierten bis ersten Lendenwirbels, und mit em breiteren Ende an den unteren Rand der zwölften pe, und an die Körper der beiden letzten Lendenwirbel. zieht die letzte Rippe herab (ist bei der Exspiration agonist der Mm. scaleni), und biegt den Lendentheil Wirbelsäule seitwärts.

Fascia transversalis s. fascia m. transversi, die queere chbinde, überzieht die innere Fläche der hinteren, voren, und vorzüglich der seitlichen Bauchwände. Sie ist rhaupt in den oberen Bauchgegenden schwächer entkelt, als in den unteren: an die Knorpel der unteren pen und die Körper der Lendenwirbel geheftet, verliert sich auf der unteren Fläche des Zwerchfells, und überht die vordere Fläche des M. quadratus lumborum; ist der inneren Fläche des fleischigen Theils des M. transsus durch kurzes fettloses Zellgewebe verbunden, mit

der Aponeurose des M. transversus (von welcher sie wohl zu unterscheiden ist) aber genau verwachsen, so dafs sie mit ihr in das hintere Blatt der Fascia recta übergeht: trennt sich indessen unterhalb der Linea semicircularis Douglasii (die durch ihr Zusammenfliefsen mit einer stark entwickelten Fascia transversalis oft undeutlich wird), von der Aponeurose des M. transversus, um die hintere Fläche des unteren Theils des M. rectus abdominis zu bekleiden. Hier ist sie sehr dünn und oft mit vielem Fett durchwachsen: mehr oberhalb der Symphysis pubis, woselbst sie sich mit dem Lig. triangulare lineae albae verbindet, ist sie wieder stärker. Am dicksten ist sie in der Leistengegend (hieselbst von Hesselbach inneres Leistenband, Lig. inguinale internum, genannt); und vereinigt sich, zwischen der Spina anterior superior oss. ilium und dem Tuberculum iliopectineum, genau mit dem Schenkelbogen und der Fascia iliaca: nach innen vom Tuberculum iliopectineum ist sie an den hinteren scharfen Rand des Schenkelbogens geheftet, verschmilzt mit der Vagina vasorum cruralium; ist an den inneren Umfang dieser Scheide, an den hinteren Rand des Schenkelbogens, und an das Lig. pubis geheftet, und in dem dreieckigen Raume zwischen diesen Theilen horizontal ausgespannt: — und bildet hier theils das obere Blatt des Lig. Gimbernati, theils liegt sie zwischen letztgenanntem Bande und der Vagina vasorum cruralium frei, und wird von Lymphgefäfsen durchbohrt. Letztere freie Stelle der Fascia transversalis verschliefst den Schenkelring und wird *Septum annuli cruralis* genannt (S. 288.).

In der Mitte zwischen Symphysis pubis und der Spina anterior superior oss. ilium, ½″ oberhalb des Schenkelbogens, zeigt sich in der Fascia transversalis eine Grube — der *hintere oder innere Leistenring*, *Annulus inguinalis posterior s. internus* — welcher nach aufsen und oben sich allmählig verflacht und verliert, nach innen und unten aber durch eine Falte der Fascia transversalis scharf begränzt wird; diese Falte, *Plica semilunaris fasciae transversalis*, läuft in einen oberen inneren und unteren äufseren Schenkel aus, die gewöhnlich ½″ und oft weiter von einander entfernt sind: (der Raum zwischen beiden Schenkeln ist Hesselbachs Schenkelfläche des hinteren Leistenringes). Der

tere Leistenring führt in den *Leistenkanal, Canalis in-*
inalis, welcher zwischen den Bauchmuskeln schräg von
en, innen und hinten nach vorn, unten und aufsen zum
rderen Leistenringe herabsteigt: beide Leistenringe bil-
n die innere und äufsere Öffnung des Leistenkanals, Aper-
ra canalis inguinalis interna et externa. Die hintere Wand
ses Kanals wird Anfangs, wenn man vom hinteren Lei-
nringe ausgeht, nur von der Fascia transversalis, dagegen
iter nach innen, nach dem vorderen Leistenringe hin
n den vereinigten Muskelbündeln und Aponeurosen der
m. obliquus internus und transversus gebildet: die vor-
re Wand besteht nach aufsen aus der Aponeurose des
obliquus externus und den Muskelfasern der Mm. obli-
us internus und transversus; in der Nähe des vorderen
istenringes aber nur aus der Aponeurose des M. obliquus ex-
nus. Die obere Wand des Kanals wird von den unteren
ndern der Mm. obliquus internus und transversus, von
lchen innerhalb des Kanals des M. cremaster abgeht,
bildet; die untere Wand, welche den Kanal von dem
henkelringe trennt, besteht aus der Vereinigung der Mm.
liquus internus und transversus mit dem hinteren Rande
s Schenkelbogens, vorzüglich aber aus der oberen ausge-
hlten Fläche des letzteren. Inwendig wird der Leisten-
nal von einem Fortsatze der Fascia transversalis beklei-
, welche am inneren Leistenringe nicht durchbohrt ist,
ndern trichterförmig in ihn eindringt, und die durch den
nal laufenden Samengefäfse und Nerven, oder im weib-
hen Geschlecht das runde Mutterband, umhüllt; — un-
halb des vorderen Leistenringes aber zur Tunica vagi-
lis communis funiculi spermatici et testis wird.

Der Mittelpunkt des hinteren Leistenringes ist von dem
s vorderen 1", und vom Tuberculum pubis $1\frac{1}{2}$" entfernt.

Zwerchfell.

Das *Zwerchfell,* Zwerchmuskel, *Diaphragma* s. Septum
ansversum, ist ein unpaarer, breiter, platter, in der un-
ren Öffnung des Thorax ausgespannter Muskel: seine
ere convexe Fläche ist der Brusthöhle und der Wirbel-
ule zugewandt; die untere ausgehöhlte bildet die obere

und einen Theil der hinteren Wand der Bauchhöhle. Der mittlere Theil des Zwerchfells ist sehnig, der Umfang fleischig; von vorn nach hinten ist es in der Mitte am schmalsten, nach den Seiten hin breiter; sein Queerdurchmesser ist der längste; hinten reicht es tiefer herab als vorn. Die höchste Wölbung des Zwerchfells steht bei Erwachsenen parallel mit dem oberen Rande des Mittelstücks der siebenten Rippe, oder mit dem Knorpel der fünften: reicht aber an der rechten Seite um einen halben oder ganzen Zoll höher hinauf, als an der linken.

Der sehnige Theil, *Centrum tendineum* s. Speculum Helmontii, besteht aus weifsen stark glänzenden von den Rändern gegen die Mitte convergirenden Fasern, welche von anderen geraden und gekrümmten durchkreuzt werden. Er liegt nicht genau in der Mitte, sondern etwas weiter nach vorn: hat eine dreigelappte einem Kleeblatt ähnliche Gestalt: sein hinterer Rand ist concav; der vordere bogenförmig ausgeschweift; der vordere Lappen ist der breiteste; der linke gewöhnlich der schmalste und kürzeste. Am hinteren Rande des rechten Lappens, ziemlich nahe vor der Wirbelsäule, findet sich eine weite rundlich viereckige Öffnung, *Foramen quadrilaterum* s. Foramen venae cavae, deren hinterer Umfang etwas tiefer liegt, als der vordere, und häufig von den Fleischfasern mitgebildet wird.

Der fleischige Theil zerfällt in den Lenden- und Rippentheil: ersterer bildet den hinteren, letzterer den vorderen und die Seitentheile des Zwerchfells: beide hangen ununterbrochen zusammen, laufen mit allen ihren Bündeln gegen das Centrum tendineum hin, und gehen in die Sehnenfasern desselben über. Der Lendentheil, *Pars lumbaris diaphragmatis,* entspringt auf jeder Seite mit drei Zipfeln oder Schenkeln von den oberen Lendenwirbeln und dem untersten Brustwirbel, steigt aufwärts und vorwärts, und verliert sich in die hinteren Ränder der Mitte und der Seitenlappen des Centrum tendineum. Die inneren Schenkel, *Crura interna,* sind die längsten und stärksten, entspringen sehnig von der vorderen Fläche des vierten und dritten Lendenwirbelkörpers und dem Fibrocartilago intervertebralis zwischen beiden, werden im Aufsteigen fleischig und weichen auseinander, so dafs sie vor den obersten Lenden-

ebeln eine unpaare längliche Spalte, den *Aortenschlitz*, *atus aorticus*, zwischen sich lassen. Vor dem zwölften ckenwirbel vereinigen sie sich durch Kreuzung in der nge eines Zolles, weichen alsdann abermals aus einander, eine zweite $1\frac{1}{2}$'' lange Spalte, den *Speiseröhrenschlitz*, *atus oesophageus*, zu bilden; oberhalb desselben vereini- sie sich wiederum, und verlieren sich in dem hinteren nde des mittleren Theils des Centrum tendineum. Die ttleren Schenkel, *Crura media*, entspringen auf jeder te schmal und spitzig von der vorderen Fläche des Kör- s des zweiten Lendenwirbels; die äufseren Schenkel, *ura externa*, sind breiter und kürzer, und kommen von vorderen und Seitenfläche des Körpers und vom Proc. nsversus des ersten Lendenwirbels; beide auf jeder Seite einigen sich mit dem inneren Schenkel, unter einander, d mit dem Rippentheil, und gehen in die hinteren Rän- der Seitenlappen des Centrum tendineum über. Die ken Schenkel sind schwächer und kürzer, indem sie ge- öhnlich um einen halben oder ganzen Wirbel höher ent- ringen als die rechten, und daher der äufsere auch vom zten Brustwirbel kommt. Zuweilen sind vier Schenkel rhanden. — Der Rippentheil, *Pars costalis*, entspringt sichig und dick von der inneren Fläche der zwölften ppe, vom Arcus tendineus fasciae lumbodorsalis, und von inneren Fläche der Knorpel der sechs untersten Rippen rmittelst mehrerer Zacken, die mit den der Mm. transversus dominis und triangularis sterni zusammenhangen: endlich ch mit dünnen Bündeln von der hinteren Fläche des Proc. phoides. Die mittleren vorderen Fasern sind kurz und ufen gerade nach hinten, die seitlichen sind länger, und ahlen convergirend von vorn nach hinten, von aufsen ch innen, und von hinten nach vorn zum Centrum ten- neum hin, in welchem sie endigen.

Bei der Zusammenziehung des Zwerchfells steigt sein ittlerer Theil herab, die Wölbung wird dadurch flacher, e Brusthöhle weiter, die Bauchhöhle enger: es ist daher r vorzüglichste Inspirationsmuskel, und befördert durch erengerung der Bauchhöhle und Herabpressen der Bauch- ngeweide die Forttreibung und Ausstofsung des Inhalts des armkanals, der Harnblase und der Gebärmutter.

Muskeln am Becken.

Die an den Wänden des Beckens gelagerten Muskeln gehören der unteren Extremität an (s. Muskeln der Hüfte); die in dem Beckenausgange ausgespannten Muskeln nebst der Fascia pelvis und Fascia perinaei bilden die untere Wand der Bauch- und Beckenhöhle, und stehen in der genauesten Beziehung zum Darmkanal, zu den Harn- und Geschlechtswerkzeugen, daher sie mit diesen beschrieben werden. Nur der zwischen Knochen ausgespannte Steifsbeinmuskel kann hier eine Stelle finden.

M. coccygeus, Steifsbeinmuskel, ist platt, dreieckig, hinten breiter als vorn, und besteht aus fleischigen und sehnigen Fasern, die von der Spina ischii entspringen, an den Rand des Os coccygis sich heften, und mit der vorderen Fläche und den Rändern des Lig. sacrospinosum so genau verwachsen, dafs sie gewöhnlich mit diesem Bande zusammen eine einzige sehnig-muskulöse Masse bilden. Er verhütet ein zu starkes Zurückweichen des Steifsbeins, und zieht es, nachdem es zurückgedrängt worden, wiederum nach vorn.

Muskeln der unteren Extremität.

61 Paare.

Sie zerfallen in die Muskeln an der Hüfte, am Oberschenkel, am Unterschenkel und am Fufse.

Die Hüftmuskeln liegen gröfstentheils an der äufseren und inneren Fläche des Hüftbeins, an den Wänden des grofsen und kleinen Beckens, und gehen von hier an die obere Extremität des Os femoris; sie beugen den Oberschenkel nach vorn gegen den Stamm, strecken ihn nach hinten, abduciren ihn, und drehen oder rollen ihn nach aufsen oder innen, wobei die Fufsspitze auswärts oder einwärts gekehrt wird: bei feststehendem Oberschenkel bewegen sie das Becken im Hüftgelenke, wodurch sie den unteren Theil des Stammes nach vorn beugen, oder rückwärts erheben und ausstrecken, oder ihn seitwärts beugen, oder die eine Seite desselben nach vorn, die andere nach hinten drehen. An der inneren Fläche des Os ilium innerhalb der Bauchhöhle liegen die Mm. psoas major und iliacus

ernus, welche unter dem Schenkelbogen an den Oberenkel hervortreten: an der äufseren Fläche desselben ochens bis zum Trochanter major herab finden sich die i. glutei, maximus, medius und minimus, welche einler bedecken und vorzüglich die Nates bilden: unter den i. glutei, zwischen dem Kreuz- und Sitzbein und dem ochanter major, liegen in queerer Richtung die Mm. iformis, gemelli, und quadratus femoris; an der vordeBeckenwand, vor und hinter dem Foramen obturatorium l dem Ligamentum obturatorium, liegen die Mm. obtuores, internus und externus, welche zwischen den obenannten Muskeln zum Trochanter major gehen.

Die Muskeln des Oberschenkels haben überhaupt die htung von oben nach unten, und wirken theils auf den erschenkel selbst, gröfstentheils aber auf den Unterenkel. Sie zerfallen in vier Abtheilungen: 1) zwei lange erflächliche Muskeln an der vorderen und inneren Seite s Oberschenkels, welche bis unter das Knie herabsteigen, d den Unterschenkel adduciren: Mm. sartorius und gracilis: 2) die Muskeln an der vorderen und äufseren Seite s Oberschenkels bis zur Kniescheibe abwärts, Strecker s Unterschenkels: Mm. rectus femoris, cruralis, vastus ernus und vastus externus: 3) die Muskeln an der innen Seite des Oberschenkels, Anzieher des Oberschenkels, lche beide Schenkel einander näheren: Mm. pectineus, ductor longus, adductor brevis und adductor magnus feris: 4) die Muskeln an der hinteren Seite des Oberenkels, Beuger des Unterschenkels: Mm. semitendinosus, nimembranosus, und biceps femoris.

Die Muskeln des Unterschenkels laufen sämmtlich (mit snahme des M. popliteus) der Länge nach zum Tarsus, etatarsus und den Zehen herab, bewegen den Fufs und Zehen, und sind in eine vordere, äufsere, und hintere ge abgetheilt. Die vordere Muskellage zwischen Tibia d Fibula enthält, von innen nach aufsen gezählt, die m. tibialis anterior, extensor longus hallucis, und extenr longus digitorum mit dem peronaeus tertius: sie laufen er die vordere Seite des Fufsgelenks zum Fufsrücken. e äufsere Lage enthält die Mm. peronaeus brevis und gus: diese gehen hinter dem Malleolus externus zum

äufseren Fufsrande und zur Fufssohle. Die hintere Lage zerfällt in eine oberflächliche und tiefe Schicht: erstere, zwischen dem Knie und der Ferse, besteht aus den Mm. gastrocnemii und soleus; diese bilden vorzüglich die Wade und gehen in eine gemeinschaftliche starke Sehne, die Achillessehne, Tendo Achillis, über. Die tiefe hintere Schicht enthält die Mm. popliteus, tibialis posticus, extensor longus digitorum und extensor hallucis longus; von welchen die drei letzgenannten hinter dem Malleolus internus zum inneren Fufsrande und zur Fufssohle gehen.

Der Fufs enthält aufser den Sehnen der Unterschenkelmuskeln mehrere kleinere eigenthümliche Muskeln. Auf dem Fufsrücken finden sich die Mm. extensor brevis digitorum und interossei dorsales. In der Fufssohle liegen der M. flexor brevis digitorum und gleich oberhalb desselben die Mm. quadratus und lumbricales (Anhänge des M. flexor longus digitorum); sodann die Mm. transversalis plantae und interossei plantares. Neben allen diesen in der Mitte der Sohle liegenden Muskeln finden sich, mehr nach dem inneren Fufsrande hin, die Mm. hallucis abductor, flexor brevis und adductor: und nach dem äufseren Fufsrande hin die Mm. digiti minimi, flexor brevis und abductor.

Aufser allen diesen Muskeln sind an der unteren Extremität drei Spannmuskeln für die Fascien vorhanden, die Mm. psoas minor, tensor fasciae latae, und plantaris.

Mehrere der obengenannten Muskeln sind an den Ursprüngen oder Insertionen mit einander verschmolzen, und werden daher einige derselben oft als mehrköpfige Muskeln betrachtet; so z. B. die drei Mm. adductores femoris als M. triceps femoris, die vier Strecker des Unterschenkels als M. quadriceps extensor cruris, die Mm. gastrocnemii und soleus als M. triceps surae.

Zwischen den Muskellagen des Schenkels finden sich zwei ansehnlichere Vertiefungen. Die eine derselben, *Fossa iliopectinea* genannt, liegt am oberen Theile der vorderen Fläche des Oberschenkels unmittelbar unter dem Schenkelbogen; ist dreieckig, oben breiter und tiefer, unten enger und spitzig: sie wird oberwärts vom Schenkelbogen, nach aufsen von den vereinigten Mm. psoas major und iliacus internus, nach innen vom M. pectineus, und unterwärts

M. sartorius begränzt, und dringt bis zum Tuberculum pectineum in die Tiefe: sie steht nach oben unter dem enkelbogen vermittelst einer dreieckigen Öffnung, der cke für die Schenkelgefäfse, *Lacuna vasorum cruralium*, der Bauchhöhle in Verbindung; und wird von der eria und Vena cruralis mit der gemeinschaftlichen Scheide selben (der *Vagina vasorum cruralium*, fibrös-zellulös, röhrenförmiger Gestalt, äufserlich mit dem Schenkel- en, den Fasciae transversalis, iliaca, und lata verwach- im Inneren mit einer Scheidewand zwischen beiden äfsen versehen) — und aufserdem von Lymphdrüsen, ven und Fett ausgefüllt. Die zweite Vertiefung ist die ekehle oder Kniegrube, *Fossa poplitea*: sie liegt an der teren Seite des Kniegelenks, hat eine rautenförmige Ge- t, dringt bis zur hinteren Fläche des Oberschenkelbeins der Kniekapsel ein, und wird nach aufsen vom M. eps femoris, nach innen von den Mm. semitendinosus semimembranosus, nach unten an beiden Seiten von Köpfen der Mm. gastrocnemii begränzt: sie enthält ischen vielem Fett und wenigen Lymphdrüsen die Haupt- nme der Gefäfse und Nerven für den Unterschenkel und s.

Die Fascia superficialis bildet die oberflächlichste Mus- hülle der unteren Extremität; sie ist in der oberen fte der Vorderfläche des Oberschenkels am stärksten wickelt; weiter abwärts verliert sie sich in die eigent- e sehnige Muskelbinde der unteren Extremität. Letztere überhaupt sehr stark und vollständig, aus inneren lon- dinalen und äufseren queeren und schrägen Fasern ge- t; und zerfällt nach den einzelnen Gegenden der Glied- se in Unterabtheilungen, nämlich in die Fasciae iliaca, , cruralis, dorsalis pedis, und plantaris.

Die *Fascia iliaca* beginnt an den Lendenwirbeln und Labium internum cristae ossis ilium, überzieht die ze vordere und innere Fläche der Mm. iliacus internus psoas major, so weit diese oberhalb des Schenkelbogens gen: an ihrem inneren und unteren Theile, vorzüglich dem M. psoas, ist sie am stärksten. Sie endigt am us cruralis und am Beckeneingange, indem sie längs äufseren Hälfte des Schenkelbogens genau mit dessen

hinterem Rande und mit der Fascia transversalis sich verwebt, die Scheide der Schenkelgefäfse vorzüglich bildet, hinter derselben an das Tuberculum iliopectineum, an die Crista und Lig. cristae pubis, und an die Linea arcuata interna sich heftet: und in die, an den letztgenannten Stellen beginnende, Fascia pelvis sich verliert. Ihre Anheftung an das Tuberculum iliopectineum hat die Gestalt eines länglichen Bandes, *Ligamentum iliopectineum* s. Lig. vaginae vasorum cruralium, welches in der Fossa iliopectinea bis zum Supercilium acetabuli hinab und in die Tiefe reicht, mit dem tiefen Blatt der Fascia lata und dem Labrum cartilagineum acetabuli sich verwebt, und den Schenkelbogen und die Scheide der Schenkelgefäfse noch genauer an das Os pubis befestigt. Die Fascia iliaca erhält einen eigenen kleinen länglich-rundlichen Spannmuskel, *M. psoas minor* s. parvus, kleiner Lendenmuskel. Dieser entspringt von der Seitenfläche des Körpers des ersten Lendenwirbels und dem Fibrocartilago intervertebralis zwischen diesem und dem letzten Rückenwirbel, steigt vor dem M. psoas major herab, und geht bald in eine dünne platte Sehne über, welche vorzüglich im inneren Theile der Fascia iliaca sich ausbreitet, und mit ihr bis zum Tuberculum iliopectineum und Lig. cristae pubis herabgeht.

Die *Fascia lata femoris* ist die sehnige Muskelbinde des Oberschenkels, welche die freie Fläche aller Muskeln desselben überzieht, an der äufseren und hinteren Seite stärker und dicker, an der inneren Seite beträchtlich dünner ist und an einigen Stellen die Muskeln durchscheinen läfst. Sie besteht aus einem oberflächlichen und einem tiefen Blatte, welche an vielen Stellen genau einander berühren und zusammenwachsen, an anderen dagegen sich von einander entfernen, und einzelne oberflächliche Muskeln und Gefäfsstämme in vollständige besondere Scheiden einschliefsen. Hinten und auswärts beginnt sie an der hinteren Fläche des Kreuzbeins und dem Labium externum cristae oss. ilium, und steigt bis zum oberen Rande des M. gluteus maximus herab: von hier an geht das dünne oberflächliche Blatt über diesen Muskel hin, das tiefe dringt zwischen ihm und dem M. gluteus medius ein; am unteren Ende des M. gluteus maximus sind beide Blätter vereinigt.

mit dem unteren Rande des Lig. sacrotuberosum und der Sehne des M. gluteus maximus verwachsen, welcher Muskel daher die Fascia anspannen kann: von hier steigt sie an der hinteren und äufseren Seite des Oberschenkels herab, dringt in der Mitte der Hinterseite desselben zwischen den Muskeln in die Tiefe, und heftet sich an die Linea aspera oss. femoris. Unterhalb der Spina anterior superior oss. ilium liegt, zwischen beiden Blättern der Fascia, ihr eigenthümlicher Spannmuskel, *M. tensor fasciae latae*; er ist länglich platt, entspringt von jener Spina, verliert sich schon am oberen Drittheil des Oberschenkels sehnig in die Fascia, welche von dieser Stelle an bis zum Condylus externus des Kniegelenks vorzüglich dick ist.

An der Kniekehle bekleidet das tiefe Blatt die Seitenwände dieser Grube, und heftet sich an die Gelenkbänder und die unteren Enden der Labia lineae asperae: das oberflächliche Blatt aber ist mit der Fascia superficialis über diese Grube ausgespannt, und schützt die in ihr enthaltenen Theile. An der vorderen Fläche des Oberschenkels heftet das tiefe Blatt hinter dem M. sartorius und genau auf den Muskeln in die Furche zwischen M. vastus internus und den Mm. adductores femoris, das oberflächliche Blatt aber vor dem M. sartorius und den grofsen Gefäfsstämmen, so dafs diese Theile in einer vollständigen Scheide liegen: auf dieselbe Weise wird an der inneren Seite des Oberschenkels der M. gracilis zwischen beiden Blättern der Scheide eingeschlossen: hier ist die Fascia oberwärts an den Ramus descendens oss. pubis, an den Ramus adscendens oss. ischii, und weiter nach hinten an das Tuber ischii geheftet. An den Seiten und der vorderen Fläche des Kniegelenks hängt die Fascia lata mit den dieses Gelenk umgebenden Sehnen und dem Lig patellae genauer zusammen, und geht in die Fascia cruralis über: vor der Kniescheibe liegt in der Fascia superficialis eine ansehnliche Bursa mucosa subcutanea.

Der Theil der Fascia lata zwischen der Spina anterior superior oss. ilium und der Symphysis pubis, nahe unterhalb des Schenkelbogens, ist wegen seiner Verbindung mit dem Arcus cruralis und anderen Fascien vorzüglich merk-

würdig. Man theilt ihn in die Portio iliaca und Portio pectinea: erstere ist das Stück der Fascia zwischen Spina anterior superior oss. ilium und Tuberculum iliopectineum, letztere das zwischen Tuberculum iliopectineum und Symphysis pubis liegende Stück. Die *Portio pectinea fasciae latae* ist dünn, ihre beiden Blätter schliefsen nahe unter der Symphysis pubis den Kopf des M. gracilis ein, gehen aber alsdann mit einander vereinigt über die vordere Fläche des M. adductor longus und M. pectineus und hinter den Vasa cruralia in die Tiefe der Fossa iliopectinea, und befestigen sich hier an das Lig. iliopectineum; oberwärts aber an das Tuberculum pubis und die Crista pubis unmittelbar unter der zweiten und dritten Insertion des Arcus cruralis. *Portio iliaca fasciae latae*: ihr tiefes Blatt ist mit seinem oberen Rande an den hinteren Rand des Schenkelbogens geheftet, hängt dadurch mit der Fascia transversalis und der Fascia iliaca zusammen, und wird daher zuweilen als eine Fortsetzung der letzteren angesehen: es geht von der Spina anterior superior oss. ilium an hinter dem M. sartorius, und durch nochmalige Spaltung auch hinter dem Kopfe des M. rectus femoris, aber vor den vereinigten Mm. psoas major und iliacus internus (und vor dem N. cruralis), in die Fossa iliopectinea, und vereinigt sich hier, hinter den Schenkelgefäfsen, mit der Portio pectinea vermittelst des Lig. iliopectineum. Das oberflächliche Blatt der Portio iliaca ist dagegen an den vorderen abgerundeten Rand des Schenkelbogens geheftet, mit der Fascia superficialis stellenweise verwachsen und von ihr verstärkt, läuft vor dem M. sartorius, und alsdann brückenförmig über die Fossa iliopectinea vor den Schenkelgefäfsen zur Portio pectinea hin, mit welcher es verwächst. An dieser Stelle, vor dem inneren Theile der Fossa iliopectinea, befindet sich eine Öffnung in dem oberflächlichen Blatte der Portio iliaca fasciae latae, welche nach aufsen, oben und unten von einem bogenförmigen Rande, dem sog. *sichelförmigen Fortsatze, Processus falciformis fasciae latae*, begränzt wird, und in die *eiförmige Grube, Fovea ovalis,* führt. Diese Grube nimmt den inneren Theil der Fossa iliopectinea ein, wird von der Fascia superficialis bedeckt, und von Fett, Drüsen, von einem kurzen Stück des inneren Umfangs der Vena crura-

und von der Endigung der Vena saphena magna aus-
illt. Sie liegt 2‴ bis 4‴ unter dem vorderen Rande des
enkelbogens, ist von oben nach unten 1″ bis 1½″ lang
½″ bis 1″ breit, im weiblichen Geschlechte gewöhn-
länger als im männlichen. — Am Proc. falciformis
erscheidet man das untere spitzige Ende oder Horn,
nu inferius, welches den unteren Rand der Fovea ovalis
et; den äufseren, aus einer doppelten Falte bestehenden,
kleine Löcher enthaltenden Rand; und das obere Ende
r Horn, Cornu superius, welches aus zwei Platten be-
t. Die vordere dieser Platten ist ein 2‴ bis 4‴ breiter
eifen, an dessen Bildung die Fascia superficialis wesent-
en Antheil nimmt; er begränzt die Fovea ovalis nach
n, und liegt senkrecht zwischen ihr und dem Schenkel-
en, an welchen er sich heftet. Die hintere stärkere
tte des oberen Horns steigt hinter der vorderen höher
auf, krümmt sich unmittelbar vor der Scheide der
enkelgefäfse nach innen und oben, kommt in eine hori-
tale Lage, und füllt den spitzigen Winkel zwischen dem
eren Ende des Arcus cruralis und der Crista pubis aus;
vorderer Rand verbindet sich mit dem hinteren schar-
Rande des Schenkelbogens; ihr hinterer Rand mit dem
. cristae pubis auf der Crista pubis; ihre obere Fläche
ils mit der unteren Fläche des Schenkelbogens, theils
der unteren Fläche des hieselbst ausgespannten Stückes
Fascia transversalis (S. 276.). Durch die letztere Ver-
dung entsteht das dreieckige platte dünne *Gimbernatsche*
nd, *Ligamentum Gimbernati*, welches gleichsam einen
ang der dritten Insertion des Schenkelbogens darstellt:
e Spitze oder innerer Winkel liegt nach innen gegen
Symphysis pubis hin; seine Basis oder äufserer halb-
ndförmiger Rand nach aufsen, gegen die Scheide der
enkelgefäfse hin gerichtet: sein vorderer Rand ist mit
n hinteren Rande des Arcus cruralis, sein hinterer Rand
dem Lig. cristae pubis verwachsen: seine Flächen nach
n und unten gerichtet. Die Länge des Gimbernatschen
ndes von der Basis zur Spitze beträgt 6‴ bis 8‴, die
eite der Basis von vorn nach hinten 3‴ bis 6‴: in weib-
nen Körpern ist es länger und schmaler als in männli-
n. (Zuweilen werden seine Dimensionen gröfser ange-

geben: alsdann ist es von der dritten Insertion des Schenkelbogens nicht gehörig unterschieden.)

Der Proc. falciformis liegt überhaupt unmittelbar vor der Schenkelgefäfsscheide, und verstärkt dieselbe. Nur die concave Basis des Gimbernatschen Bandes bleibt vom inneren Umfange der Gefäfsscheide 4‴ bis 6‴ entfernt, und bildet mit dieser eine rundliche, von der Mitte der Symphysis pubis 2″ weit entfernte Öffnung, den *Schenkelring*, *Annulus cruralis*, welcher hinter dem Schenkelbogen aus der Bauchhöhle in die Fovea ovalis hinabführt, und nur von einem durchlöcherten Stück der Fascia transversalis, dem *Septum annuli cruralis* (S. 276.), verschlossen wird. Die Fovea ovalis bildet also eine von unten nach oben und von vorn nach hinten sich verengernde trichterförmige Vertiefung (oder einen unvollkommenen Kanal, der von Einigen der *Schenkelkanal*, *Canalis cruralis*, genannt wird): die hintere und Seitenwände dieser Vertiefung werden von dem inneren Umfange der Vagina vasorum cruralium, dem Lig. iliopectineum und der Portio pectinea fasciae latae gebildet; ihre sehr kurze vordere Wand besteht nur aus der vorderen Platte des oberen Horns des Proc. falciformis; ihre obere Öffnung ist der Annulus cruralis zwischen dem Lig. Gimbernati und der Schenkelgefäfsscheide; ihre untere Öffnung ist das vom Proc. falciformis begränzte Loch in dem oberflächlichen Blatte der Portio iliaca fasciae latae.

Die *Fascia cruralis* s. Aponeurosis cruris s. Vagina tendinosa cruris, fängt am Knie an, und überzieht die Muskeln des Unterschenkels. Vorne, woselbst sie sehr stark ist, heftet sie sich an die Cristae der Tibia und Fibula, und bildet einfache abgesonderte Scheiden für die Muskeln zwischen beiden Knochen und für die Mm. peronaei. An der inneren Fläche der Tibia fehlt sie, indem diese nur von der Fascia superficialis überzogen wird: an der hinteren Seite des Unterschenkels ist sie in ein oberflächliches und tiefes Blatt für die oberflächliche und tiefe Schicht der hinteren Muskellage gespalten, und hüllt dadurch die Mm. gastrocnemii und soleus mit dem Tendo Achillis in eine vollständige Scheide ein. In der Gegend des Fufsgelenks enthält sie mehrere stärkere Streifen, Muskelbänder. Das *Ligamentum transversum* s. vaginale tibiae geht von der

rderen Seite des Unterschenkels nahe oberhalb des Fufs-
enks von der Crista tibiae queer zur Crista fibulae. An
r vorderen Fläche des Fufsgelenks selbst liegen drei län-
re schmale sehnige Streifen, die sich vor der Mitte des
lenks vereinigen, und auf diese Weise das sog. Kreuz-
nd, *Ligamentum cruciatum tarsi* s. annulare anterius, bil-
n: die beiden inneren Streifen sind an den Malleolus in-
rnus und an das Os naviculare und cuneiforme primum
heftet, der äufsere stärkste aber an die äufsere Fläche
s Calcaneus: zuweilen ist auch ein vierter schwächerer
den Malleolus externus befestigter Streifen vorhanden,
durch das Kreuz vollständig wird. Durch Spaltung die-
Streifen in Scheidewände entstehen drei Scheiden, eine
nere oberflächlichere für die Sehne des M. tibialis ante-
or, eine mittlere etwas tiefer liegende für die Sehne des
. extensor hallucis longus, und eine äufsere für die Seh-
n des M. extensor longus digitorum und peronaeus tertius.
1 der inneren Seite des Fufsgelenks steigt vom Malleolus
ternus ein breiter Streifen, *Ligamentum laciniatum* s. an-
lare internum, zur inneren Fläche des Calcaneus und zum
neren Rande der Fascia plantaris herab, und schliefst die
hnen der Mm. tibialis posticus, flexor longus digitorum
id flexor longus hallucis, jede in einer besonderen Scheide,
n: ein ähnliches schmaleres Band, *Retinaculum tendinum*
ronaeorum s. Lig. annulare externum, geht vom hinteren
nde des Malleolus externus zur äufseren Fläche des Calca-
us herab, und bildet eine in zwei Kanäle getheilte Scheide
r die Sehnen des M. peronaeus brevis und longus.

Die *Fascia dorsalis pedis* ist eine dünne Sehnenhaut, die
n den oben beschriebenen Bändern an auf dem Fufsrücken
s zu den Zehen sich erstreckt, an den Seitenrändern des
arsus in die Fascia plantaris übergeht, an den Seitenräu-
ern des Mittelfufses aber auch an das Os metatarsi primum
nd quintum sich heftet.

Die *Fascia plantaris* s. Aponeurosis plantaris ist der
ärkste Theil der Sehnenbinde der unteren Gliedmafse; sie
esteht aus dicken, glänzend weifsen, meistens longitudi-
alen Fasern, von denen einige in der Haut der Fufssohle
ch verlieren. Ihr mittlerer Theil entspringt von der Tu-
erositas calcanei und ist mehr als 1‴ dick; läuft, die

untere Fläche des M. flexor brevis digitorum überkleidend, nach vorn, und wird breiter und dünner: die dünneren Seitentheile der Fascia, welche die eigenen Muskeln der grofsen und kleinen Zehe bekleiden, hängen mit dem Lig. laciniatum, dem Retinaculum tendinum peronaeorum und der Fascia dorsalis pedis zusammen. Vermittelst zweier Scheidewände, welche in die Tiefe der Fufssohle eindringen und an die Knochen und Ligamente sich heften, werden drei geschlossene Scheiden gebildet; eine innere Scheide für die Mm. abductor und flexor brevis hallucis, eine äufsere für die Mm. abductor und flexor brevis digiti minimi, und eine mittlere geräumige für alle Muskeln und Sehnen in der Mitte der Fufssohle. An den Zehen spaltet sich die Fascia plantaris in fünf Zipfel, die durch Queerfasern vereinigt werden, und endlich mit den Lig. capitulorum oss. metatarsi und den fibrösen Scheiden der Sehnen der Zehenbeuger verschmelzen.

Die Fascia cruralis und plantaris besitzen einen eigenen in der Wade liegenden Spannmuskel, *M. plantaris*, Sohlenspanner: er ist länglich und dünn, entspringt von der hinteren Fläche des Condylus externus oss. femoris, vom M. gastrocnemius externus bedeckt: sein kurzer spindelförmiger Muskelbauch geht schon in der oberen Hälfte der Wade in eine sehr lange schmale und dünne Sehne über, welche anfänglich zwischen den Mm. gastrocnemius internus und soleus, sodann am inneren Rande des M. soleus und des Tendo Achillis hinter dem inneren Knöchel herabläuft, und mit zerstreueten Faserbündeln in der Fascia cruralis hinter dem Fufsgelenk, in dem Lig. laciniatum und dem inneren hinteren Theile der Fascia plantaris endigt. Fehlt zuweilen.

A. Muskeln an der Hüfte.

M. psoas major s. magnus, grofser Lendenmuskel. Ein starker länglicher, am oberen Ende platter, in der Mitte runder Muskel, liegt an der hinteren Bauchwand, oberhalb des seitlichen Umfanges des Beckeneingangs, und an der vorderen und inneren Seite des Hüftgelenks und Schenkelbeinhalses. Entspringt mit einer doppelten Reihe von Zipfeln von den Seitenflächen der Körper, den Fibrocartilagines

ervertebrales der fünf Lendenwirbel und des zwölften
ckenwirbels, und von den Proc. transversi der Lenden-
bel; läuft von oben, hinten und innen nach unten, vorn
l aufsen, oberhalb und vor der Linea arcuata interna
. ilium herab; tritt unter dem Schenkelbogen, zwischen
berculum iliopectineum und Spina anterior inferior oss.
im hervor; wird sehnig, verbindet sich mit dem M.
cus internus, und setzt sich an den Trochanter minor.
weilen ist noch ein überzähliger an seiner äufseren Seite
gender Psoasmuskel vorhanden.

M. iliacus internus, innerer Darm- oder Hüftbeinmuskel,
gt neben dem vorigen nach aufsen, füllt die Fossa iliaca
; ist dreieckig, platt, aber dick: entspringt vom Proc.
nsversus des letzten Lendenwirbels, dem Lig. iliolumbale,
dem Labium internum der Crista und beiden Spinae
eriores, und von der inneren Fläche des Os ilium selbst;
tt zwischen der Spina anterior inferior oss. ilium und
n Tuberculum iliopectineum unter dem Schenkelbogen
vor, und heftet sich, mit dem M. psoas major vereinigt,
den Trochanter minor, welcher von beiden Muskeln
llständig umfafst wird.

Zwischen beiden Muskeln und dem Tuberculum ilio-
ctineum und dem Hüftgelenk, dessen vordere Seite von
en bedeckt wird, liegt ein ansehnlicher Schleimbeutel,
d ein kleinerer zwischen ihrer Sehne und dem Trochan-
minor. Beide Muskeln beugen den Oberschenkel gegen
n Stamm und ziehen ihn etwas nach innen; oder sie beu-
n den Stamm vorwärts.

M. gluteus maximus, grofser Gesäfsmuskel, ist der stärkste
uskel des Körpers, rautenförmig, dick, und besteht mei-
ns aus dicken locker zusammengehefteten Bündeln grober
sern. Entspringt mit seinem hinteren Rande von dem
nteren Theile des Labium externum cristae oss. ilium,
n der hinteren Fläche des Kreuz- und Steifsbeins, von
n Ligg. iliosacra posteriora und sacrotuberosum: läuft
ch vorn, aufsen und unten herab, indem sein oberer Rand
weit von dem vorderen Theile der Crista oss. ilium ent-
rnt bleibt: geht endlich in eine breite platte starke Sehne
er, die sich an die äufsere Fläche des Trochanter major,
terhalb der Spitze desselben, und an den Anfang des

Labium externum lineae asperae oss. femoris befestigt, auch mit der Fascia lata verschmilzt. Zwischen der Sehne und dem Trochanter major liegt ein grofser Schleimbeutel, und etwas weiter abwärts zwei bis drei kleinere zwischen der Sehne, dem Knochen und den angränzenden Muskeln. Er ist Antagonist der Mm. psoas major und iliacus internus, streckt den Oberschenkel rückwärts und auswärts; oder streckt das Becken, richtet es auf, wenn es nach vorn gebogen war.

M. gluteus medius, s. iliacus externus, mittlerer Gesäfsmuskel, ist dreieckig, dick und stark; und wird, mit Ausnahme seines vorderen oberen Theils, von dem vorigen bedeckt. Entspringt mit seinem oberen Rande von dem mittleren und vorderen Theile des Labium externum cristae oss. ilium bis zur Spina anterior superior hin; aufserdem von der Fascia lata, welche seinen oberen vorderen Theil bedeckt, vorzüglich aber von der gröfsten oberen Hälfte der äufseren Fläche des Os ilium; steigt mit convergirenden Fasern gerade abwärts, und setzt sich mit einer starken kurzen Sehne an die Spitze und äufsere Fläche des Trochanter major, woselbst ein Schleimbeutel unter ihr liegt. Abducirt den Oberschenkel, rollt ihn mit seinem vorderen Theile nach innen, mit dem hinteren nach aufsen.

M. gluteus minimus, kleiner Gesäfsmuskel: wird vom vorigen bedeckt, hat dieselbe Gestalt, Richtung und Wirkung; entspringt von der Linea arcuata externa oss. ilium und der äufseren Fläche des Hüftbeins unterhalb jener Linie und setzt sich an die innere Fläche der Spitze des Trochanter major, woselbst ein Schleimbeutel liegt.

M. pyriformis s. pyramidalis s. iliacus externus, birnförmiger Muskel: länglich kegelförmig, liegt unter dem vorigen, entspringt von der vorderen Fläche des Os sacrum an den Rändern des zweiten bis vierten Foramen sacrale anterius, und von dem ganzen hinteren Umfange der Incisura ischiadica superior: läuft zugespitzt nach aufsen und vorn, und befestigt sich mit einer dünnen runden Sehne an die innere Fläche der Spitze des Trochanter major (Schleimbeutel). Rollt den Oberschenkel nach aufsen.

Mm. gemelli s. gemini, Zwillingsmuskeln; kleine längliche unter dem vorigen liegende Muskeln; der obere

gemellus superior, entspringt von der Spina ischii; der
ere, *M. gemellus inferior*, vom Tuber ischii: beide lau-
queer, convergirend, und der untere etwas aufsteigend,
Fossa trochanterica, woselbst sie sich gemeinschaftlich
der Sehne des M. obturator internus befestigen: ihre
idae gränzen an einander und bilden eine Rinne, welche
Sehne beinahe vollständig umgiebt. Rollen den Ober-
enkel nach aufsen.

M. obturator internus, innerer Hüftbeinlochmuskel. Ent-
ingt platt und mit breitem bogenförmigen Rande inner-
des Beckens, von der inneren Fläche des Sitz- und
ambeins am Umfange des Foramen obturatorium, und
der inneren Fläche des Ligamentum obturatorium: läuft
änglich nach hinten und aufsen durch die Incisura ischia-
a inferior, biegt sich unter einem rechten Winkel um
Ramus descendens oss. ischii, und läuft von hier an
espitzt nach vorn und aufsen gegen den Trochanter
jor hin. Die Sehne beginnt schon innerhalb des Beckens
tief in das Muskelfleisch eingeschobenen Zacken; au-
rhalb der Incisura ischiadica inferior liegt sie zwischen
Mm. gemelli, und befestigt sich mit diesen in der Fossa
chanterica (Schleimbeutel). Rollt den Oberschenkel nach
sen.

M. obturator externus, äufserer Hüftbeinlochmuskel.
springt dünn und breit vom äufseren Umfange des Fora-
n obturatorium und von der äufseren Fläche des Lig.
uratorium; wird hier von den Mm. pectineus und ad-
tor longus und brevis bedeckt; läuft nach aufsen und
d dicker und rundlich; geht vor dem Ramus descendens
. ischii, hinter den Sehnen der Mm. psoas und iliacus
ernus und hinter dem Collum oss. femoris, unter dem
gemellus inferior, zum Trochanter major, in dessen
ube er sich unter dem M. gemellus inferior mit einer
rzen Sehne befestigt. Rollt den Oberschenkel nach aufsen.

M. quadratus femoris, viereckiger Schenkelmuskel. Platt,
k, viereckig: entspringt von der äufseren Fläche des
ber ischii, läuft unter dem M. obturator externus hori-
ntal nach aufsen, und heftet sich an die Linea intertro-
anterica posterior oss. femoris. Rollt den Oberschenkel
h aufsen.

B. Muskeln am Oberschenkel.

a. Oberflächliche.

M. sartorius, Schneidermuskel: der längste Muskel des Körpers, platt und schmal. Entspringt von der Spina anterior superior oss. ilium, läuft am oberen Drittheil des Oberschenkels vor den Mm. rectus femoris, iliacus internus und pectineus schräg nach unten und innen, alsdann in der Vertiefung zwischen Mm. vastus internus und adductores femoris gerade herab, und windet sich hinter den Condyli interni des Os femoris und der Tibia zur inneren Fläche der Tibia; an welcher er sich, unter dem Condylus internus und neben der Tuberositas tibiae, vermittelst einer kurzen platten Sehne befestigt. Nähert den einen Unterschenkel dem anderen, hilft ihn beugen, und drehet ihn etwas nach innen.

M. gracilis s. rectus femoris internus, schlanker Schenkelmuskel: lang, dünn, plattrundlich, entspringt plattsehnig von der vorderen Fläche des Ramus horizontalis und descendens oss. pubis neben der Symphysis, läuft an der inneren Seite des Oberschenkels, hinter dem M. sartorius, vor und neben den Mm. adductores femoris herab; und geht in eine dünne Sehne über, welche hinter den Condyli interni des Os femoris und der Tibia nach vorn sich windet, und an der inneren Fläche der Tibia, unmittelbar unter der Sehne des M. sartorius, sich befestigt. Die Sehnen beider Muskeln sind unter einander und mit der Fascia lata und Fascia cruralis verwachsen: zwischen ihnen und dem Knochen liegt ein Schleimbeutel. Wirkt wie der vorige.

b. An der vorderen und äufseren Seite.

M. rectus femoris s. rectus anterior, gerader Schenkelmuskel: sehr lang, spindelförmig; läuft in der Mitte der vorderen Fläche des Oberschenkels vom Becken zum Knie gerade herab, und wird an seinem oberen Theile vom M. sartorius, übrigens nur von der Fascia lata bedeckt. Entspringt mit zwei sehnigen Köpfen; der obere gerade kommt von der Spina anterior inferior oss. ilium, der äufsere bogenförmige vom Supercilium acetabuli oberhalb des Hüftgelenks. Auf der vorderen Fläche bleibt er lange sehnig, auf der hinteren wird er bald fleischig; seine Fleischbündel laufen von einem

der Mitte des Muskels tief hinabreichenden, schmalen nigen Streifen nach beiden Seiten und zu der unteren ne herab. Letztere fängt platt auf der hinteren Fläche Muskels an, wird oberhalb der Kniescheibe schmaler, l heftet sich an den oberen Rand und die vordere Fläche Patella.

M. cruralis s. crureus, Schenkelmuskel: länglich platt, r dick und stark, liegt hinter dem M. rectus femoris l hat dieselbe Richtung; entspringt von der vorderen che des Os femoris, von der Linea intertrochanterica erior an bis zum unteren Viertheil des Knochens herab; d auf der vorderen Fläche bald sehnig, fliefst an den dern mit den beiden Mm. vasti zusammen; und setzt , mit der Sehne des M. rectus femoris verwachsen, an oberen Rand der Kniescheibe. Seine untersten Bündel en zuweilen abgesondert an die Seitenränder der Knieeibe und an die Kapsel des Kniegelenks, und werden dann *M. subcruralis* genannt.

M. vastus externus, äufserer dicker Schenkelmuskel: ein r starker plattlänglicher Muskel, bildet die Fleischmasse der äufseren Seite des Oberschenkels; entspringt mit em oberen Ende und hinteren Rande von der äufseren che des Trochanter major und dem Labium externum eae asperae: seine Bündel schlagen sich schräg herabigend um das Schenkelbein nach vorne, bedecken zum eil den M. cruralis und verschmelzen mit ihm und der ine des M. rectus femoris, und heften sich sehnig an den ren und äufseren Rand der Kniescheibe.

M. vastus internus, innerer dicker Schenkelmuskel: dem igen ähnlich, aber schwächer, reicht nicht so hoch hin-, und bildet vorzüglich die Fleischmasse an der unteren lfte der inneren Seite des Oberschenkels. Entspringt mit nem hinteren Rande vom Labium internum lineae aspe- vor der Insertion der Mm. adductores femoris, wendet h nach vorn und unten, verschmilzt mit dem M. cruralis d der Sehne des M. rectus femoris, und inserirt sich an m oberen und inneren Rande der Kniescheibe.

Es vereinigen sich also die sehnigen Caudae dieser vier uskeln an der Kniescheibe, deren vordere Fläche und erer und seitliche Ränder genau von ihnen umfafst wer-

den: von da gehen ihre Sehnenfasern zum Theil in das Lig. patellae über, und bilden die vorderen Schichten desselben. Sie ziehen zunächst die Kniescheibe in die Höhe: da aber diese mit der Tuberositas tibiae durch das starke Lig. patellae verbunden ist, so folgt das Schienbein der Bewegung der Kniescheibe, und der Unterschenkel wird gerade ausgestreckt. Es kann daher das Lig. patellae auch als gemeinschaftliche Sehne der vier Streckmuskeln des Unterschenkels, und die Kniescheibe als ein grofses Sesambein angesehen werden.

c. An der inneren Seite.

M. pectineus, Kammmuskel: platt, aber stark, länglich viereckig; liegt vor dem M. obturator externus, an der inneren und unteren Seite des Hüftgelenks. Entspringt von der Crista und Lig. pubis (Pecten pubis); läuft schräg von oben nach unten und aufsen an die innere hintere Fläche des Os femoris, und heftet sich mit einem breiten sehnigen Rande an das Labium internum lineae asperae, gleich unterhalb des Trochanter minor. Adducirt und beugt den Oberschenkel.

M. adductor longus femoris, Caput longum m. tricipitis femoris, langer Anzieher des Oberschenkels, ist länglich platt, dick und dreieckig, und liegt neben dem vorigen nach innen. Entspringt mit einer starken Sehne von der vorderen Fläche des Ramus horizontalis oss. pubis, unter dem Tuberculum pubis und neben dem Ursprunge des M. gracilis; steigt breiter werdend abwärts und auswärts zur Mitte des Oberschenkelbeins, und heftet sich mit einem breiten kurzsehnigen Rande an das Labium internum lineae asperae.

M. adductor brevis femoris s. Caput breve m. tricipitis femoris, kurzer Anzieher: dreieckig, kürzer als der vorige, von ihm und dem M. pectineus bedeckt; entspringt, unter dem Kopfe des M. adductor longus, von der Vorderfläche des Ramus horizontalis oss. pubis neben der Symphysis, und heftet sich mit einem breiten kurzsehnigen Rande an das obere Ende des Labium internum lineae asperae, über dem M. adductor longus, unter dem M. pectineus, und hinter beiden, mit welchen er hier verwachsen ist.

M. adductor magnus femoris s. Caput magnum m. trici- s femoris, grofser Anzieher des Oberschenkels: liegt ter den beiden vorigen, ist sehr grofs, platt und dick, l ungleich dreieckig. Entspringt von der vorderen Flä- des Ramus descendens oss. pubis, des Ramus adscendens , ischii und von der unteren Fläche des Tuber ischii; l befestigt sich mit einem langen sehnigen Rande an das ze Labium internum lineae asperae, vom Trochanter nor an bis zum Condylus internus herab. Der obere eil des Muskels läuft beinahe horizontal nach aufsen, gränzt seinem oberen leicht concaven Rande an den über ihm enden M. quadratus femoris, und verbindet sich mit der ertion des vor ihm liegenden M. adductor brevis. Im tleren vorderen Theile des Muskels laufen die Fasern räg nach aufsen und verbinden sich an ihrer Insertion dem M. adductor longus; im unteren und hinteren eile des Muskels steigen sie beinahe gerade herab, und rden früh sehnig, so dafs der untere Theil des Muskels einen schmalen abgerundeten sehnigen Rand bildet, lcher bis zum Condylus internus oss. femoris hinabreicht, l mit der Fascia lata verwachsen ist. — An der Stelle, selbst der M. adductor longus endigt, am Anfange des teren Drittheils des Oberschenkels, zeigt sich in der In- tion des M. adductor magnus eine nahe am Os femoris gende dreieckige Spalte, zum Durchgange der Arteria l Vena cruralis.

Die drei Mm. adductores näheren, in Gemeinschaft mit n M. pectineus, den einen Oberschenkel dem anderen, luciren ihn, und helfen bei der Beugung desselben: sind tagonisten der Mm. glutei. Oft sind sie mehrfach und f gespalten.

d. An der hinteren Seite.

M. semitendinosus, halbsehniger Muskel: lang, rundlich, ten zugespitzt, in eine lange runde Sehne auslaufend: tspringt sehnig und gemeinschaftlich mit dem langen Kopf s M. biceps femoris vom Tuber ischii (Schleimbeutel); ift anfangs in der Mitte, dann an der inneren Seite, der nterfläche des Oberschenkels herab, nur von der Fascia a bedeckt. Oberhalb des Condylus internus oss. femoris

geht er in eine lange runde Sehne über: diese windet sich hinter den Condyli interni des Os femoris und der Tibia, hinter und unter der Sehne des M. gracilis, zur inneren Fläche der Tibia, und inserirt sich hier neben der Tuberositas tibiae, mit den Sehnen der Mm. gracilis und sartorius verwebt (Schleimbeutel).

M. semimembranosus, halbhäutiger Muskel: sehr länglich platt, besteht in seinem oberen Theile aus einer platten Sehne, und liegt an der vorderen inneren Seite des M. semitendinosus, zwischen diesem und den Mm. adductor magnus und gracilis. Entspringt über dem M. semitendinosus vom Tuber ischii mit einer platten starken Sehne (Schleimbeutel), die bis zur Mitte des Oberschenkels herab breiter wird, und hier in einen rundlichen Muskelbauch übergeht. Die untere schmalere gleichfalls platte Sehne beginnt auch schon in der Mitte des Oberschenkels an der inneren Seite des Muskels, und läuft hinter dem Condylus internus oss. femoris zur Tibia, an deren Condylus internus und inneren Rand sie sich befestigt: sie wird zum Theil von der Sehne des M. semitendinosus hinterwärts bedeckt, inserirt sich aber hinter dieser, und reicht weiter herab. Zwischen ihr und dem Condylus internus oss. femoris liegt ein Schleimbeutel.

M. biceps femoris, zweiköpfiger Schenkelmuskel: besteht aus zwei länglichen plattrundlichen Köpfen, einem kurzen Bauche, und einer gemeinschaftlichen Endsehne. Der obere lange Kopf, *Caput longum*, entspringt mit einer kurzen starken Sehne vom Tuber ischii, zwischen den Mm. semitendinosus und semimembranosus, und mit beiden genau verwachsen: steigt anfangs gerade, dann nach aufsen, hinter dem M. vastus externus herab, und wird an der hinteren Fläche sehnig. Der kurze untere Kopf, *Caput breve*, entspringt in der Mitte des Oberschenkels vom Labium externum lineae asperae, zwischen dem Ursprunge des M. vastus externus und der Insertion des M. adductor magnus, und läuft beinahe gerade herab. Oberhalb und hinter dem Condylus externus oss. femoris vereinigen sich beide Köpfe zu einem kurzen Bauche, dessen starke Sehne an das Capitulum fibulae sich inserirt; zwischen dieser und dem Lig. laterale genu externum liegt ein Schleimbeutel.

Diese drei Muskeln beugen den Unterschenkel, oder sie
hen das Tuber ischii herab und richten dadurch das Becken
: die Mm. semitendinosus und semimembranosus drehen
leich den Schenkel etwas nach innen, der M. biceps
h aufsen.

C. *Muskeln am Unterschenkel.*

a. An der vorderen Seite.

M. tibialis anterior s. anticus, vorderer Schienbeinmus-
, ist der stärkste unter den vorderen Muskeln des Un-
chenkels, länglich und von dreiseitig prismatischer Ge-
t. Entspringt vom Condylus externus und der äufseren
che der Tibia, vom Lig. interosseum, und oberwärts
h von der Innenfläche der Fascia cruralis, und steigt
ade herab; geht am unteren Drittheil der Tibia in eine
tte starke Sehne über, welche durch die innere ober-
hliche Scheide des Lig. cruciatum, und von hier an in
e Synovialscheide eingehüllt, zum inneren Fufsrande geht,
l an der inneren Fläche und unterem Rande des Os cu-
forme primum, und an der Basis oss. metatarsi hallucis
befestigt. Beugt den Fufs gegen den Unterschenkel,
t die Fufsspitze und inneren Fufsrand in die Höhe; oder
ht bei befestigtem Fufse den Unterschenkel nach vorn.

M. extensor longus hallucis, langer Strecker der grofsen
ze. Länglich, platt, halbgefiedert, liegt neben dem vori-
nach aufsen, entspringt von der inneren Fläche des Mit-
tücks der Fibula und vom Lig. interosseum cruris: seine
schfasern laufen schräg nach vorn und unten, und gehen
die am vorderen Rande des Muskels liegende lange platte
ne über, welche durch die mittlere tiefere Scheide des
. cruciatum, und auf der Dorsalfläche des Os metatarsi
lucis verläuft, und hier von einer Synovialscheide be-
idet wird. Diese Sehne verschmilzt mit der des M.
ensor brevis hallucis; ist auf dem Rücken des ersten
edes der grofsen Zehe mit ihrer unteren Fläche über-
ipt, und vermittelst zweier, von ihren Rändern ausge-
der und die Seitenflächen der ersten Phalanx bedecken-
, dreieckiger Aponeurosen, an den Knochen durch kur-
Zellgewebe geheftet; und endigt an der oberen Extre-

tremität des Nagelgliedes. Streckt die grofse Zehe, hebt sie in die Höhe.

M. extensor communis longus digitorum pedis, gemeinschaftlicher langer Zehenstrecker: länglich plattrundlich, in seinem unteren Theile halbgefiedert, liegt neben dem vorigen nach aufsen: entspringt fleischig von dem Condylus internus tibiae, dem Lig. interosseum, dem Capitulum und vorderen Winkel der Fibula bis zum Malleolus externus herab. Die gemeinschaftliche Sehne des Muskels erscheint an seinem vorderen Rande schon am unteren Drittheil des Unterschenkels, und spaltet sich nahe oberhalb des Lig. cruciatum in fünf platte Sehnen, welche durch die äufsere Scheide jenes Bandes gehen. Die vier inneren dieser Sehnen gehen zur zweiten bis fünften Zehe, indem sie auf dem Rücken der ersten Phalanx der zweiten bis vierten Zehe mit den Sehnen des M. extensor brevis digitorum sich vereinigen, zu beiden Seiten eine dreieckige Aponeurose bilden, und in drei Schenkel sich spalten; von denen der mittlere an die zweite, die beiden Seitenschenkel aber vereinigt an die dritte Phalanx sich heften. — Die fünfte äufserste und kürzeste Sehne heftet sich an die Dorsalfläche des Os metatarsi quintum, und bildet mit dem unteren Theile des Muskelbauchs den *M. peronaeus tertius*, dritten Wadenbeinmuskel. Dieser ist nur an seinem unteren Theile, selten in seiner ganzen Länge, vom M. extensor longus digitorum getrennt, schickt oft eine besondere dünne Sehne zur fünften Zehe, aber fehlt zuweilen. — Der zu den Zehen gehende Theil des ganzen Muskels streckt und hebt die drei Phalangen der zweiten bis fünften Zehe; der M. peronaeus tertius beugt und hebt den Fufs. Bei befestigtem Fufse zieht er, so wie die vorigen, den Unterschenkel nach vorn.

b. An der äufseren Seite.

M. peronaeus longus s. primus, langer Wadenbeinmuskel. Lang, platt, dreiseitig, halbgefiedert mit nach aufsen liegender Sehne; steigt an der äufseren Seite des Unterschenkels herab, gränzt mit seinem oberen Theile an den M. extensor longus digitorum, wird aber durch die Fascia cruralis, und unterwärts auch durch den M. peronaeus brevis, von letzterem getrennt. Entspringt vom Capitulum

n vorderen und äufseren Winkel und der äufseren Fläche
Fibula, bis zu ihrem unteren Drittheil herab. Die
trunde starke Sehne tritt hinter den Malleolus externus
dessen Rinne; windet sich unter dem Knöchel, woselbst
von dem Retinaculum tendinum peronaeorum befestigt
d, nach vorn; läuft am äufseren Fufsrande an der äu-
en Fläche des Calcaneus, und durch den Sulcus ossis
oidei in die Fufssohle. Hier wird sie von allen Fufs-
lenmuskeln unterwärts bedeckt, verbindet sich mit dem
. calcaneo-cuboideum plantare, geht schräg nach vorn
en den inneren Fufsrand hin, und spaltet sich in meh-
e Zipfel, von denen der stärkste an die untere Fläche
Basis oss. metatarsi hallucis, die übrigen an das Os
oideum, Os cuneiforme primum, und an das zweite und
tte Os metatarsi, sich heften. Vom Retinaculum an ist
Sehne von einer Synovialscheide umgeben und enthält
wo sie vor dem äufseren Ende der Tuberositas ossis
oidei in den Sulcus dieses Knochens tritt, ein Sesambein
r Faserknorpel. — Er streckt den Fufs, hebt den äu-
en Fufsrand in die Höhe, und wendet den inneren Fufs-
d und die Fufsspitze nach unten, die Sohle nach aufsen: oder
zieht bei befestigtem Fufse den Unterschenkel nach hinten.

M. peronaeus brevis s. secundus, kurzer Wadenbein-
skel. Von derselben Gestalt, aber kürzer, als der M.
onaeus longus; liegt vor diesem Muskel und grofsentheils
. ihm bedeckt, zwischen ihm und dem M. extensor lon-
digitorum und peronaeus tertius. Entspringt von der
eren Hälfte der äufseren Fläche und des vorderen Win-
s der Fibula bis nahe oberhalb des Malleolus externus:
Sehne geht, vor und über der Sehne des M. peronaeus
gus, hinter dem äufseren Knöchel durch dessen Sulcus
l durch die vordere Scheide des Retinaculum, von einer
novialscheide bekleidet; und läuft am äufseren Fufsrande
zur Tuberositas oss. metatarsi quinti, woselbst sie sich
erirt. Streckt den Fufs, wirkt übrigens wie der vorige,
r schwächer.

c. An der hinteren Seite.

M. gastrocnemius internus und *externus* s. gemelli surae,
rillingswadenmuskeln: sind die oberflächlichen Muskeln

der Wade, platt länglich und dick, unten breiter als oben. Sie entspringen mit sehnigem Rande von den Enden des Labium internum und externum lineae asperae oss. femoris unmittelbar oberhalb der Condyli, begränzen den unteren Theil der Kniekehle, werden im Herabsteigen breiter, dicker und fleischig, bleiben aber an ihrer hinteren Fläche lange sehnig; vereinigen sich mit ihren inneren Rändern, und gehen in eine gemeinschaftliche starke breite platte Sehne über, welche mit der des M. soleus sich vereinigt.

M. soleus, grofser Waden- oder Sohlenmuskel: der stärkste Muskel des Unterschenkels, länglich platt, in seiner Mitte am breitesten und dicksten, von den Mm. gastrocnemii, vor welchen er liegt, gröfstentheils bedeckt. Entspringt vom Capitulum, der hinteren Fläche und dem äufseren Winkel der Fibula, und der hinteren Fläche und dem inneren Winkel der Tibia: dieser äufsere und innere Ursprung sind oberwärts durch eine Spalte von einander getrennt. Der Muskelbauch ist in der Mitte seiner hinteren Fläche sehnig; nach unten wird er schmaler, und vereinigt sich durch eine plattrundliche Sehne, die auf ihrer vorderen Fläche noch Muskelfasern aufnimmt, mit der Sehne der Mm. gastrocnemii zur Achillessehne, *Tendo Achillis*. Diese ist die stärkste Sehne des m. Körpers, platt, ungefähr 4″ lang, zwischen beide Blätter der Fascia cruralis eingeschlossen; sie wird im Herabsteigen schmaler und dicker, und inserirt sich mit einem etwas breiteren Ende an die hintere Fläche der Tuberositas calcanei, woselbst ein ansehnlicher Schleimbeutel zwischen ihr und dem Knochen liegt.

Die Mm. gastrocnemii und soleus bilden sonach einen vollständigen dreiköpfigen Muskel, M. triceps surae, welcher die Ferse erhebt, und dadurch den Fufs streckt: oder den Ober- und Unterschenkel nach hinten zieht.

M. popliteus, Kniekehlenmuskel: dreieckig, platt und kurz; schräg über die hintere Fläche des Kniegelenks unter dem Lig. popliteum laufend: entspringt spitzsehnig vom Condylus externus oss. femoris und dem Kapselbande des Kniegelenks (Schleimbeutel); steigt nach unten und innen herab, und setzt sich mit einer kurzen Aponeurose an den inneren Winkel und hintere Fläche der Tibia, gleich unterhalb ihres Condylus internus. Hilft den Unterschenkel beu-

und nach innen drehen; zieht die Kapsel und den äu-
n Fibrocartilago falciformis nach hinten.

M. tibialis posticus, hinterer Schienbeinmuskel: länglich
, in seinem oberen Theile breiter und gefiedert, im
ren halbgefiedert mit nach innen und hinten liegender
ie: wird grofsentheils vom M. soleus bedeckt. Ent-
ngt von der hinteren Fläche der Tibia und des Lig.
osseum und von dem inneren Winkel der Fibula: die
te Sehne läuft hinter und unter dem Malleolus internus,
ler inneren Seite des Talus, zwischen dem Proc. late-
calcanei und der Tuberositas ossis navicularis, in die
ohle, woselbst sie sich in mehrere Zipfel spaltet: der
ste setzt sich an die untere Fläche der Tuberositas oss.
cularis und an das Os cuneiforme primum; die übrigen
ie Ossa cuneiformia secundum und tertium und an das
cuboideum. Hinter und unter dem inneren Knöchel
die Sehne durch die oberste Abtheilung des Lig. laci-
im, ist von hier an mit einer Synovialscheide versehen,
enthält oft an der inneren Seite des Caput tali ein
mbein oder Faserknorpel. Streckt den Fufs, wendet
inneren Fufsrand nach oben, die Sohle nach innen (ist
ofern Antagonist des M. peronaeus longus): oder er
den Unterschenkel nach hinten.

M. flexor communis longus digitorum pedis s. flexor per-
is, langer gemeinschaftlicher Zehenbeuger. Länglich,
, halbgefiedert, liegt an der vorderen und äufseren Seite
vorigen und wird von ihm grofsentheils bedeckt: ent-
gt von der hinteren Fläche und äufseren Winkel der
, und geht hinter dem Malleolus internus in eine lange
e über. Diese läuft am äufseren Rande und unter der
e des M. tibialis posticus, unter dem inneren Knöchel,
an der inneren Seite des Talus, zur Fufssohle; erhält,
n sie durch die mittlere Scheide des Lig. laciniatum
, eine Synovialscheide; und wird am inneren Fufsrande
M. abductor hallucis, in der Fufssohle aber vom M.
r brevis digitorum bedeckt. In der Mitte der Sohle,
r den Ossa cuneiformia, verbindet sie sich mit dem M.
ratus und der Sehne des M. flexor longus hallucis, und
et sich in vier dünnere Sehnen, welche zu der zweiten
fünften Zehe laufen, und den Mm. lumbricales zum

Ursprunge dienen; die Sehnen des M. flexor brevis digitorum durchbohren, und an die dritten Phalangen sich heften. Beugt die dritten Glieder der zweiten bis fünften Zehe: oder zieht den Unterschenkel nach hinten.

M. flexor longus hallucis, langer Beuger der grofsen Zehe: länglich, gefiedert, liegt neben den Mm. tibialis posticus und flexor longus digitorum nach aufsen. Entspringt fleischig von der hinteren Fläche und dem äufseren Winkel der Fibula bis beinahe zum Malleolus externus herab; die Sehne läuft zur Fufssohle, hinter und unter dem Malleolus internus, durch die Incisura tali, in der untersten Scheide des Lig. laciniatum und einer Synovialscheide eingeschlossen; sodann über dem M. abductor hallucis längs des inneren Randes der Fufssohle, zum Nagelgliede der grofsen Zehe, woselbst sie das Sesambein umfafst. Hinter und unter dem Malleolus internus liegt die Sehne an der äufseren und unteren Seite der Sehne des M. flexor longus digitorum: in der Fufssohle läuft sie über diese hin an die innere Seite derselben; und schickt an dieser Kreuzungsstelle einen starken Zipfel ab, welcher die für die zweite Zehe bestimmte Sehne des M. flexor longus digitorum verstärkt. — Beugt die erste und zweite Zehe.

D. Muskeln am Fufse.

a. Am Fufsrücken.

M. extensor communis brevis digitorum pedis, kurzer Zehenstrecker. Platt und dünn, am vorderen Ende in vier Bäuche und Sehnen getheilt; läuft auf dem Fufsrücken von hinten nach vorn und schräg von aufsen nach innen; von den Sehnen des M. extensor longus digitorum und der Fascia dorsalis pedis bedeckt. Entspringt von der äufseren und oberen Fläche des Calcaneus vor dem Eingange des Sinus tarsi: die vier Bäuche — von denen der innerste der stärkste ist und *M. extensor brevis hallucis*, kurzer Strecker der grofsen Zehe, genannt wird — gehen auf dem Mittelfufse in platte Sehnen über: die erste derselben heftet sich an die erste Phalanx der grofsen Zehe, und geht zum Theil in die Sehne des M. extensor longus hallucis über: die drei folgenden gehen an die zweite, dritte und vierte Zehe, indem

mit den äufseren Rändern der Sehnen des M. extensor
gus digitorum zusammenfliefsen, und vorzüglich die äu-
en Schenkel dieser Sehnen bilden. Er streckt die erste
vierte Zehe, und zieht sie nach aufsen. Oft sind über-
lige Bäuche und Sehnen vorhanden, meistens für die
ite und fünfte Zehe.

M. interossei dorsales pedis s. interossei externi s. bici-
s, Zwischenknochenmuskeln des Fufsrückens: vier kleine
lich platte gefiederte Muskeln, liegen in den Interstitia
rossea metatarsi, und werden vom inneren Fufsrande
gezählt. Sie entspringen von den beiden Ossa metatarsi,
schen welchen sie liegen, und gehen mit platten Seh-
über den Ligg. capitulorum oss. metatarsi zu den er-
Phalangen, und in die seitlichen Aponeurosen der
nen der Mm. extensores digitorum über. Der erste und
ite gehen an die zweite Zehe, der dritte an die äufsere
e der dritten, der vierte an die äufsere Seite der vier-
Zehe. Der erste nähert die zweite Zehe der ersten;
übrigen ziehen die Zehen, welchen sie angehören, ge-
den äufseren Fufsrand hin.

b. In der Fufssohle.

M. flexor communis brevis digitorum pedis s. flexor per-
tus, kurzer Zehenbeuger: länglich viereckig und ziem-
dick, liegt oberflächlich in der Mitte der Fufssohle,
von der Fascia plantaris bedeckt. Entspringt sehnig
dem unteren Rande der Tuberositas calcanei und der
ren Fläche der Fascia plantaris, und spaltet sich am
ang des Mittelfufses in vier Bäuche, deren dünne Seh-
zu der zweiten bis fünften Zehe gehen. Sie laufen,
einschaftlich mit den Sehnen des M. flexor longus di-
rum, in Synovialscheiden, und an den Zehen selbst
in fibrösen Scheiden, welche denen der Beugemuskeln
Finger gleich gebildet sind; auf den Capitula ossium
atarsi enthalten sie eine Spalte, durch welche die Seh-
des M. flexor longus digitorum hindurchlaufen; alsdann
en sie sich, eine jede mit zwei Zipfeln, an die zweite
lanx der Zehen. Der Muskel beugt das zweite Glied
zweiten bis fünften Zehe. Oft fehlt der Bauch und
Sehne für die kleine Zehe.

M. quadratus plantae s. accessorius m. perforantis, s. Caro quadrata Sylvii, viereckiger Sohlenmuskel. Platt und viereckig, liegt über dem vorigen, bildet gleichsam einen zweiten kurzen Kopf des M. flexor longus digitorum. Entspringt mit zwei Zipfeln von der unteren inneren Fläche des Calcaneus und vom Lig. calcaneo-cuboideum plantare, läuft nach vorn, und heftet sich an den äufseren Rand der Sehne des M. flexor communis longus digitorum pedis; verstärkt diese Sehne, und giebt ihr die Richtung nach der Länge des Fufses.

Mm. lumbricales digitorum pedis, Spulmuskeln des Fufses: vier kleine längliche runde Muskeln, welche von den Sehnen des M. flexor longus digitorum entspringen, unter den Ligg. capitulorum oss. metatarsi zu der inneren Seite des ersten Gliedes der zweiten bis fünften Zehe aufsteigen, und in den Plantarrand der dreieckigen Aponeurosen der Sehnen des M. extensor longus digitorum sich verlieren. Beugen die erste Phalanx der zweiten bis fünften Zehe, helfen die zweite und dritte Phalanx ausstrecken, und ziehen die Sehne einwärts.

M. abductor hallucis, Abzieher der grofsen Zehe. Länglich und gefiedert, nimmt den inneren Fufsrand ein; entspringt hinten von dem inneren Rande der Tuberositas calcanei, von der inneren Fläche des Calcaneus, vom Lig. laciniatum und der Fascia plantaris, weiter nach vorn auch von der Tuberositas oss. navicularis und der inneren und unteren Fläche des Os cuneiforme primum und des Os metatarsi hallucis. Die platte starke anfänglich im Fleische verborgene Sehne heftet sich an die erste Phalanx der grofsen Zehe, das innere Sesambein an der Plantarfläche des Capitulum oss. metatarsi hallucis umfassend; und verbindet sich mit der seitlichen Aponeurose der Sehne des M. extensor longus hallucis. Zieht die grofse Zehe nach aufsen.

M. flexor brevis hallucis, kurzer Beuger der grofsen Zehe. Länglich platt und dick, indessen kürzer und schwächer als der vorige, an dessen äufserer Seite er liegt: entspringt von den Plantarrändern des Os cuneiforme secundum und tertium und der oberflächlichen Schicht des Lig. calcaneo-cuboideum plantare; und inserirt sich an die Plan

läche der Zehe. Er ist in zwei Portionen gespalten, ischen denen die Sehne des M. flexor longus hallucis in einer Rinne liegt: die innere Portion ist mit dem abductor hallucis und dem inneren Sesambein, die äu- re mit dem M. adductor hallucis und dem äufseren ambein verwachsen. Beugt die grofse Zehe.

M. adductor hallucis, Anzieher der grofsen Zehe: läng- ı plattrundlich, stärker als der vorige, an dessen äufse- Seite er liegt, und mit ihm verwachsen ist. Entspringt ıa Lig. calcaneo-cuboideum plantare, läuft von der te der Fufssohle schräg nach innen zur grofsen Zehe, selbst er sich, das äufsere Sesambein mit seiner Sehne fassend, an die erste Phalanx heftet. Zieht die grofse ıe nach aufsen, also gegen die Mittellinie des Fufses hin, l beugt sie.

M. transversalis plantae s. adductor hallucis transver- , Queermuskel der Fufssohle, kann als ein zweiter Kopf M. adductor hallucis angesehen werden: läuft queer der Plantarfläche der Capitula oss. metatarsi von dem seren nach dem inneren Fufsrande hin. Entspringt vom pitulum des fünften Mittelfufsbeins, von der an diesen ochen gehefteten Stelle der Fascia plantaris, und den rten und dritten Ligg. capitulorum oss. metatarsi; und einigt sich mit der Sehne des M. adductor hallucis. hert beide Fufsränder einander, wölbt den Fufs stärker.

M. abductor digiti minimi pedis, Abzieher der kleinen he: länglich, plattrundlich, hinten beträchtlich breiter l dicker; nimmt den äufseren Fufsrand ein. Entspringt ı der unteren Fläche der Tuberositas calcanei und von Fascia plantaris, und heftet sich theils an die Tubero- ıs oss. metatarsi quinti, theils mit einer platten Sehne das erste Glied der kleinen Zehe. Entfernt diese von r vierten Zehe.

M. flexor brevis digiti minimi pedis, kurzer Beuger der einen Zehe. Länglich rundlich, einer der kleinsten Mus- ln des Fufses, liegt neben dem vorigen nach innen; ent- ingt vom Lig. calcaneo-cuboideum plantare und vom metatarsi quintum, und heftet sich mit einer spitzigen hne an die erste Phalanx der kleinen Zehe, welche er ugt.

Mm. interossei plantares s. interni, Zwischenknochenmuskeln der Fufssohle: drei an der Zahl, gröfser als die Mm. interossei dorsales: entspringen an der inneren Seite des Mittelfufsknochens derjenigen Zehe, welcher sie angehören; und gehen unter den Ligg. capitulorum oss. metatarsi zur inneren Seite ihrer ersten Phalanx, und in die seitlichen Aponeurosen der Sehnen der Mm. extensores digitorum über. Der erste gehört der dritten, der zweite der vierten, der dritte der kleinen Zehe an; sie ziehen diese Zehen gegen den inneren Fufsrand hin.

Übersicht der Muskelthätigkeit bei den wichtigeren einfachen und zusammengesetzten Bewegungen.

Die in der Ohren-, Augen- und Nasengegend liegenden äufseren Gesichtsmuskeln erleichtern die Function dieser Sinnesorgane durch Eröffnung oder Erweiterung der zu ihnen führenden Öffnungen, oder sie verengern und schliefsen dieselben Öffnungen zum Schutz gegen schädliche Einflüsse. Auf letztere Weise wirkt der M. orbicularis palpebrarum auf die Augenspalte; auf erstere Weise die äufseren Ohrmuskeln, indem sie durch gleichzeitige Anziehung des Ohrs nach verschiedenen Richtungen die Ohrmuschel erweitern. Das Nasenloch wird durch den M. depressor alae nasi verengert, durch den M. levator labii superioris alaeque nasi und den M. compressor nasi aber beträchtlich erweitert, so dafs ein gröfserer Luftstrom in die Nase dringen kann: dieser Luftstrom wird zugleich, durch die vom M. compressor nasi bewirkte Verengerung oberhalb der Nasenlöcher, stärker gegen die Wände der Nasenhöhle gedrängt und in dieser Höhle mehr vertheilt, so dafs die in dem Luftstrome enthaltenen riechenden Partikeln einen stärkeren und anhaltenderen Eindruck auf die Nerven der Nasenschleimhaut machen. — Ähnliche Functionen üben die in der Mund-, Wangen-, Backen- und Kinngegend gelagerten Muskeln auf die Mundspalte und Mundhöhle aus: der M. orbicularis oris schliefst die Mund-

ılte; die Antagonisten desselben, nämlich die Mm. leva- labii superioris alaeque nasi, levator labii superioris oprius, zygomaticus minor und major, levator anguli is, buccinator, depressor anguli oris, und quadratus menti, nen die Mundspalte und ziehen sie nach verschiedenen chtungen: je nachdem das Fassen der Nahrungsmittel mit den ppen und ihr Durchgang durch die Mundhöhle, mit Hin- d Herbewegung innerhalb dieser Höhle, — oder der urchgang eines Luftstroms durch den Mund und die ındhöhle und die Bildung vieler Sprachlaute, die Action ser Muskeln erfordert. — Aufser allen diesen Bewe- ngen drücken aber die bezeichneten Muskeln zusammen t den Mm. frontalis, corrugator supercilii, risorius und ator menti die Affecte und Leidenschaften aus, bewirken s Mienenspiel, welches in der Augen- und Mundgegend vor- glich lebhaft ist: im Allgemeinen befinden sich bei trau- gen und schmerzlichen Affecten die Muskeln der Stirn-, igen- und Mundgegend in Contraction, bei fröhlichen fecten dagegen die Wangenmuskeln, z. B. beim Lachen e Mm. zygomaticus major, buccinator und risorius San- rini. Da diese Gesichtsmuskeln so mannigfaltigen und rschiedenen Zwecken dienen, so sind sie zwar der Will- hr unterworfen; wirken aber eben so oft ohne directen nfluſs des Willens, und sogar wider Willen.

Die Unterkinnlade stellt einen Winkelhebel dar, wel- er auf jeder Seite seinen Stützpunkt in der Cavitas gle- idea oss. temporum hat, und durch die Mm. digastricus axillae inferioris, mylohyoideus und geniohyoideus nach ten — durch die Mm. masseter, temporalis und ptery- ideus internus nach oben gezogen, und durch den M. erygoideus externus seitwärts und vorwärts bewegt wird. urch erstere Bewegung wird die Mundhöhle erweitert, rch die letzteren aber die Kauflächen der Zähne einan- r genähert und an einander hin und her gerieben, und durch die festen Nahrungsmittel zwischen den Zahnreihen rmalmt: daher die letztgenannten vier Muskeln vorzugs- eise als Kaumuskeln angesehen werden. Mit ihnen zu- eich, aber auf andere Weise, wirken der M. buccinator d die Muskeln der Lippen und Zunge, indem sie die zu zer- lmenden Nahrungsmittel zwischen die Zahnreihen schieben.

Das Zungenbein wird durch den hinteren Bauch des M. digastricus maxillae inferioris und den M. stylohyoideus nach hinten und oben gezogen, durch die Mm. mylohyoideus, geniohyoideus, und vorderen Bauch des M. digastricus maxillae inferioris nach vorn und oben, wobei aber der Unterkiefer durch die Mm. masseter, temporalis und pterygoideus internus festgehalten sein mufs: durch die Mm. sternohyoideus und sternothyreoideus mit dem M. thyreohyoideus nach unten, durch den M. omohyoideus nach unten und hinten bewegt. Wird es durch die vier letztgenannten Muskeln nach unten fixirt, so dient es als fester Punkt für die Mm. digastricus maxillae inferioris, mylohyoideus, geniohyoideus (auch für die Mm. hyoglossus und constrictor pharyngis medius): wird es dagegen von den Mm. digastricus maxillae inferioris, mylohyoideus, geniohyoideus und stylohyoideus festgehalten, so dient es zum festen Punkte vorzüglich für den M. thyreohyoideus, welcher alsdann den ganzen Kehlkopf in die Höhe hebt. —

Der ganze Kopf bildet mit dem Halse einen doppelarmigen Hebel, dessen hinterer kürzerer Arm das Hinterhaupt, der vordere längere Arm der Vorderkopf und das Gesicht ist. Er wird bei unbeweglich aufgerichtetem Halse auf dem Atlas vorwärts geneigt oder flectirt durch die Mm. sternocleidomastoidei und recti capitis anteriores; seitwärts geneigt durch die Mm. sternocleidomastoideus, splenius capitis, trachelomastoideus, rectus capitis lateralis und obliquus capitis superior der einen Seite: rückwärts gezogen oder gestreckt durch die Mm. cucullares, splenii capitis, complexi und biventres capitis, trachelomastoidei, recti capitis posteriores und obliqui capitis superiores: und gemeinschaftlich mit dem Atlas auf dem Epistropheus seitwärts gedreht durch die Mm. splenius capitis, trachelomastoideus und obliquus capitis inferior der einen Seite und den M. sternocleidomastoideus der anderen Seite. Sind diese Bewegungen ausgedehnter, so nimmt an ihnen der Halstheil der Wirbelsäule einen beträchtlichen Antheil, so dafs Kopf und Hals zusammen nach vorn und hinten um ungefähr 75°, nach den Seiten um 45° bis 50° von der senkrechten Linie abweichen, und nach jeder Seite um 65

75° (ungefähr den fünften Theil eines Kreises) sich
hen können.

Die Streckung der Wirbelsäule, welche bei stärkerer
ntraction der Muskeln in eine Beugung nach hinten über-
it, geschieht vorzüglich durch die Mm. sacrospinales;
ren untere Abtheilungen, die Mm. sacrolumbares und
igissimi dorsi, auf den Lenden- und Rückentheil, die
eren dagegen, Mm. cervicales adscendentes und transver-
es cervicis, auf den Halstheil der Wirbelsäule wirken:
Mm. sacrospinales werden aber kräftig unterstützt durch
Mm. spinales dorsi, semispinales dorsi et colli, multi-
spinae und interspinales: am Halse auch durch die
n. splenii colli. Die Vorwärtsbeugung des Stammes ge-
ieht, wenn die Oberschenkel und das Becken durch die
ihnen ruhende Last und durch die Mm. glutei, iliaci in-
ni, pectinei, adductores und recti femoris befestigt sind,
Lendentheile durch die Mm. psoae majores; am Rücken-
eile durch die Mm. abdominis recti, pyramidales, obliqui
terni und interni, welche indessen nur vermittelst der
ppen, an welche sie unmittelbar befestigt sind, auf die
irbelsäule wirken können; am Halstheile durch die Mm.
igi colli und Mm. scaleni. Die seitliche Beugung der
irbelsäule wird bewirkt durch die Mm. intertransversarii,
Lendentheile auch durch den M. quadratus lumborum,
Halse durch die Mm. transversalis cervicis, semispinalis
rsi et colli, scalenus medius und scalenus posticus der
ien Seite. Die Drehung wird durch die Mm. multifidus
inae, semispinalis und longus colli der einen Seite, und
rch die Mm. cervicalis adscendens, transversalis cervicis
d splenius colli der anderen Seite bewirkt.

Die Rippen, als Hebelarme betrachtet, haben einen
ppelten Unterstützungspunkt an den Körpern und an den
ieerfortsätzen der Wirbelbeine; und werden auf diesen
fwärts und auswärts gehoben, wobei die meisten Rippen
ren unteren Rand nach aufsen wenden: und in der ent-
gengesetzten Richtung herabgezogen. Diese Bewegungen
iden in der Regel an allen Rippen gleichmäfsig Statt,
id werden auf das Brustbein übertragen, welches selbst
ich durch eigene Muskeln aufwärts und mit seinem unte-
n Theile nach vorn gehoben, und wiederum herabgezogen

werden kann. Alle Bewegungen der einzelnen Knochen des Thorax nach oben und aufsen erweitern die Brusthöhle und finden bei der Inspiration Statt; die entgegengesetzten Bewegungen bewirken die Exspiration.

Die gewöhnliche ruhige Inspiration wird vorzüglich durch das Zwerchfell und durch die Mm. scaleni, intercostales, levatores costarum und serrati postici hervorgebracht. Ersteres drängt bei seiner Zusammenziehung die Baucheingeweide tiefer in die Bauchhöhle hinab, wird flacher, weniger gewölbt, und erweitert dadurch die Brusthöhle nach unten. Die Mm. scaleni ziehen bei fixirtem Halse das erste Rippenpaar in die Höhe, wonach das erste Paar der Intercostalmuskeln das zweite Rippenpaar gegen das erste, das zweite Paar der Intercostalmuskeln das dritte Rippenpaar gegen das zweite — und so fort bis zum zwölften Rippenpaare, in die Höhe ziehen. In gleicher Weise und Ordnung wirken die etwa vorhandenen Mm. supracostales: jeder M. levator costae aber zieht seine Rippe in die Höhe, ohne auf die Erhebung der höher liegenden Rippe warten zu müssen: und eben so unabhängig wirken die Mm. serrati postici, von denen die inferiores aber die Rippen nicht heben, sondern nur nach aufsen ziehen können.

Bei einer tieferen Inspiration wirken, aufser den genannten Muskeln, noch die Mm. serrati anteriores majores, pectorales minores, sternocleidomastoidei und subclavii mit: erstere beide wirken besonders kräftig, da sie an den vorderen Enden der Rippen, in gröfster Entfernung von den Unterstützungspunkten derselben, angeheftet sind, und auf solche Weise mit den Rippen wahre Traghebel bilden. Bevor aber alle diese Muskeln auf den Thorax wirken können, mufs der Kopf nach hinten aufgerichtet, und die Schulterblätter und Schlüsselbeine nach hinten und oben gezogen und vom Thorax möglichst weit entfernt werden: welches vorzüglich durch die Mm. cucullares geschieht. Alsdann erheben die Mm. sternocleidomastoidei das Brustbein und die vorderen Enden der Schlüsselbeine, welche durch die Ligg. rhomboidea das erste Rippenpaar nach sich ziehen: die Mm. subclavii, pectorales minores und

ati anteriores majores aber heben die neun obersten pen nach oben und aufsen.

Bei einer gewaltsamen Inspiration werden die Ellenen oder die gestreckten Arme überhaupt in einiger Entnung vor dem Thorax gegen einen festen Körper gezt, dadurch die Schulterblätter in die Höhe gedrängt und tützt, auch die vorderen Winkel der Schulterblätter ch die Mm. coracobrachiales herabgezogen, wodurch unteren Winkel und hinteren Ränder der Schulterblätter ter vom Thorax entfernt werden. In dieser Lage haben Mm. pectorales minores und serrati anteriores majores en noch freieren Spielraum: auch wirken jetzt bei fixir- Oberarmen die Mm. pectorales majores auf das Brust- und die Knorpel der obersten Rippen, dieselben nach n ziehend.

Die Exspiration bedarf viel geringerer Muskelanstrenng; sie erfolgt schon bei dem Nachlassen der Contraction r Inspirationsmuskeln durch den Druck der Atmosphäre den Brustkasten. Eine schnellere kräftigere Exspiration d bewirkt durch die Mm. intercostales, die hier in umehrter Ordnung als bei der Inspiration wirken: die . quadrati lumborum und die Mm. abdominis recti, iqui externi und interni ziehen die Rippen, an welche sie estigt sind, und das Brustbein herab, und die einzelnen rcostalmuskeln näheren die höher liegenden Rippen den fer liegenden von der zwölften an bis zur ersten: diee Wirkung übt der M. triangularis sterni auf die dritte sechste Rippe aus.

Das Becken bildet mit den feststehenden Oberschenkeln en doppelarmigen Hebel, dessen Stützpunkte die in den tabula eingeschlossenen Köpfe der Oberschenkelbeine d. Auf diesen wird das Becken nach vorn gebogen; nach ten aufgerichtet oder gestreckt; seitwärts gebogen, wo- das eine Hüftbein eine tiefere, das andere eine höhere llung erhält; und seitwärts gedreht: welche Bewegun- dem ganzen Stamm sich mittheilen, und meistens ichzeitig mit denen der Wirbelsäule erfolgen. Die Beung nach vorn geschieht durch die Mm. psoae majores d iliaci interni, mit Hülfe der Mm. recti femoris, pecei, adductores longi und breves, graciles und sartorii:

die Streckung durch die Mm. glutei maximi, unterstützt von den hinteren Theilen der Mm. glutei medii und minimi, durch die Mm. adductores magni, semitendinosi, semimembranosi, und die langen Köpfe der Mm. bicipites femoris: die Seitwärtsbeugung durch die Mm. gluteus medius und minimus der einen Seite, und die Mm. quadratus lumborum, obliquus abdominis externus und internus der anderen Seite: die Drehung erfolgt durch Contraction der Mm. gluteus maximus, pyriformis, gemelli, obturator internus, quadratus femoris, und des oberen Theils des M. adductor magnus und des vorderen Theils des M. iliacus internus der einen Seite: und des vorderen Theils des M. gluteus medius, der Mm. obturator internus, pectineus, adductor longus und brevis der anderen Seite. Die seitliche Beugung und Drehung sind freier und ausgedehnter, wenn das Becken nur auf dem einen Oberschenkel ruhet.

Die Bewegungen des Oberschenkels auf dem Becken sind ausgedehnter und freier, als die des Beckens auf den Oberschenkeln. Der Oberschenkel kann um ungefähr 130° nach vorn gebogen, um 40° bis 60° nach hinten gezogen oder gestreckt, um eben so viele Grade von der senkrechten Linie abducirt: und um beinahe 90° nach aufsen, aber um etwas weniger nach innen, gedrehet oder gerollt werden. Die Beugung geschieht durch die Mm. psoas major und iliacus internus, unterstützt von den Mm. rectus femoris, pectineus, adductor longus und brevis femoris: die Streckung durch die Mm. glutei überhaupt, eine stärkere Bewegung nach hinten aber durch den M. gluteus maximus allein und durch die Beuger des Unterschenkels, wenn dieser ausgestreckt ist. Die Abduction wird durch die Mm. glutei medius und minimus und den M. pyriformis bewirkt, die Adduction durch die Mm. pectineus und adductores femoris, longus, brevis und magnus. Die Drehung nach aufsen erfolgt durch die Mm. pyriformis, gemelli, obturatores und quadratus femoris, auch durch die Mm. psoas major, iliacus internus, pectineus und adductores femoris, und bei festgehaltenem Unterschenkel auch durch den M. popliteus: das Einwärtsrollen durch den vorderen Theil des M. gluteus medius, durch den M. tensor fasciae latae, und wenn der Unterschenkel stark ausgestreckt ist, so daſs

Oberschenkel der Richtung desselben folgt, auch durch Mm. sartorius, gracilis, semitendinosus und semimembranosus. Bei feststehendem Unterschenkel wird der Oberschenkel auf diesem nach vorn gerichtet durch die Mm. rectus ioris, cruralis und vasti; nach hinten herabgezogen ch die Mm. semitendinosus, semimembranosus, biceps oris und popliteus: zu der letzteren Bewegung wirken fixirtem Fufse auch die Mm. gastrocnemii mit. Bei der luction und Adduction zieht der Oberschenkel den Unschenkel mit sich; letzterer wird aber zugleich durch Mm. sartorius und gracilis dem anderen genähert. Auch Drehung des Oberschenkels im Hüftgelenk setzt sich den Unterschenkel und Fufs fort: indessen findet auch Kniegelenke eine Drehung von ungefähr 12° zwischen rschenkel und Unterschenkel Statt: die Drehung des teren nach innen geschieht durch die Mm. popliteus, torius, gracilis und semitendinosus, die nach aufsen durch M. biceps femoris. Beim Überschlagen des einen Beins r das andere wird der Oberschenkel durch die Mm. as major und iliacus internus gebogen, und alsdann mit Unterschenkel durch die Mm. pectineus, adductores oris, sartorius und gracilis adducirt. Die ausgedehnte Bewegung des Unterschenkels, die Beugung, welche zu 150° möglich ist, wird durch die Mm. semitendinosus, imembranosus und biceps femoris, die Streckung durch Mm. rectus femoris, cruralis, vastus internus und exnus verrichtet. Auf dem feststehenden Fufse ruhend d er durch die Mm. tibialis anterior, extensor hallucis gus und extensor communis digitorum mit dem peroaus tertius nach vorn, — durch die Mm. soleus, tibialis ticus, flexor longus hallucis, flexor communis longus itorum, und peronaeus longus und brevis nach hinten ogen.

Der Fufs stellt mit dem Unterschenkel einen doppelmigen Hebel dar, dessen kurzer Arm der Calcaneus, ssen längerer Arm der mittlere und vordere Theil des fses ist. Die ausgedehnteste Bewegung desselben ist die eckung, von 45°, wobei die Fufsspitze dem Boden sich hert, und welche durch die Mm. gastrocnemii, soleus, ialis posticus und peronaeus longus und brevis bewirkt

wird. Beschränkter ist die Beugung, von 25°, wobei die Fufsspitze erhoben und dem Unterschenkel genähert wird: sie geschieht durch die Mm. tibialis anterior und peronaeus tertius. Aufserdem unterstützen die Beuger der Zehen die Streckung des Fufses, und die Zehenstrecker die Beugung des letzteren. Der äufsere Fufsrand wird durch die Mm. peronaei longus und brevis und tertius erhoben, der innere durch die Mm. tibiales, posticus und anterior.

Das Schlüsselbein mit dem dasselbe unterstützenden Brustbeine, und das Schulterblatt mit dem Schlüsselbeine, bilden wirkliche Traghebel, indem die Muskeln gröfstentheils in ziemlicher Entfernung vom Stützpunkte angebracht sind, und daher sehr kräftig wirken können. Das Schlüsselbein wird durch den M. cucullaris aufwärts, durch die Mm. subclavius, pectoralis major und deltoides bei fixirtem Oberarme abwärts gezogen. Das Schulterblatt folgt diesen Bewegungen, ist aber für sich noch besonderer Ortsveränderungen fähig, indem es durch die Mm. cucullaris und levator scapulae aufwärts, durch den M. rhomboideus aufwärts und rückwärts gegen die Wirbelsäule, und durch die Mm. pectoralis minor, serratus anterior major und coracobrachialis nach vorn und unten gezogen wird. Die ausgedehnteren Bewegungen des Oberarms nach oben werden bewirkt von dem M. deltoides (d. i. der M. abductor des Oberarms) und M. coracobrachialis; die nach vorn von den Mm. pectoralis major und coracobrachialis; die nach hinten von den Mm. latissimus dorsi und teres major; das Herabziehen des aufgehobenen Oberarms oder die Adduction von den Mm. pectoralis major, latissimus dorsi und teres major — alle diese Muskeln befestigen sich in einiger Entfernung vom Schultergelenke und vom Stützpunkte des Oberarmbeins, der Cavitas glenoidea scapulae. Der Einwärtsroller des Oberarms, der M. subscapularis — und die Auswärtsroller, die Mm. supraspinatus, infraspinatus und teres minor — inseriren sich dagegen möglichst nahe am Stützpunkte, nämlich an das Caput oss. brachii, und halten diese bei den ausgedehnteren Bewegungen des Oberarms in der Cavitas glenoidea fest. Ohne diese Anordnung, welche Freiheit der Bewegung mit Sicherheit der Verbindung vereinigt, würde der Gelenkkopf, bei der Schlaffheit der

ultergelenkkapsel, stets von seinem Stützpunkte abglei-

Die Auswärtsroller werden übrigens noch vom M. acobrachialis, und der M. subscapularis vom M. teres or unterstützt. — Die stärkste Beugung des Vorderarms rägt 140°, wird hauptsächlich vermittelt durch die Mm. ps brachii und brachialis internus, und unterstützt durch Mm. supinator longus, pronator rotundus und flexor pi radialis: die Streckung geschieht durch den M. tri- s brachii, welchen die Mm. anconaeus, und extensores pi zu Hülfe kommen. Die Beugung der Hand, in einer dehnung von 65° bis 90°, wird von den beiden Mm. ores carpi, radialis und ulnaris, unterstützt von den . flexores communes digitorum, bewirkt: die Streckung, 55°, durch die drei Mm. extensores carpi mit Hülfe M. extensor communis digitorum: ihre Seitenbewegung h der Ulnarseite oder die Adduction, 35° betragend, ch die Mm. flexor carpi ulnaris und extensor carpi ul- is: ihre Abduction nach der Radialseite hin, von 40°, ch die Mm. flexor carpi radialis, extensores carpi ra- les, longus und brevis, und abductor pollicis longus. Pronation der Hand bei gleichzeitigem Einwärtsrollen Oberarms beträgt ungefähr 225°, die Supination mit swärtsrollen des Oberarms 180°: bei der ersteren sind Mm. subscapularis, teres major, pronator rotundus und dratus, flexor carpi radialis und extensor carpi ulnaris tig: bei der letzteren die Mm. supraspinatus, infraspi- us, teres minor, coracobrachialis, supinator longus und vis, anconaeus und abductor pollicis longus. Die ersten gergelenke können um 90°, die zweiten um 120°, die tten um 90°, gebogen werden. Die Finger mit den ttelhandknochen werden durch die Mm. abductor pollicis gus und brevis, abductor digiti minimi, und interosseus rsalis primus und quartus aus einander gespreitzt; durch Mm. adductor pollicis, adductor digiti minimi und erossei volares einander genähert: durch letztere Mus- ln im Verein mit allen Beugern der Finger wird die ust vollständig geschlossen; die offene Hand aber durch Mm. opponens pollicis, adductor digiti minimi und in- ossei volares hohl gemacht.

Die Beugung des ganzen Körpers nach vorn beträgt

ungefähr 190°, wovon auf die Fufsgelenke 20°, auf die Hüftgelenke 70°, auf den Hals und Kopf 75° fallen: die Rückwärtsbeugung beträgt 140°. Der ganze Körper kann um 180° oder um einen Halbkreis nach jeder Seite gedrehet werden: davon fallen auf die Kniegelenke 12°, auf die Hüftgelenke 60°, auf die Lenden- und Rücken 30°, auf den Hals und Kopf 78°.

Beim Stehen ruhet die ganze Last des Körpers auf den Füfsen, welche mit den Fersen, den Enden der Mittelfüfse, vorzüglich den Ballen der grofsen Zehen, den äufseren Fufsrändern, und den Spitzen der etwas gebogenen Zehen den Boden berühren: bei langer Dauer des Stehens wird der Fufs etwas breiter, welches die Mm. transversalis plantae, adductor hallucis und interossei zu verhindern streben. Die Mm. soleus, tibialis posticus, peronaeus longus und brevis, flexor longus hallucis und flexor communis longus digitorum sowohl, als deren Antagonisten, nämlich die Mm. tibialis anterior, peronaeus tertius, extensor longus digitorum und extensor longus hallucis, halten den auf dem Talus beinahe senkrecht stehenden Unterschenkel im Gleichgewicht; ein Gleiches geschieht am Oberschenkel durch die Mm. gastrocnemii, die Beuger und Strecker des Unterschenkels; am Becken durch die Mm. gluteus maximus, psoas major und iliacus internus. Da die Schwere des Bauchs, des Brustkastens und des Gesichts die Wirbelsäule nach vorn zu beugen strebt, so befinden sich alle Rückgrats- und Kopfstrecker in Contraction, vorzüglich wenn der Körper im Stehen etwas nach vorn geneigt ist: bei der Neigung nach hinten verhüten auch die Bauchmuskeln, die tiefe Schicht der Halsmuskeln und die Mm. sternocleidomastoidei den Fall nach hinten: diese mit den Mm. intertransversarii und allen Streckern der Wirbelsäule und des Kopfs erhalten auch das seitliche Gleichgewicht des Stammes und Kopfes. Letzteres wird bei dem Ruhen des Stammes auf beiden unteren Extremitäten um so leichter erhalten, wenn diese mäfsig von einander entfernt sind, wodurch die Unterstützungsfläche (der Raum, welchen die Füfse einnehmen und der, welcher zwischen diesen liegt) gröfser wird: noch mehr wird es gesichert durch die Wirkung der M. glutei beider Seiten. Bei dem Stehen auf einem

e verhüten vorzüglich die Mm. glutei und adductores
oris durch Balancirung des Beckens den Fall zur Seite.
Knien erfordert gröfsere Anstrengung als das Stehen,
em der Körper zwar auf einer längeren, aber schmale-
Fläche, auf dem Knie und einem Theil der Vorder-
he des Unterschenkels und des Fufsrückens, ruhet; indem
Theil dieser Unterstützungsfläche hinter der senkrechten
tellinie des Stamms sich befindet, und alle Muskeln des
erschenkels und Fufses unthätig sind: beim Sitzen in
rechter Stellung ruhet die Last des Stammes und Kopfes
dem Becken, insbesondere auf den Tubera ischii, und
nden sich alsdann nur die Rückenmuskeln in Contraction.
Beim Vorwärtsgehen ruhet anfänglich der Körper auf
einen unteren Extremität; der andere wird im Fufs-,
e- und Hüftgelenk gebeugt und dadurch nach vorn be-
t, zugleich die Beckenhälfte derselben Seite durch die
ler des Oberschenkels nach vorn gedrehet, welche Be-
ung dem Stamme sich mittheilt. Alsdann wird, durch
mäfsige Streckung der Gelenke der vorwärtsbewegten
remität, der Fufs auf den Boden gesetzt, und der Un-
und Oberschenkel durch stärkere Contraction der Strecker
Zehen, des Fufses und Unterschenkels in perpendicu-
Richtung gebracht: wobei die Mm. psoas und iliacus
rnus das Becken mit dem Stamm nach sich ziehen, und
andere untere Extremität, auf welcher der Körper bis-
ruhete, durch Streckung aller ihrer Gelenke das Becken
den Stamm vorwärts schiebt: wonach diese Extremität
ch Beugung ihrer Gelenke den zweiten Schritt beginnt,
das beschriebene Muskelspiel sich wiederholt. Beim
kwärtsgehen wird die Extremität, welche den Schritt
innt, zuerst gebeugt und durch den M. gluteus maximus
h hinten gezogen: alsdann ziehen, nachdem die Fufs-
ze niedergesetzt worden, die Mm. soleus, tibialis posti-
, peronaeus longus und brevis, und die langen Beuger
grofsen und übrigen Zehen den Unterschenkel nach
ten; und gleichmäfsig ziehen die Mm. gastrocnemii und
bliteus und der kurze Kopf des M. biceps femoris den
erschenkel — die Beuger des Unterschenkels, die vor-
en Hälften der Mm. gluteus medius und minimus, und
Mm. psoas major und iliacus internus das Becken nach

hinten. Beim Seitwärtsgehen wird die mäfsig gebeugte und dadurch verkürzte untere Extremität durch die Mm. gluteus medius und minimus abducirt, und sodann durch Streckung gerade gemacht und der Fufs auf den Boden gesetzt: hierauf ziehen die M. adductores des Ober- und Unterschenkels die andere Extremität der ersteren nach.

Beim Sprunge werden alle Gelenke der unteren Extremitäten und die Wirbelsäule stark gebeugt, und alsdann mit grofser Kraftanstrengung plötzlich gestreckt, wobei vorzüglich die Mm. gastrocnemii und solei durch Erhebung der Calcanei, und die Mm. tibiales postici und peronaei longi und breves durch ihren Druck auf die Knöchel, unter welchen sie hinlaufen, die Unterschenkel in die Höhe schnellen: diese Bewegungen werden durch die Oberschenkel auf das Becken und den Stamm übertragen. Bei dem Sprunge nach vorn treiben auch die Rollmuskeln des Oberschenkels das Becken vorwärts.

Beim Laufen geschehen in jeder unteren Extremität die Beugungen in derselben Ordnung, wie beim Gehen: die Streckungen folgen jenen aber schneller, und sind von denselben in die Höhe schnellenden Muskelcontractionen, wie beim Sprunge, begleitet: der Stamm ist stärker als beim Gehen nach vorn geneigt, gleichsam im Fall begriffen, welcher nur durch die eine und andere, abwechselnd vor seinem Schwerpunkte niedergesetzte, untere Extremität verhütet wird. Beim Laufen und beim Sprunge sind die Arme nach hinten gerichtet und oft vom Körper entfernt, zu besserer Erhaltung des Gleichgewichts, und um den an ihnen befestigten Rückenmuskeln einen festen Punkt zu geben. — Auch bei dem gewöhnlichen Schwimmen sind die unteren Extremitäten wie beim Sprunge beschäftigt, Hals und Kopf aber gestreckt, die abducirten und supinirten Arme in abwechselnder Vorwärts- und Rückwärtsbewegung begriffen, und die Inspirationsmuskeln in angestrengter Thätigkeit.

Beim Klettern klammern sich meistens die inneren Fufsränder, Knie und Schenkel vermittelst der Mm. tibiales postici und der Adductoren des Ober- und Unterschenkels fest: hat alsdann die Hand einen Gegenstand oberhalb des Kopfs ergriffen, so verkürzt sich der Arm durch die

iger der Hand und des Vorderarms; die Muskeln zwi-
en Arm und Schulterblatt ziehen letzteres, — die Mm.
toralis major und minor, serratus anterior major, rhom-
deus, cucullaris und latissimus dorsi aber den Stamm
h sich: während zugleich die Rückgratsstrecker den
rümmten Rumpf in die Höhe schieben, und die Strecker
Unter- und Oberschenkel die unteren Extremitäten ver-
gern, wodurch diese das Becken aufwärts schieben.

Literatur

zur

sten Abtheilung des ersten Bandes.

Geschichte und Bücherkunde.

Aufser den Werken über Geschichte und Literatur der ammten Heilwissenschaft:

1. *A. O. Goelicke* historia anatomiae nova aeque ac iqua. Halae 1713. 8.

2. Ej. introductio in historiam literariam anatomes. t. ad V. 1738. 4.

3. *J. Douglas* bibliographiae anatomicae specimen. gd. B. 1734. 8.

4. *A. Portal* histoire de l'anatomie et de la chirurgie. Paris 1770 — 1773. 6 Vol. 8.

5. *A. de Haller* bibliotheca anatomica. Tigur 1774 — 77. 2 Tom. 4.

6. *Th. Lauth* histoire le l'anatomie. Strasb. 1815 — 16. 2 Tom. 4.

Sehr vollständig ist die anatomische Literatur angeben in Hildebrandts Anatomie. 4te Ausg. von E. H. eber. (№ 38.)

Lehr- und Handbücher,

welche die gesammte Anatomie umfassen.

7. *A. Vesalii* de c. h. fabrica libri VII. Basil. 1543 a. m. — Ven. 1604. Fol. — Deutsch von H. P. Leveg. Ingolstadt 1783. Fol.

8. *Ej.* Opp. omnia anatomica et chirurgica. Curantis H. Boerhaave et B. S. Albino. Tom. I. II. Lugd. B. 25. Fol.

9. *J. Valverde* historia de la composicion del cuerpo mano. 1556. Fol. — Ital. in Roma 1560. — Anatomia h. vert. M. Columbus. Ven. 1607. Fol.

10. *R. Columbi* de re anatomica libri XV. Ven. 1559. Fcft. a. M. 1593. 8.

11. *G. Fallopii* de c. h. anatome compendium. Ven. 1571. 8.

12. *F. Plateri* de c. h. structura et usu. Basil. 1583. Fol. — Daselbst 1603. Fol.

13. *C. Bauhini* de c. h. fabrica. Basil. 1590. 8. — Institutiones anat. Basil. 1592. 8. — Bern. 1604. 8. — Theatrum anat. Fcft. a. M. 1605. 4. — ib. 1621. 4.

14. *A. Laurentii* historia anatomica c. h. Fcft. 1600. Fol. — ib. 1627. 8.

15. *J. Riolani* encheiridium anatomicum et pathol. L. B. 1649. 8. Daselbst 1685. — Franz v. Sauvin. Paris 1661, u. a. m.

16. *A. Spigelii* de c. h. fabrica libri X. Ven. 1627. Fol. Ed. D. Bucretius. Fcft. 1632. 4. (Mit den Casserischen Tafeln, s. № 86.)

17. *Th. Bartholini* anatomia reformata. L. B. 1651. 8. u. a. m. 1669. 8. — Holländ. v. Stassart. Leyden 1653. 8. — Engl. Lond. 1668. Fol. — Anatome quartum renovata. Lugd B. 1673. 8. — Deutsch Nürnb. 1677. 4.

18. *J. de Diemerbroeck* anatomia c. h. Ultraj. 1672. Fol. ib. 1685. Fol. — Franz. Par. 1728. 4. — Engl. Lond. 1689.

19. *D. le Clerc et J. J. Manget* Bibliotheca anatomica. Gen. 1685. Fol. ib. 1699.

20. *St. Blancardi* anatomia reformata. L. B. 1687. 8. u. a. m. — Holl. Amst. 1686. 8. — Deutsch. Leipz. 1705. 4.

21. *P. Dionis* anatomie de l'homme, suivant la circulation du sang. Genêve 1690. 8. u. a. m. — Anatomia c. h. Gen. 1696. 4. — Engl. Lond. 1716. 8.

22. *Ph. Verheyen* c. h. anatome. Lovan. 1693. 4. u. a. Lips. 1731. 8. — Deutsch Leipz. 1704. u. a.

23. *J. Keill* the anatomy of the human body. Lond. 1698. 12. u. a. — Edinb. 1760. 12. — Holl. Amst. 1722. 8.

24. *G. Cheselden* the anatomy of the h. body. Lond. 1713. 8. 6th ed. Lond. 1763. 8. — Deutsch, Gött. 1790. 8.

25. *L. Heister* compendium anatomicum. Altorf 1717. 8. u. a. m. 1770. 8. — Deutsch in vielen Ausg. —

anz. v. J. B. Senac. à Par. 1753. 3 Vol. 8. — Engl. 34. 8.

26. *J. A. Kulmus* anat. Tabellen. Danzig 1722. u. a. ngearbeitet v. C. G. Kühn. Leipz. 1789. Fol.

27. *C. Verdier* abrégé de l'anatomie du corps humain. Paris 1732. 2 Vol. 8. — 4e ed. p. R. B. Sabatier. r. 1768. 8.

28. *J. Winslow* exposition anatomique de la structure corps humain. à Paris 1732. 4 Vol. 8. u. a. m. — . 1767. 5 Vol. 8. — Lat. Fcft. a. M. 1753. 8. u. a. — utsch, Basel 1754. 8. — Engl. v. G. Douglas, Lond. 33. 8. — Holl. Roterd. 1735. 8. — Ital. 1764. 4.

29. *J. Lieutaud* anatomie historique et pratique, ed. rm. p. A. Portal. à Paris 1776. 2 Vol. 8. — Deutsch. ipz. 1782. 8.

30. *A. de Haller* elementa physiologiae c. h. Laus. 57—66. 8 Vol. 4. — De partium c. h. fabrica et functionibus. Bernae 1777. 8 Vol. 8.

31. *J. A. Schaarschmidt* anatomische Tabellen. Frkft. 59. 8. u. a. — Verm. v. Hartenkeil u. S. Th. Sömmerig. Frkft. a. M. 1803. 2 Bde. 8.

32. *R. B. Sabatier* traité complet de l'anatomie. Paris 1772. 2 Vol. 8. — Par. 1781. 3 Vol. 8.

33. *J. J. Plenck* primae lineae anatomes. Vien. 1775. u. a. 1794. 8. Deutsch das. 1796. 8.

34. *F. Leber* Vorlesungen über die Zergliederungsnst. Wien 1776. 8. — 1781. 8.

35. *J. L. A. Mayer* Beschreibung des ganzen menschhen Körpers. 8 Thle. Berl. u. Leipz. 1783 — 1794. 8.

36. *J. C. Loder* anat. Handbuch 1r Bd. Jena 1788. Grundrifs der Anat. des m. K. 1r Bd. Jena 1806. 8.

37. *L. M. Caldani* Institutiones anatomicae. Venet. 89. 8. Lips. 1792. 8.

38. *F. Hildebrandt* Lehrb. der Anatomie des Menschen. Bde. Braunschw. 1789—92. 8. 3te Aufl. 1803. 4te ngearbeit. u. verm. Ausgabe von *E. H. Weber*. Braunweig 1830—32. 4 Bde. 8.

39. *S. Th. Sömmering* vom Baue des menschl. Körpers. Theile. Fkft. a. M. 1791. 8. 2te Aufl. 1800. Lat. von G. Clossius. Fkft. a. M. 1794—1800. 8.

40. *W. R. C. Wiedemann* Handb. der Anatomie. Brschw. 1796. 8. 3te Aufl. Gött. 1813.

41. *A. Boyer* traité complet d'anatomie. à Paris 1797—1799. 4 Vol. 8.

42. *J. Bell* the anatomy of the human body. Edinb. u. Lond. 1797. 5 Vol. 8. — 2d ed. (by John and Charles Bell) 4 Vol. Edinb. 1809. 4 Vol. 8. — Deutsch von J. C. A. Heinroth u. J. C. Rosenmüller. Leipz. 1806—7. 2 Bde. 8.

43. *X. Bichat* traité d'anatomie générale et descriptive, à Paris 1801. 9 Vol. 8.

44. *A. F. Hempel* Anfangsgründe der Anatomie. Gött. 1801. 8. 5te Ausg. 1827. 2 Bde. 8.

45. *A. R. Vetter* Lehrb. der Anatomie des gesunden Menschenkörpers. Wien 1802. 3 Bde. 8.

46. *G. W. Consbruch* u. *J. C. Ebermaier* anat. Taschenbuch. Lpz. 1802. 8. 2te Aufl. 1806.

47. *A. Portal* cours d'anatomie médicale. à Paris 1804. 5 Tom. 8.

48. *C. J. M. Langenbeck* anat. Handb. Tabellarisch entw. Gött. 1806. 8.

49. *J. C. Rosenmüller* Handb. der Anat. Leipz. 1808. 8. 4te Ausg. v. E. H. Weber. Leipz. 1828. 8.

50. *J. Schallgruber* Grundbegriffe vom Körperbau des Menschen. Wien 1808—11. 5 Theile. 8.

51. *C. Wistar* a system of anatomy. Philadelph. 1811. 8 — 1822. 2 Vol. 8.

52. *J. G. Ilg* Grundlinien der Zergliederungskunde des Menschenkörpers. Prag 1811—12. 2 Bde. 8.

53. *A. M. Mayr* anat. Hdbuch. Wien 1812. 8.

54. *A. Monro* II. outlines of the anatomy of the human body. 3 Vol. 8. Edinb. 1813.

55. *J. Gordon* a system of human anatomy. Edinb 1815. 8.

56. *J. F. Meckel* Hdb. der menschlichen Anatomie Halle und Berl. 1815 – 20. 4 Bde. 8. Franz. v. A. J. L Jourdan u. G. Breschet. à Par. 1815. 8.

57. *A. Fyfe* a compendium of the anat. of the h. body Lond. 1815. 4 Vol. 8.

58. *M. Münz* Hdb. der Anat. d. menschl. Körpers. Landsh. 5—27. 3 Bde. 8. Mit Abbild. in Fol. (s. № 96.)

59. *H. Cloquet* traité d'anatomie descriptive. Paris 1816. Vol. 8. — 4e ed. 1832 ff.

60. Allg. Encyclopaedie der Anatomie, nach Gordon, . Bell u. A. von J. C. Rosenmüller, H. Robbi u. A. C. ck. Leipz. 1819—28. 8 Bde. 8.

61. *A. L. J. Bayle* petit manuel d'anatomie descrip- e. à Paris et Montpell. 1823. 12.

62. *A. Monro III.* elements of the anat. of the h. body. inb. 1825. 2 Vol. 8.

63. *M. J. Weber* Elemente der allg. u. speciellen Ana- nie mit der Zergliederungskunst. Bonn 1826—32. 8.

64. *A. C. Bock* Katechismus der praktischen Anatomie. ipz. 1826. 2 Bde. 8.

65. *A. Brierre de Boismont* traité élémentaire d'ana- nie. à Paris 1827. 8.

66. *B. Bransby Cooper* lectures on anatomy. Lond. 32. 4 Vol. 8.

Wörterbücher und Synonymik.

Aufser den allgemeinen med. chir. Encyclopädien und örterbüchern:

67. *P. Tarin* dictionnaire anatomique suivi d'une biblio- eque anat. et physiol. à Paris 1753. 4.

68. *F. Vicq d'Azyr* vocabulaire anatomique. à Paris 69. Fol.

69. *J. F. Pierer* u. *L. Choulant* medic. Realwörterbuch, ste Abtheil., Anatomie und Physiologie. Lpz. u. Altenb. 16—29. 8 Bde. 8.

70. *C. H. T. Schreger* Synonymik der anat. Literatur. irth 1803. 8.

Zergliederungskunst.

71. *J. F. Cassebohm* methodus secandi, oder deutliche nweisung zur anat. Betrachtung und Zergliederung des . K. Berlin 1746. 8. Verb. v. E. G. Baldinger. Berl. Stralsund 1769. 8.

72. *J. Suë* abrégé d'anatomie etc. à Paris 1748. 2 Vol. 2. — Anthropotomie. Paris 1765. 12.

73. (*P. Tarin*) Anthropotomie. à Par. 1750. 2 Vol. 8.

74. *Th. Pole* the anatomical instructor. Lond. 1790. 8. 1814. 12.

75. *J. L. Fischer* Anweisung z. prakt. Zergliederungskunst. Leipz. 1791. 8. Fortsetz. 1793. 8.

76. *Ch. Bell* a system of dissections: part. 1—5. Edinb. 1799—1806. Fol.

77. *J. P. Maygrier* manuel de l'anatomiste. 2e edit. Par. 1811. 8.

78. *J. N. Marjolin* manuel d'anatomie etc. à Paris 1814. 2 Vol. 8.

79. *J. Shaw* manual for the student of anatomy: containing rules for displaying the structure of the body etc. Lond. 1821. 8. — Anleitung zur Anatomie u. s. w. Weimar 1823. 8.

80. *A. M. Mayr* pract. Anleitung zur Zergliederung des menschl. Körpers. Wien 1822. 8.

81. *H. Mayo* course of dissections. Lond. 1825. 8.

82. *M. J. Weber* (№ 63. auch unter d. Titel die Zergliederungskunst des m. K. Bonn 1826—32. 8.

83. *Brierre de Boismont* (№ 65.)

84. *A. C. Bock* der Prosector. Leipz. 1829. 8.

85. *E. A. Lauth* nouveau manuel de l'anatomiste. à Paris et Strasb. 1829. 8.

Abbildungen,

welche alle oder die meisten Theile des Körpers darstellen.

86. *J. Casserii Plac.* tabulae anatomicae LXXVIII. cum supplemento XX tabularum D. Bucretii. Ven. 1627. Fol. Deutsch von J. J. Ficker. Fkft. a. M. 1707. 4. (s. № 16.)

87. *G. Bidloo* anatomia corporis humani cum CV tab. Amstel. 1685. Fol.

88. *W. Cowper* the anatomy of the human bodies. Oxf. 1698. Fol. — Anatomia corporum humanorum CXIV tabulis explicata. Lgd. B. 1739. Fol.

89. *B. Eustachii* tabulae anatomicae, ed. J. M. Lancisius. Romae 1714. Fol. — B. S. Albini explicatio anat tabularum B. Eustachii. Lgd. B. 1743. Fol. 1761. Fol.

90. Tabulae anatomicae delineatae a *Petro Berretino*, stratae a C. Petrioli. Rom. 1741. Fol. — ed. F. Petra-i. Rom. 1788. Fol.

91. *A. C. Gautier d'Agoti* essai d'anatomie en tableaux primés etc. — suite de l'essai d'anatomie — anatomie de tête — anatomie génér. des viscéres etc. Paris 1745—51. — Exposition anat. de la structure du corps humain. rseille 1759. Fol.

82. *A. de Haller* icones anat. Fasc. I—VIII. Gött. 3—56. Fol. — ed. alt. ib. 1780.

93. *J. C. A. Mayer* anat. Kupfertafeln mit Erklärun-. 6 Hefte. Berl. 1783—94. 4.

94. *J. C. Loder* tabulae anat. Fasc. I—VI. Vimar. 4—1804. Fol. Auch mit deutschem Text.

95. *L. M. A. et Fl. Caldani* icones anatomicae. Ven. 1—13. 4 Vol. Fol. explicatio iconum. 4 Vol. 4.

96. *M. Münz* № 58.

97. *J. a Scherer* tabulae anat. originales. Vien. 1817—5 Vol. Fol. Auch unter dem Titel: anatom. Original-ellen.

98. *P. Mascagni* prodromo della grande anatomia, po-in ordine da F. Antomarchi. Firenze 1819. Milano 1824. Vol. 8. — Anatomia universa XLIV tabulis repraesen-a, cura A. Vaccà-Berlinghieri, J. Barzellotti et J. Rosini. a 1823. Fol.

99. *J. Cloquet* anatomie de l'homme. à Par. 1821. Fol. Dessen manuel d'anatomie descriptive. à Paris 1825 ff. 4.

100. *J. Lizars* a system of anatomical plates. Lond. 24—30. 12 Hefte. Fol.

101. *C. J. M. Langenbeck* icones anatomicae. Gött. 26 ff. Fol.

102. *J. H. Oesterreicher* tabulae anatomicae Sect. 1. chst. 1827. Fol. — Anatomische Steinstiche u. neue anat. einstiche, 25 Hefte. Fol. München 1827—30.

103. *A. Fyfe* a system of anatomy of the h. body. ond. 1827. 3 Vol. 4.

104. *M. J. Weber* anatomischer Atlas. Düsseldorf 30 ff. Fol.

105. *N. Bourgery* traité complet de l'anatomie de omme. Paris 1832 ff. 4.

Vermischte anatomische Schriften.

106. *G. Fallopii* observationes anat. ad P. Mannam. Ven. 1561. 8. — Opp. Fkft. a. M. 1600. Fol. — und in Vesalii opp. ed. B. S. Albinus. L. B. 1725. Fol. (№ 8.)

107. *A. Vesalii* anatomicarum G. Fallopii observationum examen. Ven. 1564. 4. u. in Opp. ed. B. S. Albinus L. B. 1725. Fol. (№ 8.)

108. *B. Eustachii* opuscula anat. Ven. 1564. 4.

109. *L. Botalli* commentarioli, in opp. ed. J. v. Hoorne. L. B. 1660. 8.

110. *Volcher Coiter* anatomicae exercitationes observationesque. Norimb. 1572. Fol.

111. *J. C. Arantii* observationes anat. V. Ven. 1587. 4.

112. *F. Plateri* mantissa observationum. libri III. Basil. 1614. 8.

113. *Th. Bartholini* historiarum anatom. rariorum cent. VI. Hafn. 1654—65. 8.

114. *J. Veslingii* observationes anat. edid. B. Bartholinus. Hafn. 1664. 8.

115. *G. Blasii* miscellanea anat. Amstel. 1673. 8. — Observata anatomico-practica L. B. 1674. 8.

116. *N. Tulpii* observationes medicae. Amstel. 1672. 8.

117. *C. Bartholini* exercitationes miscellaneae. L. B. 1675. 8. — Exercitationes anat. Hafn. 1678. 1692. 8.

118. *J. J. Mangeti* thesaurus anatomicus. Genev. 1717. 2 Vol. Fol. — Theatrum anat. Gen. 1718. 2 Vol. Fol.

119. *C. Drelincurtii* opuscula med. Hag. C. 1727. 4.

120. *Th. Kerkringii* opp. omnia anatomica. L. B. 1729. 4.

121. Paeonis et Pythagorae (*J. J. Harderi et J. C. Peyeri*) exercitationes anat. Basil. 1682. 8. — *J. C. Peyeri* parerga anat. et med. Genev. 1681. 8. Lugd. B. 1750. 8.

122. *M. Malpighii* opp. omnia. Lond. 1686. Fol. Lgd. B. 1687. 2 Vol. 4. — Opp. posthuma. Amstel. 1700. 4. Ven. 1743. 4.

123. *Fabricii ab Aquapendente* opp. omn. anatomica e physiol. praef. est J. Bohnius. Lips. 1687. — praef. est B. S. Albinus, L. B. 1737. Fol.

124. *Stalparti v. d. Wiel* observationes variae anat. L. B. 1687. 8.

125. *J. H. Pechlini* observationes physico-medicae. ıb. 1691. 4.

126. *A. v. Leeuwenhoek* arcana naturae detecta. Delph. 5—97. 2 Tom. 4. Opp. omnia s. arcana naturae de- a. L. B. 1722. 4 Vol. 4.

127. *F. Ruyschii* opp. omnia. Amst. 1737. 3 Vol. 4.

128. *R. de Vieussens* oeuvres françaises. Toulouse 1715. ol. 4.

129. *J. B. Morgagni* adversaria anat. Patav. 1706—19. ı. a. Ven. 1762. Fol. — Epistolae anat. Ven. 1762. — Opusc. miscellanea. Ven. 1763. 3 Vol. Fol.

130. *R. de Graaf* opp. omnia. Amst. 1705. 8.

131. *G. Bidloo* opp. omnia anatomico-chirurgica. L. 1715. 4.

132. *L. Bellini* opuscula. L. B. 1737. 4.

133. *A. Pacchioni* opp. ed. 4ta. Rom. 1771. 4.

134. *J. D. Santorini* observationes anat. Ven. 1724. — Tabulae XVII (opus posthumum) ed. M. Girardi. mae 1775. Fol.

135. *J. M. Lancisii* opp. varia. Venet. 1739. 2 Tom. Fol.

136. *W. Hunter* medical commentaries, part. 1. Lond. 0. 4. supplement, Lond. 1764. 4. — 2d edit. Lond. 1777. 4.

137. *A. M. Valsalvae* opp. acc. *J. B. Morgagni* episto- annat. XX., ed. J. B. Morgagni. Ven. 1740. 2 Vol. 8.

138. *A. de Haller* Disputationes anatomicae quas col- it et edidit. Gött. 1746—51. 7 Vol. 4. ej. Opp. mi- a. Laus. 1762—68. 3 Vol. 8.

139. *P. Tarini* adversaria anat. Par. 1750. 4.

140. *P. C. Fabricii* observationes anat. Helmst. 1751. — Sylloge observationum anat. ib. 1759. 4.

141. *P. A. Boehmeri* observat. anat. Fasc. II. Hal. 52—1756. Fol.

142. *P. Tabarrani* observ. anat. ed. 2da. Lucae 1753. 4.

143. *J. L. L. Loeseke* observ. anatomico-chirurgico- edicae. Berol. 1754. 4.

144. *A. Monro I.* observations anatomical and physio- gical. Edinb. 1758. 8. — Works, Edinb. 1781. 4.

145. *B. S. Albini* annotationum academicarum libri III. Leid. 1754—68. 4.

146. *P. Camperi* demonstrationum anatomico-pathologicarum libri II. Amstel. 1760. Fol.

147. *C. G. Büttner* anat. Wahrnehmungen. Königsb. u. Leipz. 1768. 4.

148. *J. G. Walter* observationes anat. Berol. 1775. Fol. Deutsch von J. G. D. Michaelis. Berlin 1782. 4.

149. *E. Sandifort* thesaurus dissertationum programmat. aliorumq. opusc. select. Roterd. 1768—78. 3 Tom. 4. — Observ. anat. pathol. libri IV. L. B. 1777. 4. — Exercit. academ. lib. II. L. B. 1783—85. 4. — Opusc. anat. L. B. 1784. 4.

150. *Ch. F. Ludwig* exercitationes academicae. Lips. 1779. 8.

151. *G. Prochaska* annotationum academicarum fasc. III. Prag. 1780—84. 8. — Opp. minora Vienn. 1800. 8. — Disquisitio anatomico-physiologica organismi corporis hum. Vien. 1812. 4.

152. *A. Scarpa* anatomicarum annotationum lib. I. Mutin. 1779. 4. Lib. II. Tic. 1785. 4.

153. *A. F. Walter* annotat. academicae. Berol. 1786. 4.

154. *J. C. Neubauer* opp. anatomica collecta, ed. C. Hinderer. Fcft. et Lips. 1786. 4.

155. *J. Hunter* observations on certain parts of the animal oeconomy. Lond. 1786. 4. — 1792. 4.

156. *H. A. Wrisberg* sylloge commentationum anatomicarum. Gött. 1786. 4. — Commentationes medici, physiologici, anatomici et obstetr. argumenti, soc. reg. scient. Götting. oblatae. Gött. 1800. 8.

157. *H. P. Leveling* observationes anatomicae rariores. Norimb. 1787. 4.

158. *G. Azzoguidi, J. B. Pallettae* et *J. Brugnon* opusc. anatom. selecta, ed. E. Sandifort. L. B. 1788. 8. — Deutsch von H. Tabor. Heidelb. 1791. 8.

159. *J. D. Metzger* opusc. anat. et physiologica. Goth. 1790. 8. — Exercitationes anat. Regiom 1792. 8.

160. *B. N. Schreger* fragmenta anat. et physiol. Lips. 1791. 4.

161. *C. A. Rudolphi* anatomisch-physiologische Abhandlungen. Berlin 1802. 8.

162. *J. F. Meckel* Abhandlungen a. d. vergl. u. menschl. omie und Physiologie. Halle 1806. 8. — Beiträge zur l. Anatomie. Leipz. 1808—12. 2 Bde. 8. — Ana- -physiolog. Beobachtungen u. Untersuchungen. 1822. 8.
163. *B. G. Seiler* observationum anatomicarum fasc. III. b. 1809—12. 4.
164. *C. F. Burdach* anatom. Untersuchungen. Leipz. . 4.
165. *G. R.* und *L. C. Treviranus* vermischte Schriften, . u. physiol. Inhalts. Göttingen u. Bremen 1806—20. le. 4.
166. *H. F. Isenflamm* anat. Untersuchungen. Erlangen

Zeitschriften.

167. *J. F. Isenflamm* u. *J. C. Rosenmüller* Beiträge für Zergliederungskunst. 2 Bde. Leipz. 1800. 8.
168. *J. C. Reil* Archiv für die Physiologie. Halle 3—1815. 12 Bde. 8.
169. *Ph. F. Meckel* Journal f. anat. Varietäten, feinere ergl. Anatomie. Bd. I. St. 1. Halle 1805. 8.
170. *J. F. Meckel* Deutsches Archiv f. d. Physiologie. ie 1815—23. 8 Bde. 8.
171. *Dessen* Archiv f. Anatomie u. Physiologie. Lpz. 3 ff. Bd. 1—6. 8.
172. *F. Magendie* Journal de physiologie experimen- . à Paris 1820 ff. jährlich ein Bd. 8.
173. *F. Tiedemann, G. R. Treviranus* u. *L. C. Trevi- us* Zeitschrift für die Physiologie. Darmst. 1824 ff. 1—4. 4.
174. (*Dupuytren* et) *G. Brsechet* Répertoire général natomie et de physiologie pathologiques. 1827 ff. jährdrei Bände 8.
175. *C .F. Heusinger* Zeitschrift für organische Physik. enach 1827—29. Bd. I—III. (17 Hefte) 8.

Beschreibungen anatomischer Sammlungen

n F. Ruysch, B. S. Albin, A. Vater, J. G. u. F. A. Walter, W. Otto, J. Bleuland, u. a.

Allgemeine Anatomie.

Überhaupt.

176. *G. Fallopii* lectiones de partibus similaribus, collectae a Volchero Coiter. Norimb. 1675. Fol.

177. *M. Malpighi*, in Opp. (№ 122.)

178. *F. Ruysch*, in Opp. (№ 127.)

179. *S. T. Sömmering*, in vom Baue des m. K. (№ 39.)

180. *X. Bichat* anatomie générale. à Paris 1801. 4 Vol. 8. Deutsch von C. H. Pfaff. Leipz. 1802—3. 2 Bde. 8. — X. Bichat anatomie générale, précedée des récherches physiol. sur la vie et la mort; avec des notes de M. Maingault. à Paris 1818. 2 Vol. 8. — nouv. ed. par F. A. Béclard. à Paris 1821. 2 Vol. 8. — *F. A. Béclard* additions à l'anatomie générale de X. Bichat. à Par. 1821. 8. Deutsch von L. Cerutti. Leipz. 1823. 8.

181. *K. A. Rudolphi* Prog. de h. c. partibus similaribus. Gryphisw. 1809. 4.

182. *J. F. Meckel* Handbuch d. m. Anatomie. (№ 56.) Bd. I.

183. *C. Mayer* über Histologie u. eine neue Eintheilung der Gewebe des m. K. Bonn 1819. 8.

184. *J. Cloquet* anat. de l'homme (№ 99.) Introduction.

185. *C. F. Heusinger* System der Histologie. Th. I. (2 Hefte.) Eisenach 1822. 4.

186. *P. Mascagni* Prodromo della grande anatomia. Milano 1824. 4 Vol. 8.

187. *F. A. Béclard* élémens d'anatomie générale. à Paris 1825. 8.

188. *M. J. Weber* Elemente der allg. Anat. (1r Th. der Zergliederungskunst des m. K. № 63.)

189. *A. L. J. Bayle* et *H. Hollard* manuel d'anatomie générale. à Paris 1827. 12.

190. *E. H. Weber* Allgemeine Anatomie des Menschen (1r Th. von F. Hildebrandts Hdb. d. A. d. M. 4te Ausg. № 38). Braunschweig 1830. 8.

---

191. *A. de Haller* elementa physiol. (№ 30.)

192. *L. C. M. Richerand* nouveaux élémens de physiologie. à Paris 1801. 2 Vol. 8. — 10e edit. 1832. 4 Vo

193. *G. R. Treviranus* Biologie. Gött. 1802—22. 6 Bde. 8.
194. *F. Magendie* Précis élémentaire de physiologie. ır. 1816. 2 Vol. 8. — 2e ed. 1825. — Deutsch von lofacker. Tübing. 1826. 2 Bde. 8.
195. *J. Lenhossék* physiologia medicinalis. Vien. 1817. ol. 8.
196. *K. A. Rudolphi* Grundrifs der Physiologie. Bd. . Berlin 1821—28. 8.
197. *N. P. Adelon* physiologie de l'homme. à Par. 1824. ol. 8.
198. *J. Bostock* an elementary system of physiology. d. 1825—27. 3 Vol. 8. 2d ed. 1828.
199. *K. F. Burdach* die Physiologie als Erfahrungs- enschaft. Leipz. 1826 ff. 8. 1r—4r Bd.
200. *F. Tiedemann* Physiologie des Menschen. Darm- t 1830 ff. 8. 1r Bd.

Mischungsbestandtheile.

201. *M. E. Chevreul* considérations générales sur l'a- se organique et sur ses applications. à Paris 1824. 8.
202. *L. J. Thénard* traité de chimie, 4me vol. à Pa- 1824. 8.
203. *F. L. Hünefeld* physiologische Chemie des m. anismus. Leipz. 1826. 2 Bde. 8.
204. *J. J. Berzelius* Lehrbuch der Chemie. A. d. wed. v. F. Wöhler. Dresden 1825—31. 8. Vierten des 1e Abth. Thierchemie. — Dess. Jahrsberichte über Fortschritte der physischen Wissenschaften. A. d. wed. v. C. G. Gmelin u. F. Wöhler. Tüb. 1822—32. 11 Jahrgänge.
205. *L. Gmelin* Handbuch der theoretischen Chemie. ft. 1826—30. 8. Bd. II.

Formbestandtheile.

206. *A. a. Leeuwenhoek* in Opp. (№ 126) und in Phi- ophical Transactions f. th. y. 1673—1707.
207. *della Torre* nuove osservazioni microscopiche. poli 1776. 4.

208. *F. Fontana* traité sur le vénin de la vipère — avec observations sur la structure primitive du corps animal. Flor. 1781. 4.

209. *A. Monro* in The structure and functions of the nervous system. Edinb. and Lond. 1783. Fol.

210. *G. Prochaska* in Opp. min. und in disquis. anat. org. c. h. (№ 151.)

211. *G. R. Treviranus* über die organischen Elemente des thier. Körpers, in verm. Schr. Bd. I. (№ 165.)

212. *E. Home u. Bauer* in Philosophical Transact. f. th. y. 1799. 1818. 1822. 1824. — Meckels deutsch. Archiv. (№ 170.) Bd. V. 1819.

213. *Prévost u. Dumas* in Magendie Journal de physiologie (№ 172.) 1823.

214. *H. Milne Edwards* mémoire sur la structure élémentaire des principaux tissus organiques des animaux. à Paris 1823. 8. — auch in Annales des sciences naturelles 1826. u. in Heusingers Zeitschrift (№ 175.) Bd. II.

215. *Hodgkin u. Lister* in Philosophical Magazine and Annals of Philosophy, for Aug. 1827. — Annales des sciences natur. 1827.

216. *Raspail* in Breschet répertoire (№ 174.) Tom. III. IV. 1827. — Heusingers Zeitschrift. (№ 175.) Bd. II.

217. *B. W. Seiler* in dessen Naturlehre des Menschen. Dresd. u. Leipz. 1826. Fol.

218. *C. A. Schultze* (gratulatur J. J. Bellermann) prodromus descriptionis formarum partium elementarium in animalibus. Berol. 1828. 4. — u. in dess. Lehrbuch der vergl. Anat. Berl. 1828. Bd. I.

Zellstoff und Fett.

219. *W. Hunter* remarks on the cellular membrane, in Med. observations und inquiries by a society of physicians in London. Vol. II.

220. *Th. Bordeu* récherches sur le tissu muqueux, à Paris 1767. 12. — Deutsch, Wien u. Leipz. 1772. 8.

221. *C. F. Wolff* de tela quam dicunt cellulosa, i. Nova acta acad. scient. Petropolitanae. Tom. VI. VII. VIII.

222. *K. A. Rudolphi* Anatomie der Pflanzen. Berlin 1807. 8.

223. *Lorry* sur la graisse dans le corps humain, in n. de la soc. roy. de médecine, 1779. Deutsch von Lin-ıann. Berl. 1797. 8.

224. *W. X. Janssen* pinguedinis animalis consideratio s. et path. L. B. 1784. Übers. v. Jonas. Halle 1786. 8.

225. *S. C. Lucae* in Reils Archiv (Nr. 168.) Bd. IX.

226. *C. H. E. Allmer* Diss. in. sistens disquisitiones t. pinguedinis animalis. Jen. 1823. 4.

227. *O. B. Kühn* de pinguedine imprimis humana. Lips. 5. 4.

Fontana (Nr. 208.) Heusinger (Nr. 185.) Raspail . 216.)

Gefäſssystem.

Kreislauf.

228. *G. Harvaèi* exercitatio anat. de motu cordis et guinis circulatione in animalibus. Fcf. 1628. 4.

229. *St. Hales* statical essays. Lond. 1731—33. 2 Vol. — Haemastatique — (trad. par de Sauvages.) à Genève. 4. 4.

230. *J. B. Sénac* traité de la structure du coeur, de action et des ses maladies. à Paris 1749. 4. — Das. 4. 4.

231. *F. Boissier de Sauvages* pulsus et circulationis ıria. Monsp. 1752. 4.

232. *A. de Haller* deux mémoires sur le mouvement sang. Laus. 1756. 12. — und in Elem. physiol.

233. *G. Verschuir* de arteriarum et venarum vi irri-ili etc. Gron. 1766. 4.

234. *L. Spallanzani* dell' azione del cuore n'e vasi san-gni. Mod. 1768. 4. — Dei fenomeni della circolazione. d. 1777. 8.

235. *G. Prochaska* in opp. min. (Nr. 151.)

236. *Th. Young* on the functions of the heart and the eries, in Philos. Transact. 1809.

237. *C. Hillier Parry* experimental inquiry into the nature, cause and variety of pulse, and certain other properties of the larger arteries. Lond. 1816. 8. Deutsch v. Embden. Hannover 1817. 8. — Dess. additional experiments. Lond. 1819. 8.

238. *C. Hastings* de vi contractili vasorum. Edinb. 1818. 8. — u. in dess. treatise on the inflammation of the mucous membrane of the lungs. Lond. 1820. 8. Deutsch von G. v. d. Busch. Bremen 1822. 8.

239. *C. G. Carus* über den Blutlauf, in wiefern er durch die Druck- und Saugkraft des Herzens bewirkt wird, in Meckels deutsch. Archiv Bd. IV.

240. *M. Jaeger* de arteriarum pulsu. Virceb. 1820. 8.

241. *C. W. L. Jaeckel* de motu sanguinis. Vratisl. 1821. 4.

242. *J. H. Oesterreicher* Versuch einer Darstellung der Lehre vom Kreislaufe des Bluts. Nürnb. 1826. 4.

243. *D. Barry* experimental researches on the influence exercised by atmospherical pressure upon progression of blood in the veins. Lond. 1826. 8.

244. *C. H. Schulz* über Blutbildung und Blutbewegung, in Meckels Archiv f. A. u. Ph. (Nr. 171.) 1826.

245. *L. F. Koch* Ist die Contraction des Herzens die einzige bewegende Kraft des Blutumlaufs? u. s. w. in Meckels Archiv (Nr. 171.) 1826.

246. *H. F. Bonorden* Beitrag zur Lehre von der Blutbewegung, in Meckels Archiv (Nr. 171.) 1826.

247. *G. Wedemeyer* Untersuchungen über den Kreislauf des Bluts. Hannov. 1828. 8. — Ergänzungen in Meckels Archiv (Nr. 171.) 1828.

248. *Poiseuille* sur la force du coeur aortique — sur l'action des artères — in Breschet répertoire (Nr. 174. T. VI. u. VII. 1829.

Arterien.

249. *B. S. Albin* de arteriae membranis et vasis, in Annotat. ac. (Nr. 145.) L. IV.

250. *A. Monro I.* on the coats of the arteries, in Works
. 144.)
251. *J. E. Hebenstreit* de arteriarum c. h. confiniis —
vaginis vasorum — de flexu arteriarum — in Haller Disp.
. 138.) Vol. I. II.
252. *Ch. G. Ludwig* de tunicis arteriarum, in Haller
p. (Nr. 138.) Vol. II.
253. *A. de Haller* de arteriarum et venarum fabrica,
Opp. min. (Nr. 138.) Vol. I.
354. *J. Hunter* treatise on the blood, inflammation and
shot wounds. Lond. 1794. 4. Deutsch von E. B. G.
enstreit. Leipz. 1797—1800. 2 Bde. 8.
255. *H. A. Wrisberg* de nervis arterias venasque co-
antibus, in Comment. (Nr. 156.)
256. *S. C. Lucae* über die Nerven, die zu den Arterien
en, in Reils Archiv (Nr. 168.) Bd. IX.
257. *J. F. Meckel* über den Verlauf der Arterien und
Venen, im deutschen Arch. (Nr. 170.) Bd. I.
258. *F. Ribes* Untersuchungen, s. Meckels deutsch. Arch.
. 170.) Bd. V.
259. *C. Th. Rainarz* Diss. de irritabilitate arteriarum
pria. Bonn 1821. 4.
260. *Ch. H. Ehrmann* Structure des artères, leurs pro-
etés, leurs fonctions etc. Strasb. 1822. 4.
261. *D. Belmas* sur la structure des artères etc. Strasb.
2. 4.

Venen.

262. *H. Fabriz ab Aquapendente* de venarum ostiolis
Opp. (Nr. 123.)
263. *H. Meibom* de valvulis vasorum, in Haller Disp.
. 138.) Vol. II.
264. *Th. Kemper* de valvularum fabrica, in Hall. Disp.
. 138.) Vol. II.
265. *J. E. Hebenstreit* de venis communicantibus, in
II. Disp. (Nr. 138.) Vol. II.
266. *J. G. Janke* de ratione venas c. h. angustiores
endendi, in Sandifort thesaurus dissertationum. Vol. II.
. 149.)

267. *H. Marx* diatribe anat. phys. de structura et vita venarum. Caroliruhae 1819. 8.

268. *F. Ribes* in Revue médicale 1825. Juillet.

Capillargefäfse.

269. *R. Vieussens* novum vasorum c. h. systema. Amstelod. 1705. 8.

270. *J. G. Janke* (Nr. 266.)

271. *J. G. Haase* de fine arteriarum earumque cum venis anastomosi. Lips. 1792. 4.

272. *A. F. Hecker* über die Verrichtung der kleinsten Schlagadern und einiger aus einem Gewebe der feinsten Gefäfse bestehenden Eingeweide. Erfurt 1790. 8.

273. *B. N. G. Schreger* in Fragm. (Nr. 160.) Fasc. I.

274. *G. Prochaska* in Disquisitio. (Nr. 151.)

275. *K. Burdach* in den Russischen Sammlungen für Naturwiss. und Heilkunst. Bd. II. 1817.

276. *S. Th. Sömmering* in den Denkschriften der Münchener Akad. d. Wissensch. 1818—20.

277. *J. Döllinger* über die Vertheilung der feinsten Blutgefäfse, in Meckels deutsch. Arch. (Nr. 170.) Bd. VI. — De vasis sanguinis quae villis intestinorum insunt. Monach. 1828. 4.

278. *J. Bleuland* icones anatomico-physiologicae. Fasc. I. II. Traj. ad Rh. 1827. 4.

Siehe aufserdem die Schriften über den Kreislauf von Haller (Nr. 232.), Spallanzani (Nr. 234.), Prochaska (Nr. 235.), Hastings (Nr. 238.), Österreicher (Nr. 242.), Wedemeyer (Nr. 247.).

Blut.

279. *A. Leeuwenhoek* in Opp. (Nr. 126.)

280. *W. G. Muys* investigatio fabricae quae in partibus musculos componentibus exstat. L. B. 1741. 4.

281. *della Torre* n. osservaz. micr. (Nr. 207.)

282. *W. Hewson* experimental inquiries into the properties of the blood, part. I. and III. Lond. 1771—78. 8. — Opus posthumum, ed. M. Falconar, lat. vertit J. Th. van de Wynpersse. L. B. 1785. 8.

283. *F. Fontana* sur le vénin de la vipère. (Nr. 208.)
284. *J. Hunter* on the blood. (Nr. 254.)
285. *F. P. v. Gruithuisen* Beiträge zur Physiognosie d Eautognosie. München 1812. 8.
286. *G. R. Treviranus* über d. org. Elem. (Nr. 211.)
287. *E. Home* u. *F. Bauer* in Philos. Transact. 1818.
288. *J. C. L. Schröder van der Kolk* Diss. sistens saninis coagulantis historiam. Gron. 1820. 8.
289. *Prevost* und *Dumas* (Nr. 213.)
290. *J. C. Schmidt* über d. Blutkörner. Zürich 1823. 4.
291. *Hodgkin* und *Lister* (Nr. 215.)
292. *P. S. Denis* récherches experimentales sur le sang main. Paris 1830. 8.
293. *K. H. Baumgärtner* über die Nerven und das ut. Freiburg 1830. 8.
294. *J. Müller* in Poggendorfs Annalen der Phys. und iemie. 1832. Heft 8. — Burdachs Physiol. (Nr. 199.) l. IV.

* * *

295. *Lecanu* in Annales de chimie et de physique. om. XLVIII. Paris 1831. Poggendorf Annalen 1832. Hft. 4.

Lymphgefäſse.

296. *O. Rudbeck* nova exercitatio anat. exhibens ductus patis aquosos et vasa glandularum serosa. Aros. 1653. 4. De sero ejusque vasis in Haller Disp. (Nr. 138.) Vol. VII.
297. *Th. Bartholini* opusc. nova anat. de lacteis thocis et lymphaticis vasis. Hafn. et Frft. 1670. 8.
298. *F. Ruysch.* in Opp. (Nr. 127.)
299. *A. Monro I.* de venis lymphaticis valvulosis et de rum inprimis origine. Edinb. 1770. 8.
300. *J. F. Meckel* (sen.) Diss. epistolaris de vasis lymhaticis glandulisque conglobatis ad A. de Haller. Lipsiae 760. 8. — Ej. nova experimenta et observationes de finius venarum ac vasorum lymphaticorum. Berol. 1772. 8.
301. *W. Hewson* experimental inquiries into the properties of the blood, part. the II. Lond. 1774. 8.
302. *J. G. Haase* de motu chyli et lymphae, glandusque conglobatis. Lips. 1778. 4.

303. *P. Ch. F. Werner* et *Ch. G. Feller* vasorum lacteorum et lymphaticorum anat. phys. descriptio. Fasc. I. Lips. 1784. 4.

304. *W. Cruikshank* The anatomy of the absorbing vessels of the human body. Lond. 1786. 4. — 2d edit. 1791. — Deutsch von Ch. F. Ludwig. Leipz. 1789. 4. Neuere Beiträge. 1794. 4.

305. *P. Mascagni* Prodomo d'un opera sul sistemo de' vasi linfatici. Siena 1784. 4. — Vasorum lymphaticorum c. h. historia et ichnographia. Senis 1787. Fol. Deutsch mit Anm. u. Zusätzen von C. F. Ludwig. Leipz. 1789. 4. — Vasorum lymphaticorum historia, s. totius operis pars prima denuo edita. Tom. I. Senis 1795. 8. Deutsch Leipz. 1799. 2 Thle. 8.

306. *B. N. G. Schreger* Beiträge zur Cultur der Saugaderlehre. Bd. I. Leipz. 1793. 8.

307. *V. Fohmann* anat. Untersuchungen über die Verbindung der Saugadern mit den Venen. Heidelb. 1821. 8. — S. auch Isis Jahrg. 1829.

308. *R. Lippi* illustrationi fisiologiche e pathol. del sistema linfatico-chilifero etc. Firenze 1825. 4. — Vergl. Archives générales de Méd. 1829. Août. Nov.

309. *J. Ch. Ogilvie* on the interior structure and oeconomy of the conglobate glands, in Lond. med. and phys. Journal. 1827.

310. *J. F. Meckel* (jun.) S. Th. Sömmeringio gratulatur. Lips. 1828. Fol.

Lymphe.

311. *P. Lassus* Diss. sur la lymphe. Genève 1774. 8.

312. *S. Th. Sömmering* v. Baue d. m. K. (Nr. 39.) Th. IV.

313. *J. Müller* (Nr. 294.)

Nervensystem.

Über das ganze Nervensystem und dessen Centralorgan.

314. *M. Malpighi* de cerebro in Opp. (Nr. 122.)

315. *R. Vieussens* Neurographia universalis. L. B. 1684. Fol. — Fcft. 1690. 8.

316. *Th. Willis* cerebri anatome, cui acc. nervorum criptio et usus. Lond. 1664. 4. (auch in Mangets Bibl. Nr. 19. T. II.)

317. *H. Ridley* The anatomy of the brain, containing mechanismus and physiology. Lond. 1695. 8. (auch in gets Bibl. an. Nr. 19.)

318. *A. Monro I.* The anatomy of the human bones the nerves. Edinb. 1726. 8. 8th ed. 1763. 8. (Works, 144.) — latine reddita a G. Coopmans, Harling. 1763. 8.

319. *J. C. A. Mayer* anat. phys. Abhandlung vom irn, Rückenmark und Ursprung der Nerven. Berlin u. ps. 1779. 4.

320. *J. G. Haase* cerebri nervorumque anatomia repe- . Lips. 1781. 8.

321. *Rol. Martin* institutiones neurologicae — et de prietatibus nervorum generalibus. Holm. et Lips. 1781. 8.

322. *A. Monro II.* Observations on the structure and ctions of the nervous system. Edinb. 1783. Fol. Deutsch Anm. v. S. Th. Sömmering. Leipz. 1789. 4.

323. *F. Vicq d'Azyr* récherches sur la structure du veau etc., quatre mémoires in Mém. de l'Acad. des sc. Paris. 1781 u. 1783. — Traité d'anatomie et de physio- ie, 5 cahiers (cerveau de l'homme) à Paris 1786—90. . — Oeuvres, Tom. VI.

324. *S. Th. Sömmering* vom Hirn u. Rückenmark. inz 1788. 8. — Über das Organ der Seele. Königsb. 6. 8.

325. *V. Malacarne* Neuro-encefalotomia. Pavia 1791. 8.

326. *C. F. Ludwig* Scriptores neurologici minores. s. 1791—95. 4 Vol. 4.

327. *J. und K. Wenzel* Prodromus eines Werks über Hirn. Tübing. 1806. 4. — De penitiori structura ebri hominis et brutorum. Tub. 1812. 4.

328. *J. Ch. Reil* (Untersuchungen über das Hirn und ckenmark) im Archiv (№ 168.) Bd. VIII. IX. XI.

329. *G. G. Keuffel* de medulla spinali. Hal. 1810. — ils Archiv. Bd. X.

330. *F. J. Gall* Anatomie et physiologie du système rveux en général et du cerveau en particulier. à Paris 10—20. 4 Vol. 4.

331. *F. J. Gall u. G. Spurzheim* Untersuchungen über die Anatomie des Nervensystems u. s. w. Paris u. Strasb. 1810 — 12. 2 Bde. 8.

332. *J. G. Spurzheim* The physiological system of Dr. Gall and Dr. Spurzheim. Lond. 1815. 8.

333. *C. G. Carus* Versuch einer Darstellung des Nervensystems, und insbesondere des Gehirns. Leipz. 1814. 4.

334. *G. Wedemeyer* physiol. Abhandlungen über das Nervensystem und die Respiration. Hannov. 1818. 8.

335. *C. F. Burdach* vom Bau und Leben des Gehirns. Leipz. 1819 — 26. 3 Bde. 4.

336. *G. R. Treviranus* Unters. über den Bau und die Functionen des Gehirns, der Nerven und Sinneswerkzeuge, in verm. Schriften. (Nr. 165.) Bd. III.

337. *L. Rolando* récherches anatomiques sur la moëlle allongée, in Magendie Journal (Nr. 172) Tom. IV. — Ricerche anatomiche sulla struttura della midolla spinale. Torino 1824. 8.

338. *C. P. Ollivier* traité de la moëlle épinière etc. 2de ed. Par. 1827. 2 Vol. 8. Deutsch v. J. Radius. Leipz. 1824. 8.

Nervensubstanz, Textur des Hirns und der Nerven

339. *M. Malpighi* de cerebri cortice, in Opp. (№ 122. und in Manget Bibl. an. (Nr. 19.) T. II.

340. *A. a Leeuwenhoek* (№ 126.)

341. *G. L. Teissier* de substantia corticosa et medullosa cerebri. L. B. 1710. 4.

342. *M. E. Ettmüller* und *F. Ruysch* in F. Ruysch Opp. (Nr. 127.)

343. *J. F. Isenflamm* de vasis nervorum. Erl. 1768. i Ludwig Script. neurol. (Nr. 326.) T. III.

344. *G. Prochaska* de structura nervorum. Vind. 177 Opp. min. (Nr. 151.) Vol. I.

345. *C. F. Ludwig* de cinerea cerebri substantia, i Exercit. ac. (Nr. 150.) Fasc. I.

346. *J. Pfeffinger* de structura nervorum. Argen 1782 — 83. 4. u. in Ludwig Script. (Nr. 326.) T. I.

347. *A. Monro II.* observations etc. (Nr. 322.)

348. *F. Fontana* súr la vénin de la vipère. (Nr. 208

349. *A. Barba* osservazioni microscopische sull' cer- e sue parti adjacenti. Nap. 1807. 4. Das. 1819. sch v. A. v. Schönberg. Würzb. 1829. 4.

350. *J. C. Reil* exercitationes anatomicae. Fasc. I. 1796. Fol.

351. *G. R. Treviranus* über d. org. Elem. (Nr. 211.)

352. *E. Home* Exp. and obs. upon the structure of es, in Philos. Transact. 1799. 1822. On the internal ture of the h. brain. ib. 1824.

353. *Prevost et Dumas* (Nr. 213.)

354. *E. Milne Edwards* (Nr. 214.)

355. *Hodgkin* und *Lister* (Nr. 215.)

356. *J. A. Bogros* Mémoire sur la structure des nerfs, reschet Répert. (Nr. 174.) Vol. IV. Heusingers Zeitschr. 175.) Bd. II.

357. *G. Breschet* et *Raspail* Anatomie microscopique nerfs, in Breschet Répert. (Nr. 174.) Tom. IV. Heu- ers Zeitschr. (Nr. 175.) Bd. II.

358. *F. Rosenthal* in Frorieps Notizen. 1830.

Hirn - Rückenmarksnerven.

359. *J. J. Huber* Pr. de medulla spinali, speciatim de is ab ea provenientibus. Gött. 1741. 4.

360. *Ch. Bell* An exposition of the natural system of nerves of the h. body. Lond. 1824. 8. — On the ous circle wich connects the voluntary muscles with brain, in Philos. Transact. 1826. — Lectures on the ous system, in London med. Gazette 1828 ff. — Karl anat. physiol. Abhandl. über d. Nervensystem, übers. M. H. Romberg. Berlin 1832. 8.

361. *F. Magendie*, in Journal (Nr. 172.) T. II. 1822. ckels deutsches Archiv (Nr. 170.) Bd. VII.

362. *C. F. Bellingeri* de medulla spinali nervisque ex prodeuntibus annotationes anat. phys. Aug. Taurin. 3. 4.

363. *C. G. Schöps* über die Verrichtungen verschie- er Theile des Nervensystems, in Meckels Archiv. f. A. Ph. 1827.

364. *J. Müller* in Frorieps Notizen 1831. März.

365. *B. Panizza* in Annali universali di medicina, 1831. Maggio e Giugno. — auch bei Scarpa ad H. E. Weber (Nr. 369.)

Gangliensystem.

366. *J. M. Lancisi* de structura usuque gangliorum in Morgagni adversar. anat. (Nr. 129.)

367. *J. G. Haase* Diss. de gangliis nervorum. Lips. 1772. in Ludwig Script. neur. (Nr. 326.) T. I.

368. *J. Johnstone* essay on the use of the ganglions of the nerves. Shrewsbury 1771. 8. Deutsch, Stettin 1787. 8. — Dess. Medical essays and observations, with disquisitions relative to the nervous system. Lond. 1795. 8. Deutsch v. Michaelis. Leipz. 1796. 8.

369. *A. Scarpa* de nervorum gangliis et plexubus, in Annot. anat. (Nr. 152.) Lib. I. — De gangliis nervorum deque origine et essentia nervi intercostalis, ad E. H. Weberum. Mil. 1831. 8.

370. *J. C. Reil* über die Eigenschaften des Gangliensystems und sein Verhältnifs zum Cerebralsystem, in Reils Archiv. Bd. VII.

371. *K. A. Rudolphi* Einige Bemerk. über den sympathischen Nerven, in Abh. der K. Acad. d. Wiss. in Berlin f. d. J. 1814 u. 1815.

372. *C. G. Wutzer* de c. h. gangliorum fabrica atque usu. Berol. 1817. 4.

373. *J. F. Lobstein* de nervi sympathici humani fabrica, usu et morbis. Paris 1813. 4.

374. *J. L. Brachet* Mémoire sur les fonctions du système nerveux ganglionaire. à Par. 1823. 8.

375. *F. Tiedemann* über den Antheil des sympathischen Nerven an den Verrichtungen der Sinne, in dess. Zeitschrift (Nr. 173.) Bd. I.

376. *F. Arnold* der Kopftheil des vegetativen Nervensystems beim Menschen, in anat. u. physiol. Hinsicht bearbeitet. Heidelb. 1830. 4.

Knochensystem.

Überhaupt.

377. *A. Monro I.* The anatomy of the human bones

nerves). Edinb. 1726. 8. — 8th ed. 1763. 8. — auch
ss. Works (Nr. 144.) — Deutsch von C. C. Krause.
. 1761. 8. — Franz. v. J. J. Suë. à Paris 1759. av.
hes. Fol.

78. *B. S. Albinus* de ossibus c. h. Leid. 1726. 8. —
eleto humano liber. Leid. 1762. 4.

79. *W. Cheselden* Osteographia. Lond. 1733. Fol.

80. *E. J. Bertin* Traité d'ostéologie. à Paris 1754.
l. 8. — Deutsch von J. P. G. Pflug. Kopenh. 1777—
4 Bde. 8.

81. *J. F. Blumenbach* Geschichte und Beschreibung
Knochen des m. K. Gött. 1786. 8. das. 1807. 8.

---

82. *C. G. Carus* von den Urtheilen des Knochen-
Schalengerüstes. Leipz. 1828. Fol.

Textur und Entstehung, Mark.

83. *M. Malpighi* de ossium structura, in Opp. posth.
122.)

84. *D. Gagliardi* Anatome ossium. Romae 1689. 8.

85. *J. G. Duverney* nouvelles observations sur l'ostéo-
. Par. 1689. 4. u. in Haller. Disp. (Nr. 138.) Vol.
— De la structure et du sentiment de la moëlle, in
. de l'Acad. de Paris 1700.

86. *Clopton Havers* Osteologia nova. Lond. 1691. 8.
el. 1731. 8.

87. *R. Nesbitt* human osteogeny. Lond. 1736. 4.
sch von Greding. Altenb. 1753. 4.

88. *F. Ruysch* Adversaria anat. dec. III. in Opp.
127.)

89. *L. Lemery* Diss. sur la nourriture des os, ou l'on
que la nature et l'usage de la moëlle, in: Description
te des os par J. J. Courtial, J. J. Petit et L. Lemery.
ide 1709. 4.

390. *du Hamel* Mémoires sur les os, in Mém. de l'Acad.
'aris 1742. 1743.

391. *B. S. Albin* de constructione, generatione etc.
im, in Annot. (Nr. 145.) L. II. III. VI. VII. — Icones
im foetus, acc. osteogeniae brevis historia. L. B. 1737. 4.

392. *F. Grützmacher* Diss. de medulla ossium, in Haller Disp. an. (Nr. 138.) Tom. VII.

393. *J. M. F. de la Sône* deux mémoires sur l'organisation des os, in Mém. de l'ac. d. sc. à Paris 1751. 1752.

394. *A. de Haller* deux mémoires sur la formation des os. Laus. 1758. 8. Opp. min. Vol. I. III.

395. *G. C. Reichel* Diss. de ossium ortu atque structura. Lips. 1760. 4. in Sandifort thesaurus dissertat. Vol. II.

396. *C. Rickmann* osteologische Abhandlungen. Jena 1766. 4.

397. *W. Hunter* experiments and observations on the growth of the bones, publ. by E. Home. S. Transactions of a society for med. and chir. knowledge. Vol. II.

398. *M. Troja* de novorum ossium regeneratione experimenta. Lut. Par. 1775. 8. Deutsch v. C. G. Kühn. Strasb. 1780. 8. u. von A. v. Schönberg, Erlangen 1828. 8. Vgl. Blumenbach in Richters chir. Bibl. Bd. VI.

399. *A. Scarpa* de penitiori ossium structura commentarius. Lips. 1799. 4. Deutsch v. G. A. Roose. Leipz. 1800. 4. Neue Ausgabe: de anatome et pathologia ossium commentarii. Ticin. 1827. 4.

400. *J. F. Isenflamm* über das Knochenmark, in Isenflamm und Rosenmüllers Beiträgen (Nr. 167.) Bd. II.

401. *J. Howship* in Medico-chirurg. Transactions, Vol. VI. VII. 1815. 1816. — J. Howships Beob. über den gesunden und krankhaften Bau der Knochen, a. d. Engl. v. L. Cerutti. Leipz. 1823. 8.

402. *M. Medici* sulla tessitura organica degli ossi, in Opuscoli scientif. di Bologna, T. II. 1818. Meckels deutsch. Archiv. Bd. VII. — Vgl. Speranza in Annali universali di medicina. T. XI. ff.

403. *P. A. Beclard* über die Osteose, in Meckels deutsch. Archiv. Bd. VI.

404. *C. H. Meding* Diss. de regeneratione ossium, Lips. 1823. 4.

405. *G. Breschet* über neuentdeckte Theile des Venensystems. Nova Acta phys. med. Acad. C. Leopold Carol. T. XIII. Bonn. 1826.

Verbindungen der Knochen.

106. *E. G. Bose* de suturarum c. h. fabricatione et usu. 1765. 4.
107. *B. Gibson* on the use of the sutures in the skull imals, in Nicholson Journal of nat. Philosophy. Vol. 1806.
108. *S. Th. Sömmering* Bemerkungen über den Schädel dessen sog. Näthe in Tiedemann u. Treviranus Zeitft (Nr. 173.) Bd. III. Heft 2.

Knorpel und Faserknorpel.

109. *J. B. Morgagni* in Advers. anat. (Nr. 129.)
110. *W. Hunter* on the structure and diseases of arating cartilages, in Phil. Transact. 1748.
111. *F. X. Herissant* sur la structure des cartilages côtes, in Mém. de l'Acad. de Paris. 1748.
112. *J. M. F. de la Sône* sur les cartilages. das. 1752.
113. *J. G. Haase* de fabrica cartilaginum. Lipsiae. 4.
114. *C. F. Doerner* de gravioribus quibusdam cartilam mutationibus. Tüb. 1798. 8.
115. *E. H. Weber* einige Beob. über die Knorpel und knorpel, in Meckel's Archiv. f. A. u. Phys. 1827.

Sehnenfasersystem.

Sehnenfasern.

F. Fontana (Nr. 208.) G. R. Treviranus (Nr. 211.) ost u. Dumas (Nr. 213.) E. Milne Edwards (Nr. 214.)

Fibröse Häute und Sehnen.

416. *X. Bichat* Traité des membranes. à Paris. 1802. s Archiv f. d. Ph. Bd. V.
417. *F. Martini* Versuche u. Erfahrungen über die findlichkeit der Sehnen. Kopenh. 1769. 8.
418. *B. S. Albin* de tendinis ortu, in annot. acad. V.
419. *P. J. Tornatore* observationes anat. de tendinum ica in homine et brutis. Bonon. 1793. 4.

420. *H. J. Isenflamm* Bemerkungen über die Flechsen, in Isenflamm u. Rosenmüllers Beiträgen (Nr. 167.) Bd. I.

Elastisches System.

421. *X. Bichat* in Anat. gén. (Nr. 180.)

422. *F. B. Béclard* Additions à l'anat. gén. (Nr. 180.)

423. *J. Cloquet* Anatomie de l'homme (Nr. 99.) Introduction.

Muskelsystem.

Textur.

424. *A. de Heide* experimenta circa sanguinis missionem, fibras motrices etc. Amst. 1686. 12.

425. *W. G. Muys* musculorum artificiosa fabrica, observationibus et iconibus illustrata. L. B. 1751. 4.

426. *G. Prochaska* de carne musculari, in Opp. min. (Nr. 151.)

Leeuwenhoek (Nr. 206.) Fontana (Nr. 208.) Treviranus (Nr. 211.) Prevost u. Dumas (Nr. 213.) M. Edwards (Nr. 214.) Hodgkin u. Lister (Nr. 215.) Raspail (Nr. 216.)

Muskelkraft.

427. *G. Croone* de ratione motus musculorum. Lond. 1664. 4.

428. *Th. Willis* in Manget. Bibl. T. II.

429. *G. Baglivi* tractatus de fibra motrice et morbosa. Basil. 1703.

430. *J. Bernouilli* de motu musculorum etc. cum P. A. Michelotti et J. Keillii tentamin. V. Ven. 1721. 4.

431. *Browne Langrish* a new essay ou muscular motion. Lond. 1733. 4.

432. *C. N. le Cat* Diss. sur le principe des actions des muscles. à Berlin 1754. 4.

433. *R. Whytt* on essay on the vital and other involuntary motions of animals. Edinb. 1751. 8.

434. *A. de Haller* de partibus c. h. sensibilibus et irritabilibus. Gött. 1753. 4. Deutsch von C. C. Krause. Leipz. 1756. 4. — Opp. min. T. I. — Mémoires sur la

·e sensible et irritable du corps humain. à Laus. —59. 4 Vol. 12.

335. *G. Zimmermann* Diss. de irritabilitate. Gött. 4.

136. *J. L. Roger* spec. phys. de perpetua fibrarum ılarium palpitatione. Gött. 1760. 12.

137. *A. Ypey* observationes phys. de motu musculari ıtari et vitali. Leov. 1775. 8. Deutsch von Leune. z. 1789. 8.

138. *G. Blane* a lecture on muscular motion. Lond. 4.

139. *G. Barzellotti* esame di alcune moderne teorie no alla causa prossima della contrazione muscolare. ı 1796. 8. Reils Archiv Bd. VI.

140. *F. A. v. Humboldt* Versuche über die gereizte ıel- und Nervenfaser etc. Berlin 1797—99. 2 Bde. 8.

141. *G. Carlisle* on muscular motion, in Phil. Trans- 1805.

142. *P. Erman* einige Bemerkungen über die Muskel- ıactionen, in Gilberts Annalen der Physik, Jg. 1812.

143. *H. Nysten* récherches de physiologie et de chi- pathologiques. à. Paris 1811. 8.

144. *F. P. v. Gruithuisen* Beiträge (Nr. 285.)

145. *Segalas d'Etchepare* in Magendie Journal 1824.

Mechanismus der Muskelbewegung.

146. *J. A. Borelli* de motu animalium. Rom. 1680— 2 Tom. 4. — L. B. 1711. 4. — in Manget Bibl. an.

147. *F. Ch. Oettinger* de antagonismo musculorum. 1764. 4.

148. *J. G. Haase* de adminiculis motus muscularis. 1785. 4.

149. *A. Monro II.* Essay on the oblique muscles. b. Philos. Transact. Vol. III.

150. *P. J. Barthez* nouvelle mécanique des mouvemens homme et des animaux. à Carcassone 1798. 4. Deutsch K. Sprengel. Hal. 1800. 8.

151. *J. Barclay* on muscular motion of the human . Edinb. 1808. 8.

452. *F. Roulin* récherches sur le mécanisme des mouvemens, in Magendie Journal T. I. II. 1821. 1822.

453. *J. Jeffreys* an inquiry into the comparative forces of the extensor- and flexor-muscles. Lond. 1822. 8.

454. *J. C. C. Proebsting* Diss. de mechanismo musculorum locomoventium. Berol. 1827. 8.

Seröses System.

Seröse Häute.

455. *X. Bichat* Traité des membranes (Nr. 416.)

456. *A. N. Gendrin* Histoire anat. des inflammations à Paris et Montpell. 1826. T. I. 8. Deutsch von J. Radius. Leipz. 1828. 8.

Synovialhäute.

457. *Clopton Havers* Osteologia nova (Nr. 386.)

458. *J. G. Janke* de capsulis tendinum articularibus. Lips. 1753. 8.

459. *J. G. Haase* de unguine articulari. Lips. 1774. 4.

460. *A. F. de Fourcroy* mém. pour servir à l'histoire anat. des tendons etc. in Mem. de l'Acad. des sc. de Paris. 1785. 1786. 1787.

461. *C. M. Koch* Diss. de bursis mucosis. Lips. 1789. 4. — in P. Frank delectus opusc. medicor. Vol. X.

462. *A. Monro II.* a description of all the bursae mucosae of the h. body, etc. Edinb. 1788. Fol. Deutsch von J. C. Rosenmüller. Leipz. 1799. Fol.

463. *B. N. Schreger* Commentarius de bursis mucosis cutaneis. Erlang. 1825. Fol.

Hautsystem.

Überhaupt.

464. *A. Bonn* de continuationibus membranarum. I. B. 1763. 4. — in Sandifort Thesaur. dis. Vol. II.

465. *H. A. Wrisberg* de membranarum ac involucrorum c. h. continuationibus, in Comment. (Nr. 156.)

466. *X. Bichat* Traité de membranes (Nr. 416.)

167. *J. B. Wilbrand* das Hautsystem in allen seinen weigungen. Giesen 1813. 8.

168. *M. H. Hébreard* sur l'analogie qui existe entre stême muqueux et dermoïde. Mém. de la societé d'étion. Vol. VIII.

Schleimhäute.

169. *C. Billard* de la membrane gastro-intestinale dans sain et dans l'état d'inflammation. à Paris 1825. 8.

170. *A. N. Gendrin* hist. an. des infl. (Nr. 456.)

171. *Rousseau* des differents aspects que présente la brane gastro-intestinale, in Archives générales le Méd. VI.

Äufsere Haut.

172. *Th. Bartholinus* de integumentis c. h. Hafn. 8.

173. *M. Malpighi* de externo tactus organo, in Opp. 122.)

174. *A. Kaauw Boerhaave* perspiratio dicta Hippocrati universum corpus anatomice illustrata. L. B. 1738. 8.

175. *F. de Riet* Diss. de organo tactus. L. B. 1743. n Haller Disp. (Nr. 138.) T. III.

176. *J. Fantoni* Diss. anat. VII. Taur. 1745. 8.

177. *C. J. Hintze* examen anat. papillarum cutis tacnservientium. L. B. 1747. — in Haller Disp. T. VII.

178. *C. F. Wolff* de cute etc. in Nov. act. acad. Pelit. Vol. VII. 1793.

179. *F. L. A. Koeler* Diss. de odore per cutem spi. Gött. 1794. 8.

180. *W. Cruikshank* experiments on the insensible pertion of the h. coat. Lond. 1779. u. 1795. 8. Deutsch lichaelis. Leipz. 1798. 8.

481. *G. A. Gaultier* recherches anat. sur le système né de l'homme. à Paris 1811. 4.

482. *G. Prochaska* disquisitio organismi (Nr. 151.)

483. *J. F. Schröter* das menschliche Gefühl oder Ordes Getastes (Abbild.) Leipz. 1814. Fol.

484 a. *H. Dutrochet* observations sur la structure de la

peau, im Journal complémentaire du dictionaire des sciences médicales. Vol. V. 1820.

484. b. *J. Purkinje* com. de examine physiol. organi visus et systematis cutanei. Vratisl. 1823. 8.

485. *B. W. Seiler* von den Integumenten, in Pierer u. Choulant Realwörterb. (Nr. 69.)

486. *H. Eichhorn* über die Absonderung durch die Haut — Bemerk. über die Anat. u. Phys. der äufseren Haut des Menschen. — in Meckels Archiv f. A. u. Ph. 1826. 1827.

Hornsystem.

487. *K. A. Rudolphi* über Hornbildung, in Abh. der K. Acad. d. Wiss. zu Berlin. 1814—1815.

488. *C. F. Heusinger* System der Histologie (Nr. 185.) Hft. 2.

Oberhaut.

M. Malpighi (Nr. 122.) A. a Leeuwenhoek (Nr. 126.)

489. *J. B. Morgagni* de cuticulae natura et generatione, in Adversar. anat. (Nr. 129.) L. II.

490. *C. G. Ludwig* Diss. de cuticula. Lips. 1739. in Haller Disp. Vol. III.

491. *J. F. Meckel sen.* sur la nature de l'épiderme et du réseau Malpighien, in Histoire de l'acad. roy. des sc. de Berlin 1753.

492. *A. Monro II.* de cuticula humana, in A. Monro I. Works (Nr. 144.)

493. *B. S. Albin* de cuticula, — de reticulo, in Annot. acad. L. I. VII.

Cruikshank (Nr. 480.) Gaultier (Nr. 481.) Dutrochet (Nr. 484. a.) Seiler (Nr. 485.) Eichhorn (Nr. 486.)

494. *E. H. Weber* Beob. über die Oberhaut, Hautbälge — u. über die Haare des Menschen, in Meckels Archiv f. A. u. Ph. 1827.

---

495. *B. S. Albin* de sede et causa coloris Aethiopum L. B. 1737. 4. und in Annot. ac. L. I.

496. *C. N. le Cat* traité de la couleur de la peau humaine etc. Amst. 1765. 8.

497. *P. Camper* über die Farbe der Schwarzen, in dess. ıen Schriften übers. v. Herbell. Bd. I. Leipz. 1782. 8.
498. *J. F. Blumenbach* de generis humani varietate ra. ed. 3a. Gött. 1795. 8.
499. *S. Th. Sömmering* über die körperliche Verschiedeit des Mohren vom Europäer. Mainz 1784. 8.
500. *E. Home* über das schwarze Schleimnetz der Neger. Meckels deutsch. Archiv. Bd. VIII.
501. *W. Lawrence* Lectures ou physiology etc. Lond. 8.

Nägel.

502. *C. G. Ludwig* Com. de ortu et structura unguium. 1748. in Haller Disp. Vol. VII.
503. *B. S. Albin* de ungue humano etc. in Annot. ac.
504. *J. G. Haase* experimenta anat. ad nutritionem ium declarandam. Lips. 1774. 4.
505. *C. F. Nürnberger* meletemata super digitorum unus. Viteb. 1798. 4.
506. *J. G. W. Sinds* Diss. de unguibus humanis. Lan- 1825. 4.
507. *A. Cooper* observations on the anatomy and dis- of the nails, in London med. and phys. Journal. 1827.

Haare.

508. *A. de Leeuwenhoek* in Opp. om. (Nr. 126.)
509. *B. S. Albin* in Annot. acad. L. VI.
510. *J. P. L. Withof* de pilo humano. Duisb. 1750. u. in Coment. reg. soc. Gött. T. III. 1753.
511. *J. G. Kniphof* de pilorum usu, in Comment. de etc. Lips. Vol. IV. pars I. — Deutsch Rotenburg 8.
512. *J. F. Pfaff* de varietatibus pilorum. Hal. 1799. 4.
513. *J. F. W. Richter* Com. de pilo humano. Gött. 8.
514. *K. A. Rudolphi* Diss. de pilorum structura. Gryv. 1806. 4.
515. *A. Rowlandson* essay on the human hair. Lond. 8.

516. *C. F. Heusinger* über das Hären etc. in Meckel deutsch. Archiv. Bd. VII. VIII.

517. *E. H. Weber* in Meckels Arch. f. A. u. Ph. 1827

518. *C. Girou de Buzareingues* mém. sur les poils, i Breschet Repert. T. VI. 1828.

519. *B. Eble* die Lehre von den Haaren. Wien 183 2 Bde. 8.

Zähne.

520. *B. Eustachius* de dentibus, in opusc. ana (Nr. 108.)

521. *J. J. Rau* de ortu et regeneratione dentium, Haller Disp. an. Vol. VI.

522. *C. G. Ludwig* de cortice dentium. Lips. 1753.

523. *F. X. Hérissant* nouvelles recherches sur la fo mation de l'émail des dents et sur celle des gencives. Me de l'acad. de Paris. 1754.

524. *B. S. Albin* de dentium ortu et incremento, Annot. acad. Lib. II.

525. *Jourdain* essai sur la formation des dents. à P ris 1766. 8.

526. *R. Curtis* a treatise on the structure and form tion of the teeth. Oxf. 1769. 8.

527. *F. X. de Wasserberg* aphorismi de dentibus, Opp. min. Vindob. 1775. 8.

528. *J. Hunter* the natural history of the hum teeth. Lond. 1778. 4. Deutsch Leipz. 1780. 8.

529. *R. Blake* de dentium formatione et structu Edinb. 1780. 8. — Dublin 1801. — Reils Archiv f. d. Bd. IV.

530. *B. N. G. Schreger* Beitrag zur Geschichte Zähne, in Isenflamm u. Rosenmüller Beiträgen (Nr. 1 Bd. I.

531. *K. A. Rudolphi* in dess. anat. phys. Abhandl gen. Berlin 1802. 8. u. in Reils Archiv Bd. III.

532. *F. Rosenthal* über Schmelzbildung der Zähne Reils Archiv Bd. X.

533. *J. Fox* the natural history and diseases of human teeth. Lond. 1814. 4.

534. *A. Serres* essai sur l'anatomie et la physiologie
lents. à Paris 1817. 8.
535. *J. F. Meckel* Beitrag zur Entwickelungsgeschichte
Zähne, im deutsch. Archiv Bd. III.
536. *C. G. van Kaathoven* de dentium formatione et
ra. L. B. 1821. 4.
537. *Oudet* considérations sur la nature des dents et
urs alteration, in Journal universel des sc. médicales.
LIII. 1826.
538. *L. F. M. Rousseau* anatomie comparée du systê-
lentaire chez l'homme et chez les principaux animaux.
ris 1827. 8.
539. *Th. Bell* the anatomy, physiology and diseases of
teeth. Lond. 1829. 8.

Drüsensystem.

540. *Th. Wharton* adenographia. Lond. 1656. 8. u.
anget Bibl. anat. Tom. II.
541. *M. Malpighi* de viscerum structura, in Opp. omn.
122.)
542. *A. Nuck* adenographia. L. B. 1691. 8. u. in
get Bibl. an. T. II.
543. *G. Mylius* de glandulis, in Hallers Disp. Vol. II.
544. *L. Heister* de vera glandulae appellatione. Altd.
. 4.
545. *J. Ch. Wolfen, H. Boerhaave* u. *Fr. Ruysch* in
uyschii Opp. om. (Nr. 127.)
546. *C. G. Ludwig* de glandularum differentia. Lips.
. 4.
547. *A. L. de Hugo* de glandulis in genere et specia-
de thymo. Gött. 1746. 4.
548. *Th. de Borden* recherches anat. sur la position
glandes et sur leurs actions. à Paris 1751. 8.
549. *G. A. Haase* de glandularum definitione. Lips.
l. 4.
550. *E. H. Weber* Beobachtungen über die Structur
ger einfachen und conglomerirten Drüsen, u. ihre Ent-
kelung, in Meckels Archiv f. A. u. Ph. 1827.

551. *J. Müller* de glandularum secernentium structura penitiori earumque prima formatione. Lips. 1830. Fol.

Specielle Anatomie.

Überhaupt: s. Nr. 7—105.

Äufsere Form und Dimensionen des Körpers.

552. *A. Dürer* vier Bücher von menschlicher Proportion. Nürnb. 1528. 4.

553. *J. S. Elsholtz* Anthropometria. Fcft. ad V. 1663. 4.

554. *A. C. Bock* der menschl. Körper nach seinem äufseren Umfange. Leipz. 1824. Fol.

555. *J. D. Fiorillo* über die Proportion, im Kunstblatt Nr. 91. zum Morgenblatt. 1828.

556. *P. N. Gerdy* anatomie des formes exterieures du corps humain. à Paris 1829. 8.

557. Lehre von den Knochen und Muskeln, von den Verhältnissen des m. K. und von den Verkürzungen, herausg. v. d. K. Acad. der Künste zu Berlin. Berlin 1832. Fol.

---

558. *J. F. Ackermann* de discrimine sexuum praeter genitalia. Mogunt. 1788. 8. Deutsch v. Wenzel. Coburg 1788. 8.

559. *J. H. F. Autenrieth* über die Verschiedenheit beider Geschlechter in Reil's Archiv Bd. VII.

---

560. *J. P. Falguerolles* de extremitatum analogia. Erlang. 1785. 4.

561. *F. H. Loschge* de sceleto hominis symmetrico: praemittuntur quaedam de totius c. h. symmetria. Erlang. 1793. 8.

562. *H. F. Isenflamm* über die Verschiedenheit der rechten u. linken Seite, in Isenflamm u. Rosenmüllers Beiträgen (Nr. 167.)

563. *F. M. Heiland* Darstellung des Verhältnisses zwi- n der rechten u. linken Hälfte des m. K. in seinen schiedenheiten im gesunden und kranken Zustande. nb. 1807. 8.

564. *F. L. H. Ardieu* considérations sur la ligne mé- e. Strasb. 1812. 4.

565. *J. F. Meckel* in Beiträgen zur vergleich. Anato- Leipz. 1812. 8. Bd. II.

Knochen und Bänder.

566. *A. Vesalii* tabulae ossium humanorum. Denuo E. Sandifort. L. B. 1782. Fol.

567. *G. Fallopii* expositiones in librum Galeni de os- , in Opp. (Nr. 106.)

568. *B. Eustachii* examen ossium et de motu capitis, pusc. anat. (Nr. 108.)

569. *Volcher Coiter* de ossibus et cartilaginibus c. h. lae. Bonon. 1566. Fol.

570. *A. Monro I.* the anatomy of the human bones nerves. Edinb. 1726. 8. — 1783. 2 Vol. 8. — Deutsch C. C. Krause. Leipz. 1761. 8. — Traité d'ostéologie . p. J. J. Suë. à Paris 1759. Fol. av. planches.

571. *B. S. Albin* de ossibus c. h. L. B. 1726. 8. — ulae sceleti et musculorum c. h. L. B. 1747. Fol. — ulae ossium humanorum. L. B. 1753. Fol. — De sce- hum. liber. L. B 1762. 4.

572. *W. Cheselden* Osteographia, or the anatomy of bones. Lond. 1733. Fol. m. Abb.

573. *F. M. Disdier* histoire exacte ou description plète des os du corps humain. 3e edit. à Par. 1767. ol. 8.

574. *Ph. A. Böhmer* institutiones osteologicae. Hal. . 8.

575. *M. P. Tarin* Ostéographie etc. à Par. 1753. 4.

576. *E. J. Bertin* Traité d'ostéologie. à Par. 1754. ol. 8. Deutsch von Pflug. Kopenh. 1777. 4 Bde. 8.

577. *C. J. Trew* tabulae osteologicae. Nürnb. . Fol.

578. *J. G. Walter* Abhandlung von trocknen Knochen des m. K. Berlin u. Strals. 1763. 8. das. 1798. 8.

579. *E. Sandifort* descriptio ossium hominis. L. B. 1785. 4.

580. *J. F. Blumenbach* Geschichte und Beschreibung der Knochen des m. K. Gött. 1786. 8. — 1807. 8.

581. *J. C. Loder* anat. Hdb. (Nr. 36.)

582. *H. M. v. Leveling* Anatomie des Menschen. Ir Bd. Erlangen 1795. 8. (enthält nur die Knochenlehre.)

583. *J. Oechy* Bau des Menschenkörpers. Ir Theil. Prag 1805. 8. (Knochen, Bänder u. Muskeln.)

584. *F. H. Loschge* die Knochen des m. Körpers und ihre vorzüglichsten Bänder in Abbildungen und Beschreibungen. Erl. 1804—1806. Fol.

585. *J. Bell* engravings of the bones, muscles and joints. Lond. 1809. 4.

586. *J. Gordon* Knochenlehre, übers. v. H. Robbi. Leipz. 1819. 8. — (S. allg. Encycl. Nr. 60.)

587. *J. Barclay* a series of engravings representing the bones of the human sceleton. Lond. 1819. 4. Edb. 1824.

588. *M. J. Weber* Grundlinien der Osteologie und Syndesmologie des Menschen. Bonn 1820. 8.

589. *G. Simpson* the anatomy of the bones and muscles. Lond. 1825. 2 Vol. 4.

590. *J. Weitbrecht* Syndesmologia. Petropol. 1742. 4. Deutsch, Strasb. 1779. 8. Franz. v. Tarin unter d. Titel Desmographie, à Par. 1752. 8.

591. *F. Caldani* tabulae anat. ligamentorum c. h. Venet. 1801. Fol. (Dieselben in Nr. 95.)

592. *H. Robbi* Darstellung der Bänder. Leipz. 1822. 8. (s. Allg. Encycl. Nr. 60.)

593. *B. Bransby Cooper* a treatise on the ligaments. Lond. 1827. 4.

594. Icones anatomicae secundum *Cloquet* ed. *L. Wagenfeld.* Syndesmologia, X tabulis explicata. Berol. 1827. Fol.

Einzelne Schädelknochen.

595. *C. V. Schneider* de catarrhis. Viteb. 1660. 4. Lib. I. — De osse occipitis. Vit. 1653. 12. — De ossibus temporum. Vit. 1653. 12. — De osse frontis. Vit. 1650. 12.

)e ossibus sincipitis. Vit. 1653. 12. — De osse cribri-
ni et sensu ac organo odoratus. Vit. 1665. 12.
596. *J. B. Morgagni* Adversar. (Nr. 129.) adv. VI.

Betrachtung der Kopfknochen als Wirbel.

597. *L. Oken* über die Bedeutung der Schädelknochen.
1807. 8. u. in der Isis 1820.
598. *J. B. Spix* Cephalogenesis. Monach. 1815. Fol.
599. *L. H. Bojanus* in der Isis 1818 u. 1819.
600. *Geoffroy St. Hilaire* in Annales des sc. naturel-
Vol. III.
601. *C. G. Carus* von den Urtheilen des Knochen-
Schalengerüstes. Leipz. 1828. Fol.
602. *E. A. W. Himly* Beiträge zur Anat. u. Physiol.
. I. Hannov. 1829. 4.

Nathknochen.

603. *Ol. Wormii* epistolae. Hafn. 1728. 8.
604. E. G. Bose (Nr. 406.)
605. *G. v. Doeveren* specimen observationum anat.
n. 1765. 4.
606. *E. Sandifort* de ossiculis suturarum in Observ.
. path. L. III. L. B. 1774. 4.
607. *J. F. Meckel* in Beiträgen zur m. u. vergl. A.
162.) B. I.
608. *S. Th. Sömmering* (Nr. 408.)

Form des ganzen Kopfs.

609. *Daubenton* sur les differences de la situation du
d trou occipital, in Mém. de l'acad. des sc. de Par. 1764.
610. *S. Th. Sömmering* über die körperl. Verschieden-
des Neger vom Europäer. F. a. M. 1785. 8.
611. *R. Saumarez* in principles of physiology. Lond.
). 8.
612. *J. F. Blumenbach* collectiones craniorum diversa-
gentium, decades VI et pentas nova. Gött. 1790—1828.
– De gen. h. varietate nativa. Gött. 1795. 8.
613. *P. Camper* über den natürl. Unterschied der Ge-
tszüge, übers. von S. Th. Sömmering. Berlin 1792. 4.

614. *C. R. W. Wiedemann* in Archiv für Zoologie. Braunsch. 1800. 8. Bd. I.

615. *G. Cuvier* Vorlesungen über vergl. Anatomie, übers. v. J. H. Froriep u. J. F. Meckel. Leipz. 1809. 8. Bd. II.

616. *W. Crull* Diss. de cranio ejusque ad faciem ratione. Gron. 1810. 4.

617. *L. Choulant* über die Kopflinien, in Pierers Realwörterbuch. (Nr. 69.)

Höhlen des Gesichts.

618. *N. Highmore* disquisitio anat. c. h. Hag. 1651. Fol.

619. *S. Reiniger* de cavitatibus ossium capitis, in Hall. Disp. Vol. IV.

620. *J. G. Janke* de cavernis quibusdam quae ossibus capitis continentur. Lips. 1753. 4.

621. *S. Aurivillius* de naribus internis, in Sandifort thesaurus diss. Vol. I.

622. *B. S. Albin* de sinib. front. in Annotat. ac. L. I.

623. *J. F. Blumenbach* prolusio anat. de sinibus frontalibus. Gött. 1779. 4.

Verbindungen der Wirbel.

624. *B. D. Mauchart* capitis articulatio cum prima et secunda colli vertebra. Tüb. 1741. u. in Haller Disp. Vol. VI.

625. *E. H. Weber* über einige Einrichtungen im Mechanismus der menschl. Wirbelsäule, in Meckels Arch. f. A. u. Ph. 1827.

Obere Extremitäten.

626. *F. Vicq d'Azyr* sur les clavicules, in Oeuvres Tom. V.

627. *J. G. Hahn* de manu hominem a brutis distinguente. Lips. 1716. 4.

628. *M. J. Bluff* über den Metacarpus des Daumens in Meckels Arch. f. A. u. Ph. 1826.

529. *J. F. Crell* de ossibus sesamoideis. Helmst. 4.

530. *J. G. Ilg* anat. Monographie der Sehnenrollen. 1823. 4.

Becken.

531. *W. Hunter* remarks on the symphysis of the ossa , in London med. observ. and inquiries. Vol. II.

532. *J. G. Röderer* de axi pelvis. Gött. 1751. 4. c. med. Gött. 1763. 4.

533. *C. L. Creve* vom Bau des weibl. Beckens. Leipz. 4.

534. *G. W. Stein* de situ pelvis ejusque inclinatione. . 1797. 8.

535. *J. R. Tenon* mémoire sur les os du bassin de la ıe, in Mém. de l'Institut des sciences, lettres et des arts ris. 1806.

536. *G. Bakker* descriptio pelvis feminae. Gron. 4.

537. *F. C. Nägele* das weibl. Becken betrachtet in Be- ng auf seine Stellung und die Richtung seiner Höhle. ruhe 1823. 4.

538. *G. Vrolik* considérations sur la diversité des bas- le differens races humaines. Amst. 1826. 8.

539. *Betschler* über Kluge's Polycometron, in Rusts zin f. d. ges. Heilk. Bd. XVII. u. in Rusts krit. Reper- Bd. XIII.

Die Lehrbücher der Geburtshülfe von Baudelocque, , Osiander, Froriep, Carus (Gynäkologie) u. a.

Hüft- und Kniegelenk.

540. *Th. Schwencke* observ. anat. de ligamento aceta- interno. Hag. 1743. 8.

541. *G. B. Palletta* (über das Lig. teres) in exercita- s pathologicae. Mediol. 1820. 4. Meckels deutsch. . Bd. VI.

542. *L. Heister* de genuum structura eorumque morbis, aller Collect. dissert. chirurg. Vol. IV.

Weibliches Skelet.

643. *G. Bidloo* anat. c. h. (Nr. 87.) (Abbildungen weiblicher Knochen.)

644. *M. P. Tarin* in Ostéographie. (Nr. 575.)

645. *A. Monro* traité d'ostéol. (Nr. 570.)

646. *S. Th. Sömmering* tabula sceleti feminini. Fft. ad M. 1796. Fol.

Muskeln, Sehnen, Fascien, Schleimbeutel.

647. *N. Stenonis* elementorum myologiae specimen. Amst. 1669. 8. in Manget Bibl. an. T. II.

648. *J. Browne* myographia nova. L. B. 1690. Fol.

649. *J. Douglas* myographiae comparatae specimen, or a comparative description etc. Lond. 1707. 8. — latine vertit J. F. Schreiber. L. B. 1738. 8.

650. *W. Cowper* myotomia reformata. Lond. 1724. Fol.

651. *A. F. Walther* anatome musculorum teneriorum c. h. repetita. Lips. 1731. 4. — Observationes novae de musculis. Lips. 1733. — Beide in Haller Disp. an. Vol. VI.

652. *B. S. Albin* historia musculorum hominis. L. B. 1734. 4. — ed. J. Hartenkeil. Bamb. et Wirceb. 1796. 4. — Tabulae sceleti et musculorum. L. B. 1747. Fol.

653. *P. Tarin* Myographie. à Paris 1753. 4.

654. *G. W. Müller* zwölf Kupfertafeln, welche die meisten kleineren und zarteren Mäuslein an dem m. K. vorstellen. Fkft. u. Leipz. 1755. 4.

655. *J. G. Walter* myologisches Handbuch. Berlin 1777. 8. 3te Aufl. 1795. 8.

656. *E. Sandifort* descriptio musculorum hominis. L. B. 1781. 4.

657. (*J. Barth*) Anfangsgründe der Muskellehre. Wien 1786. Fol.

658. *C. H. T. Schreger* Versuch einer neuen Nomenclatur der Muskeln des m. K. Leipz. 1794. 8.

659. *T. Chaussier* exposition sommaire des muscles. ar. 1797. 4.

660. *C. L. Dumas* système methodique de nomencla- e et de classification des muscles du corps humain. à Mont- l. 1797. 4.

661. *J. Oechy* Bau des Menschen. (Nr. 583.)

662. *F. C. Hesselbach* vollständige Anleitung zur Zer- ederungskunde des m. K. Bd. I. II. Arnstadt 1805—10. 4.

663. *G. Fleischmann* Anweisung zur Zergliederung der uskeln des Menschenkörpers. Erl. 1810. 8.

664. *G. Lewis* views of the muscles of the human dy. Lond. 1820. 4.

665. *H. Robby* Darstellung der Muskeln. Leipz. 1821. (Allg. Encycl. d. A. (Nr. 60.)

666. *G. Simpson.* (Nr. 589.)

667. *E. W. Tuson* Myopolyplasiasmus. Nach d. Engl. Veimar 1826 — 28. Fol.

---

668. *A. Monro II.* a description of all the bursae mu- sae of the human body. Edinb. 1788. Fol. — A. Mon- 's Abbildungen und Beschreibungen der Schleimsäcke des K., umgearb. u. verm. v. J. C. Rosenmüller. Leipz. 99. Fol.

Muskelvarietäten.

669. *A. de Haller* observationes myologicae. Gött. 42. 4.

670. *J. F. Isenflamm* Diss. de musculorum varietatibus. rl. 1765. 4.

671. *J. D. Santorini* observat. anat. (Nr. 134.)

672. *E. Sandifort* exercit. acad. (Nr. 149.) L. I.

673. *G. Brugnone* observations myologiques, in Mém. e l'acad. de Turin. Vol. VII.

674. *J. C. Rosenmüller* Diss. de nonnullis musculorum . h. varietatibus. Lips. 1804. 4. u. in Isenflamm und osenmüllers Beiträgen. (Nr. 167.) Bd. I.

675. *G. Fleischmann* in Abh. der phys. med. Gesellsch. zu Erlangen. Bd. I. Fkft. 1810. 4.

676. *C. F. L. Gantzer* Diss. musculorum varietates sistens. Berol. 1813. 4.

677. *W. G. Kelch* Beiträge z. pathol. Anatomie. Berlin 1813. 8.

678. *H. J. Sels* Diss. musculorum varietates sistens. Berol. 1815. 8.

679. *Moser* in Meckels deutsch. Archiv. Bd. VII.

680. *J. F. Meckel* de duplicitate monstrosa. Hal. 1815. Fol.

Muskeln am Kopfe und Halse.

681. *D. C. de Courcelles* icones musculorum capitis. L. B. 1743. 4.

682. *J. D. Santorini* tabulae XVII. (Nr. 134.)

683. *J. F. Isenflamm* Versuch einiger praktischer Anmerkungen über die Muskeln. Erlang. 1778. 8.

684. *J. Weitbrecht* observ. anat. ad historiam et notionem musculorum etc. in Comment. acad. Petropolit. Vol. VII. et IX.

685. *A. Monro I.* remarks on the articulation, muscles and luxation of the lower jaw, in Edinburgh med. essays and observ. Vol. I. u. III.

686. *J. B. Winslow* sur l'usage des muscles digastriques, in Mém. de l'ac. d. sc. à Paris 1742.

687. *B. S. Albin* de musculis digastricis, in Annot. ac. L. VII.

688. *Allan Burns* über die chirurg. Anatomie des Kopfes und Halses, a. d. Engl. v. G. E. Dohlhoff. Halle 1821. 8.

689. *F. E. Gerlach* Diss. de bursis tendinum mucosis in capite et collo reperiundis. Viteb. 1793. 4.

690. *R. B. Sabatier* remarques sur les muscles situés à la partie exterieure du col, in Mém. de l'ac. des sc. à Paris 1790.

Nacken- und Rückenmuskeln.

691. *Dupré* les sources de la synovie et une nouvelle ɔription des muscles de l'épine. à Paris 1699. 12.

692. *J. B. Winslow* in Mem. de l'ac. d. sc. à Paris 1730.

Brustmuskeln.

693. *G. E. Hamberger* de respirationis mechanismo et genuino. Jen. 1748. 4.

694. *A. de Haller* de respiratione experimenta, in ɔ. min. Tom. I.

695. *T. F. Trendelenburg* de sterni costarumque in ɔiratione motus ratione. Gött. 1779. 4.

696. *F. C. Oettinger* Diss. de usu et actione musculo- ɑ intercostalium. Tub. 1769. 4.

697. *A. Monro I.* remarks on the intercostal muscles, Edinburgh essays and observations, physical and lite- y. 1771. Vol. I.

698. *R. B. Sabatier* sur le mouvement des côtes et l'action des muscles intercostaux, in Mém. de l'ac. d. à Paris 1778.

Zwerchfell.

699. *J. Senac* mémoire sur le diaphragme, in Mém. l'ac. d. sc. à Paris 1729. 4.

700. *A. de Haller* de musculis diaphragmatis — nova ɑ septi transversi. — in Opp. min. Vol. I.

701. *J. D. Santorini* Tabulae. (Nr. 134.)

Muskeln der oberen Extremität.

702. *J. T. Adolph* de commodis ex scapularum mobi- te oriundis. Hal. 1759. 4.

703. *P. Camper* de fabrica brachii, in Demonstr. anat. hol. L. I. (Nr. 146.)

704. *J. B. Winslow* observations sur la rotation, la ɔnation, la supination etc. in Mém. de l'ac. de Paris. 9.

705. *F. Vicq d'Azyr* problème relatif aux mouvemens pronation et de supination, in Mém. de la soc. roy. de d. 1777. 1778.

706. *F. J. Hunauld* observations sur la structure et l'action de quelques muscles des doigts, in Mém. de l'ac. d. sc. à Paris 1729.

707. *L. Heister* vera musculorum interosseorum in manu descriptio atque delineatio, in Haller Disp. Vol. VI.

Bauchmuskeln.

708. *G. Fallopii* observat. an. (Nr. 106.)

709. *F. Poupart* in Mém. de l'ac. de Paris. 1705.

710. *J. B. Winslow* remarques sur le muscle grand dorsal et ceux du bas-ventre, in Mém. de l'ac. de Paris 1726.

711. *E. J. Bertin* mémoire sur l'usage les muscles droits du ventre, in Mém. de l'ac. de sc. à Paris 1746.

712. *A. de Gimbernat* nuevo metodo de operar en la hernia crural. Madrid 1793. 4. Deutsch v. B. N. Schreger. Nürnb. 1817. 8.

713. *P. Camper* icones herniarum inguinalium, ed. S. Th. Sömmering. Fcft. 1801. Fol.

714. *A. Cooper* the anatomy and surgical treatment of inguinal and congenital hernia. Lond. 1804. Fol. Deutsch von Krutge. Breslau 1809. Fol. — The anatomy and surg. treatm. of crural and umbilical hernia. Lond. 1807. Fol.

715. *F. C. Hesselbach* über Ursprung und Fortschreiten der Leisten- und Schenkelbrüche. Würzb. 1814. 4.

716. *C. J. M. Langenbeck* commentarius de structura peritonaei. Gött. 1817. 8. — Abhandlung v. d. Leisten- und Schenkelbrüchen. Gött. 1821. 8.

717. *J. Cloquet* recherches anat. sur les hernies de l'abdomen. à Paris 1817—19. 8.

718. *R. Liston* memoirs on the formation and connexion of the crural arch and other parts concerned in inguinal and femoral hernia. Lond. 1819. 4.

719. *G. Breschet* sur la hernie fémorale. à Paris 1819. 4.

720. *A. Scarpa* sull' ernie. Paris 1821. 4. Sull' ernie del perineo. Paris 1821. 8. Deutsch v. B. W. Seiler. Halle 1813. u. Leipz. 1822. 8.

721. *B. W. Seiler* in A. Scarpa Abh. über die Schen- u. Mittelfleischbrüche, übers. u. verm. v. B. W. Seiler. pz. 1822. 8.

722. *A. C. Hesselbach* die Lehre von den Eingeweide- chen. Würz. 1829. 8. Th. I.

Muskeln der untern Extremität.

723. *B. W. Seiler.* (Nr. 721.)

724. *A. Portal* observations sur les muscles capsulaires, Mém. de l'ac. d. sc. à Paris 1770.

725. *A. F. Walther* de articulis, ligg. et musculis essu statuque dirigendis etc. in Haller Disp. an. l. VI.

726. *D. C. de Courcelles* icones musculorum plantae lis. L. B. 1739. 4.

727. *L. Heister* obs. med. in Haller Disp. anat. l. VI.

Bewegungen.

728. *Fab. ab Aquapendente* in Opp. omn. (Nr. 123.)

729. *A. Deusingii* exercit. de motu animalium. Gron. 51. 12.

730. *J. A. Borelli* de motu animalium. Tom. I. II. m. 1680—81. 4. — L. B. 1688. 4.

731. *J. Gottsched* Diss. de motu musculorum. Regism. 15. 4. in Haller Disp. an. Vol. III.

732. *L. Bellini* de motu musculorum. Ven. 1742. 4.

733. *G. E. Hamberger* physiologia medicinalis. Jen. 51. 4.

734. *G. Vrolik* Diss. de homine ad statum gressumque r corporis fabricam disposito. L. B. 1795. 8.

735. *P. J. Barthez* nouvelle mécanique des mouve- ens de l'homme et des animaux. à Carcassone, an VI. 798.) 8. Deutsch v. K. Sprengel. Halle 1800. 8.

736. *J. Barclay* on muscular motion of the human dy. Edinb. 1808. 8.

737. *F. Roulin* recherches sur le mécanisme des mouvemens et des attitudes de l'homme, in Magendie Journal. (Nr. 172.) 1821 — 1823.

738. *J. C. C. Proebsting* Diss. de mechanismo musculorum locomoventium. Berol. 1827. 8.

739. *E. H. Weber* über den Mechanismus der Wirbelsäule, in Meckels Archiv f. A. u. Ph. 1827.

740. *G. R. Treviranus* über die beim Sprunge wirkenden Kräfte, in Tiedemann u. Treviranus Zeitschrift. (Nr. 173) Bd. IV.

Hannover, gedruckt bei den Gebr. Jänecke.

Handbuch

der

menschlichen Anatomie.

Durchaus nach eigenen Untersuchungen,

und mit

besonderer Rücksicht auf das Bedürfnifs der Studirenden, der praktischen Ärzte und Wundärzte und der Gerichtsärzte

verfafst

von

Carl Friedr. Theod. Krause M. D.

Professor der Anatomie, Mitglied der K. ärztlichen Prüfungsbehörde, und Landphysikus zu Hannover, m. g. G. M.

Ersten Bandes zweite Abtheilung.

Hannover 1836.

In Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.

Vorwort.

Der von mir dankbar erkannte Beifall, welcher
r ersten Abtheilung meines Handbuchs von Männern
Theil geworden ist, deren Urtheil den höchsten Werth
r mich hat, legte mir die Verpflichtung auf, den fol-
nden Abtheilungen einen wenn möglich verdoppelten
eifs und Sorgfalt zu widmen. Dieses darf ich zur
ntschuldigung der Verzögerung geltend machen, so wie
ch die Beschränkung der auf die Abfassung dieses
andbuchs zu verwendenden Zeit, durch ausgebreitete
aktische Wirksamkeit und andere Berufsgeschäfte:
n denen übrigens erstere zur Anregung und Bestim-
ung einer fruchtbaren Richtung anatomisch-physio-
gischer Studien in hohem Grade förderlich ist. —
ufser einer gedrängten, jedoch reichhaltigen und überall
f eigener Anschauung ruhenden Darstellung des längst
kannten, nach dem früher angegebenen Plane und Um-
ge und unter gewissenhafter Benutzung der neuesten
rschungen, enthält diese Abtheilung viele mir eigen-
ümlich angehörende Beobachtungen u. Bestimmungen:
elche hier anzudeuten oder besonders hervorzuheben
erflüssig scheint, da sie von Kennern der Wissenschaft
cht werden übersehen werden. Nur hinsichtlich der
gaben der absoluten und specifischen Gewichte mufs
n bemerken, dafs die betreffenden Wägungen an den
üsigen u. a. Organen völlig gesunder Menschen beiderlei
eschlechts angestellt worden, welche an plötzlichen
odesarten, namentlich durch Strangulation, Ertrinken,

Verblutung und Zerschmetterung des Schädels und Hirns, gestorben waren: dafs diese Todesarten im gleichen Verhältnisse bei dem Ziehen der Mittelzahlen in Rechnung gebracht sind, unter Ausschlufs von Eingeweiden aus Menschen, deren Tod durch Krankheiten herbeigeführt worden: und dafs die Wägungen auf dem einen Arme einer empfindlichen hydrostatischen Wage und mit Cautel wegen der Imbibition, bei 12^0 bis 13^0 R. der Luft und des Wassers vorgenommen worden sind. Hiernach kann man, wenn man will, die bis auf die vierte Decimalstelle angegebenen spec. Gewichte leicht auf den luftleeren Raum und die gröfste Dichtigkeit des Wassers reduciren: eine Correction, welche mir, sowohl aus physikalischen Gründen als besonders für den Gebrauch, den die Physiologie und Pathologie auf ihrem jetzigen Standpunkte von solchen Bestimmungen des specifischen Gewichts nicht ohne Nutzen machen kann, unnöthig erscheint.

Inhalt.

Seite

tes Buch. Von den zusammengesetzten Organen u. Apparaten 373—588

Übersicht 373

Ohr 375

Äufseres Ohr 375

Inneres Ohr 379

Pauke 379

Paukenfell 379

Paukenhöhle 380

Cellulae mastoideae 381

Tuba Eustachii 381

Gehörknöchelchen 382

Muskeln 383

Labyrinth 385

Vorhof 385

Bogengänge 386

Schnecke 389

Aquaeductus Cotunnii 393

Innerer Gehörgang 393

Canalis Fallopii 394

Auge 395

Schutzmittel des Auges 395

Augenhöhle 395

Augenbraue 395

Augenlieder 396

Thränenorgane 399

Augapfel 403

Tunica sclerotica 404

Tun. cornea 405

Tun. choroidea, Orbiculus u. Corona ciliaris . . 406

Iris 409

Seite

Pigment 413
Membrana pigmenti 414
Tun. retina 414
Glaskörper 417
Linse 418
Humor aqueus 422
Augenkammern 422
Augenmuskeln 424
Nase 428
Äufsere Nase 428
Nasenhöhle 430
Mundhöhle 432
Lippen 433
Backen 434
Zähne 434
Gaumen 437
Zunge 441
Speicheldrüsen 447
Speichel 450
Schlundkopf 451
Kehlkopf 456
Knorpel 456
Bänder 458
Muskeln 460
Höhle, Stimmritze, Schleimhaut 463
Schilddrüse 463
Respirationsorgane 46
Luftröhre, Bronchi 46
Lungen 46
Gewebe 47
Function 47
Brusthöhle 47
Brustfelle 47
Mediastina 48
Thymus 48
Verdauungsorgane 48
Ingestionsorgane 48
Speiseröhre 48
Chylificationsorgane 48
Tubus digestorius 48
Magen 48
Dünndarm 48
Duodenum, Jejunum, Ileum 48
Mesenterium 48

Seite

Schleimhaut, Falten, Zotten, Drüsen . . 494
Darmsaft, Chylus 499
Dickdarm 500
Coecum, Colon, Rectum 500
Mesocolon 502
Faeces 505
Leber 507
Gefäfsvertheilung 511
Läppchen 512
Gallengänge 513
Gallenblase 514
Galle 515
Bauchspeicheldrüse 516
Milz 518
Harnorgane 521
Nieren 521
Tubuli uriniferi 522
Gefäfsvertheilung 524
Nierenkelche und Harnleiter 525
Harnblase 526
Harnröhre 529
männliche 529
weibliche 531
Harn 532
Geschlechtsorgane 535
Männliche Geschlechtstheile 535
Hoden 535
Tubuli seminiferi 537
Nebenhoden und Samenleiter 539
Scheidenhaut 540
Samenstrang 541
Hodensack 543
Samenleiter und Samenbläschen 544
Prostata und Cowpersche Drüsen 545
Ruthe 547
Functionen. Samen 552
Weibliche Geschlechtstheile 555
Eierstöcke 555
Folliculi 556
Ovula 557
Muttertrompeten 559
Gebärmutter 561
Mutterscheide 566
Schamglied 568

Seit

Grofse Schamlefzen 568
Kleine Schamlefzen 569
Clitoris 569
Functionen 570
Allgemeine Betrachtung der Bauch- und Beckenhöhle, des Dammes und des Bauchfells 572
Bauchhöhle 572
Beckenhöhle 573
Fascia pelvis 574
Perinaeum 575
Fascia perinaei 576
Muskeln des Afters und der Geschlechtstheile . 577
Bauchfell 580
Brüste 583
Literatur . . . . . 589—635

Drittes Buch.

Von den

usammengesetzten Organen und Apparaten.



on den zusammengesetzten Organen und Apparaten.

In der Lehre von den zusammengesetzten Organen Apparaten, gewöhnlich *Eingeweidelehre*, *Splanchnologia*, annt, werden diejenigen sehr verschieden gestalteten ane beschrieben, zu deren Zusammensetzung meistens rere einfachere, verschiedenen organischen Systemen ehörende Theile beitragen, und die für sich allein, oder Verein mit anderen, einer wichtigen, an mehrfache Begungen geknüpften Verrichtung vorstehen. Letztere ist complicirt und erfordert das Zusammentreffen mehreinzelner, von verschiedenen Organen, oder von veredenen einzelnen Theilen eines sehr zusammengesetzten ans, ausgeübten Functionen. In Rücksicht auf die ihnen etheilte Verrichtung können diese Organe folgendersen eingetheilt werden:

I. Sinnesorgane, Organa sensuum:
   1) Gehörorgan, Organon auditus, Ohr,
   2) Sehorgan, Org. visus, Auge,
   3) Geruchsorgan, Org. olfactus, Nase,
   4) Geschmacksorgan, Org. gustus, Zunge u. Gaumen,
   5) Tastorgan, Org. tactus, äufsere Haut.

I. Stimm- und Sprachorgane, Organa vocis et loquelae: Kehlkopf, Luftröhre, Mund- und Nasenhöhle.

I. Athmungswerkzeuge, Organa respirationis:
   1) Luftwege: Nasen- und Mundhöhle, Schlundkopf, Kehlkopf.
   2) Eigentliche Athmungsorgane: Lungen mit der Luftröhre.

(Schilddrüse. Thymusdrüse.)
(Brusthöhle. Brustfelle.)

IV. Verdauungswerkzeuge, Organa digestionis, aus dem Speisekanal, Canalis alimentarius, und aus drüsigen Anhängen bestehend:

1) zur Ingestion der Nahrungsmittel, Org. ingestionis: Mundhöhle, Schlundkopf, Speiseröhre (d. i. der Speisekanal oberhalb des Zwerchfells, Tubus ingestorius).

2) zur Bereitung des Chylus, Organa chylopoëtica: Magen und Darmkanal (Speisekanal unterhalb des Zwerchfells, Verdauungsrohr, Tubus digestorius), Leber, Bauchspeicheldrüse, Milz.

(Bauchhöhle. Bauchfell.)

V. Harnwerkzeuge, Organa uropoëtica:

1) absondernde, Nieren,

2) ausführende, Harnleiter, Harnblase, Harnröhre.

(Nebennieren.)

VI. Geschlechtswerkzeuge, Organa genitalia s. sexus:

1) Zeugungsorgane, Org. generationis:

a. männliche: Hoden mit den Samengängen u Samenbläschen, Vorsteherdrüse und Cowpersche Drüsen.

b. weibliche: Eierstöcke, Muttertrompeten, Gebä mutter.

2) Begattungsorgane, Org. copulationis:

a. männliche: Ruthe mit der Harnröhre.

b. weibliche: Scheide, Schamglied.

(Beckenhöhle.)

3) Brüste.

Da indessen einige der genannten Organe mehre verschiedenen Verrichtungen vorstehen, so werden nicht genau in der Reihenfolge obiger, von den Functio abgeleiteter Classification beschrieben, sondern nach Ordnung, in welcher sie am Kopfe, Halse, in der B und Bauchhöhle gelagert sind.

Ohr, Gehörorgan.

Das *Ohr*, *Auris*, oder das Gehörorgan, *Organon auditus*, gt an jeder der beiden Seiten des Schädels, an der äufse- n Fläche des Schläfebeins und innerhalb der Pyramide sselben (S. 115); und zerfällt in das äufsere und innere r.

I. Äufseres Ohr, Auris externa.

Zu diesem gehört das äufserlich sichtbare knorpelig- itige Ohr, Auricula, und der äufsere Gehörgang, Meatus litorius externus.

Die *Auricula* hat im Allgemeinen eine unregelmäfsige, glich platte, muschelförmige Gestalt, ist 25‴ lang und ‴ breit, unter einem Winkel von 32° von der Seiten- nd des Schädels abstehend (selten unter 10° und über °); und in verschiedenen Richtungen aus- und eingebogen, dafs auf beiden Flächen Erhabenheiten entstehen: indes- ı ist die vordere äufsere Fläche mehr concav, die hintere ıere mehr convex.

Die Grundlage der Auricula ist der *Ohrknorpel*, *Carti- o auris* s. auriculae, welcher die Gestalt der Auricula timmt, aber kürzer als diese und im Mittel 1‴ dick ist. seiner Vorderfläche bemerkt man, und zwar an seiner ren Hälfte, den äufsersten, umgebogenen, gekrümmten nd, die *Ohrleiste*, *Helix*, dessen vorderes Ende aus einem tten Stachel, *Spina helicis*, und einem nach hinten in Concha sich verlängernden Schenkel, *Crus helicis*, be- ht. Mit dem Helix parallel läuft eine längliche Erha- ıheit, die *Gegenleiste*, *Anthelix*: letztere fängt am oberen eil des Ohrs, unter dem Helix, mit zwei Schenkeln an, lche eine Vertiefung zwischen sich lassen, und läuft am ıtern Theil des Ohrs vor dem Helix herab. Die untere lfte des Ohrknorpels wird vorn von einer viereckigen orpelscheibe, der *Ohrecke*, *Tragus*, gebildet, welche gleich er Klappe vor der Öffnung des Gehörganges hervorragt; gegenüber, nach hinten, zeigt sich eine kleinere drei-

eckige Hervorragung, die *Gegenecke*, *Antitragus*, welche mit dem unteren Ende des Anthelix zusammenfliefst. Zwischen Tragus und Antitragus bleibt ein abgerundeter Einschnitt, *Incisura intertragica.* Die längliche gekrümmte Vertiefung zwischen Helix und Anthelix ist die *Scapha* s. Fossa scaphoidea; die zwischen den Schenkeln des Anthelix ist die *Fossa triangularis* s. anonyma: die ansehnlichste Vertiefung findet sich aber zwischen dem Anthelix, dem Tragus und Antitragus, und wird die *Ohrmuschel*, *Concha auriculae*, genannt: sie hat eine Höhe von 10‴, eine Breite von 8½‴, und ist in der Mitte 5½‴ tief: in ihrer vorderen Hälfte findet sich der Eingang des äufseren Gehörganges; in ihrer Mitte ist der Ohrknorpel zum Durchgange von Gefäfsen und Nerven durchbohrt. Zwischen dem vorderen Ende des Helix und dem Tragus befindet sich ein tiefer Einschnitt, *Incisura auris*, der sich tief in die Concha erstreckt, hier aber von einem zellulösfibrösen Gewebe ausgefüllt wird: einen kleineren Ausschnitt findet man zwischen dem hinteren Ende des Helix und der Vereinigung des Anthelix mit dem Antitragus.

Der ganze Ohrknorpel wird von der äufseren Haut überzogen; diese ist fein und durch kurzen, sehr wenig Fett enthaltenden Zellstoff straff an ihn geheftet; bildet aber unterhalb des Tragus und Antitragus das weiche, schlaffe, fettreiche *Ohrläppchen*, *Lobulus auriculae.*

Die Befestigung des Ohrs an den Kopf wird vermittelt durch den Hautüberzug, durch Verschmelzung des Knorpels der Auricula mit dem Knorpel des äufseren Gehörganges, und durch bandartige zellulösfibröse Streifen, die von der Wurzel des Processus zygomaticus oss. temporum von der Fascia temporalis und vom Proc. mastoideus in das Perichondrium des Ohrknorpels übergehen; *Ligg. auricularia*, *anterius* s. Valsalvae, *superius* u. *posterius* genannt. Diese Befestigung ist nicht sehr straff, so dafs die Auricula durch die Mm. auriculares superior, anterior und posteriores (S. 220) bewegt werden kann: aufser diesen finden sich an verschiedenen Stellen des Knorpels selbst folgende sehr kleine *eigene Muskeln:*

M. helicis major, gröfserer Muskel der Leiste, ist länglich, entspringt von der Spina helicis, läuft aufwärts, un

efestigt sich an den Helix selbst, da wo dieser nach hin-
n sich biegt.

M. helicis minor, kleiner Muskel der Leiste, liegt hin-
r jenem, auf dem Crus helicis: beide Mus. helicis ziehen
n vorderen Theil des Helix nach unten.

M. tragicus, Muskel der Ecke, ist beinahe viereckig
id platt, entspringt unten am Tragus, bedeckt dessen äu-
ere Fläche und zieht ihn nach aufsen.

M. antitragicus, Muskel der Gegenecke, ist mehr läng-
ch, liegt hinter der flachen Einbiegung zwischen Antitra-
us und Anthelix, ist an beide befestigt, nähert beide ein-
ider und zieht den Antitragus nach hinten.

M. transversus auriculae, Queermuskel des Ohrs, besteht
us mehreren, von einander getrennten, kleinen platten
indeln, welche an der hinteren Fläche des Ohrknorpels,
vischen den, der Concha und Scapha entsprechenden,
chabenheiten ausgespannt sind und den Helix nach hinten
enden.

Zuweilen fehlen diese Muskeln, am häufigsten der M.
elicis minor, am seltensten der M. tragicus.

Der *äufsere Gehörgang* zerfällt in den knorpeligen
id knöchernen Theil. Ersterer, *Meatus auditorius exter-
us cartilagineus*, fängt hinter dem Tragus in dem vorderen,
ärker vertieften Theile der Concha an, und endigt am
orus acusticus externus des Schläfebeins, an welchen er
urch fibröses Gewebe genau befestigt ist: seine untere
Vand wird durch einen rinnenförmigen Knorpel gebildet,
ner Fortsetzung des Tragus und der Concha, die an zwei
ellen unterbrochen ist und hier durch zellulösfibröses
ewebe ersetzt wird. Seine obere etwas kürzere Wand
esteht nur aus fibrösem Gewebe, und ist an die Wurzel
es Proc. zygomaticus oss. temporum geheftet. — Der
nöcherne Gehörgang, *Meatus auditorius externus osseus*,
ringt vom Porus acusticus externus an schräg nach unten
nd vorn in die Pyramide des Schläfebeins ein; seine
Vände sind glatt; die untere, ihrer Länge nach schwach
onvexe und die vordere Wand sind etwas länger, als die
bere leicht concave und die hintere Wand. Er endigt
it einem Falz, *Sulcus tympani*, der nur am oberen Um-

fange des Gehörganges fehlt, und in welchem das Paukenfell ausgespannt ist. Die Richtung des Gehörganges ist im Allgemeinen horizontal von aufsen nach innen; indesssen macht er mehrere leichte Biegungen, indem der knorpelige Theil nach vorn und oben und alsdann nach unten und hinten läuft; von hier an wendet sich der knöcherne Theil nach vorn und unten. Seine Länge beträgt von der Mitte seines Einganges bis zur Mitte des Paukenfells 12‴, von welcher auf den knorpeligen Theil 4‴ bis 5‴, auf den knöchernen 7‴ bis 8‴ fallen. Die Länge der oberen Wand beträgt 10‴, die der unteren 13‴, die der hinteren 10½‴, die der vorderen 12⅓‴. Im senkrechten Durchschnitte hat der Gehörgang eine elliptische Gestalt, und zwar eine Höhe von 4‴ bis 5‴, eine Breite von 3‴; der Eingang ist 4‴ hoch und 2‴ breit; die engste Stelle ist in der Biegung nach oben unweit des Einganges; die weiteste an der Vereinigung des knorpeligen Theils mit dem knöchernen: hiernach verengert er sich noch einmal um ein Geringes an der 8‴ vom Eingange entfernten Stelle, und erweitert sich wiederum etwas, indem er dem Paukenfell sich nähert.

Im Innern ist der Gehörgang von einem dünnen Perichondrium und Periosteum, und von einer schleimhautähnlichen Fortsetzung der äufseren Haut überzogen, welche um so feiner und weicher wird, je weiter sie nach innen dringt, aber sehr fest an die Beinhaut geheftet ist: und am Paukenfell, dessen äufsere Platte sie bildet, wie ein blinder Sack endigt. Sie besitzt ein dickes Epithelium, und ist am Eingange und im knorpeligen Theile des Gehörganges mit feinen Haaren dicht besetzt. Zwischen ihr und der Knorpel- und Beinhaut liegen, vom Anfange des knorpeligen Gehörganges an bis nahe vor dem Ende des knöchernen, zahlreiche, kleine, röthliche Drüsenbälge: die Ohrenschmalzdrüsen, *Cryptae ceruminosae;* welche, vorzüglich im knorpeligen Gehörgange, ein halbflüssiges, gelbliches, bitteres, klebriges Secret, das *Ohrenschmalz, Cerumen aurium*, absondern. Dieses bildet, von den Haaren des Gehörganges gestützt, einen röhrenförmigen, den Gehörgang verengernden und seine häutige Bekleidung schützenden Überzug. Es besteht vorzüglich aus einem butterartigen Fett und aus Eiweifs, in Verbindung mit einer eigenthümlichen

rischen Materie; aus einem gelben bitteren Alcohol-
act mit milchsaurem Alcali und Kalk, und einem wäs-
gen Extracte.

II. Inneres Ohr, Auris interna.

Dieses zerfällt in zwei Abtheilungen: in die Pauke
r das mittlere Ohr), zu welcher die Paukenhöhle, das
kenfell, die Gehörknöchelchen, deren Bänder und Mus-
, die Tuba Eustachii, und die Cellulae mastoideae ge-
n: und in den Labyrinth (oder das innerste Ohr),
cher den Vorhof, die Bogengänge, die Schnecke und
Wasserleitungen begreift: zu ihm führt der innere
örgang.

A. Pauke, Tympanum.

Die *Paukenhöhle* oder Trommelhöhle, *Cavitas*
pani, ist eine ungefähr in der Mitte der Pyramide
Schläfebeins liegende, knöcherne, unregelmäfsig rund-
e Höhle, welche durch eine weite elliptische Öffnung
dem Ende des Meatus auditorius externus in Verbin-
g steht: diese Öffnung wird durch das Paukenfell voll-
dig verschlossen. *Das Paukenfell* oder Trommelfell,
brana tympani, ist eine ziemlich dünne weifsröthliche
t, im Sulcus tympani befestigt, stark gespannt und
isch: es hat die Gestalt einer oberwärts abgestutzten
pse, eine Höhe von $4\frac{1}{2}'''$, eine Breite von $4'''$, und
schräg nach aufsen, unten und vorn geneigte Lage,
m sein unterer und vorderer Rand $3'''$ und $2'''$ weiter
innen liegen, als der obere und hintere; so dafs es
der Axe des Gehörgangs einen Winkel von ungefähr
macht. Seine äufsere Fläche ist leicht concav, die
ere Fläche leicht convex: in der Mitte der äufseren
che zeigt sich aber eine stärkere Vertiefung, *Umbo*
branae tympani. Es besteht aus drei Platten: die mitt-
ist vermittelst eines dickeren knorpeligen Ringes im
us tympani des äufseren Gehörgangs angeheftet, und
ch diesen mit der Beinhaut des letzteren verbunden; ist
igens dünn, halbdurchsichtig und besteht aus sehnigen
rn, die vom Umfange an gekrümmt gegen die Mitte

hin sich erstrecken (enthält aber weder elastische noch Muskelfasern). Die äufsere Platte ist das blinde Ende des häutigen Überzugs des äufseren Gehörganges; die innere gehört der Schleimhaut der Paukenhöhle an: in beiden verbreiten sich Netze von Capillargefäfsen, und auch, vorzüglich in ersterer, ein kleiner Plexus sehr feiner Nervenendigungen. Am oberen Rande des Paukenfells weichen die häutigen Platten auseinander, so dafs dasselbe hierselbst dicker und schlaffer erscheint.

Die Paukenhöhle selbst ist von unten nach oben 6‴ hoch, von vorn nach hinten 4½‴ breit, und von aufsen nach innen 1¾‴ bis 2‴ tief; in ihrem oberen Theile überhaupt geräumiger, als im unteren. Man unterscheidet in ihr die, dem (vom Paukenfell geschlossenen) Eingange gegenüber liegende, innere Wand oder den *Boden*, welcher an den Labyrinth gränzt, und eine ähnliche schräge, nach unten gewandte Richtung hat, wie die Membrana tympani: und den oberen, vorderen, unteren und hinteren *Umfang*; welche sämmtlich von Knochenmasse gebildet und uneben, mit Erhabenheiten, Vertiefungen und Löchern versehen sind. An dem Boden bemerkt man in der Mitte eine beinahe 1‴ tiefe Grube, *Sinus tympani*, und eine zum Theil in dieser Grube schräg liegende längliche Öffnung, das sog. ovale Fenster, *Fenestra ovalis*, deren Umfang nicht oval, sondern bohnen- oder nierenförmig, oben convex, unten concav, und an seinem vorderen Ende mit einem Falz versehen ist. Der Queerdm. beträgt 1¼‴, der senkrechte ⅔‴. Die Fenestra ovalis führt aus der Paukenhöhle in den Vorhof, und liegt 3‴ weiter nach innen als das Paukenfell. Unter ihr zeigt sich eine längliche Hervorragung, *Promontorium*, und von dieser verborgen, weiter nach unten und hinten, ein abgerundet dreieckiges, nach hinten gerichtetes Loch, das runde Fenster, *Fenestra rotunda*, welches ⅔‴ Dm. hat und in die Schnecke führt. Über das Promontorium hinweg läuft eine feine Furche oder ein sehr enger Kanal von unten nach oben. Eine kleine, hohle, an der Spitze mit einem Loche versehene Erhabenheit, *Eminentia papillaris* s. pyramidalis, liegt hinter der Fenestra ovalis und über der Fenestra rotunda: sie steht mit dem hinter ihr herablaufenden Canalis Fallopii in Verbindung. —

n vorderen Theile des Bodens der Paukenhöhle zeigt sich
ne queerlaufende Vertiefung, die in einen kurzen weiten
anal am vorderen Umfange der Paukenhöhle übergeht:
e Vertiefung und der Kanal werden durch ein dünnes
nochenblatt, Processus cochlearis, in eine obere engere
nd eine untere weitere Abtheilung geschieden: die obere
die Furche für den Musculus mallei internus oder die
ffelförmige Grube, *Sulcus muscularis* s. Fossa cochlearis: die untere der knöcherne Theil der Tuba Eustachii.
Am hinteren Umfange der Cavitas tympani liegt eine
eite, in die Cellulae mastoideae führende Öffnung.

Aufser jenen gröfseren Öffnungen finden sich in der
ukenhöhle mehrere kleinere, in enge Knochenkanäle füh-
nde Löcher. Eins derselben, unmittelbar unter dem Sul-
s muscularis, führt zum Hiatus canalis Fallopii: ein
deres am hinteren Umfange der Paukenhöhle, nach aufsen
n der Eminentia papillaris, ist die Mündung des aus dem
teren Ende des Canalis Fallopii in die Paukenhöhle drin-
nden Canalis chordae, und wird *Apertura canalis chordae*
nannt: ein drittes, unter dem Promontorium, leitet in
nen engen, aus der Fossula petrosa oder aus dem Foramen
gulare heraufsteigenden Kanal: ein viertes neben dem
zteren, aber weiter nach vorn, geht zum Canalis caroti-
s: endlich befinden sich, in gleicher Höhe mit der knö-
ernen Tuba Eustachii, aber weiter nach aufsen, zwei bis
ei kleine in die Fissura Glaseri ausmündende Löcher.

Die *Cellulae mastoideae*, Zitzenzellen, sind kleinere und
öfsere unregelmäfsige Höhlen, welche das ganze Innere
s Processus mastoideus einnehmen, unter einander zusam-
enhangen, und endlich in die Paukenhöhle, am hinteren
nfange derselben, über der Eminentia papillaris, mit
ner weiten Mündung sich öffnen.

Die *Tuba Eustachii*, s. Canalis gutturalis auris s. Sal-
nx, die *Eustachische* oder *Ohr-Trompete*, ist eine lange,
attgedrückte, theils knöcherne, theils knorpelighäutige
ihre, welche die Cavitas tympani mit dem Schlundkopfe
Verbindung setzt. Ihr knöcherner Theil, *Pars ossea*
bae Eustachii, beginnt am vorderen Umfange der Pauken-
hle mit der Paukenmündung, *Ostium tympanicum*, und
hrt an der äufseren Seite des Canalis caroticus bis zum

vorderen Winkel der Pyramide des Schläfebeins: hier geht er über in den knorpeligen Theil, *Pars cartilaginea tubae Eustachii*, welcher schräg nach innen und von oben nach unten läuft, und an der Seitenwand des Pharynx mit der ovalen, wulstigen Rachenmündung, *Ostium pharyngeum*, endigt. Nur sein unterer Umfang besteht aus einer knorpeligen Rinne; der obere ist von einer fibrösen Haut gebildet, und an den vorderen Winkel der Pyramide des Schläfebeins, an die innere Seite der Spina angularis des Keilbeins, und an den Sulcus tubae Eustachii des Processus pterygoideus geheftet. An beiden Mündungen, vorzüglich an dem 3‴ hohen und 2‴ breiten Ostium pharyngeum, ist sie weiter; in der Mitte aber beträchtlich enger, namentlich an der Vereinigungsstelle des knöchernen und knorpeligen Theiles, woselbst sie einen Kaliber von nur ½‴ hat. Die ganze Länge der Tuba Eustachii beträgt 14‴ bis 17‴, von welcher auf den knöchernen Theil 4‴ bis 5‴, auf den knorpeligen 10‴ bis 12‴ fallen.

Die Gehörknöchelchen, Ossicula auditus, sind die drei kleinsten Knochen des Körpers, und liegen im oberen Umfange der Paukenhöhle.

Der Hammer, Malleus, ist von diesen der ansehnlichste, und liegt weiter als die anderen nach vorn und aufsen. Sein oberer Theil bildet einen länglich rundlichen, von beiden Seiten plattgedrückten Kopf, *Capitulum*, welcher mit einer sehr convexen überknorpelten Gelenkfläche versehen ist, und auf einem dünneren Halse, *Collum*, sitzt. Der Kopf und der Hals liegen im oberen Umfange der Paukenhöhle und oberhalb des Paukenfells; die äufsere Fläche des Halses stützt sich an den oberen Rand des Eingangs der Paukenhöhle. — Der untere, dünnere, längliche Theil des Hammers ist der Handgriff, *Manubrium*; dieser ist zwischen der inneren und mittleren Platte des Paukenfells befestigt und mit beiden verwachsen; sein knopfförmiges Ende reicht bis zur Mitte dieser Haut herab, ist nach innen gebogen, und bewirkt dadurch die Einbiegung des Paukenfells, den sog. Umbo (S. 379). Vom oberen Ende des Manubrium geht der dicke, nach aufsen gerichtete, kurze Fortsatz des Hammers, *Processus brevis*, ab, und drängt den oberen Rand der Membrana tympani nach aufsen: —

iter nach oben, an der Vorderseite des Halses, entspringt
: sehr dünne und gekrümmte, plattspitzige, lange Fort-
z, *Processus longus* s. spinosus s. Folii s. Folianus s.
vii; dieser ist nach vorn gerichtet, und heftet sich genau
den vorderen Rand des Paukenfells und den Sulcus
npani.

Der Ambos, Incus, besteht aus einem dickeren Körper
d zwei Fortsätzen oder Schenkeln. Das *Corpus* liegt im
eren Umfange der Paukenhöhle hinter dem Capitulum
llei, und ist mit ihm durch eine convex-concave Gelenk-
che und ein Kapselband beweglich verbunden. Das *Crus*
ve s. Proc. brevis ist nach hinten, gegen die Öffnung
: Cellulae mastoideae gerichtet; das *Crus longum* s. Proc.
igus steigt hinter dem Manubrium mallei bis zur Mitte
r Paukenhöhle herab, ist aber kürzer als das Manubrium,
gt weiter nach innen und hinten, ist nicht mit dem Pau-
nfell verwachsen, und gegen die Fenestra ovalis hin ge-
ümmt: am Ende desselben sitzt ein plattes, ovales, mit
ner schwach convexen Gelenkfläche versehenes Knöpfchen,
lenticulare s. orbiculare s. Ossiculum Sylvii. Durch
rze Bänder, *Ligg. mallei et incudis*, werden das Capitu-
m mallei, das Corpus und das Crus breve incudis in dem
eren Umfange der Paukenhöhle angeheftet.

Der Steigbügel, Stapes, hat den Namen von seiner
stalt; sein platter Fufstritt, *Basis*, liegt locker in der
nestra ovalis, und hat, wie diese, einen bohnenförmigen
nfang mit einem convexen oberen und concaven unteren
nde. Von dem vorderen und hinteren Ende der Basis
hen die beiden Schenkel horizontal nach aufsen und ver-
nigen sich zu einem Köpfchen, *Capitulum stapedis,* wel-
es auf einem schmaleren platten *Collum* sitzt, und mit
ner länglichen concaven Gelenkfläche, zur Articulation
it dem Os lenticulare, versehen ist. Der vordere Schen-
l, *Crus rectilineum,* ist weniger gebogen und kürzer als
r hintere, *Crus curvilineum*: beide sind an den einander
ntgegengerichteten Flächen mit einem Falz, *Sulcus stape-*
s, versehen.

Muskeln der Gehörknöchelchen.

M. mallei internus s. tensor tympani, innerer Hammer-
uskel, Paukenfellspanner, ist länglich rundlich, entspringt

sehnig von der Tuba Eustachii, von der unteren Fläche des hinteren Theiles des Ala magna oss. sphenoidei und von dem vorderen Winkel der Pyramide des Schläfebeins; läuft in der Richtung von vorn nach hinten durch den Sulcus muscularis, oberhalb der Tuba Eustachii; sodann durch den vorderen Umfang und auf dem Boden der Paukenhöhle; und geht in eine dünne runde Sehne über, welche queer durch die Paukenhöhle von innen nach aufsen sich wendet, und an den Anfang des Manubrii, an dessen innerer Fläche, sich anheftet. Zieht den Handgriff des Hammers nach innen, gegen den Boden der Paukenhöhle hin, und spannt dadurch das mit dem Manubrium mallei verwachsene Paukenfell an.

M. mallei externus s. anterior s. laxator tympani major, äufserer Hammermuskel, Erschlaffer des Paukenfells. Kleiner als der vorige, länglich rundlich und etwas platt, häufig gröfstentheils sehnig: entspringt von der äufseren Fläche der Spina angularis oss. sphenoidei, von der Tuba Eustachii, und dem tiefen Blatte der Fascia buccopharyngea; läuft nach hinten und innen, sehr nahe an der innern und hinteren Seite der Kiefergelenkkapsel; geht mit einer dünnen Sehne durch eine der Öffnungen der Fissura Glaseri, und heftet sich an das Collum mallei, über der Wurzel des Proc. longus. Zieht den Hals des Hammers nach vorn und innen, wodurch der vordere Theil des Paukenfells in transversaler Richtung etwas angespannt wird, der Kopf und Hals des Hammers aber nach vorn und innen bewegt werden, so dafs das Manubrium weiter nach aufsen gerichtet, und die Membrana tympani erschlafft wird.

Der M. laxator tympani minor, welcher vom oberen Umfange des knöchernen äufseren Gehörganges an den Proc. brevis mallei gehen soll, existirt nicht; und wird öfters eine röthliche Falte der Schleimhaut des Gehörgangs, bei ihrem Übergange zum oberen schlafferen Theil des Paukenfells, für diesen Muskel angesehen worden sein.

M. stapedius, Muskel des Steigbügels; der kleinste Muskel des Körpers; länglich kegelförmig, füllt die trichterförmige Höhle der Eminentia papillaris aus, in welcher er entspringt: durch die Öffnung derselben dringt die dünne Sehne des Muskels in die Paukenhöhle, und heftet

t an den hinteren Rand des Collum stapedis. Zieht das
ɔfchen des Steigbügels nach hinten, und drängt dadurch
hintere Ende der Basis tiefer in die Fenestra ovalis
ein, wobei der vordere Theil der Basis aus dieser Öff-
ıg sich erhebt.

Das Paukenhöhle mit allen in ihr liegenden Theilen,
wie auch die Tuba Eustachii und die Cellulae mastoi-
e, werden aufser einem feinen Periosteum von einer
men, röthlichen, gefäfsreichen Schleimhaut überzogen,
che als Fortsetzung der Schleimhaut des Pharynx, durch
Tuba Eustachii zu ihr gelangt. Sie bildet Falten zwi-
en den knöchernen Vorsprüngen der Höhle selbst, be-
idet die Gehörknöchelchen, indem sie vermittelst Falten
dem einen zum anderen übergeht, so wie auch die
nen ihrer Muskeln; füllt den Raum zwischen den
ienkeln der Stapes aus (Membrana obturatoria stapedis);
estigt dessen Basis in der Fenestra ovalis; tritt auch
e kurze Strecke weit in die Fenestra rotunda ein, und
let die äufsere Platte der in diesem Loche ausgespann-
Haut, der sog. Membrana tympani secundaria.

B. Labyrinth, Labyrinthus.

Der Labyrinth oder das innerste Ohr, Auris intima,
nzt nach aufsen an die Pauke, nach innen an den Boden
Meatus auditorius internus, durch welchen er mit der
ädelhöhle in Verbindung steht. Er besteht aus einer
inen Höhle und mehreren gewundenen Kanälen: Vorhof,
engänge, Schnecke, Wasserleitungen. Diese hangen
er einander zusammen, und werden von sehr harter
npacter Knochenmasse umgeben, welche von der äufse-
Rinde der Pyramide des Schläfebeins theils durch Sub-
atia spongiosa getrennt, theils mit ihr verschmolzen ist.

Der Vorhof, Vestibulum, ist eine kleine, länglich
nde, von glatten Wänden umgebene Höhle, $2\frac{3}{5}'''$ bis $3'''$
ch, $1\frac{7}{10}'''$ bis $2'''$ von vorn nach hinten breit, und $1\frac{2}{5}'''$
$1\frac{1}{2}'''$ von aufsen nach innen tief, in der Mitte zwischen
Bogengängen und der Schnecke liegend: seine äufsere
was nach unten geneigte Wand ist der mittlere Theil
Bodens der Paukenhöhle; seine innere Wand gränzt
den Boden des Meatus auditorius internus, die vordere

an die Schnecke, die hintere an die Bogengänge; die untere und obere Wand (über welche letztere der Canalis Fallopii hinläuft), werden von der übrigen Knochenmasse der Pyramide des Schläfebeins gebildet. Das Vestibulum enthält zwei kleine Vertiefungen, *Recessus hemisphaericus* s. Fossa subrotunda, und *Recessus hemiellipticus* s. Fossa semiovalis, welche durch einen länglichen, nach oben breiteren Vorsprung an der oberen und inneren Wand des Vorhofes, *Crista pyramidalis* genannt, von einander getrennt werden. Der rundliche Recessus hemisphaericus liegt nach vorn gegen die Schnecke hin, der Fenestra ovalis gegenüber; der längliche Recessus hemiellipticus liegt weiter nach hinten und oben, an die vorderen Mündungen des Canalis semicircularis superior und externus und an die gemeinschaftliche Mündung des Canalis semicircularis superior und inferior gränzend. An der äufseren Wand des Vorhofes findet sich die Fenestra ovalis, die aber von der Basis des Steigbügels genau verschlossen wird; und weiter nach vorn und unten, unter dem Recessus hemisphaericus, eine in die Schnecke führende Öffnung, *Apertura scalae vestibuli*. An der oberen, hinteren und unteren Wand, zum Theil neben dem Recessus hemiellipticus, zeigen sich die fünf gröfseren Öffnungen der Bogengänge, und ein sehr enges Loch zum Eingang in den Aquaeductus vestibuli: aufserdem finden sich drei, von vielen sehr engen Löchern durchbohrte Stellen, *Maculae cribrosae*: die ansehnlichere Macula cribrosa superior in der Crista pyramidalis und am hinteren Umfange derselben; die kleine Macula cribrosa inferior zwischen dem Recessus hemiellipticus und der unteren Mündung des Canalis semicircularis inferior; und die Macula cribrosa recessus hemisphaerici in der Mitte dieser Vertiefung.

Die Bogengänge, Canales semicirculares sind drei, durch den äufseren und hinteren Theil der Pyramide des Schläfebeins verlaufende, von sehr harter Knochenmasse umgebene Kanäle; ungefähr $\frac{3}{4}'''$ weit und etwas platt gedrückt, so dafs die Höhe ihres Lumen (vom concaven zu convexen Umfange) zu der Breite desselben (von einer Seite zur anderen) sich verhält wie 3 zu 2 oder wie 4 zu 3. Ihre Krümmung ist unregelmäfsig, und kommt einem Abschnitt

ner Ellipse näher als einem Kreisabschnitte; die eine der t Vestibulum sich öffnenden Mündungen eines jeden Bonganges bildet eine längliche Erweiterung, einer plattuchigen Flasche nicht unähnlich, von $1\frac{1}{5}'''$ Länge, $1'''$ eite, und $\frac{7}{10}'''$ Tiefe; diese wird *Ampulla ossea* genannt.

Der *obere Bogengang*, *Canalis semicircularis superior* s. terior, verläuft in der Richtung des Queerdurchmessers r Pyramide des Schläfebeins, über dem Vestibulum, und schreibt einen fast elliptischen, senkrecht nach oben gehteten Bogen, der aber auch nach vorn und hinten S-förge Biegungen macht; seine stärkste Convexität bewirkt f der oberen Fläche der Pyramide eine längliche Herrragung: an seiner vorderen Mündung befindet sich die *npulla ossea superior*, die hintere fliefst mit der oberen ündung des Canalis semicircularis inferior zusammen. ine mittlere Länge beträgt $6\frac{1}{3}'''$, sein Lumen ist beinahe $'''$ hoch und $\frac{2}{5}'''$ breit. — *Der untere Bogengang*, *Cana- semicircularis inferior* s. posterior, läuft beinahe parallel t der hinteren Wand der Pyramide und fast senkrecht; ine stärkste Convexität nach hinten und unten gerichtet: ist der längste und engste der drei Bogengänge, am eisten gebogen, und beschreibt eine länglich elliptische ümmung mit schwacher S-förmiger Biegung nach innen d aufsen; seine Länge beträgt $7'''$, sein Lumen ist $\frac{1}{2}'''$ ch und $\frac{2}{5}'''$ breit. Sein oberes Ende fliefst mit dem hinen Ende des Canalis semicircularis superior zu einem ' langen, wenig erweiterten Kanale zusammen, der sich t einer einfachen Mündung an der hinteren Wand des stibulum öffnet; das untere Ende mündet mit der *Amlla ossea inferior* an der hinteren unteren Wand des stibulum. — *Der äufsere Bogengang*, *Canalis semicircuris externus* s. horizontalis, ist der kürzeste und weiteste, dem er nur $4'''$ lang, sein Lumen aber $\frac{2}{3}'''$ hoch und was über $\frac{2}{5}'''$ breit ist; er läuft horizontal zwischen den iden vorigen; seine Convexität liegt nach aufsen und was nach hinten über dem Canalis Fallopii; seine Krümung kommt einem Kreisabschnitte näher, mit leichter, von r Horizontalebene nach unten abweichender seitlicher Biung. Seine vordere Öffnung mit der *Ampulla ossea externa* anterior liegt neben der vorderen Öffnung des Canalis

semicircularis superior, zwischen dieser und der Fenestra ovalis; die hintere zwischen der unteren Öffnung des Canalis semicircularis inferior und der gemeinschaftlichen des Canalis semicircularis inferior und superior.

Der Vorhof und die Bogengänge werden inwendig von einer sehr feinen glatten Haut, die aus dünner Beinhaut und einem serösen Blatte (einer Fortsetzung der Tunica arachnoidea) besteht, genau bekleidet und von einer dünnen hellen Flüssigkeit, *Aquula labyrinthi* s. Cotunnii, erfüllt. Ersterer enthält aufserdem zwei weifsliche, von einer $\frac{1}{130}'''$ dicken, ziemlich elastischen Nervenmarkhaut gebildete Säckchen; letztere enthalten ähnliche dünnhäutige Röhren, welche aber die knöcherne Höhle und Kanäle nicht völlig ausfüllen, sondern in der Aquula labyrinthi, von welcher sie umspült werden, flottiren. Der gröfsere länglich rundliche Sack des Vorhofs, *Sacculus hemiellipticus* s. semiovalis, oder der gemeinschaftliche Schlauch, *Alveus* s. *Sinus communis*, s. Utriculus, ist $1\frac{2}{3}'''$ hoch und $1'''$ breit, liegt mit seinem oberen vorderen Ende im Recessus hemiellipticus, und hängt nur vermittelst der Nerven, die er aufnimmt, an der inneren Wand des Vestibulum fest; von ihm gehen die häutigen Bogenröhren, *Tubuli* s. *Ductus semicirculares* s. Canales semicirculares membranacei, aus, welche durchaus die Richtung der Canales semicirculares, in welchen sie liegen, haben, aber kaum $\frac{1}{4}'''$ hoch und $\frac{1}{6}'''$ breit sind. In den Ampullae der Canales semicirculares bilden auch sie blasige Anschwellungen von $\frac{3}{4}'''$ Dm., *Ampullae tubulorum semicircularium*: die *Ampulla superior* am vorderen Ende des Tubulus semicircularis superior, die *Ampulla inferior* am unteren Ende des Tubulus semicircularis inferior, die *Ampulla externa* s. anterior am vorderen Ende des Tubulus semicircularis externus. — Der kleine, rundliche, plattgedrückte Sack, *Sacculus rotundus* s. sphaericus, hat $\frac{2}{3}'''$ im Dm., liegt im Recessus hemisphaericus und ist durch die Nerven an den Boden dieser Grube geheftet, aufserdem mit dem Sacculus hemiellipticus durch einen zarten häutigen Strang verwachsen, aber völlig geschlossen; sein äusserer freier Umfang liegt der Fenestra ovalis beinahe gegenüber, ohne jedoch die Basis stapedis zu berühren. Im Inneren sind die Säckchen und häutigen Bogengänge

t einer hellen Flüssigkeit angefüllt, welche eine dickere
ere Consistenz, als die Aquula labyrinthi besitzt (?),
uula vitrea auditiva genannt. Aufserdem enthält jedes
ckchen eine pulverförmige Ablagerung von Ohrkalk oder
rsteinchen, *Otolithi* s. Otoconia: Häufchen weifsgelblicher,
bdurchsichtiger Körperchen von krystallinischem Gefüge
l unregelmäfsig länglich-eckiger Gestalt mit abgerunde-
Enden und Kanten, zum Theil auch spiefsig zugespitzt:
meisten $\frac{1}{246}'''$ lang und $\frac{1}{370}'''$ breit und dick; viele aber
iner, und einige nur $\frac{1}{800}'''$ lang und $\frac{1}{1200}'''$ breit. Auch
den Ampullae finden sich einige wenige dieser Krystalle
der kleinsten Art. Sie bestehen (nach Huschke und
ruel) aus Schleim, kohlensaurem und phosphorsaurem
lk und etwas thierischer Substanz.

Der Alveus communis und die drei Ampullen erhalten
e einen besonderen, vom Nervus vestibuli stammenden
rvenast, welche bei dem Durchgange durch die Macula
brosa superior und inferior in zahlreiche feine Reiser
spalten; diese verbreiten sich an dem Schlauche mit
ahlenförmigen platten Büscheln, treten dagegen an jede
pulla mit zwei kurzen, dicken, gabelförmig divergiren-
Bündeln zarter Fäden, welche in der Höhle der Am-
la einen niedrigen halbmondförmigen Vorsprung bilden.
se Nerven lösen sich an der inneren Fläche des Schlauchs,
Ampullen und Bogenröhren in ein weiches Nervenmark
, in welchem man zarte Fibrillen und Reihen von Ner-
kügelchen, an den Bogenröhren aber nur regellos zer-
eute Nervenkügelchen wahrnimmt. An den Sacculus
undus tritt ein Ast vom Nervus cochleae, mit zahlrei-
n, die Macula cribrosa des Recessus hemisphaericus
chbohrenden Fäden.

Die Schnecke, Cochlea, ist ein spiralförmig gewun-
er Kanal von dritthalb Windungen, dessen Gehäuse von
harten compacten Knochensubstanz der Pyramide ge-
det wird. Sie liegt mit ihrer Axe (von der Basis zur
itze) beinahe in der Queerrichtung der Pyramide des
läfebeins, vor dem Vestibulum, hinter der Biegung des
alis caroticus; ihr breiterer Theil oder die *Basis* nach
en und oben gegen den Boden des Meatus auditorius
ernus hin; die abgerundete Spitze, die *Kuppel, Cupula*,

genannt, reicht fast bis zur inneren Wand der knöchernen Tuba Eustachii. Der Dm. der Basis der Schnecke beträgt 4‴, der Dm. der Cupula $\frac{4}{5}$‴; die Axe der Schnecke von der Mitte der Basis bis zur Mitte der Cupula mifst $2\frac{1}{2}$‴.

Der innerste Theil der Schnecke oder ihr Kern, die *Spindel* oder der *Modiolus* genannt, um welchen gröfstentheils der Kanal der Schnecke sich herumwindet, hat die Gestalt eines Bechers oder Kelchs, und zerfällt in drei Stücke, die Basis, die Säule, und der Becher oder Trichter. Die *Basis modioli* ist breit, kegelförmig, und zu einer weiten Grube ausgehöhlt, welche gegen den Boden des Meatus auditorius internus hin offen ist und einen Theil desselben ausmacht: in dieser Grube finden sich die Spirallöcher, *Tractus spiralis foraminulentus,* eine Menge in eine Spirallinie gestellter kleiner Löcher, und ein gröfseres in der Mitte derselben. Um diese Grube windet sich der gröfste Theil der ersten Windung der Schnecke. Aus der Mitte der Basis geht eine kurze knöcherne *Säule, Columella,* hervor, welche in der Axe der Schnecke ihre Richtung gegen die Cupula nimmt, ohne aber diese zu erreichen. Ihr Umfang besteht aus dichterer Knochenmasse, welche die innere Wand der zweiten Schneckenwindung, die um die Columella läuft, bildet: das Innere der Columella besteht aus schwammiger Knochenmasse, die von engen Kanälen durchzogen wird: der ansehnlichste dieser Kanäle läuft durch die Axe der Spindel, von dem gröfseren Loche des Tractus spiralis an, und wird *Tubulus centralis modioli* s. *cochleae* genannt. Am Ende der zweiten Schneckenwindung endigt die Columella, indem sie in das *Spindelblatt, Lamina modioli,* übergeht, welches divergirend gegen das Gehäuse an der Spitze der Schnecke sich erstreckt, mit dem Gehäuse verschmilzt, die Cupula inwendig begränzt, die zweite Windung von der dritten halben Windung trennt, und mit einem freien, halbmondförmigen, scharfen (gegen die obere Fläche der Pyramide des Schläfebeins gerichteten Rande endigt. Dieses Spindelblatt schliefst einen weiteren trichterförmigen Raum, den *Trichter, Scyphus* s. Infundibulum, ein, dessen engerer Theil an dem Ende der Columella, der weitere aber an der Cupula liegt, und von dieser geschlossen wird. Der Scyphus enthält einen Theil der

veiten und die dritte halbe Windung der Schnecke; in
m öffnet sich der Tubulus centralis cochleae.

Der *Schneckenkanal* ist inwendig glatt: seine äufsere
/and wird von dem knöchernen Gehäuse der Schnecke,
e innere von der Knochenmasse der Basis modioli und
r Columella, die untere (gegen die Basis der Schnecke
ngerichtete) und die obere (gegen die Spitze hingewen-
te) theils vom Gehäuse, theils von der Lamina modioli
bildet. Die erste Windung ist die längste und weiteste,
t nicht weit von ihrem Anfange $1\frac{1}{3}'''$ Höhe und $1'''$ im
n., und läuft grofsentheils um die Basis modioli und den
actus spiralis; ihr Anfang, welcher an der äufseren und
rderen Wand des Vestibulum und an der Fenestra ro-
nda sich befindet, wird durch das Promontorium tympani
zeichnet. Die zweite Windung läuft gröfstentheils um
e Columella, wird von der ersten eingeschlossen, und
gt nur um $\frac{1}{3}'''$ über diese hervor; sie hat an ihrem Über-
nge in die dritte eine Höhe von $\frac{3}{4}'''$ und eine Breite von
'. Stärker erhebt sich die dritte halbe, das Innere des
yphus einnehmende und von der Cupula bedeckte Win-
ng. Von aufsen her betrachtet (indem man von der Seite
r Paukenhöhle her gegen die Cupula sieht) laufen die
indungen im rechten Ohre von der linken zur rechten
nd, im linken Ohre umgekehrt. — Der Schneckenkanal
rd in seiner ganzen Länge durch *das Spiralblatt, Lamina
iralis,* einer aus einem knöchernen und einem häutigen
reifen zusammengesetzten Scheidewand, in zwei Abthei-
ngen, *Treppen, Scalae,* getheilt. Der knöcherne Streifen
s Spiralblatts, *Zonula ossea laminae spiralis,* besteht aus
ei über einander liegenden dünnen Knochenblättchen,
e an den Umfang der Basis modioli und der Columella
rgestalt sich anlegen, dafs zwischen ihnen und dem Um-
nge des Modiolus zwei unregelmäfsig dreiseitige Zwi-
henräume bleiben: auf diese Weise entsteht ein doppel-
s, in spiraler Richtung um die Basis und Columella, an
r inneren Wand einer jeden Scala laufendes Kanälchen,
ubulus spiralis modioli genannt. — Die Zonula ossea
gt ungefähr bis in die Mitte des Schneckenkanals hinein,
uft nur in der ersten und zweiten Windung, und endigt
n Scyphus mit einer gebogenen Spitze, *Hamulus laminae*

spiralis, welche sich um den freien Endrand der Lamina modioli krümmt. Der häutige Streifen, *Zonula membranacea laminae spiralis*, ist an den freien Rand der knöchernen Zonula geheftet, und hieselbst dicker, weifslich, knorpelähnlich; mehr nach aufsen hin wird sie dünner, und befestigt sich wulstig an die äufsere, vom Gehäuse gebildete Wand des Kanals: vom Hamulus spiralis an steigt sie, mit einem freien, tutenförmig umgerollten Rande bis zur Cupula hinauf: so dafs ein kleiner häutiger Trichter, *Scyphulus*, innerhalb des knöchernen Scyphus sich bildet, in welchem beide Scalae, die übrigens durch die Lamina spiralis vollständig von einander getrennt sind, communiciren. (Der innere Raum des häutigen Trichters führt in Scala tympani und ist das sog. Helicotrema.) Zuweilen verknöchert der Scyphulus, und hat alsdann, von der Seite des Vorhofs betrachtet, das Ansehen eines dünnen knöchernen Stiftes, welcher aus dem Scyphus bis zur Cupula sich erhebt. — Die obere (der Cupula näher liegende) engere *Vorhofstreppe*, *Scala vestibuli*, steht durch die Apertura scalae vestibuli (S. 386) mit dem Vorhofe in Verbindung: die untere (der Basis der Schnecke nähere) und weitere *Paukentreppe*, *Scala tympani*, mündet mit der Cavitas tympani vermittelst der Fenestra rotunda zusammen, wird aber verschlossen durch die in diesem Loche ausgespannte *Membrana tympani secundaria*, einem dünnen, aus den häutigen Überzügen der Paukenhöhle und der Schnecke gebildeten, und nach der Pauke hin convexen Häutchen.

Das Innere des Schneckenkanals ist, wie der Vorhof und die Bogengänge, mit der Aquula labyrinthi angefüllt, und von einer sehr feinen Beinhaut und einer dünnen Nervenmarkhaut überzogen, welche letztere auch das innere Blatt der Membrana tympani secundaria und den häutigen Streifen der Lamina spiralis bildet, den knöchernen Streifen derselben aber an seinen beiden Flächen überzieht. In dieser Haut, vorzüglich an der unteren Fläche der Lamina spiralis, verflechten sich die feinen Äste des Nervus cochleae, welche in die erste Windung durch die Löcher des Tractus spiralis, in die zweite durch die Kanälchen der Columella und aus dem Tubulus spiralis, in den Scyphus aber durch den Tubulus centralis eindringen.

Die Wasserleitungen, Aquaeductus Cotunnii s. Diverti-
ula Meckelii, sind zwei 2‴ bis 3‴ lange Kanäle, die im
abyrinth mit einer engen Öffnung anfangen, durch die
nochenmasse der Pyramide des Schläfebeins dringen, und
llmählig sich erweiternd auf die Oberflächen der Pyramide
ihren. Sie enthalten trichterförmige Verlängerungen der
einhaut des Labyrinths (nicht der Nervenmarkhaut),
elche in die, die Pyramide bekleidende Dura mater und
eriosteum übergehen, und kleine Venen und Lymphge-
fse. Der *Aquaeductus vestibuli* fängt an unter der gemein-
haftlichen Öffnung des Canalis semicircularis superior und
nferior, läuft anfänglich nach innen, wendet sich dann
ach hinten und unten, und endigt mit einer länglichen
palte auf der hinteren Fläche der Pyramide (S. 117). Der
quaeductus cochleae beginnt auf dem Boden der Scala
mpani cochleae, sehr nahe vor der Membrana tympani
cundaria, steigt schräg nach vorn herab, und mündet mit
ner dreieckigen Öffnung am hinteren Winkel der Pyra-
ide neben der Fossa jugularis (S. 116).

Der innere Gehörgang, Meatus auditorius internus,
elcher den zum Labyrinth gehenden Nervus acusticus
nd die Arteria auditiva interna, auch den Nervus facialis
nthält, ist kürzer und enger als der äufsere Gehörgang,
‴ bis 5‴ lang, von elliptischem Umfange; dringt vom
orus acusticus internus an schräg nach aufsen und hinten,
nd endigt mit einer unteren gröfseren Grube, und einer
nteren, und einer oberen kleineren. Erstere enthält den
ractus spiralis in der Basis modioli, und hinter dem An-
nge desselben noch einige Löcher, die zur Macula cri-
osa recessus hemisphaerici führen. Die hintere Grube
nthält drei bis fünf Löcher, welche, in engere Kanälchen
ihrend, als Macula cribrosa superior im Vestibulum aus-
münden; unter diesen Löchern finden sich auf der unteren
Vand des Meatus auditorius internus noch ein oder zwei
ndere, die zur Macula cribrosa inferior leiten. Die obere
rube enthält ein einzelnes gröfseres Loch, d. i. die innere
ffnung des *Canalis Fallopii*. Dieser Kanal läuft oberhalb
es Vorhofs nach aufsen, nimmt hier einen kurzen am
fiatus canalis Fallopii (S. 116) beginnenden Kanal auf, und
etzt sich durch ein enges, unter den Sulcus muscularis

tympani eindringendes Kanälchen mit der Paukenhöhle in Verbindung: hierauf wendet er sich unter einem rechten Winkel (d. i. das sog. *Knie*, Geniculum, des Fallopischen Kanals) nach hinten und dann nach unten, indem er an der inneren Wand der Paukenhöhle, zwischen dem Canalis semicircularis horizontalis und der Fenestra ovalis, alsdann aber durch die schwammige Knochensubstanz hinter der Paukenhöhle, in einem Halbkreise herabläuft, und als Foramen stylomastoideum endigt. Er steht mit der Höhle der Eminentia papillaris, und durch den engen *Canalis chordae*, welcher nahe über dem For. stylomastoideum anfängt und nach oben und vorn läuft, mit der Paukenhöhle in Verbindung (S. 381).

Der an die Nervenmarkhaut des Labyrinths sich vertheilende Hörnerv ist bestimmt, den Eindruck der Schallwellen aufzunehmen, und zum Gehirn fortzupflanzen. Es werden die Schallwellen der atmosphärischen Luft durch das äufsere Ohr und Gehörgang aufgefangen, verstärkt und zum Trommelfell geleitet, welches dadurch in Schwingungen geräth; behuf Modificirung dieser Schwingungen wird es wahrscheinlich durch die Muskeln bei leisen Tönen stärker gespannt, bei scharfen und starken Tönen aber mehr erschlafft. Die Schwingungen des Paukenfells theilen sich dem Hammer, Ambos und Steigbügel, und vermittelst der Basis des letzteren, deren hinteres Ende durch den Musculus stapedius tiefer in das Vestibulum eingedrückt werden kann, dem Wasser des Vorhofs mit: gleichzeitig geräth aber auch die in der Paukenhöhle (und den Cellulae mastoideae) befindliche, durch die Tuba Eustachii dahin gelangende Luft, in wellenförmige Schwingungen, welche die Membrana tympani secundaria, und durch diese die Scala tympani der Schnecke treffen.

Auge, Sehorgan.

Das *Auge*, *Oculus*, Ophthalmos, das *Sehorgan* oder gan des Gesichts, *Organon visus*, besteht aus dem eigentlichen Auge oder *Augapfel*, *Bulbus oculi*, und den *Schutzteln* des Augapfels, *Tutamina oculi*, welche jenen vollndig umgeben.

I. Schutzmittel des Auges.

Zu diesen gehören die Augenhöhle, die Augenbraue, Augenlieder und die Thränenorgane.

Die knöcherne *Augenhöhle*, *Orbita*, (S. 139) ist vendig von einer dünnen und ziemlich locker angehefen Beinhaut, *Periorbita*, überzogen, die durch das Foran opticum und die Fissura orbitalis superior mit der cten Hirnhaut, durch die Fissura orbitalis inferior und den Rändern der vorderen Öffnung der Augenhöhle mit Beinhaut des Gesichts unmittelbar zusammenhängt. e Höhle ist von sehr lockerem und sehr fettreichem Zellff ausgefüllt, welcher für den Augapfel ein weiches, erall genau anschliefsendes Lager bildet: an der äufseren che des letzteren aber zu einer schlaffen, fettlosen, hautlichen Schicht sich verdichtet, *Fascia bulbi oculi*, welche Augapfel, mit Ausnahme seines vorderen Drittheils schliefst, und die Sehnen der Augenmuskeln einwickelt.

Die *Augenbraue*, *Supercilium*, ist eine Reihe rzer steifer Haare, welche in queerer, bogenförmiger, h oben convexer Richtung die Gränze zwischen der rn und der Augengegend bezeichnet, über dem oberen genliede hervorragt, und am äufseren Ende schmaler, der Mitte oder gegen das innere Ende hin breiter ist. e einzelnen Haare sind meistens 3‴ bis 7‴ lang, $\frac{1}{20}$‴ eit und $\frac{1}{25}$‴ dick, leicht gebogen, nicht gekräuselt, und nmtlich schräg nach aufsen, die unteren aber zugleich vas nach oben, die oberen etwas nach unten gerichtet. schützen das Auge gegen ein, von oben einfallendes, starkes Licht und gegen den von der Stirn herabrinnden Schweifs.

Die Augenlieder, Palpebrae, sind zwei vor der vorderen Öffnung der Orbita ausgespannte Hautfalten, welche platte Knorpel, *Tarsi,* einschliefsen; die queerlaufende Augenliedspalte, *Fissura palpebrarum,* zwischen sich lassen, und an den Enden dieser Spalte sich vereinigen. Durch diese Vereinigung, *Commissura palpebrarum interna et externa,* werden die Augenwinkel, *Canthus oculi internus et externus,* gebildet: letzterer ist kleiner und spitzig, ersterer gröfser und abgerundet. Beide Augenlieder, das obere und untere, *Palpebra superior et inferior,* sind an ihrer vorderen oder auswendigen Fläche convex, an der hinteren oder inwendigen Seite concav, der Vorderfläche des Augapfels genau anpassend; das obere ist überhaupt länger, breiter und stärker nach vorn gebogen, als das untere. Man unterscheidet an jedem Augenliede den *befestigten* und den *freien Rand;* ersterer fliefst bei dem oberen Augenliede mit der Haut der Augenbraue, bei dem unteren mit der Haut der Wange zusammen; beide sind aufserdem an die Vorderfläche des Augapfels geheftet. Der freie, beinahe ebene, sehr schwach convexe Rand der Augenlieder begränzt die Augenliedspalte; am oberen ist er seiner Länge nach leicht convex, am unteren beinahe gerade; an beiden glatt, $\frac{3}{4}'''$ bis $1'''$ breit, und mit einem vorderen und hinteren *Saume, Limbus,* versehen, von denen der vordere mehr scharfwinkelig, der hintere Saum aber schräg abgeschnitten oder abgestumpft ist.

Die vordere oder auswendige Hautplatte der Augenlieder besteht aus dünner, schlaffer, haarloser Cutis, hinter welcher eine dünne Schicht schlaffen fettlosen Zellstoffs liegt. Hinter der Zellstoffschicht findet sich die innerste Lage der Muskelfasern des Musc. orbicularis palpebrarum (S. 215), und am oberen Augenliede auch die Aponeurose des M. levator palpebrae superioris (S. 399): hinter den Muskelfasern aber eine zweite lockere Zellstoffschicht und sodann die Augenliedknorpel, *Tarsi.* Diese sind dünne, längliche, nach vorn convexe Knorpelscheiben, welche den Augenliedern einen gewissen Grad von Steifigkeit und Elasticität verleihen und ihnen die gebogene Gestalt geben; sie reichen nicht durch die ganze Länge und Breite der Augenlieder, aber beinahe bis an ihren freien Rand, und

d in der Nähe desselben dicker. Der Tarsus des oberen genliedes ist fast $\frac{1}{2}'''$ dick, $9'''$ lang und in der Mitte breit; der des unteren ist fast eben so lang, aber nur breit, auch dünner, weicher und weniger steif. An n Commissurae palpebrarum werden sie, und dadurch Augenlieder selbst, durch die *Augenliedbänder*, *Liga-nta palpebralia* s. tarsi, vereinigt und an den Eingang Augenhöhle befestigt: diese sind platt längliche, aus dichtetem Zellstoff und Sehnenfasern gebildete Streifen. s *Lig. palpebrale internum* ist $2\frac{1}{2}'''$ lang und $1'''$ breit, ne Flächen nach oben und unten, seine Ränder nach rn und hinten gerichtet: es hängt nicht allein mit den rsi, sondern auch mit dem M. orbicularis palpebrarum sammen, welcher zum Theil von ihm entspringt: es ist eer vor der Fossa lacrymalis hingespannt, und an den oc. nasalis ossis maxillaris superioris geheftet. Das *Lig. pebrale externum* ist kürzer und schwächer, nur locker t dem M. orbicularis palpebrarum verbunden, und be-tigt sich an den Proc. frontalis oss. zygomatici, $1'''$ weit ter dem äufseren Augenhöhlenrande, also innerhalb der genhöhle. — Die hintere oder inwendige Hautplatte Augenlieder besteht aus der *Bindehaut*, *Tunica con-ctiva palpebrarum*, einer röthlichen, weichen, dünnen l halbdurchsichtigen Schleimhaut, die einen deutlichen xtus papillaris besitzt und dadurch eine leichte sammt-ige Rauhigkeit erhält, auch mit sehr kleinen Cryptae cosae versehen ist, welche am befestigten Rande der genlieder am zahlreichsten sind. An den freien Augen-drändern fliefst die Conjunctiva palpebrarum mit der rderen Hautplatte ununterbrochen zusammen, ist übri-ns mit der hinteren Fläche der Tarsi sehr fest verwach-n, dagegen mit den Fasern des M. orbicularis palpebra-m und der Aponeurose des M. levator palpebrae supe-ris locker durch Zellstoff verbunden: und bildet im neren Augenwinkel eine kurze, halbmondförmige, von en nach unten herabsteigende Falte, *Plica semilunaris njunctivae* s. Palpebra tertia, welche in ihrem freien, ncaven, nach aufsen gerichteten Rande einen sehr schma-n Knorpelstreifen enthält. Von den befestigten Rändern r Augenlieder schlägt sich die Conjunctiva zur vorderen

Fläche des Augapfels um, und verwächst mit derselben (S. unten).

Der vordere Saum der freien Augenliedränder ist mit kurzen steifen Haaren, den *Augenwimpern, Cilia*, besetzt, welche in einer Reihe, aber sehr nahe neben einander und zu zweien bis dreien hinter einander stehen. Ihre Länge beträgt 3‴ bis 4‴, in der Mitte der Augenliedspalte sind sie am längsten; ihre Breite beträgt $\frac{1}{20}$‴, ihre Dicke $\frac{1}{30}$‴. Ihre $1\frac{1}{5}$‴ tiefen Bälge liegen in schräger Richtung vor den Tarsi, in der Zellstoffschicht zwischen diesen und den innersten Fasern des M. orbicularis palpebrarum, welche hier etwas dicker ist. Die zahlreicheren und längeren Wimpern des oberen Augenliedes sind nach unten convex und mit der Spitze aufwärts gebogen, die des unteren nach oben gekrümmt und ihre Spitze abwärts gerichtet: so dafs die Wimpern bei geschlossener Augenspalte nur mit ihrem mittleren Theile einander berühren und bogenförmig durchkreuzen. — An dem hinteren Saume der freien Augenliedränder findet sich eine Reihe sehr feiner Öffnungen, die den *Meibomschen Drüsen, Glandulae Meibomianae*, angehören. Diese sind Cryptae aggregatae, welche in der Gestalt länglicher, höckeriger, etwas gewundener, $\frac{1}{12}$‴ von einander entfernter Stränge durch die Tun. conjunctiva an der hinteren Augenliedfläche gelblich hindurchschimmern; sie liegen in der Substanz der Tarsi selbst. Die Zahl der Glandulae Meibomianae beträgt im oberen Augenliede meistens 30, im unteren 20 bis 25; ihre Richtung geht vom befestigten Augenliedrande zum freien hin; ihre Länge entspricht der Breite der Tarsi, ihre Breite und Dicke beträgt $\frac{1}{3}$‴ bis $\frac{2}{5}$‴. Jede Glandula Meibomiana besteht aus einem engen langen, $\frac{1}{12}$‴ bis $\frac{1}{8}$‴ weiten, stellenweise bis zu $\frac{1}{4}$‴ erweiterten, dünnhäutigen Schlauche, welcher auf allen Seiten von zahlreichen, rundlich eckigen, $\frac{1}{20}$‴ bis $\frac{1}{5}$‴ im Durchhaltenden Cryptae umgeben wird, die theils in einander theils in den mittleren Schlauch sich öffnen, welcher endlich am freien Augenliedrande in eine $\frac{1}{12}$‴ weite Mündung oder sehr kurzen Ausführungsgang ausgeht. Diese Drüsen sondern ein dickflüssiges, klebriges, gelbliches, an der Luft erhärtendes Sebum aus, das *Sebum palpebrale* oder die Augenbutter, *Lema*: welches die freien Augenliedränder über

eht und schlüpfrig macht, wahrscheinlich auch das Über-
efsen der Thränen einigermafsen verhindert. Zwischen
n Blättern der Plica semilunaris conjunctivae sind noch
ehrere solcher Glandulae Meibomianae zusammengehäuft,
elche einen im inneren Augenwinkel hervorragenden,
thlichen, mit sehr feinen kurzen Haaren besetzten Kör-
r, die *Caruncula lacrymalis*, bilden.

Der gemeinschaftliche Muskel beider Augenlieder ist
r *M. orbicularis palpebrarum* (S. 215), welcher die Augen-
alte schliefst, bei stärkerer Contraction die Augenlieder
nzelt, und einen gelinden Druck auf den Augapfel ausübt.
s obere Augenlied erhält einen besonderen *Aufhebe-Mus-*
, *M. levator palpebrae superioris.* Dieser ist länglich
eieckig, platt, entspringt vom oberen Rande des Foramen
ticum, läuft unmittelbar unter dem Dach der Augenhöhle
ch vorn, wird breiter, und geht in eine dünne Aponeu-
se über, welche an den oberen Rand und die vordere
iche des Tarsus sich befestigt, und am äufseren Augen-
nkel mit dem Lig. palpebrale externum sich verbindet.
lem dieser das obere Augenlied erhebt, und der Augapfel
ırch den M. obliquus oculi superior) vorwärts über das
tere Augenlied gerollt wird, öffnet sich die Augenlied-
lte. Die Bewegungen der Augenlieder sind dem Willen
terworfen, erfolgen aber auch unwillkührlich, vorzüglich
im wachenden Zustande häufig sich wiederholende
nelle Schliefsen und Öffnen der Augenspalte, das sog.
nzeln, Nictitatio.

Die Augenlieder und Wimpern schützen durch Ver-
gerung und Schliefsung der Augenliedspalte die Augen
gen zu starkes Licht und gegen das Eindringen fremder
rper: durch das Blinzeln aber vertheilen sie die Thrä-
ı und den von ihnen selbst abgesonderten Schleim und
ıen Theil des Secretes der Meibomschen Drüsen gleich-
ifsig über die vordere Fläche des Augapfels, und erhalten
ese feucht.

Thränenorgane. Die hintere Fläche der Augen-
der und die Vorderfläche des Augapfels werden bestän-
g von den Thränen benetzt, welche von den Thränen-
üsen abgesondert, und von den thränenleitenden Organen
ı inneren Augenwinkel in die Nase abgeführt werden.

Die *Thränen, Lacrymae*, sind eine dünne, farblose, wasserhelle Flüssigkeit, welche aus 99 bis 96 p. C. Wasser und 1 bis 4 p. C. fester Substanz zusammengesetzt ist: letztere besteht aus einer eigenthümlichen, gelblichen, extractartigen Materie, Thränenstoff genannt, aus Kochsalz, und Spuren von Natron, phosphorsaurem Kalk und phosphorsaurem Natron.

Die *Thränendrüsen* sind acinöse, über dem äufseren Augenwinkel, hinter dem oberen Augenliede liegende Drüsen. Die obere Thränendrüse, *Glandula lacrymalis superior* s. innominata Galeni, liegt in der Fossa glandularis des Stirnbeins unter dem Dache der Augenhöhle; ist von gelbröthlicher Farbe, länglich platt, nach oben und aufsen convex, nach unten und innen concav, in queerer Richtung 9‴ lang, 5‴ breit und $2\frac{1}{2}$‴ dick, wiegt 11 Gran und hat ein Volumen von $\frac{1}{30}$ Kub. Zoll oder 57 Kub. Linien. Sie besteht aus mehreren, ziemlich genau verbundenen und von einer gemeinschaftlichen starken zellstoffigen Kapsel eingeschlossenen Läppchen. Die untere Thränendrüse, *Glandula lacrymalis inferior* sive Glandulae congregatae Monroi liegt unter der oberen, reicht bis hinter das Lig. palpebrale externum herab, ist 4‴ bis 5‴ lang, $3\frac{1}{2}$‴ breit, 1‴ dick, $3\frac{2}{3}$ Gran schwer, und hat ein Volumen von $\frac{1}{90}$ Kub. Zoll oder 19 Kub. Linien; sie besteht aus unregelmäfsig gestalteten, locker verbundenen Läppchen. Aus den rundlichen Acini beider Drüsen entspringen mehrere, im Ganzen sieben bis zehn, enge Ausführungsgänge, welche in und zwischen den Läppchen der Drüsen verborgen nach vorn laufen, und die Tun. conjunctiva des oberen Augenliedes, oberhalb des äufseren Augenwinkels, mit sehr engen, in einer gebogenen Reihe stehenden Mündungen durchbohren.

Von hier aus verbreiten sich die Thränen über die ganze vordere Fläche des Augapfels, welches durch das Blinzeln der Augenlieder und eine gleichzeitige rollende Bewegung des Augapfels (S. 399) befördert wird. Beim Schliefsen der Augenliedspalte berühren die hinteren abgestumpften Säume der freien Augenliedränder einander nicht, und bilden daher mit dem Augapfel eine queerlaufende dreiseitige Rinne, durch welche die Thränen, über

convexe Vorderfläche des Augapfels hinweg, vom äu-
n Augenwinkel zum innern fliefsen, und hieselbst in
ı *Thränensee*, *Lacus lacrymalis*, sich sammeln. Der
·änensee ist der vertiefte Theil des inneren Augenwin-
, welcher von den Augenliedern und ihrer inneren Com-
sur begränzt, und dessen Boden von der Plica semilu-
s conjunctivae und der Caruncula lacrymalis gebildet
d.

Thränenpunkte und Thränenkanälchen. Am hinteren
me eines jeden Augenlieds, zwischen den inneren Enden
Tarsi und der inneren Commissur, $2\frac{1}{2}'''$ von der letz-
n entfernt, zeigt sich eine kleine von einem wulstigen
de umgebene Öffnung, der Thränenpunkt, *Punctum la-
nale*, *superius et inferius*: welche beim Schliefsen der
enliedspalte in den Thränensee eingetaucht wird, und
demselben die mit dem Schleim der Conjunctiva und
Sebum der Meibomschen Drüsen vermischten Thränen
augt. Die Thränenpunkte führen in die Thränenkanäl-
ı oder sog. Schneckenhörner, *Canaliculi lacrymales* s.
nua limacum, welche von einer Fortsetzung der Con-
tiva gebildet werden. Beide dringen anfänglich, vom
änenpunkte an, senkrecht in das Augenlied, $\frac{1}{3}'''$ tief ein,
obere nach oben, das untere nach unten, und bilden hier
kleine Erweiterung: alsdann wenden sie sich nach in-
und laufen, von den Fasern der M. orbicularis palpe-
um bedeckt und die Caruncula lacrymalis umfassend,
er das Lig. palpebrale internum; nähern sich einander,
durchbohren nahe neben einander die vordere äufsere
nd des Thränensacks. Ihre Länge beträgt $4'''$, ihr Dm.
— $\frac{1}{3}'''$; der untere ist etwas weiter als der obere, so
auch der ihm zugehörende Thränenpunkt. Hinter den
änenkanälchen liegt der kleine länglich platte Thrä-
nuskel, *M. lacrymalis* s. tensor tarsi s. M. Horneri.
ier entspringt hinter dem Thränensacke von der Crista
ymalis des Thränenbeins, läuft hinter dem Lig. palpe-
e internum, zwischen Thränensack und Thränenkarun-
nach vorn und aufsen, und endigt an der inneren Com-
ur des Augenliedes: er zieht die inneren Enden der
enlieder nach hinten und innen, und taucht die Thrä-
punkte tiefer in den Thränensee.

Der Thränensack, *Saccus lacrymalis*, ist ein länglicher, oberwärts blind geendigter, von aufsen etwas platt gedrückter Schlauch, welcher die Fossa lacrymalis (S. 129) ausfüllt; vorn wird er vom M. orbicularis palpebrarum und Lig. palpebrale internum bedeckt, und ragt mit seinem oberen Drittheil über das letztere hinauf; nach aufsen geht der M. lacrymalis neben ihm vorbei, nach innen und hinten ist er an die Beinhaut der Fossa lacrymalis geheftet. Er ist von einer $\frac{1}{2}'''$ dicken, weichen, inwendig rauhen, röthlichen Schleimhaut, einer Fortsetzung der Nasenschleimhaut, gebildet und äufserlich von einer ziemlich dünnen Zellstoffschicht umgeben: nach vorn und aufsen wird er auch von einer starken fibrösen Haut bekleidet, welche der an dem Umfang der Fossa lacrymalis befestigte und über diese Grube hingespannte Theil der Periorbita ist. In seinem oberen Theile, unmittelbar hinter dem Lig. palpebrale internum, nimmt er die Thränenkanälchen auf, welche innerhalb seiner Höhle einen kleinen Vorsprung bilden: nach unten, am Ende der Fossa lacrymalis geht er in den etwas engeren, an den Seiten plattgedrückten *Thränennasengang*, *Ductus nasolacrymalis*, über, welcher in schräger Richtung von oben und vorn nach unten und hinten und etwas nach aufsen, durch den knöchernen Canalis nasolacrymalis (S. 142) in den Meatus narium inferior herabsteigt; und in dem vorderen Theile des letzteren, an der Seitenwand der Nasenhöhle, mit einer länglichen Spalte sich mündet. Die Stelle des Übergangs des Thränensacks in den Thränennasengang wird durch eine schwache Verengerung, zuweilen auch durch eine im Inneren hervorspringende Falte der Schleimhaut, aus welcher beide gebildet sind, bezeichnet. Die Länge des Thränensacks beträgt $5'''$, seine Breite äufserlich $2'''$ bis $2\frac{1}{2}'''$; der Thränennasengang ist $10'''$ lang und läfst eine Sonde von $\frac{2}{3}'''$ Dicke ohne Schwierigkeit hindurchgehen.

II. Augapfel, Bulbus oculi.

Der Augapfel hat im Allgemeinen die Gestalt eines, rn nicht geschlossenen Elliptoids, an welches vorn ein ines Segment einer Kugel angesetzt ist. Der Dm. von rn nach hinten oder die Axe des Augapfels beträgt $10\frac{2}{3}'''$ $11'''$, der horizontale Queerdurchmesser von der Schlä- - zur Nasenseite des Bulbus ist der Axe gleich, der senk- hte Dm. um $\frac{1}{5}'''$ bis $\frac{1}{3}'''$ kürzer als die Axe. Die schrä- ı Diagonaldurchmesser sind länger: der kleinere Diago- ldm., in der Richtung von der Schläfenseite und von rn nach der Nasenseite und nach unten, ist meistens um '' bis $\frac{1}{5}'''$ länger als die Axe; dagegen ist der grofse ıgonaldm., in der Richtung von der Nasenseite und von rn nach der Schläfenseite und nach unten, immer der gste aller Dm. des Augapfels, und mifst selten unter $11'''$, ufig $11\frac{1}{3}'''$. Der hintere Theil des Augapfels ist regel- fsiger gewölbt; der vordere Theil dagegen von oben l unten, von der Schläfen- und der Nasenseite her wach abgeplattet, mit Ausnahme des mittleren kugeligen eils der Vorderfläche (welcher von der stärker convexen rnhaut gebildet wird). Der Mittelpunkt des Elliptoids l der gröfste Umfang des Augapfels, in welchem die rn angegebenen senkrechter, queerer und diagonale Dm. ogen werden, liegt dem hinteren Ende der Augenaxe $\frac{2}{3}'''$ bis $1'''$ näher, als dem vorderen Ende derselben. Gewicht des Augapfels beträgt zwischen 100 und 125 ın, das Volumen beinahe $\frac{1}{3}$ Kubikzoll.

Der Umfang des Augapfels wird von Häuten gebildet, lche nach Mafsgabe der Gestalt des Bulbus gekrümmt, ihrer Aufsenfläche convex, an ihrer Innenfläche concav d, und den inneren Raum oder die Höhle des Augapfels ;ränzen. Diese *Häute* sind die harte oder weifse Haut, nica sclerotica, und die Hornhaut, Tun. cornea, welche de den äufsersten Umfang des Bulbus bilden, und die stalt desselben vorzüglich bestimmen: — ferner die Ader- ıt, Tun. choroidea, mit der Pigmenthaut, Membrana menti, und die Netz- oder Markhaut, Tun. retina. In Höhle des Augapfels ist eine kleine durchlöcherte Haut, Blendung oder Regenbogenhaut, Iris, in einer mit der

Axe des Augapfels sich kreuzenden Richtung ausgespannt; — aufserdem ist aber dieses hohle Innere von den durchsichtigen sog. *Augenflüssigkeiten*, Humores oculi, vollständig ausgefüllt. Diese sind ein festweicher Körper, die Linse, Lens; die wässerige Flüssigkeit, Humor aqueus; und der Glaskörper oder die Glasfeuchtigkeit, Corpus vitreum s. Humor vitreus: welche gröfstentheils in besonderen durchsichtigen Häuten eingeschlossen sind. In der Höhle des Augapfels werden die inneren Durchmesser des Augapfels in denselben Richtungen gezogen, wie die äufseren: die innere Augenaxe von der hinteren Fläche der Hornhaut bis zur inneren Fläche der Retina; der innere horizontale, senkrechte und die diagonalen Dm. von einem Punkte der Retina zum andern. Diese inneren Dm. sind kürzer als die äufseren um so viel, als die Dicke der Augenhäute an den betreffenden Punkten beträgt.

Tunica sclerotica, s. *albuginea* s. cornea opaca die *weifse* oder *harte Haut*, umgibt den hinteren, mittleren, und zum Theil auch den vorderen Theil des Augapfels ungefähr fünf Sechstheile desselben: ist eine fibröse, aus sehr kurzen und vielfach sich kreuzenden Sehnenfasern dicht gewebte Haut; weifsglänzend und sehr fest und stark. Am hinteren Umfange des Bulbus ist sie $\frac{3}{5}'''$, am mittleren Umfange $\frac{2}{5}'''$ bis $\frac{1}{2}'''$, am vorderen nur $\frac{3}{10}'''$ dick, wird indessen hier von den Sehnen der geraden Augenmuskeln verstärkt. Ihr vorderer Theil wird von dem umgeschlagenen Theile der Tun. conjunctiva (S. 398) locker überzogen, und enthält eine ovale, $5'''$ im gröfsten Dm. haltende Öffnung, deren Umfang verdickt, aber von der inneren Fläche nach der äufseren hin schräg abgeschnitten erscheint, so dafs er einen $\frac{2}{3}'''$ breiten, mit der Augenaxe parallelen Rand bildet. Die vordere Kante dieses Randes ist dünn und scharf; die hintere Kante dagegen enthält eine, jene Öffnung kreisförmig umgebende Furche oder Falz, *Sulcus scleroticae*, von $\frac{1}{6}'''$ Breite und $\frac{1}{20}'''$ Tiefe. Mit diesem vorderen Rande legt die Sclerotica sich an die Hornhaut. Am hinteren Umfange der Sclerotica findet sich ein rundes Loch, Foramen scleroticae s. Lamina cribrosa, welches indem es diese Haut von hinten oder aufsen nach vorn oder innen durchdringt, enger wird, so dafs es an der

ern Fläche $1\frac{2}{3}'''$, an der inneren Fläche nuur $\frac{4}{5}'''$ Dm.
Der Mittelpunkt dieses Loches liegt $1\frac{1}{2}'''$ vom hinte-
Ende der Augenaxe entfernt, mehr nach der Nasenseite
Es wird von dem Marke des Sehnerven ausgefüllt,
sein Rand hängt mit der fibrösen Scheide dieses Ner-
ununterbrochen zusammen. An mehreren Stellen der
rotica, vorzüglich in ihrer hinteren Hälfte, wird sie von
reichen kleinen Löchern und kurzen Kanälen, (für die
argefäfse und Nerven) in schräger Richtung durchbohrt.
innere glattere Fläche ist durch Gefäfse, Nerven und
dünne Lage eines zarten, blätterigen, bräunlich ge-
ten Zellstoffs, *Lamina fusca scleroticae* genannt, ziem-
fest mit der Aderhaut verbunden. In früheren Le-
perioden erscheint dieser Zellstoff deutlich als eine
se Haut, und wird daher von Einigen auch bei Er-
hsenen als eine solche angesehen, und *Tunica arachnoidea*
i genannt.

Tunica cornea s. cornea pellucida, *die Hornhaut*,
et das vordere Sechstheil des Augapfels; ist vorn con-
hinten concav, und hat die Gestalt einer flachen run-
Schale. Sie ist farblos und vollkommen durchsichtig,
einem eigenthümlichen sehr festen und dichten Gewebe,
hes aus höchst feinen und sehr innig mit einander ver-
ten Zellstofffibrillen zu bestehen scheint, und nur künst-
in grobe platte Fasern und Blättchen sich zerlegen
; ohne sichtbare Gefäfe und Nerven, biegsam und
isch; durch die Augenflüssigkeiten in stark gespanntem
ande, und in ihrer ganzen Dicke durchfeuchtet. In
hlafftem Zustande und bei anfangender Austrocknung
iert sie an Durchsichtigkeit. In der Mitte ist sie ge-
nlich $\frac{2}{5}'''$, am Rande $\frac{1}{2}'''$ dick. Ihr Rand ist, von der
leren Fläche nach der hinteren hin, beinahe parallel
der Augenaxe abgeschnitten, und mit dem vorderen
de der Sclerotica äufserst fest verschmolzen, indem letz-
r über den Rand der Cornea hinübergreift, und die
rn der Sclerotica in den Rand der Hornhaut eindrin-
Die scharfe vordere Kante des Randes der Sclerotica
reckt sich bis zur Vorderfläche der Hornhaut, und be-
t dieselbe oberwärts und unterwärts mehr, als zu bei-
Seiten, daher die Vorderfläche der Hornhaut nicht

kreisförmig, sondern oval erscheint, und in queerer Richtung $4\frac{3}{4}'''$ bis $5\frac{1}{5}'''$ breit, in senkrechter Richtung aber nur $4\frac{1}{5}'''$ bis $4\frac{4}{5}'''$ hoch ist. Von hinten angesehen erscheint dagegen die Hornhaut kreisrund, $5'''$ im Dm. haltend, und gränzt unmittelbar an den Falz der Sclerotica. Die Krümmung der Vorderfläche ist gleich einem Abschnitt einer Kugel von $3\frac{1}{3}'''$ bis $4\frac{1}{3}'''$ Radius; ihr gröfster horizontaler Bogen hält 63^0 bis 84^0. Die hintere Fläche ist parabolisch gekrümmt, dem Scheitelabschnitt eines Paraboloids gleich, dessen Parameter $5\frac{1}{2}'''$ bis $6\frac{1}{3}'''$ mifst.

Der vordere Theil der Sclerotica und die Vorderfläche der Hornhaut werden von der Tunica conjunctiva überzogen. Diese schlägt sich, von den befestigten Rändern des Augenliedes aus, an die vordere Fläche des Bulbus um, bedeckt die Sclerotica bis zu einer Entfernung von $3'''$ vom unteren und inneren Rande der Hornhaut, und von $5\frac{1}{2}'''$ bis $6'''$ vom oberen und äufseren Rande der Cornea, ist an die Sclerotica nur locker angeheftet, und bildet einen etwas dickeren, schlaffen, wulstigen Ring von $1'''$ Breite auf dem vorderen Rande der Sclerotica und dem Rande der Cornea welchen man *Annulus conjunctivae* nennt. Von hier an verbreitet sie sich über die Hornhaut, und verschmilzt so genau und fest mit der letzteren, dafs sie in der That das vorderste Blatt der Hornhaut bildet. Diesen an den vorderen Umfang des Augapfels befestigten Theil der Conjunctiva nennt man, zum Unterschiede von dem, welcher die hintere Fläche der Augenlieder bekleidet, *Tunica conjunctiva bulbi* s. Tunica adnata oculi, und unterscheidet auch Tun. conjunctiva scleroticae und Tun. conjunctiva corneae.

Die hintere Fläche der Hornhaut wird von der dünnen durchsichtigen *Demoursschen Haut*, Tunica Demoursiana s. Membrana humoris aquei überzogen (S. 423.), welche mit der ersteren äufserst fest und innig verwachsen ist.

Tunica choroidea, s. chorioidea s. vasculosa oculi die *Aderhaut* des Auges, ist eine dünne, weiche, braungefärbte, aus Zellstoff und sehr zahlreichen Gefäfsen gewebte Haut: auf der äufsern Fläche hat sie ein gestreiftes Ansehen (welches von dem Laufe ihrer Gefäfse herrührt), und ist heller gefärbt; auf der inneren Fläche (dem sogenannten Tapetum s. *Membrana Ruyschiana*) erscheint sie dunkler

t zarten Flocken besetzt und sammtartig. Die Färbung rd ihr durch einen schwarzbraunen Farbstoff, Pigmentum rum, mitgetheilt, welcher ihr Gewebe durchdringt, vorglich aber an ihrer innern Fläche als eine dickere, locker angende Schichte liegt: nach Wegnahme desselben ereint sie weifslich und halbdurchsichtig. In ihrem hinen Theile ist die Choroidea $\frac{1}{15}'''$ bis $\frac{1}{20}'''$ dick, und wird a einem runden Loche mit weifslichem Rande, durch lches das Mark des Sehnervens dringt, durchbohrt: von r an verläuft sie, indem sie in der vordern Hälfte des lbus allmählig bis zu $\frac{1}{30}'''$ dünner wird, an der inneren che der Sclerotica nach vorn, und ist mit der letzen durch einen zarten bräunlich gefärbten Zellstoff mäfest verbunden (welcher beim Fötus das Ansehen einer nen serösen Haut hat, und als eine Fortsetzung der Tun. chnoidea des Hirns angesehen wird (S. 405). Bevor insen die Choroidea den vordern Rand der Sclerotica ercht, geht sie ununterbrochen in den sog. *Strahlenkörper*, *rpus ciliare*, über, welcher das vordere stark verdickte de der Choroidea bildet, und aus zwei Gebilden, dem ahlenbande, Orbiculus ciliaris, und dem Faltenkranze, rona ciliaris, besteht.

Orbiculus ciliaris, s. Ligamentum ciliare s. Lig. scleico-choroidale, *das Strahlenband*, ist ein dickerer mattifser Ring, aus Zellstoff und aus vielfach verflochtenen tten Nervenfasern, die den Nn. ciliares angehören, benend; weniger gefäfsreich als die Choroidea selbst, und sichtlich seiner Textur den Nervenganglien ähnlich. Er von dreiseitiger Gestalt; seine vordere breiteste Fläche inzt an die innere Fläche der Sclerotica, die hintere an n Faltenkranz; die innere schmalste Fläche ist gegen die genaxe gewendet, mit der Iris verbunden, und zum Theil n der Demoursschen Haut bekleidet. Der äufsere, etwas nach nten, gegen den gröfsten Umfang des Augapfels geriche Rand, fliefst mit der Choroidea zusammen; der hintere nd mit dem Faltenkranze; der vordere Rand ist abgedet, wulstig, in den Sulcus scleroticae hineinragend, l daselbst mit den zusammenstofsenden Rändern der Scleica und Cornea fester zusammenhängend. Die Richtung Ringes ist ziemlich genau kreisförmig, seine Öffnung,

durch welche die Augenaxe läuft, hält 5‴ im Dm.; seine gröfste Breite (vom vorderen bis zum äufseren Rande) beträgt $1\frac{1}{5}$‴, und die gröfste Dicke (vom vorderen zum hinteren Rande) $\frac{2}{5}$‴.

Corona ciliaris s. Corpus ciliare, der Faltenkranz oder Strahlenkranz, besteht aus einer grofsen Anzahl von der Choroidea gebildeter Falten, *Plicae ciliares*, welche, an der hinteren Fläche des Orbiculus ciliaris befestigt, in die Höhle des Augapfels frei hineinragen, meistens parallel von hinten und aufsen nach vorn und innen (gegen die Augenaxe hin) gerichtet, und hinten niedriger, vorne höher sind. Das hintere Ende des Faltenkranzes — da, wo derselbe aus dem glatteren Theile der Choroidea hervorgeht, die Falten niedrig beginnen und weiter von einander entfernt stehen — wird *Ora serrata* genannt. Die ansehnlichsten dieser Falten, 70 bis 72 an der Zahl, führen den Namen *Processus ciliares*, *Ciliarfortsätze*: diese sind $\frac{4}{5}$‴ bis $1\frac{2}{5}$‴ lang, $\frac{2}{5}$‴ bis $\frac{1}{2}$‴ hoch, und $\frac{1}{10}$‴ bis $\frac{1}{5}$‴ breit: ihr hinterer, gegen die hintere Wölbung des Augapfels gerichteter Rand ist da, wo die Falten noch niedrig sind, concav; mehr nach vorn aber, woselbst sie höher werden, convex: ihr vorderer gegen die Hornhaut gerichteter Rand ist concav; und ihre stark convexe Spitze nach innen gegen die Augenaxe gerichtet. Die Ränder sind an den meisten Ciliarfortsätzen durch kleine Aus- und Einbiegungen leicht ausgeschweift, selten ganz glatt. Öfters fliefsen zwei neben einander stehende Ciliarfortsätze mit ihren vorderen Rändern zusammen. Zwischen diesen Ciliarfortsätzen stehen kleinere und schmalere Falten, verborgen unter einer dickeren Lage des Pigments, welche die $\frac{1}{10}$‴ bis $\frac{1}{5}$‴ breiten Zwischenräume zwischen den Processus ciliares ausfüllt, und über welche die weifslichen abgerundeten Spitzen der Proc. ciliares hervorragen. Der Durchmesser des von den Ciliarfortsätzen gebildeten Ringes oder Kranzes beträgt $4\frac{1}{5}$‴ bis $4\frac{3}{5}$‴. Sowohl die Proc. ciliares, als die kleineren Plicae ciliares, laufen in sehr kleine queer gerichtete Nebenfalten aus, wodurch sie ein flockiges und öfters baumförmiges Ansehen erhalten.

Die gröfseren Gefäfse der Choroidea, von $\frac{1}{28}$‴ bis $\frac{1}{80}$‴ Dm., vorzüglich die Venen, laufen gröfstentheils an ihrer

fseren Fläche und geben ihr das gestreifte Ansehen: die nsten Gefäfsverzweigungen bilden auf der inneren Fläche hinteren Theils der Choroidea ein äufserst dichtes Netz n Capillargefäfsen, aus welchen auch die zarten Flocken stehen, welche der inneren Fläche das sammtartige An- ien verleihen. Die Maschen dieses Netzes sind kaum eiter, als der Dm. der Haargefäfse selbst: letztere ha- n eine Dicke von $\frac{1}{400}'''$ bis $\frac{1}{133}'''$, die meisten von $\frac{1}{233}'''$: ige wenige sogar nur von $\frac{1}{900}'''$ bis $\frac{1}{800}'''$.

Die Schlagadern, *Arteriae ciliares posteriores breves*, mmen mit zwei stärkeren und mehreren kleineren Stämm- n vom Stamme der Arteria ophthalmica, einige auch n der A. ethmoidalis posterior, A. supraorbitalis, A. scularis inferior und A. lacrymalis: durchbohren mit bis 20 Ästen den hinteren Theil der Sclerotica unweit es Loches für den Sehnerven; dringen in das Gewebe Choroidea, verlaufen unter Spaltung in $\frac{1}{30}'''$ dicke reige, nahe an der äufseren Fläche derselben und geben lreiche Reiser zu dem Capillargefäfsnetz auf der ieren Fläche: sodann laufen sie, ziemlich parallel und er sehr spitzigen Winkeln sich theilend nach vorn; treten und zwischen die Plicae ciliares; bilden in diesen, bei ei- n Kaliber von $\frac{1}{56}'''$ bis $\frac{1}{40}'''$, längliche, zum Theil con- trische Schlingen, von denen die ansehnlichste meistens gs des freien Randes der Falte läuft: und biegen sich llich, nach zahlreichen Anastomosen unter einander und den Aa. ciliares anteriores, in Venenwurzeln um; icken nur wenige Zweige zur Iris. Die Venenwurzeln stehen theils in der Corona ciliaris, theils in dem Ca- largefäfsnetze des hinteren Theils der Choroidea, wenden h bald zur äufsern Fläche der Aderhaut; und laufen istens gekrümmt und in wirbelförmiger Richtung zu r kurzen Venenstämmchen, *Venae vorticosae*, Strudelge- se, zusammen: letztere, nebst anderen kleineren Venen- immchen, durchdringen die Sclerotica im hinteren Theile rselben, und gehen in die Venae ophthalmicae über.

Iris, *die Regenbogenhaut*, *Blendung*, der Augenstern, ne Membrana vasculosa; hat die Gestalt einer runden, in r Mitte von dem *Seheloche*, *Pupilla*, durchbohrten heibe von 5''' Dm.; ist in einer mit der Augenaxe sich

kreuzenden Richtung hinter der Hornhaut ausgespannt, wird von dem Humor aqueus umspült und flottirt in ihm, und theilt den Raum zwischen der Hornhaut und Linse in zwei Abtheilungen, in die vordere und hintere Augenkammer.

Der äufsere Rand der Iris, *Margo ciliaris iridis*, ist vorn an die innere, der Augenaxe zugewendete Fläche des Orbiculus ciliaris, durch Zellstoff und Gefäfse, auch vermittelst der Demoursschen Haut angeheftet; hinten fliefst er ununterbrochen mit den vorderen Rändern der Ciliarfortsätze der Choroidea zusammen. Der innere scharfe Rand der Iris, *Margo pupillaris*, umgiebt die Pupille: diese befindet sich nicht genau in der Mitte der Iris, sondern etwas weiter nach der Nasenseite hin, indem die Iris zwischen ihrem Ciliarrande und Pupillarrande an der Nasenseite um $\frac{1}{5}'''$ schmaler ist, als an der Schläfenseite. Der Durchmesser der Pupille beträgt zwischen 1''' und 2'''; ist aber sehr veränderlich, indem die Iris einer sehr lebhaften Ausdehnung und Zusammenziehung ihres Gewebes fähig ist, und im ersteren Zustande die Pupille sich verengert, im letzteren sich erweitert. Die Mittelpunkte der Pupillen beider Augen sind bei Erwachsenen 2'' 2''' von einander entfernt; nur selten mehr, und höchstens bis zu 2'' 6'''. — Die vordere Fläche der Iris ist glatt, von der fest anhängenden und bis zum Pupillarrande sich erstreckenden Demoursschen Haut bekleidet; bläulich, grau oder braun gefärbt, und von convergirenden weifslichen oder gelblichen Streifen durchzogen: — die hintere Fläche oder die sog. Traubenhant, *Tunica uvea*, ist rauher, von sammtartigem Ansehen, mit niedrigen, gegen die Pupille hingerichteten Fältchen versehen, an sich von gelblicher Farbe, aber mit einer dicken Schicht des Pigments belegt, und erscheint daher dunkelbraun. Diese Pigmentschicht wird hinterwärts von der Membrana pigmenti überzogen. An der vorderen Fläche, in der Nähe des Ciliarrandes und in geringer Entfernung vom Pupillarrande, zeigen sich ein äufserer gröfserer und ein innerer kleinerer Kreis, *Annulus major et minor iridis*, welche durch eine dunklere Färbung und durch ein theilweises Zusammenfliefsen der weifslichen Streifen, von der blasseren Stelle oder Zone zwischen den beiden Kreisen sich unterscheiden. — Die Richtung der

is im zusammengezogenen Zustande ist rechtwinkelig ge-
n die Augenaxe; im ausgedehnten Zustande biegt sie sich
gegen etwas nach vorn; in diesem Zustande ist die Mitte
r Pupille $1'''$ weit von dem Mittelpunkte der hinteren Fläche
r Hornhaut entfernt. Die Dicke der Iris (mit der Pigment-
nicht an der hinteren Fläche) ist ungleich; am Margo
iaris beträgt sie $\frac{1}{10}'''$ bis $\frac{1}{8}'''$, am Annulus major und in
r Mitte zwischen Ciliarrand und Pupillarrand $\frac{1}{6}'''$ bis
', am Annulus minor, woselbst sie am dicksten ist, $\frac{1}{5}'''$
$\frac{3}{10}'''$; — von hier an bis zum Pupillarrande, in einer
recke von $\frac{2}{5}'''$, ist sie an ihrer vorderen Fläche schräg
geschnitten, so dafs der Pupillarrand vollkommen scharf
cheint.

Das Gewebe der Iris besteht aus ziemlich lockerem
llstoff, und aus sehr zahlreichen Gefäfsen und Nerven.
e Arterien stammen theils von den Arteriae ciliares poste-
res longae, theils von den Aa. ciliares anteriores, nur we-
ge von den in der Choroidea verlaufenden Aa. ciliares
steriores breves. Die *Aa. ciliares posteriores longae, in-
na et externa*, sind zwei Stämmchen, aus der Aa. oph-
dmica oder einem der gröfseren Äste der letzteren ent-
ringend; durchbohren am hinteren Umfange des Augapfels
Sclerotica, und laufen in dem Zellstoff zwischen Scle-
ica und Choroidea geschlängelt nach vorn; die externa
der Schläfenseite des Augapfels etwas oberhalb der
tte derselben, die interna an der Nasenseite etwas unter-
b der Mitte; sie geben der Choroidea keine Äste ab,
ngen in den Orbiculus ciliaris, spalten sich zuerst in
ei Äste und sodann in zahlreiche Zweige, die in den
rgo ciliaris iridis eintreten. Die *Aa. ciliares anteriores*
d kurze, von der A. ophthalmica, A. lacrymalis, A.
praorbitalis und Aa. musculares entspringende kleine
hlagadern, welche den vorderen Theil der Sclerotica
rchbohren, im Orbiculus ciliaris sich verästeln und in
e Iris an ihrem Ciliarrande eindringen: von den Proc.
iares aus gehen Ästchen der Aa. ciliares posteriores breves
eichfalls in die Iris. Alle diese Arterien bilden im Margo
iaris der Blendung durch Anastomosen einen Gefäfskranz,
er vielmehr ein kranzförmiges Netz, *Circulus arteriosus
jor iridis*: laufen sodann geschlängelt convergirend und

$\frac{1}{130}'''$ dick, gegen den Pupillarrand hin; bilden im Annulus minor ein kleineres kranzförmiges Netz von feineren Gefässen, *Circulus arteriosus minor iridis*; laufen sodann bis zum Pupillarrande selbst, und biegen sich hier in Venen um: so dafs der Pupillarrand fast gänzlich aus sehr länglichen engen Schlingen, deren Gefäfse meistens einen Dm. von $\frac{1}{180}'''$ bis $\frac{1}{130}'''$ haben, gebildet erscheint. Auch die Venen bilden zahlreiche Anastomosen und kranzförmige Netze, fliefsen grofsentheils im vorderen Rande des Orbiculus ciliaris zu einer ringförmigen Vene zusammen, *Circulus venosus orbiculi ciliaris*, welche im Sulcus scleroticae liegt; aus dieser und aus dem Orbiculus ciliaris überhaupt treten kürzere und längere Venenstämmchen hervor, die *Venae ciliares anteriores* und *Venae ciliares posteriores longae*; erstere durchbohren sogleich die Sclerotica, letztere begleiten die gleichnamigen Arterien; und ergiefsen sich zuletzt sämmtlich in die Venae ophthalmicae. Nur wenige Venen der Iris gelangen durch den Faltenkranz zu den Venae vorticosae.

Die Nerven der Iris, *Nervi ciliares*, Blendungsnerven, sind im Verhältnifs zu der Gröfse dieser Haut aufserordentlich zahlreich und stark. Sie entspringen aus dem Ganglion ciliare und vom N. nasociliaris, bilden ein kleineres Bündel von zwei bis drei Stämmchen, welches oberhalb des Sehnerven liegt, und ein gröfseres Bündel von vier bis sechs Stämmchen an der unteren und äufseren Seite des Sehnerven. Nachdem sie sich hinter dem Augapfel in überhaupt 12 bis 20 Äste gespalten haben, durchbohren sie die Sclerotica an dem hinteren Umfange des Augapfels; laufen in dem Zellgewebe zwischen der Sclerotica und Choroidea nach vorn, geben der Choroidea nur sehr kleine Äste, von welchen einige aber die Choroidea durchbohren und mit der Retina sich verbinden: alsdann treten sie in den Orbiculus ciliaris, und spalten sich in platte, vielfach verflochtene und verschmolzene Bündel. Aus dem Orbiculus ciliaris, dem Sammelpunkte aller Nn. ciliares, treten wiederum zahlreiche Nervenbündel und Nervenfasern in die Iris ein; und laufen nahe an der Vorderfläche derselben welcher sie das weifsgestreifte Ansehen geben, convergirend und hin und wieder Schlingen bildend, gegen die

pille hin, an deren Rande ihre Endigungen nicht deut-
h erkannt werden können.

Im ausgedehnten Zustande der Iris, bei verengerter
pille, sind die Gefäfse und Nerven stärker gestreckt, im
sammengezogenen Zustande mehr geschlängelt. Andere
sern, als Zellstoff- und Nervenfasern, sind in der Iris
ht vorhanden.

Pigmentum nigrum, das schwarze Pigment, das Au-
schwarz, hat im Menschenauge eine bald hellere, bald
nklere schwarzbraune Farbe, welche Nuance der Fär-
ng meistens mit der Farbe der Oberhaut und Haare über-
stimmt. In dünnen Schichten erscheint es heller, in
ken Lagen aber dunkler. Es ist an der inneren Fläche
Choroidea und des Faltenkranzes, und an der hinteren
che der Blendung (Uvea) ausgebreitet; am hinteren
eil der Choroidea ist es in geringerer Menge vorhan-
, als am mittleren und vorderen Theile, und fehlt rings
das Loch derselben für das Mark des Sehnerven gänz-
; durchdringt aber das Gewebe der Choroidea, so dafs
h die äufsere Fläche derselben und selbst der Zellstoff
der inneren Seite der Sclerotica gefärbt erscheinen. Am
tenkranze, von der Ora serrata an, ist es stärker ange-
ft, und füllt die Zwischenräume zwischen den Proc.
ares vollkommen aus, so dafs es die kleineren Plicae
ares verbirgt; dagegen die freien Ränder der Proc. ci-
es aus der Pigmentschicht hervorragen und daher weifs-
erscheinen. Die Pigmentschicht an der hinteren Fläche
Blendung, die mit der am Faltenkranze ununterbrochen
ammenhängt und bis zum Pupillarrande sich erstreckt,
von verhältnifsmäfsig ansehnlicher Dicke, daher die
ea eine sehr dunkle Farbe besitzt. — Das Pigment be-
t aus zahlreichen, unregelmäfsig runden und platten,
igen Körnchen von $\frac{1}{1000}'''$ bis $\frac{1}{1600}'''$ Dm., welche in ei-
zähen farblosen Saft eingesenkt sind und von diesem
ammengeklebt werden; dieser Saft löset sich in Wasser,
bei die Körnchen sich von einander trennen, und in
inere kugelige Körnchen von $\frac{1}{1600}'''$ bis $\frac{1}{2400}'''$ Dm.
ilen lassen. — Hinsichtlich der chemischen Eigenschaf-
ist das Pigment der Kohle ähnlich; in seiner Asche
len sich Chlornatrium, Kalk, phosphorsaurer Kalk und

Eisenoxyd. — Wahrscheinlich wird es von den Gefäfsen der Choroidea, des Faltenkranzes und der Iris abgesetzt.

Membrana pigmenti s. Membrana Jacobi s. Jacobiana, die *Pigmenthaut*, Jacobsche Haut, ist eine sehr zarte, etwas rauhe, von anklebendem Pigmente hellbräunlich gefärbte Zellhaut, welche an der inneren Fläche der ganzen Pigmentschicht ausgebreitet ist; von dem hinteren Umfange des Augapfels an, woselbst sie am Rande des Loches der Choroidea für den Sehnerven ihren Anfang nimmt, erstrekt sie sich bis zum Pupillarrande der Iris. Sie unterstüzt die Pigmentschicht, trennt diese von der Retina, und verhütet an der Uvea und dem vorderen Rande des Faltenkranzes, die Vermischung des Pigments mit dem Humor aqueus und Trübung des letzteren. Am hinteren und mittleren Umfange des Augapfels liegt sie locker zwischen Choroidea und Retina; am hinteren Ende des Faltenkranzes (an der Ora serrata) verklebt sie genau mit der Retina; entfernt sich alsdann von dieser, um auch die Spitzen und vorderen Ränder der Proc. ciliares und die hintere Fläche der Iris zu bekleiden; und gränzt am Pupillarrande der Blendung mit der Demoursschen Haut zusammen. — Wegen ihrer genaueren Verbindung mit der Retina von der Ora serrata an bleibt sie, nebst dem Pigment, leicht an der ersteren hangen, wenn man die Choroidea und den Faltenkranz von der Retina abzieht; es erscheint alsdann auf dem vorderen Ende der Retina ein kreisförmiger Abdruck des Faltenkranzes, welchem von Einigen gleichfalls der Name Faltenkranz beigelegt wird. — Von Huschke wird diese Haut als das äufserste Blatt der Retina und als Nervenhaut angesehen.

Tunica retina s. nervea oculi, die Netzhaut oder Markhaut, liegt an der inneren Seite der Pigmenthaut, zwischen dieser und der Oberfläche des Glaskörpers ausgebreitet, mit jenen beiden nicht verwachsen, von ihnen leicht sich abschälend, und nur an ihrem hinteren Ende durch wenige zarte Gefäfse mit der Choroidea, der Pigment- und Glashaut verbunden. Sie ist weich, weifslich und halbdurchsichtig, im hinteren Theile des Augapfels $\frac{1}{16}'''$, am mittleren Umfange desselben $\frac{1}{30}'''$ dick, und besteht vorzüglich aus der Ausbreitung des Sehnerven. Man unterscheidet an

· eine innere und eine äufsere Schicht: die innere Schicht, *mina celluloso-vasculosa retinae*, ist sehr dünn, aber fest, chsichtig, aus Zellgewebe gebildet, und enthält die Gese der Retina. Die äufsere Schicht, *Lamina nervea reae*, ist das Nervenmark des Sehnerven, welches als eine nne, weiche, weifsliche Lage auf der Lamina cellulosoculosa sich ausbreitet, aus Nervenfibrillen und regellos einander liegenden Nervenkügelchen besteht, und aufser n Marke des Sehnerven auch sehr zarte Äste von den . ciliares in sich aufnimmt: sie läfst sich leicht von der mina celluloso-vasculosa abstreifen, aber nicht als eine ammenhangende häutige Ausbreitung sich darstellen: durch Membrana pigmenti wird sie gegen die Berührung und rmischung mit dem Pigment der Choroidea geschützt. r Anfang der Retina, im hinteren Theile des Augapfels, das Ende des *Sehnerven, Nervus opticus*. Dieser gelangt · hinteren Wölbung des Augapfels, $1\frac{1}{4}'''$ vom hinteren le der Augenaxe entfernt, wird hier dünner; durchbohrt, hdem seine äufsere fibröse Scheide mit der Sclerotica i vereinigt hat, die Sclerotica, Choroidea und Membrana menti; ragt in die innere Höhlung des Augapfels in Gelt eines flachen *Markhügels*, *Papilla* s. *Colliculus nervi ici*, hervor, und breitet sich nun nach allen Seiten hin , indem sein inneres Neurilem die Lamina celluloso- culosa, sein Mark aber die Lamina nervea der Retina let. Neben dem Colliculus nervi optici nach aufsen, der Mitte der hinteren Wölbung der Retina, zeigt sich e queerlaufende, $2'''$ lange und $\frac{2}{5}'''$ hohe, nach vorn in Höhle des Augapfels hervorspringende Falte, *Plica cenlis retinae*, welche zuweilen doppelt ist. Diese Falte hält einen gelben, meistens ovalen Fleck, *Macula flava inae* s. Limbus luteus foraminis centralis genannt, von ' Dm.; und in der Mitte dieses Fleckes eine kleinere, glich transversale, marklose und daher durchsichtige lle, welche wegen des durchscheinenden Pigmentübergs im Inneren des Augapfels dunkler erscheint, und darch das Ansehen eines Loches in der Retina hat, *Foran centrale retinae*. Der Fleck und die dunkle Stelle beden sich im Mittelpunkte der hinteren Wölbung des

Augapfels, am hinteren Ende der Axe des Auges, $1\frac{1}{2}'''$ von dem Mittelpunkt des Colliculus n. optici entfernt.

Das vordere Ende der Retina wird an dem hinteren Ende der Corona ciliaris beträchtlich dünner und klebt fester an der Pigmenthaut und dem Faltenkranze; wird aber da, wo sie hinter den hinteren Rändern der Processus ciliares sich befindet, wiederum dicker. Hier endigen die beiden Schichten der Netzhaut auf verschiedene Weise. Die Lamina celluloso-vasculosa erstreckt sich, hinter den Proc. ciliares hervortretend, in der Richtung gegen die Augenaxe hin, bis vor den Rand der Linse, und verwächst mit der vorderen Wand der Linsenkapsel. Dieses vordere Ende der Lamina celluloso-vasculosa wird das *Strahlenplättchen*, *Lamina ciliaris* s. Zonula ciliaris s. Zonula Zinnii genannt: es ist zart, durchsichtig und mit concentrisch gegen die Augenaxe strahlenden, niedrigen Falten versehen, deren vertiefte Zwischenräume den hinteren Rändern der Proc. ciliares entsprechen und diesen an Zahl gleichkommen. Jede dieser Falten enthält mehrere kleinere Fältchen, welche den gröfseren Falten ein gestreiftes Ansehen geben. Auf den vorderen Rändern der Falten liegt die Endigung der Lamina nervea in der Gestalt weifslicher länglicher gezackter Flocken, *Flocculi retinae* s. *Margo flocculosus retinae* genannt: diese Flocken reichen nicht ganz bis zum Rande der Linsenkapsel, ragen aber hinter den Processus ciliares, $\frac{1}{10}'''$ bis $\frac{1}{5}'''$ weit, frei in die hintere Augenkammer hinein.

Die Gefäfse der Netzhaut sind die sehr zarten *Arteria* und *Vena centralis retinae*, erstere aus der A. ophthalmica stammend, letztere in die Vena opthalmica cerebralis sich ergiefsend. Beide laufen in der Mitte des Sehnerven; die Arterie spaltet sich im Colliculus n. optici in mehrere Äste, welche um den gelben Fleck und um die Centralfalte einen Gefäfskranz bilden und sich theils bis gegen den vordere Rand der Retina, theils aber in den Glaskörper verzweigen; die Venen nehmen denselben Lauf rückwärts. Aufserdem gehen aber auch sehr kleine Äste der Aa. ciliares breves posteriores von der Choroidea und Membrana pigmenti in die Retina über, welche den von der A. centralis retinae gebildeten Kranz vervollständigen. Die Capillargefäfse der

zhaut, welche zum Theil einen Dm. von nicht mehr $\frac{1}{5\,4\,0}'''$ haben, bilden ein ziemlich unregelmäfsiges weitchiges Netz.

Corpus vitreum s. *Humor vitreus*, *der Glaskörper* r die Glasflüssigkeit, füllt den grofsen hinteren Raum Augapfels zwischen Retina und Linse aus, und entspricht 1 seinem Umfange und seiner Gestalt der Höhle des bus. Sein Gewicht beträgt 65 bis 75 Gran. Er besteht der Flüssigkeit selbst, dem eigentlichen *Humor vitreus*, aus der Glashaut. Erstere ist dünnflüssig, farblos, serhell, schwach klebrig, und enthält

Wasser	98, 40
Eiweifs	0, 16
Kochsalz mit einer extractartigen Materie	1, 42
Ein Wasserextract	0, 02
	100, 00.

Die *Glashaut*, *Tunica hyaloidea* s. vitrea, ist eine sehr ie, aber ziemlich feste, durchsichtige seröse Haut: sie ibt als ein äufserer Sack, *Capsula hyaloidea*, den gan- Glaskörper; und ist im Inneren in viele kleine Zellen theilt, welche die einzelnen Tropfen der Flüssigkeit alten: sie verleihet durch diese Anordnung dem Glas- er ein gallertähnliche Consistenz. Sie besitzt sehr zarte gefäfse (beim Fötus; ob auch bei dem Erwachsenen?): stammen von der Arteria centralis retinae, und ver- en sich theils an den äufseren Sack der Glashaut, theils ein stärkeres Gefäfschen, die *Arteria capsularis*, durch nnere des Glaskörpers nach vorn, gibt seitwärts Äste ie Wände der Zellen ab, und endigt in der hinteren d der Linsenkapsel. Zur Aufnahme dieses Gefäfses t sich (nach J. Cloquet und Arnold) die Capsula hya- a vor der Papilla nervi optici ein, und bildet eine, in Glaskörper nach vorn eindringende, röhrenförmige ide, Canalis hyaloideus, deren Anfang Area Martegiana nnt ist. — Der hintere Umfang des Glaskörpers, wel- die Retina ausgespannt erhält, hat eine elliptoidische alt; seine gröfste Axe (im gröfseren Diagonaldurchmes- des Augapfels) beträgt $9\frac{3}{5}'''$ bis $10\frac{1}{4}'''$; die senkrechte (im senkrechten Dm. des Bulbus) $= 9\frac{1}{6}'''$ bis $9\frac{2}{3}'''$; die

halbe kleine Axe, welche der hintere Theil der Augenaxe selbs ist, = $4\frac{2}{5}'''$ bis $4\frac{7}{10}'''$. In der Mitte der Vorderfläche de Glaskörpers findet sich eine kreisrunde Vertiefung von 4''' Dm., d. i. die *schüsselförmige* oder *tellerförmige Grube* de Glaskörpers, *Fossa hyaloidea*: diese nimmt die hinter Fläche der Linse auf, und ist hieselbst die Glashaut mi der hinteren Wand der Linsenkapsel verwachsen. Am Um fange der schlüsselförmigen Grube, rings um den Rand de Linse, liegt die Vorderfläche des Glaskörpers in geringe Entfernung hinter dem, zur Linsenkapsel sich erstrecken den, Ende der Lamina ciliaris, so dafs hieselbst zwische ihr und der Lamina ciliaris ein Raum, der Canalis Petit bleibt: der äufserste Umfang der Vorderfläche des Glas körpers legt sich dagegen sehr genau an die hintere Fläch des Anfangs der Lamina ciliaris, ohne mit dieser eigentlic verwachsen zu sein. — Das Vermögen des Glaskörpers, di Lichtstrahlen zu brechen, ist = 1,3394, wenn das de atmosphärischen Luft zu 1.0000, und das des Wassers z 1.3358 angenommen ist (Brewster.)

Lens crystallina s. Humor crystallinus, *die Lins* oder *Crystalllinse*, ist ein festweicher, farbloser, vollkom men durchsichtiger Körper von linsenförmiger Gestal welcher vor dem Glaskörper, hinter der Pupille lieg Man unterscheidet an der Linse ihre vordere und hinte Fläche und ihren Rand. Beide Flächen sind sehr glatt un convex, die vordere aber flacher und nach einer Ellips gekrümmt, deren grofse Axe 4''' bis $4\frac{1}{10}'''$, und deren klein Axe $1\frac{4}{5}'''$ bis $2\frac{1}{3}'''$ mifst. Diese vordere Fläche ist gege die Pupille und die Uvea hin gerichtet; ihr Mittelpunk (oder der vordere Pol der Linse) von dem Mittelpunkt der Pupille $\frac{1}{10}'''$ bis $\frac{3}{20}'''$, und von dem Mittelpunkte de Hinterfläche der Hornhaut 1''' bis $1\frac{1}{3}'''$ entfernt. Die hi tere Fläche hat eine parabolische Krümmung von $3\frac{3}{4}'''$ b $5\frac{1}{10}'''$ Parameter; sie ist in die schüsselförmige Grube d Glaskörpers eingesenkt, der hinteren Wölbung des Au apfels zugewandt, und ihr Mittelpunkt (hinterer Pol d Linse) von der Plica centralis retinae $5\frac{3}{5}'''$ bis $6\frac{2}{5}'''$ entfern Der Rand der Linse ist breit, abgerundet, gegen den Fa tenkranz hin gerichtet, und liegt zwischen der Lami ciliaris und dem Umfange der schüsselförmigen Grube d

skörpers. Der Durchmesser der Linse zwischen den ander gegenüber stehenden Punkten ihres Randes mifst bis $4\frac{1}{10}'''$; die Dicke vom Mittelpunkte der Vorder- he bis zum Mittelpunkte der Hinterfläche, oder die Axe Linse, welche nicht immer genau in der Augenaxe t, beträgt $1\frac{4}{5}'''$ bis $2\frac{2}{5}'''$.

Die Linse ist von einem vollkommen geschlossenen tigen Sacke, *der Linsenkapsel, Capsula lentis crystallinae*, geben. Diese ist zwar sehr eng und schmiegt sich der rfläche der Linse genau an; ist indessen nirgends mit verwachsen, sondern die Linse liegt frei in der Kapsel, m diese, aufser der Linse, noch ein Tröpfchen einer en Flüssigkeit, *Liquor Morgagnii*, enthält. Indessen öfters die Menge des Liquor Morgagnii so gering, die Hinterfläche der Linse die hintere Kapselwand ittelbar zu berühren scheint. — Die Linsenkapsel ist kommen durchsichtig; ihre vordere Wand ist $\frac{1}{160}'''$, fester und elastischer, als die hintere, nur halb so e und der Glashaut mehr ähnliche Wand. Die vordere nd verbindet sich vor dem Rande der Linse mit der igung der Lamina ciliaris; die hintere Wand ist in r ganzen Ausdehnung mit der Glashaut in der schüssel- nigen Grube sehr innig verwachsen. Die vordere Wand tzt ein Netz von Capillargefäfsen, welche aus den Ge- n der Lamina ciliaris herstammen, und vor ihrem Über- ge in die Kapsel einen Gefäfskranz in der Lamina ciliaris en; die hintere Wand erhält ihre Capillargefäfse aus Arteria capsularis, einem mitten durch den Glaskörper genden Ast der Art. centralis retinae.

Die Linse ist nicht überall von gleicher Dichtigkeit Festigkeit: man unterscheidet an ihr eine äufsere chere Schicht und einen inneren härteren Kern, welche essen in der frischen Linse nicht deutlich und scharf einander gesondert sind, sondern allmählig in einander rgehen. Die äufsere Schicht ist sehr weich, feucht und breiartig: sie ist an der Vorderfläche der Linse dicker an der Hinterseite. Der Kern der Linse, *Nucleus lentis*, t daher der hinteren Fläche der Linse näher als der deren; er ist merklich fester als die äufsere Schicht und eilen (bei älteren Menschen öfters) von einer hellen

Bernsteinfarbe. Der Umfang des Kerns oder die äufser Kernschicht ist weicher als der innerste härteste Theil des selben; letzterer liegt immer in der hinteren, paraboliso gekrümmten Abtheilung der Linse, und hat meistens ein biconvexe Gestalt wie die ganze Linse; zuweilen aber ein planconvexe Gestalt oder auch die eines Meniscus.

Die Linse besteht 1) aus einer vollkommen durchsich tigen, weichen, zähen, halbflüssigen, formlosen Substanz diese scheint durch Einwirkung der Luft, des Weingeiste der Säuren u. a. Agentien zu gerinnen, (wobei die Lin mehr oder weniger weifs und durchsichtig wird) und ve wandelt sich in ein Aggregat von platt rundlichen, sche benförmigen, $\frac{1}{265}'''$ bis $\frac{1}{135}'''$ im Dm. haltenden Körnche die vorzüglich deutlich in der äufsersten weichsten La der Linse (aber nicht in der Kapsel) sichtbar werden: und 2) aus Fasern eigenthümlicher Art, welche jene we chere Substanz in regelmäfsigen Richtungen und Abständ durchziehen, und zwar in Hauptabtheilungen und Schic ten oder Blätter geordnet sind, aber nirgends zur Bildu geschlossener Zellen sich vereinigen. Die einzelnen Fase sind von verschiedener Länge, parallel laufend und eina der nie durchkreuzend, glatt und eben, durchsichtig, d Muskelfasern nicht im Geringsten, mehr noch den Zellsto fasern ähnlich: ihre Dicke beträgt $\frac{1}{900}'''$ bis $\frac{1}{650}'''$, ih Abstände von einander in den äufseren Schichten der Lin $\frac{1}{260}'''$, in dem Kerne $\frac{1}{325}'''$. Sie sind in neun bis ze Hauptabtheilungen oder Bündel geordnet, welche die G stalt keilförmiger Ausschnitte der Linse haben, am Ran der Linse breit sind, mit ihren Seitenflächen an einand gränzen, und an der Axe schmal und scharf zusammens fsen. Durch verschiedene Einwirkungen mechanischer u chemischer Art, z. B. der Luft, des Wassers, der Säur durch einen Druck auf die Pole der Linse u. a. m. trenn sich diese keilförmigen Ausschnitte bald mehr, bald weni vollständig von einander, wobei am öftersten auf der V derfläche der Linse eine dreischenkelige, auf der Hint fläche eine vierschenkelige Spalte sich bildet. In jed dieser Ausschnitte laufen die Fasern regelmäfsig, beina parallel, und im Allgemeinen von dem Linsenrande na der Axe hin, jedoch nur in der Mitte des Ausschnitts ger

en die Axe gestreckt: dagegen die Fasern in den Seitenflä-
n jedes Ausschnittes, ohne die Axe zu erreichen, sich aus-
·ts biegen — so dafs ihre Enden mit den Enden der Fasern
benachbarten Ausschnittes convergiren, sogar auch unter
ärischen Winkeln zusammenstofsen, aber nicht in einander
rgehen. Je näher den Seitenflächen des Ausschnittes und
i Rande der Linse, desto kürzer und desto mehr gebogen sind
Fasern, und die von ihnen eingeschlossenen Winkel stum-
·: so dafs am Linsenrande die zusammenstofsenden Fasern
ier Ausschnitte beinahe concentrische Kreise oder Wirbel
en. Die längeren, mehr geraden Fasern in der Mitte
s Ausschnittes erstrecken sich bis nahe zu den Polen
der Axe der Linse, woselbst aber die von dem Linsen-
le her von oben und unten, von aufsen und innen,
nder entgegen laufenden Fasern einander nicht erreichen:
dafs die Axe der Linse und die der Axe benachbar-
Zwischenräume der Ausschnitte nur von der weiche-
, halbflüssigen, nichtgefaserten Substanz gebildet wer-
. In jedem Ausschnitte sind überdiefs die Fasern
concentrisch über einander liegende Schichten oder
ter angeordnet, welche in gröfserer oder geringerer
ke, vielleicht bis zur Dicke der Fasern, gespalten wer-
können. Diese Blätter sind, wegen der keilförmigen
talt der Ausschnitte, am Rande der Linse am breitesten,
mmen sich hieselbst nach der Gestalt des Randes, und
recken sich verschmälert in der vorderen und hinteren
fte der Linse, den Krümmungen der Vorder- und Hin-
äche im Allgemeinen sich anpassend, bis zu den Polen
der Axe der Linse. Von der Oberfläche nach der Tiefe
men sie an Breite immer mehr ab.

Die Linse enthält weder Blut- noch Lymphgefäfse noch
ven.

Das absolute Gewicht der Linse beträgt 4 bis $4\frac{1}{2}$ Gran,
specifische Gewicht 1,079 (Chenevix). Das Brechungs-
mögen der ganzen Linse ohne Unterschied der einzelnen
ichten ist = 1,3839; das Brechungsvermögen der äufseren
senschicht = 1,3767; das der äufseren Kernschicht =
786; das des eigentlichen Kerns = 1,3999: (wenn das
athmosphärischen Luft = 1,0000, und das des Wassers

= 1,3358 gesetzt ist. Brewster.) Die chemischen Bestand theile sind

Eigenthümliche eiweifsartige Materie (Linsenstoff)	359 p. M.
Alkoholextract mit milchsaurem Alkali und Kochsalz	24
Wasserextract mit Spuren von Salzen	13
Wasser	580
Reste von Häuten und Zellstoff	24

Petit'scher Kanal. Ringsum den Rand der Linse läu ein dreiseitiger Kanal, *Canalis Petiti*, welcher die Lin kreisförmig umgibt, und von einer klaren Flüssigkeit ang füllt ist. Seine vordere Wand ist die Lamina ciliari seine hintere Wand der Theil der Tunica hyaloidea a Umfange der schüsselförmigen Grube des Glaskörpers: na aufsen ist der Kanal durch das Aneinanderstofsen der L mina ciliaris und des Glaskörpers geschlossen; seine inne Wand (gegen die Augenaxe hin) wird vom Rande der Li senkapsel gebildet. Die Breite dieses Kanals beträgt m stens $\frac{1}{2}'''$, die Tiefe von vorn nach hinten, nahe am Ran der Linselkapsel, $\frac{2}{5}'''$.

Humor aqueus, die wässerige Augenflüssigkeit, findet sich im vordersten Theile des Augapfels zwisch Hornhaut und Linse, und umspült die zwischen beiden au gespannte Iris. Sie ist dünnflüssig wie Wasser, klar, far los, und nicht, wie die Glasflüssigkeit, in Zellen eing schlossen: ihre Menge beträgt nur wenige Tropfen, i Gewicht $3\frac{1}{2}$ bis 5 Gran; ihr spec. Gewicht 1,0053, ihr Br chungsvermögen 1,3366. Ihre chemischen Bestandthe sind Wasser 98 p. C., Kochsalz, Alkohol- und Wassere tracte, und kaum eine Spur von Eiweifs. —

Der von dem Humor aqueus angefüllte Raum wi durch die Iris in die gröfsere vordere und hintere kl nere Augenkammer geschieden, welche durch die Pupi mit einander in Communication stehen. *Die vordere A genkammer, Camera oculi anterior*, wird begränzt vo durch die hintere Fläche der Hornhaut, hinten durch vordere Fläche der Iris, ringsum von dem vorderen Th der inneren (der Augenaxe zugewandten) Fläche des Or

is ciliaris. Sie wird inwendig bekleidet von einer sehr
nen, durchsichtigen (serösen?) Haut — *Membrana hu-*
's aquei oder die *Demourssche* oder *Descemetsche Haut,*
Wasserhaut, genannt: — welche mit der Hornhaut,
vorderen Rande des Orbiculus ciliaris und der Vor-
läche der Iris, vorzüglich mit der ersteren, sehr genau
vachsen ist, und am Margo pupillaris der Iris endigt.
Dm. der vorderen Augenkammer beträgt 5‴; die
ste Tiefe in der Mitte (in der Augenaxe) 1‴, und nimmt
dem Umfange hin beträchtlich ab. — *Die hintere*
renkammer, Camera oculi posterior, wird begränzt
von der Uvea, hinten von der vorderen Wand der
enkapsel, von der Lamina ciliaris und dem Margo
ulosus retinae, ringsum von den Processus ciliares:
ere, so wie die Uvea, werden von der Membrana pig-
ti überzogen, und dadurch eine Trübung des Humor
us durch Mischung mit dem Pigment, mit welchem
häutigen Theile belegt sind, verhindert. Der Durch-
er der hinteren Augenkammer vor den Processus cilia-
beträgt nicht völlig 5‴, und zwischen zwei einander
nüber stehenden Processus ciliares $4\frac{1}{5}'''$ bis $4\frac{3}{5}'''$; die
e in der Mitte (in der Augenaxe) nur $\frac{1}{10}$ bis höchstens
aber gegen den Umfang hin, zwischen der Uvea und
Lamina ciliaris, $\frac{3}{5}'''$. —

Die durchsichtigen Häute und die sogenannten Flüssig-
n des Auges lassen die von einem erleuchteten Gegen-
le ausgehenden Lichtstrahlen durch die Höhle des Aug-
s bis zur Retina gelangen, und brechen sie im Allge-
en nach der Augenaxe hin, aber in verschiedenem
.e, welcher von den oben angegebenen Krümmungen
Flächen der strahlenbrechenden Theile, von ihrem ver-
denen Brechungsvermögen, Dicke und Abständen von
ider, abhängig ist. Von der Cornea und der mit Humor
us gefüllten voderen Augenkammer werden die Lichtstrah-
schwach gebrochen: von der Linse, vorzüglich vom
ie derselben, werden sie sehr stark, vom Glaskörper
lerum schwächer als von der Linse, aber stärker als
der wässerigen Flüssigkeit gebrochen; und dadurch
einem gröfseren oder kleineren Punkte der Retina ge-
nelt. Es entsteht auf diesem Punkte ein verkleinertes,

scharf begränztes und stark erleuchtetes Bild des Gegenstandes, welches aber, da die von dem Gegenstande ausgehenden Lichtstrahlen, vor dem Auge oder innerhalb desselben, sich kreuzen, eine verkehrte Stellung hat, übrigens ohne Bedeutung für das eigentliche Sehen ist. Der Eindruck, welchen die Retina von den zu einem Kegel gesammelten Lichtstrahlen empfängt, wird alsdann von dem Sehnerven zum Gehirn übertragen. Dafs nicht ein zu lebhafter Licht, und überhaupt nur ein scharf begränzter Strahlenkegel von gewissen, beim Nahe- und Fernsehen verschiedenen Dimensionen auf die Netzhaut falle, wird zum Theil durch Verengerung der Augenliederspalte, vorzüglich aber durch die im starken Lichte erfolgende Expansion der Iris und Verengerung der Pupille verhindert; dagegen die letztere im schwachen Lichte durch Contraction der Iris erweitert wird. Durch das Pigment der Choroidea wird die Höhle des Augapfels dunkel erhalten, und die, ein deutliches Sehen störende, Reizung der Retina durch diejenigen Strahlen, welche von der inneren Fläche der Sclerotica zurückgeworfen würden, verhütet: so wie auch die Processus ciliares und die Uvea die von den Flächen der Linse zurückgespiegelten Strahlen absorbiren.

Augenmuskeln. Die Vorderfläche des Augapfels mit der Hornhaut und Pupille wird durch die Augenmuskeln den zu beschauenden Gegenständen entgegengerichtet. Es finden sich sechs eigene Muskeln des Augapfels, vier *gerade Mm. recti oculi,* und zwei *schräglaufende, Mm. obliqui oculi*. *Die Mm. recti oculi* sind länglich-platte, hinten schmale vorn breitere Muskeln; entspringen sämmtlich in der Tiefe der Augenhöhle, laufen gebogen oberhalb, unterhalb, an der Nasenseite und Schläfenseite des Augapfels; inseriren sich mit einer dünnen kurzen Aponeurose am vorderen Umfange des Augapfels, in einiger Entfernung von dem Rande der Hornhaut, in die Sclerotica, indem die Fasern ihrer Aponeurosen mit denen der Sclerotica sich innig verweben. Von der hinteren Wölbung des Augapfels sind sie durch das dicke Fettpolster der Orbita getrennt, dagegen werden ihre vorderen Enden durch die Fascia bulbi oculi mit einander verbunden, und berühren genau den Umfang der

apfels an den Endpunkten des senkrechten und queeren chmessers desselben.

M. rectus superior s. attollens oculi, oberer gerader enmuskel, ist der dünnste, entspringt am oberen und eren Umfange des Foramen opticum, von der äufseren rzel des Proc. clinoideus anterior und von der Scheide Sehnerven; läuft unter dem M. levator palpebrae supeis über den Augapfel hin, und befestigt sich $3\frac{2}{5}'''$ vom en Rande der Hornhaut entfernt. — *M. rectus inferior* primens oculi, unterer gerader Augenmuskel, ist dicker der obere; entspringt gemeinschaftlich mit den beiden enden Muskeln von einem platten sehnigen Streifen, her an der Seitenfläche des Corpus oss. sphenoidei stigt ist, durch die Fissura orbitalis superior in die enhöhle hineinragt, und in drei Zipfel sich spaltet. Der kel läuft unter dem Augapfel, auf dem Boden der Auöhle, nach vorn, und inserirt sich $3'''$ hinter dem unteRande der Hornhaut. — *M. rectus internus* s. adduoculi, innerer gerader Augenmuskel, ist kürzer und er als die übrigen geraden Augenmuskeln; entspringt dem gemeinschaftlichen Sehnenstreifen und von der eide des Sehnerven, läuft zwischen der inneren Wand Augenhöhle und der Nasenseite des Augapfels, und stigt sich $2\frac{1}{4}'''$ vom inneren Rande der Hornhaut entt. — *M. rectus externus* s. abducens oculi, äufserer der Augenmuskel, ist länger als die anderen und dicker ler obere und untere; entspringt von der gemeinschaften Sehne und von der äufseren Wurzel des Proc. clinoideus rior, mit zwei Zipfeln, welche einen Spalt zwischen lassen; läuft an der äufseren Wand der Augenhöhle, inserirt sich in die Schläfenseite der Sclerotica, in r Entfernung von $3\frac{1}{3}'''$ vom äufseren Rande der Cor: woselbst die obere Thränendrüse zum Theil auf ihm et.

Die *schiefen* oder *schrägen Augenmuskeln* sind rhaupt schwächer als die geraden, laufen oberhalb und erhalb des Bulbus, und inseriren sich mit sehnigen Enin das Gewebe der Sclerotica am hinteren Umfange Augapfels, $5'''$ vom hinteren Ende der Augenaxe, $8'''$ $8\frac{1}{4}'''$ vom Rande der Hornhaut entfernt. *M. obliquus*

oculi superior s. trochlearis s. patheticus, oberer schiefer Augenmuskel oder Rollmuskel, ist der längste, aber dünnste aller Augenmuskeln: entspringt sehnig vom inneren Rande des Foramen opticum und von der Scheide des Sehnerven; sein länglicher rundlicher Bauch läuft längs des oberen Randes der inneren Wand der Augenhöhle, zwischen Mm. recti superior und internus, nach vorn und oben. In der Nähe der vorderen Öffnung der Augenhöhle geht er in eine dünne runde Sehne über: diese läuft durch einen $1\frac{1}{2}'''$ breiten, faserknorpeligen Halbring oder Rolle, *Trochlea*, welche an der Fovea trochlearis oder Spina trochlearis des Stirnbeins befestigt ist; und wird von einer mit der Fascia bulbi oculi zusammenhangenden Synovialscheide umgeben. Alsdann wendet sich die Sehne unter einem spitzigen Winkel nach hinten und aufsen, läuft oberhalb des Augapfels schräg rückwärts gegen die Tiefe der Augenhöhle, dringt unter den M. rectus superior; und befestigt sich, indem sie breiter und platt wird, an der oberen Seite des hinteren Umfangs des Augapfels, etwas mehr nach der Schläfenseite als nach der Nasenseite hin. — *M. obliquus inferior*, unterer schiefer Augenmuskel, der kürzeste aller Augenmuskeln, entspringt vom Margo infraorbitalis, zwischen dem untere Ende der Fossa lacrymalis und dem Canalis infraorbitalis, läuft auf dem Boden der Augenhöhle, unter dem M. rectus inferior, nach hinten und aufsen; biegt sich alsdann zwischen dem Augapfel und dem M. rectus externus nach oben und inserirt sich an der Schläfenseite des hinteren Umfangs des Bulbus, indem seine hinteren Fasern über den gröfsten horizontalen Umfang des Augapfels emporsteigen.

Diese sechs einzelnen Muskeln bewirken eine verän derte Stellung der Hornhaut und Pupille durch Rollen des Augapfels um seine verschiedenen Durchmesser. Bei vollkommener Unthätigkeit der Muskeln des Auges und der Augenlieder ist die Augenspalte leicht geschlossen, und die Pupille hinter dem oberen Augenliede nach oben und etwas nach innen gerichtet. Durch den M. rectus superior wird die Hornhaut und Pupille nach oben, durch den M. rectus inferior nach unten, durch den M. rectus externus nach aufsen, durch den M. rectus internus nach innen gerichtet; die combinirte Wirkung zweier dieser Muskeln gibt die

pille eine Stellung zwischen zwei jener Hauptrichtun-
: z. B. die Mm. rectus internus und rectus inferior brin-
sie schräg nach unten und innen, u. s. w.: durch succes-
e Wirkung der einzelnen Muskeln wird die Pupille im
eise gerollt. Die gleichzeitige Contraction aller geraden
genmuskeln zieht den Augapfel in die Augenhöhle zurück,
ch nur in sehr geringem Grade: zugleich wird aber
Augapfel an seiner oberen, unteren, Schläfe- und Na-
seite durch die ihn umgebenden geraden Augenmuskeln
primirt, der senkrechte und horizontale Durchmesser
kürzt, die Augenaxe verlängert, der hintere Umfang des
skörpers und der Retina mehr gespannt, und die Plica
ralis der letzteren flacher. — Der M. obliquus supe-
, (welcher nicht in der Richtung seines Bauchs, sondern
er Richtung seiner Sehne von der Trochlea an wirkt)
t den hinteren Umfang des Augapfels nach oben und
n, richtet daher die Pupille nach unten und aufsen,
gt sie beim Öffnen des Auges mitten in die Augenlied-
te, und stellt den grofsen Diagonaldurchmesser des Aug
ls in die Richtung der Augenspalte: aufserdem bewirkt
as schnelle Herabsteigen des unteren Augenliedes, indem
en Augapfel über dasselbe hinwälzt. Der M. obliquus
ior zieht den hinteren Umfang des Bulbus nach unten,
nach aufsen, indem er einen grofsen Theil des Bul-
umfafst und unter dem M. rectus inferior bogenförmig
uft: drängt dabei den ganzen Augapfel nach innen
vorn, und wendet die Pupille nach innen und oben.
Blinzeln führt er die Hornhaut, indem die Augenspalte
schliefst, genau an der hinteren Fläche des oberen Au-
ieds nach innen und oben, wonach sie vom M. obli-
superior wieder zurück in die sich öffnende Augen-
e gebracht wird: diese Bewegung verbreitet die Thrä-
lüssigkeit über die ganze vordere Fläche des Augapfels.
ken beide Mm. obliqui zugleich, so ziehen sie den
apfel aus der Augenhöhle nach vorn, so dafs er
er aus der Augenliederspalte hervortritt: wird aber
eres durch eine gleichzeitige Contraction des M. orbi-
ris palpebrarum und Verengerung der Augenspalte
ndert, so verkürzen die Mm. obliqui die Augenaxe.

Die Augenmuskeln erhalten ansehnliche Nerven und sind überhaupt der Willkühr unterworfen, wenn gleich die Contractionen der schiefen Augenmuskeln sehr häufig auch automatisch vor sich gehen.

Nase.

Die Nase, *Nasus*, ist das Organ des Geruchs, *Organon olfactus*, gehört aber als Luftweg auch den Respirationsorganen an, indem durch sie hin die Luft in den Schlundkopf, Kehlkopf und die Lungen dringt. Sie besteht aus der äufseren Nase und der Nasenhöhle mit ihren Nebenhöhlen.

Die *äufsere Nase, Nasus externus*, hat eine längliche, dreiseitig pyramidalische Gestalt, deren breiterer Theil oder *Basis* nach unten liegt. Das obere schmalere Ende der Nase zwischen den Augenhöhlen ist die Nasenwurzel, *Radix nasi*; der vordere breite abgerundete Rand ist der Nasenrücken, *Dorsum nasi*, welcher entweder gerade oder convex oder concav ist, und mit der Nasenspitze *Apex nasi*, endigt. Die Seitenwände der Nase sind oberwärts leicht gewölbt, weiter nach unten schwach concav, an ihrem unteren Ende, nach hinten zu, bilden sie die mehr hervorragenden gewölbten Nasenflügel, *Alae* s. pinnae nasi. Die untere Fläche der Nase ist von vorn nach hinten kaum halb so lang, als der Nasenrücken; man findet an ihr die beiden länglichen und von vorn nach hinten und aufsen gerichteten Nasenlöcher, *Nares* s. Nares externae, welche auswärts von den Nasenflügeln begränzt, und durch den untersten Theil der Nasenscheidewand, durch das *Septum mobile narium*, von einander geschieden werden.

Die Grundlage der äufseren Nase besteht aus den Nasenbeinen und den einzelnen Nasenknorpeln, welche inwendig von Bein- oder Knorpelhaut und von Schleimhaut bekleidet, auswendig aber von den Nasenmuskeln und der Gesichtshaut überzogen werden. Die Nasenbeine (S. 12[illegible] bilden nur den oberen kleineren Theil der äufseren Nase; der

rpelige Theil der Nase ist an den Umfang der Apertura iformis geheftet, und verschliefst diese, bis auf die Nalöcher, vollständig. Die beiden Seitenwandknorpel der e, *Cartilagines nasi laterales, dexter et sinister*, sind unregelmäfsig dreieckiger Gestalt, platt, bilden den fseren mittleren Theil der Seitenwand, verschmelzen an Nasenrücken vollkommen mit einander und mit dem tilago septi nasi; und sind oberwärts an die Nasenbeine, erwärts an die Processus nasales der Oberkieferbeine ch Sehnengewebe (Übergang des Periosteum in das chondrium), geheftet. Die beiden unteren Nasenknorpel, *tilagines nasi inferiores* s. *alarum nasi* s. pinnales, sind nal, platt und stark gekrümmt, bilden den vorderen il der Nasenflügel und die Nasenspitze; biegen sich an letzteren nach hinten um und gehen in das Septum ile über, dessen unteren breiteren Theil sie bilden und erwärts an die Spina nasalis anterior sich heften. In hinteren Theile eines jeden Nasenflügels finden sich drei kleine platte Knorpelstücke, *Cartilagines alarum minores s. posteriores*; öfters auch noch ein kleineres schen diesen und dem Cartilago nasi lateralis. Alle e kleineren Knorpel sind unter einander und mit den enwandknorpeln durch zellulös-fibröse, hautähnliche breitungen verbunden. — Der Scheidewandknorpel, *tilago septi nasi*, ist platt und ungleich viereckig, bildet vorderen Theil der Scheidewand der Nasenhöhle, ist erwärts mit dem unteren Rande der Lamina perpenlaris oss. ethmoidei und dem vorderen Rande des Vomer unden; vorn am Nasenrücken mit den Cartilagines rales verschmolzen; unterwärts reicht er nicht bis zu Nasenlöchern herab, sondern ist mit den Cartilagines inferiores im Septum mobile nur durch ein zellulösises Blatt und durch die bekleidende Schleimhaut vergt. Gewöhnlich ist der Cartilago septi nach der rechoder linken Seite hin ausgebogen, aber nur sehr selten einem Loche durchbohrt. — Die Muskeln der äufseNase s. S. 216. — Die äufsere Haut der Nase ist ch kurzes, beinahe fettloses Zellgewebe ziemlich straff lie Knorpel und Muskeln geheftet, und mit vielen und hnlichen Cryptae sebaceae versehen, welche zum Theil

eine Tiefe von $\frac{1}{2}'''$, eine Weite von $\frac{1}{3}'''$ haben, und au ihrem Boden durch kleine Grübchen oder schlauchartig Verlängerungen vertieft sind. Sie geht an den Nasen löchern in die Schleimhaut der Nasenhöhle über, woselbs kurze steife Haare, *Vibrissae,* welche meistens $\frac{1}{18}'''$ brei und $\frac{1}{25}'''$ dick sind, in ihr wurzeln.

Die *Nasenhöhle*, *Cavum nasi*, mit ihren *Neben höhlen*, *Sinus nasi accessorii*, von der äufseren Nas und von Knochen (S. 141) gebildet, steht durch die Choana mit dem Schlundkopfe in Verbindung, und ist überall vo der Nasenschleimhaut, *Membrana mucosa nasi* s. Membran pituitaria narium s. Membrana Schneideriana, überzoge Diese fliefst an den Nasenlöchern mit der Gesichtshaut, a den Choanae mit der Schleimhaut des Gaumens und Schlund kopfes zusammen: in der eigentlichen Nasenhöhle ist si genau an das Periosteum geheftet, lebhaft rosenroth, seh gefäfsreich, weich, rauh, zottig, und mit ansehnliche Cryptae mucosae versehen; welche an ihrer inneren, mi der Beinhaut verwachsenen Fläche grofse zusammenhan gende Schichten bilden. Ihre Dicke, zusammt der Schich der Schleimdrüsen, beträgt $\frac{1}{2}'''$ bis $1'''$; daher die von ih bekleideten Muscheln und Nasenscheidewand eine Dick von $2'''$ bis $2\frac{1}{2}'''$ darbieten, der Raum zwischen den Mu scheln und der Nasenscheidewand nur $1'''$ bis $2'''$ weit ist und die ganze Nasenhöhle im frischen Zustande beträcht lich enger erscheint, als die knöcherne Nasenhöhle: — de Meatus narium inferior eine Weite von $2'''$ bis $3'''$ un eine Höhe von $5'''$ bis $7'''$ hat. Die freie Fläche de Schleimhaut ist von einem weichen Epithelium überzoge und stets von dem zähen Nasenschleim befeuchtet: nu innerhalb der knorpeligen Nase ist sie etwas trockner un blasser gefärbt. Im Meatus narium inferior, $\frac{3}{4}''$ bis 1 von dem hinteren Rande des Nasenlochs entfernt und 4 oberhalb des Bodens der Nasenhöhle, findet sich in de Schleimhaut eine $1\frac{1}{2}'''$ lange, schmale Spalte, die Öffnun des Thränennasenganges (S. 402): welcher, gleich der Thränensack, vorzüglich von dieser Haut gebildet wird Am Boden der Nasenhöhle dringt sie, an der rechten un linken Seite der Crista nasalis, mit einer hohlen trichter förmigen Verlängerung in den Canalis incisivus ein, durc

lche eine sehr enge Communication zwischen der Nasen- Mundhöhle vermittelt wird. An der Öffnung des Sinus cillaris im Meatus narium medius bildet sie einen wul- en Rand, der diese Öffnung bis auf einen Dm. von $1\frac{1}{2}'''$ engert. In den Nebenhöhlen der Nase, vorzüglich in Sinus sphenoidales und Cellulae ethmoidales, ist sie sser, weniger gefäfsreich, glatter, beträchtlich dünner, serer an die Knochen geheftet, aber in alle Vertiefungen lringend; ihre Schleimdrüsen sind hier mehr vereinzelt sehr klein, und der von diesen abgesonderte Schleim ner und wässeriger.

Das (mit den Thränen vermischte) Secret der Nasen- le ist wasserhell oder weifslich opak, bietet sowohl in Haupthöhle als in den Nebenhöhlen die physischen nschaften des Schleims dar, und enthält ziemlich spar- Schleimkörnchen von $\frac{1}{800}'''$ Dm. Es ist zusammen- tzt aus

igenthümlichen Schleim	5, 33
lkoholextract mit milchsaurem Alkali	0, 30
hlorkalium und Chlornatrium	0, 56
Vasserextract mit Spuren von Eiweifs und phosphorsauren Salzen	0, 35
atron mit Schleim	0, 09
Vasser	93, 37
	100, 00

In der Schleimhaut der Nasenhöhle verbreiten sich die reichen Äste des Geruchsnerven, *Nervus olfactorius*, he an jeder Seite mit einer doppelten Reihe durch die mina cribrosa oss. ethmoidei in die Nasenhöhle ein- gen. Die äufsere Reihe vertheilt sich an der inneren id des Labyrinthus oss. ethmoidei, an die obere und lere Muschel; die innere, aus zahlreicheren Ästen ehende Reihe an den oberen und vorderen Theil der nscheidewand. Anfangs laufen sie in unvollständigen ilchen und flachen Furchen der Knochen und zwischen Knochen und der Schleimhaut, vielfach verästelt und förmig vereinigt; zuletzt verlieren sie sich mit ihren ten, sehr weichen Enden in der freien Fläche der eimhaut. Sie dringen weder in den unteren Theil der

Nasenhöhle noch in die Nebenhöhlen. Die übrigen zahlreichen Nerven der Nase stammen vom Ganglion sphenopalatinum und vom N. trigeminus.

Mundhöhle.

Die Mundhöhle, *Cavum oris*, bildet den Anfang des Speiserohrs oder allgemeinen Nahrungskanals, Tubus cibarius s. Canalis alimentarius, indem sie das *Geschmacksorgan*, *Organon gustus*, enthält und in ihr die Nahrungsmittel durch Kauen und Vermischung mit Speichel ihre erste Veränderung erleiden: ferner dient sie als *Luftweg* und als *Sprachorgan*, *Organon loquelae*, indem sie die im Kehlkopfe hervorgebrachten Laute articulirt und die Buchstaben, vorzüglich die Mitlauter, bildet. Sie liegt unter der Nasenhöhle im unteren Theile des Gesichts vorn und zum Theil an den Seiten von den Alveolartheilen des Ober- und Unterkiefers, von den Backen und Lippen begränzt; zwischen den letzteren befindet sich der Eingang in die Mundhöhle, die Mundspalte, Os. Oben wird sie durch den harten Gaumen, Palatum durum, von der Nasenhöhle getrennt, unterwärts durch die, zwischen dem Unterkiefer und dem Zungenbein ausgespannten, Mm. mylohyoidei und Mm. geniohyoidei geschlossen, indem diese den eigentlichen Boden der Mundhöhle bilden. Hinten gränzt sie an den mittleren vorderen Theil des Schlundkopfs, den sogenannten Rachen, Fauces; sie wird von der Höhle des letzteren durch eine bewegliche Scheidewand, das Gaumensegel, Velum palatinum, nur unvollständig getrennt, und steht mit ihm durch eine Öffnung zwischen dem Gaumensegel und der Zungenwurzel in Verbindung, welche Öffnung man die Rachenenge, Isthmus faucium, nennt. Innerhalb der Mundhöhle ragen vorn und an den Seiten die Alveolarränder der Kiefern und die Zähne hervor; ihr Boden wird von der Zunge, Lingua, und einem Paar von Speicheldrüsen, den Glandulae sublinguales, eingenommen: die übrigen Speicheldrüsen liegen aufserhalb der Mundhöhle an den

ren und den äufseren Wänden derselben. Die Mund-
eimhaut, Membrana mucosa oris, überzieht den ganzen
ren Umfang der Mundhöhle und die in ihr liegenden
ile, mit Ausnahme der Kronen der Zähne, hängt an
Lippen mit der äufseren Haut, am Isthmus faucium
der Schleimhaut des Schlundkopfs und Kehlkopfs zu-
men.

Lippen.

Die Lippen, *Labia oris*, sind mit ihrem dünneren be-
gten Rande an die Vorderflächen der Limbi alveolares
ftet, mit ihrem dickeren rothen freien Rande begränzen
lie *Mundspalte, Os* s. Fissura oris, und vereinigen sich
en etwas vertieften *Mundwinkeln*, *Anguli oris*, mit ein-
r und mit den Backen; welche Stellen man die *Com-
ırae labiorum, dextra et sinistra*, nennt. Die Oberlippe,
um superius, ist länger und meistens hervorragender,
ie Unterlippe, zeigt eine breite, flache, von der Scheide-
l der Nasenlöcher herablaufende Furche, *Philtrum*, und
durch eine flache, bogenförmig von den Nasenflügeln
blaufende Furche, *Sulcus naso-labialis*, von den Wan-
getrennt: dagegen die Unterlippe, *Labium inferius*,
h eine queerlaufende Furche, *Sulcus mento-labialis*,
dem Kinn geschieden. Die vorderste Schicht der Lip-
wird von der Gesichtshaut gebildet; sie ist zart, weich,
Talgdrüsen reichlich versehen, mit zahlreichen feinen
stärkeren Haaren besetzt: diese bilden bei Männern
r Oberlippe den *Schnauzbart*, *Mystax*: auch die Unter-
trägt am Sulcus mento-labialis zahlreiche Barthaare,
he gleich den Barthaaren des Kinns eine Breite von
und eine Dicke von $\frac{1}{30}'''$ zu haben pflegen. — Hinter
r vorderen Hautplatte der Lippen liegt nur wenig
r Zellstoff mit körnigem Fett, und an der Oberlippe
ndfasern des Mm. levator labii superioris alaeque nasi,
maticus minor und zygomaticus major: sodann folgt
M. orbicularis oris und auf jeder Seite die Endigungen
Mm. levator labii superioris proprius, levator anguli
buccinator, depressor anguli oris, u. quadratus menti,
he ihre Fasern mit denen des M. orbicularis oris mi-
ı. Die hintere Fläche der Lippen wird von der Mund-

schleimhaut gebildet, welche an dem rothen Rande der Lippen anfängt, roth und rauh ist; indessen durch ihre Bekleidung von dickerem Epithelium und Befeuchtung durch Schleim und Speichel glatt erscheint. In der Mittellinie einer jeden Lippe, nahe an ihrem Übergange an die Alveolarränder, bildet die hintere Hautplatte eine schmale senkrechte Falte, die *Lippenbändchen*, *Frenulum labii superioris* und *Frenulum labii inferioris*, von denen das erstere stärker hervorspringt. Zwischen der Schleimhaut und den Muskeln liegen zahlreiche, ansehnliche, linsenförmige Schleimdrüsen, *Glandulae labiales*.

Die Lippen dienen vorzüglich zum Fassen der Nahrungsmittel, zur Bildung der Lippenbuchstaben und zum Ausdruck verschiedener Gemüthszustände.

Backen.

Die Backen, *Buccae*, werden von Gesichtshaut, die bei Männern einen Theil des Bartes trägt, von einer ansehnlichen Menge Fett, vom M. buccinator, zum Theil auch von den Mm. zygomaticus major, risorius Santorini, depressor anguli oris und masseter — endlich von der Mundschleimhaut gebildet; welche hier dünner ist, oben und unten an die Kieferknochen sich heftet, und hinten zum Gaumensegel übergeht. Zwischen ihr und den Fasern des M. buccinator, zum Theil auch an der äufseren Fläche des genannten Muskels, liegen Schleimdrüsen, *Glandulae buccales*, welche den Lippendrüsen ganz ähnlich sind: die in der Gegend des letzten Backenzahns liegenden sind zu zwei bis drei gröfseren drüsigen Massen zusammengehäuft, und werden *Glandulae molares* genannt. Aufser den Ausführungsgängen dieser Drüsen zeigt sich in der Mitte der inneren Fläche der Backen eine gröfsere Öffnung für den Ductus Stenonianus.

Die Backen sind besonders beim Kauen, Schlingen, Blasen, Ausspeien und Ausspritzen thätig.

Zähne.

Die Zähne, *Dentes* (S. 83), ragen nur mit ihren Kronen frei in der Mundhöhle hervor, indem ihre Hälse von dem *Zahnfleische*, *Gingivae*, genau umschlossen werden

ses ist der, die Alveolarränder des Ober- und Unter-
fers überziehende Theil der Mundschleimhaut, welche
r $\frac{1}{2}'''$ dick, härtlich, von bei weitem derberer und feste-
Textur, als die anderen Stellen der Mundschleimhaut
und durch kurzen Zellstoff an die Beinhaut der Alveo-
ränder und die der Alveoli selbst genau angeheftet wird.
Die 32 Zähne des erwachsenen Menschen sind in der
enförmigen oberen und unteren *Zahnreihe, Arcus den-
superior et inferior*, in gleicher Anzahl, 16 in jeder
ie, vorhanden und einander gleich gebildet; nur dafs
obere Reihe meistens etwas stärker hervorragt und
Zähne etwas gröfser sind. Die Function der Zähne
las Fassen, Lostrennen und Zermalmen härterer Nah-
smittel, und die Bildung einiger Buchstaben. Sie wer-
nach ihrer Gestalt und Stellung in folgende Ordnungen
theilt:

Die 8 *Schneidezähne* oder Vorderzähne, *Dentes
isivi* s. incisores s. primores, stehen in der Mitte der
er am weitesten nach vorn, 4 in jeder Reihe. Die
ie eines jeden dieser Zähne ist meifselförmig, breit,
, auf der vorderen Fläche convex, auf der hinteren
ie concav: an der zu einer Schneide geformten Kaufläche
er, aber dünner; an der Basis der Krone schmaler,
von vorn nach hinten dicker. Die Schneide ist im
unversehrten Zustande mit drei sehr kleinen Zacken
zt, die durch das Kauen bald abgeschliffen werden.
Hals ist schmaler als dick, die Wurzel einfach und
lich kurz, und etwas plattgedrückt. Die beiden vor-
n Schneidezähne der ersten Reihe sind die ansehn-
ten.

Die 4 *Eck-* oder *Hundszähne, Dentes angulares*
nini s. cuspidati s. laniarii, folgen auf die Schneide-
e: jede Reihe enthält 2, an jeder Seite einen, welcher
r dem zweiten Schneidezahn steht und der dritte in
Reihe von der Mittellinie an ist. Ihre Kronen sind
er, dicker und länger als die der Schneidezähne, rund-
und endigen mit einer stumpfen Spitze, die vorn con-
hinten in zwei Facetten abgeplattet ist. Die Wurzeln
einfach, einen starken, etwas plattgedrückten Zapfen

bildend, und sehr lang, vorzüglich die der oberen Eckzähne oder sog. Augenzähne.

Die 20 *Backenzähne* oder Stockzähne, *Dentes molares*, haben grofse, niedrige, rundlich viereckige Kronen und gespaltene Wurzeln, und zerfallen in kleine und grofse Backenzähne. Erstere, *Dentes molares minores* s. molares anteriores s. bicuspidati, folgen zunächst auf die Eckzähne: an jeder Seite, oben und unten, finden sich zwei, also 8 überhaupt. Ihre Kronen sind schmaler als dick, und laufen in zwei kurze, stumpfe, nach aufsen und innen stehende und durch eine Furche getrennte Spitzen aus; ihre Wurzeln sind doppelt, oder auch zu einem einfachen, platten, nur am Ende gespaltenen Zapfen zusammengeflossen; aber auch in dieser Form jedesmal mit zwei Kanälen (für die Gefäfse und Nerven) versehen. Die *Dentes molares majores* s. posteriores sind die drei, an jedem Ende beider Reihen am meisten nach hinten stehenden Zähne 12 in ganzer Anzahl; sie haben sehr grofse, aber niedrige Kronen, die gleich breit als dick sind und an der Kaufläche in vier (selten fünf), durch eine Kreuzfurche getrennte Spitzen auslaufen; und sind mit doppelten oder vierfachen meistens jedoch dreifachen Wurzeln, von denen die eine stärker zu sein pflegt, versehen. Die Backenzähne der oberen Reihe haben oft eine Wurzel mehr, als die ihnen entsprechenden Zähne der unteren Reihe; der erste grofse Backenzahn hat gewöhnlich die ansehnlichste Krone; dagegen hat der dritte oder letzte, der sog. Weisheitszahn Dens sapientiae, öfters eine besonders niedrige Krone und kurze verbogene Wurzeln, zuweilen nur eine einfach kegelförmige Wurzel. Dieser letzte grofse Backenzahn bricht bei manchen Menschen gar nicht hervor; seltener fehlen andere Zähne gänzlich; zuweilen finden sich überzählige, die alsdann entweder in den Zahnreihen selbst oder aufserhalb derselben stehen. Die Kronen sind in seltenen Fällen gekrümmt oder mit den zunächst stehenden zusammengeflossen; überhaupt aber solchen Varietäten bei Weitem seltener unterworfen, als die Wurzeln.

Unter den 20 *Wechselzähnen*, Milch- oder Kindszähne, *Dentes decidui* s. lactei s. infantiles, welche im ersten und zweiten Lebensjahre ausbrechen und vom siebenten bis

zehnten gewechselt werden, sind die 8 Schneide- und kzähne den bleibenden Zähnen der Erwachsenen (*Den- permanentes*), hinsichtlich der Gestalt ihrer Kronen, ähnlich. Die 8 Wechselbackenzähne folgen auf die ähne und nehmen die Stellen der Dentes molares mi- s permanentes ein, von welchen sie späterhin verdrängt len; ihre Kronen sind aber breit, viereckig, mit vier fünf Spitzen versehen; und gleichen daher denen der en Backenzähne der Erwachsenen. (Über den Zahn- uch und Wechsel s. Bd. II.)

Gaumen.

Der *harte* oder *knöcherne Gaumen, Palatum m* s. osseum s. stabile ist S. 143 beschrieben. Der Theil Mundschleimhaut, welcher ihn überzieht, Membrana i, ist dick und mit ansehnlichen, gedrängt stehenden imdrüsen an seiner oberen Fläche besetzt, welche n kurzen Zellstoff ziemlich fest mit der Beinhaut des nens verwachsen ist. In dieser Schleimhaut finden sich r den Schneidezähnen zwei, durch einen warzenähn- n Vorsprung der Schleimhaut getrennte, trichterför- Öffnungen: diese sind die unteren Mündungen der n engen von der Schleimhaut gebildeten Kanäle, ie von dem Boden der Nasenhöhle durch den Canalis vus herabsteigen (S. 430), und vermittelst welcher allein die Schleimhaut der Mund- und Nasenhöhle lbst zusammenhangen, sondern auch beide Höhlen selbst unniciren; indessen sind diese Kanäle, *Canales naso- ini*, ungeachtet der gröfseren Weite ihrer oberen und en Mündung, in der Mitte ihres Verlaufs sehr eng, $\frac{1}{5}'''$ im Dm. haltend. In die Foramina palatina po- ra dringt dagegen die Schleimhaut nicht ein.

Das *Gaumensegel* oder der *weiche Gaumen, Velum tinum* s. Palatum molle s. Velum pendulum palati, ne auf jeder Seite doppelte, Muskelfasern und Schleim- n einschliefsende Falte der Schleimhaut des Mundes Schlundkopfes, welche vom unteren Rande der Choanae g nach hinten gegen die Zungenwurzel herabsteigt. vordere etwas concave Fläche des Gaumensegels ist schräg gegen die Zungenwurzel, die hintere etwas

convexe Fläche gegen die hintere und obere Wand des Pharynx gerichtet; der obere Rand an den hinteren Rand des harten Gaumens befestigt; der äufsere, rechte und linke, sehr breite Rand mit der Seitenwand der Mundhöhle und Seitenwand des Pharynx verschmolzen: der untere bogenförmige Rand mit dem Zäpfchen ragt frei gegen die Zungenwurzel herab. Das *Zäpfchen*, *Uvula* s. Staphyle, ist der mittlere Theil des Gaumensegels: ein kegelförmiger, an der Spina palatina befestigter, vorzüglich durch angehäufte Schleimdrüsen und durch einen Muskel gebildeter Vorsprung. Zu beiden Seiten des Zäpfchens besteht das Gaumensegel aus einer vorderen und hinteren bogenförmigen Falte, die sog. *Gaumenbögen*, *Arcus palati*, deren freie Ränder nach unten und innen gerichtet sind. Die vordere Falte oder Bogen ist der *Arcus glossopalatinus* welcher oben mit dem Zäpfchen, unten mit der Schleimhaut der Seitenränder der Zungenwurzel zusammenfliefst. Die hintere, etwas dickere und weniger gebogene Falte, *Arcus pharyngopalatinus* s. palatopharyngeus, erhebt sich aus der Schleimhaut der Seitenwand des Pharynx, und erstreckt sich gleichfalls bis zum Zäpfchen. Der Raum zwischen den beiden Bögen auf der rechten und linken Seite ist fast dreieckig, bezeichnet die Gränze zwischen der Seitenwand der Mundhöhle und der Seitenwand des Pharynx, und enthält die sog. *Mandel*, *Tonsilla* s. Amygdala. Diese ist eine längliche, plattrundliche, 6‴ lange und 4‴ breite Drüse eine Glandula aggregata, aus zusammengeflossenen Cryptae mucosae bestehend; sie ist an ihrer inneren, dem Isthmus faucium zugewandten Fläche von der Schleimhaut überzogen und von einem Wulst derselben umgeben; und ergiefst den von ihr secernirten Schleim aus mehreren weiten Öffnungen. Aufserdem enthält die Schleimhaut des Gaumensegels — welche vorne mit der des harten Gaumens und der Zunge, hinten mit der Schleimhaut der Nasenhöhle an den unteren Rändern der Choanae und mit der des Pharynx ununterbrochen zusammenhängt — noch sehr zahlreiche Schleimdrüsen, die vorzüglich im Zäpfchen, in dem oberen dickeren Rande des Gaumensegels, und in dem Raume zwischen den beiden Bögen, am Umfange der Tonsillen, zusammengehäuft sind.

Die *Muskeln des Gaumensegels* liegen theils in
r ganzen Länge zwischen den Schleimhautplatten dessel-
wie der M. uvulae, M. glossopalatinus und M. pharyngo-
inus: theils liegen sie entfernter vom Gaumen, an der
s cranii, und treten nur mit ihren Enden in das Gau-
segel ein, wie der M. levator veli palatini und M.
or veli palatini. Alle diese Muskeln, mit Ausnahme des
aren M. uvulae, nehmen ihre Richtung von beiden
en gegen die Mitte des Gaumensegels hin und fliefsen
lbst zum Theil in einander über.

M. uvulae s. azygos uvulae s. palatostaphylinus, Zapfen-
el; ein kleiner länglicher Muskel, welcher von der
a palatina entspringt; zwischen den Schleimdrüsen des
chens, der hinteren Fläche desselben näher als der
eren, herabsteigt, und die Uvula in die Höhe und rück-
s zieht und sie verkürzt.

M. glossopalatinus s. constrictor isthmi faucium, Gau-
schnürer, Zungengaumenmuskel. Ein plattrundliches
kelbündel, welches am Seitenrande der Zungenwurzel
n Anfang nimmt, indem es mit den Muskelfasern der
ge zusammenhängt: läuft im Arcus glossopalatinus bogen-
ig aufwärts, und fliefst an der Basis des Zäpfchens mit dem
anderen Seite zusammen. Beide Gaumenschnürer zie-
die Arcus glossopalatini herab, spannen sie an und
rn sie der Zungenwurzel: durch ihre Verbindung mit
Zungenwurzel bewirken sie, dafs die Arcus glossopa-
i den Bewegungen der lezteren folgen.

M. pharyngopalatinus s. palatopharyngeus, Rachen-
irer, Schlundkopfgaumenmuskel; geht von der seitli-
und hinteren Wand des Pharynx, aus den Muskelfa-
desselben, vorzüglich aus dem M. constrictor pharyn-
nedius hervor, und läuft im Arcus pharyngopalatinus
um Zäpfchen; woselbst er sich mit dem der anderen
e und mit dem M. glossopalatinus verwebt. Die beiden
pharyngopalatini nähern die Arcus pharyngopalatini
nder, indem sie diese Bögen beinahe gerade strecken;
ziehen das Gaumensegel etwas herab und nach hinten.

M. levator veli palatini s. petro-salpingo-staphylinus
ristaphylinus internus, Gaumenheber: ist länglich rund-
; entspringt von der unteren Fläche der Pyramide des

Schläfebeins, nahe vor dem Foramen caroticum externum, und von dem knorpeligen Theile der Tuba Eustachii (Salpinx); steigt an dem obersten Theile der Seitenwand des Pharynx, genau an der Schleimhaut derselben und oberhalb des M. constrictor pharyngis superior verlaufend, nach vorn und innen herab; geht zwischen den Bündeln des M. pharyngopalatinus hindurch und verbindet sich mit den Endfasern desselben; und breitet sich, mit dem der vorderen Seite zusammenfliefsend, im Gaumensegel aus. Hebt das Velum palatinum in die Höhe und zieht es etwas nach hinten, erweitert den Isthmus faucium in der Richtung nach oben.

M. tensor veli palatini s. circumflexus palati s. spheno-salpingo-staphylinus s. peristaphylinus externus, Gaumenspanner: länglich platt und dünn, liegt an der äufseren Seite des vorigen, von dem hinteren oberen Theile der Fascia buccopharyngea bedeckt und mit dieser verwachsen: entspringt sehnig von der Lamina interna proc. pterygoidei, von der Spina angularis oss. sphenoidei und dem Knorpel der Tuba Eustachii; läuft fleischig nach vorn und unten und geht in eine schmale platte Sehne über. Diese schlägt sich von aufsen nach innen um den Hamulus pterygoideus (Schleimbeutel); und breitet sich als dünne Aponeurose, in horizontaler Richtung, im Gaumensegel aus, bis zur Mittellinie desselben hin, woselbst sie mit der der anderen Seite sich vereinigt: auch verbindet sie sich mit dem M. levator palatini, der sich hinter ihr ausbreitet, und mit dem M. pharyngopalatinus. Spannt das Gaumensegel in queerer Richtung aus und bewegt es etwas nach vorn.

Das Gaumensegel ist vorzüglich thätig

1) beim Kauen, indem es ein wenig herabsteigt, der erhobenen Zungenwurzel sich nähert und diese umfafst (Wirkung der Mm. glossopalatini), und dadurch das Entweichen des Bissens nach hinten verhütet.

2) Beim Schlingen, indem sein vorderer oberer Theil durch die Mm. tensores veli palatini queergespannt und etwas nach vorn bewegt wird; die Arcus glossopalatini sobald der Bissen zwischen ihnen hindurch gegangen ist die erhobene Zungenwurzel umfassen (Mm. glossopalatini) und nunmehr der Gaumen in der Mitte sich erhebt (Mm.

ıtores veli palatini und M. uvulae) und die Arcus pha-
gopalatini gerade gestreckt sich einander nähern und
ıahe berühren (Mm. pharyngopalatini): so dafs mit Hülfe
Uvula eine Scheidewand zwischen dem oberen hinteren
dem unteren vorderen Theile der Höhle des Schlund-
fs gebildet wird.

3) Bei der Bildung der Gaumenbuchstaben, indem die
ıgenwurzel und die vordere Fläche des Gaumensegels
einander nähern (Wirkung der Mm. tensores und
sopalatini).

4) Beim Singen, indem es bei der Hervorbringung
er Töne in der Mitte sich erhebt (Mm. levatores), das
fchen nach hinten sich richtet (M. uvulae), und die
ıs pharyngopalatini sich strecken und einander nähern,
ch in geringerem Grade als beim Schlingen (Mm. pha-
gopalatini): — dagegen das Gaumensegel bei tiefen Tö-
queer ausgespannt wird (Mm. tensores), und durch
kürzung der Uvula (M. uvulae) und Herabsinken des
ynx, mit welchem die Arcus pharyngopalatini zusam-
hangen, mehr die Gestalt eines weiten flachen Bogens
mmt.

5) Aufserdem ist der Gaumen, vorzüglich das Gaumen-
i, für manche Arten von Geschmäcken empfänglich.

Z u n g e.

Die Zunge, *Lingua* s. Glossa, hat eine längliche, ab-
ndet viereckige, plattgedrückte Gestalt; ihr hinterer
erer Theil, die Zungenwurzel, *Radix linguae*, ist an
Os hyoides und den Kehldeckel geheftet: ihre obere
exe Fläche oder der Zungenrücken, *Dorsum linguae*,
völlig frei; auf demselben bemerkt man mehrere queer-
ende flache Furchen, und eine mittlere Längenfurche;
che hinten, auf dem Rücken der Zungenwurzel, eine
eckige Vertiefung, *Foramen coecum linguae*, enthält:
hinteren Ende der Längenfurche zeigt sich eine,
Kehldeckel übergehende, Schleimhautfalte, *Frenulum*
lottidis s. Lig. glosso-epiglotticum. Auch die abgerun-
n Seitenränder und die gleichfalls abgerundete dünnere
genspitze, *Apex linguae*, liegen frei; indessen hangen
Seitenränder an der Zungenwurzel mit dem Gaumen-

segel zusammen. Die untere Zungenfläche ist nur unterhalb der Seitenränder und der Spitze frei, dagegen mit ihrem mittleren Theile an dem Boden der Mundhöhle angewachsen und ruhet auf den Mm. geniohyoidei und mylohyoidei: unter der Zungenspitze zeigt sich in der Mittellinie eine Schleimhautfalte, das *Zungenbändchen*, *Frenulum linguae*.

Die Substanz der Zunge ist aus einem Knorpelblatt, aus Muskelfasern oder dem Fleisch der Zunge, welche den gröfsten Theil der Masse der Zunge ausmachen, aus der dicken Mundschleimhaut, welche alle freien Flächen der Zunge überzieht, aus Schleimdrüsen und aus zahlreichen Gefäfsen und Nerven zusammengesetzt.

Der *Zungenknorpel*, *Cartilago lingualis*, ist ein kleines und dünnes Knorpelblatt in der Mittellinie der Zungenwurzel: seine Flächen sind nach der rechten und linken Seite gerichtet, sein hinterer Rand durch einige Sehnenfasern an die vordere Fläche der Basis ossis hyoidei geheftet; übrigens ist er von allen Seiten von den Muskelfasern umgeben und verborgen.

Muskeln der Zunge.

M. hyoglossus, Zungenbein-Zungenmuskel, hat eine platte viereckige Gestalt, liegt am hinteren Seitentheile der Zunge, und läuft, vom Zungenbein entspringend, in der Richtung von unten und hinten nach oben und vorn. Er besteht aus drei abgesonderten Bündeln oder Portionen: das hintere platte und dünnere Bündel, *M. ceratoglossus* genannt, entsteht von dem Cornu majus ossis hyoidei und steigt an der Seite der Zungenwurzel aufwärts und vorwärts, zwischen den beiden Schichten des M. styloglossus, mit dessen Fasern er sich zum Theil vermischt. Das vordere dickere und schmalere Bündel, *M. baseoglossus*, kommt von der vorderen Fläche der Basis oss. hyoidei und geht nach vorn und oben: das mittlere kleinste Bündel, *M. chondroglossus*, kommt vom Cornu minus oss. hyoidei und läuft zwischen den beiden anderen, mit ihnen sich verwebend, aufwärts in die Zungensubstanz.

M. genioglossus, Kinn-Zungenmuskel, ist der ansehnlichste Muskel der Zunge, pyramidalisch gestaltet, und liegt nahe an der Mittellinie der Zunge, so dafs beide Mm. ge-

lossi nur durch eine Zellstoffschicht und den Cartilago
ıalis von einander getrennt werden. Entspringt mit
:m dünneren, sehnigen, vorderen Ende von der Spina
.alis interna, unter dem Frenulum linguae, über dem
eniohyoideus; seine Fleischfasern laufen rückwärts und
ın aufwärts, breiten sich büschelförmig aus und hef-
sich zum Theil an den Cartilago lingualis, reichen
gröfstentheils bis zu der Schleimhaut auf dem Rücken
Zunge.

M. styloglossus, Griffel-Zungenmuskel; anfänglich dünn
rundlich, nachher mehr von plattlänglicher, jedoch
aler Gestalt; entspringt vom Proc. styloideus und Lig.
mylohyoideum; läuft nach vorn und innen; spaltet
in zwei Schichten, von welchen die äufsere, stärkere,
: Schicht an der äufseren Seite des M. hyoglossus und
ıande der Zunge bis zur Zungenspitze — dagegen die
'e innere, queer nach innen gegen die Mittellinie des
ren Theils der Zunge läuft.

M. lingualis, Zungenmuskel, ist ein besonderes längli-
Muskelbündel, welches an der unteren Fläche der
'e sichtbar ist und vorne zwischen dem M. genioglossus
ler äufseren Schicht des M. styloglossus, hinten zwi-
. den Mm. genioglossus und hyoglossus, in der Rich-
von vorn nach hinten sich erstreckt. — Aufser diesem
ı sich noch viele andere, queerlaufende, eigenthüm-
Muskelfasern, besonders im vorderen Theile der
e, welche sämmtlich, so wie der sog. M. lingualis,
an die benachbarten Knochen geheftet sind.

Die Endfasern aller dieser Muskeln sind sehr lebhaft
weich, durch höchst zarte zellige Scheiden und sehr
ıe kleine Fettklümpchen von einander getrennt; durch-
:en und verweben sich mit einander und endigen theils
:r Schleimhaut, theils am Zungenknorpel; theils flie-
sie von beiden Seiten her in der Mittellinie zusammen.
bemerkt eine queerlaufende Schicht, die von den in-
ı Schichten der Mm. styloglossi und den eigenthümli-
Queerfasern der Zunge gebildet wird; eine obere und
untere longitudinale Schicht, welche den äufseren
:hten der Mm. styloglossi, den Mm. genioglossi, hyo-
i und linguales angehört; und eine perpendiculäre

Schicht, welche aus den sich aufwärts krümmenden Endfasern der Mm. genioglossi besteht.

Bewegungen der Zunge. Sie wird ausgestreckt durch die Mm. genioglossi; zurückgezogen durch die Mm. hyoglossi und styloglossi; breiter und kürzer gemacht durch die Mm. hyoglossi und linguales; zugespitzt, schmaler, länger und dicker gemacht durch die eigenthümlichen queeren Muskelfasern; gegen den Boden der Mundhöhle und gegen das Zungenbein herabgezogen durch die Mm. hyoglossi; gegen den harten Gaumen hinaufgehoben durch die Mm. styloglossi; hohl gemacht durch die äufsere Schicht der der Mm. styloglossi, welche die Zungenränder und Spitze erheben, und durch die Mm. genioglossi, welche die Mitte der Zunge herabziehen; auch durch die Queerfasern. Bei den schiefen Bewegungen der Zunge wirken nur die Muskeln der einen Seite allein; bei den rollenden Bewegungen die Muskeln der rechten und linken Seite abwechselnd.

Die *Schleimhaut der Zunge, Membrana mucosa linguae* s. Involucrum linguae, ist lebhaft roth, weich, ziemlich dick, am Zungenrücken mit den Enden der Muskelfasern genau verwachsen, an der unteren Zungenfläche und den Rändern lockerer mit den Muskeln verbunden. Vom Boden der Mundhöhle an bekleidet sie zuerst den Theil der unteren Fläche unterhalb der Seitenränder und Spitze; bildet unter den ersteren eine Reihe gefranzter zackiger Hervorragungen, *Fimbriae linguae*; dagegen unter der Zungenspitze, in der Mittellinie, eine longitudinale Falte, das *Zungenbändchen, Frenulum linguae,* welches vom Boden der Mundhöhle hinter der Spina mentalis interna aufsteigt und nicht ganz bis zur Zungenspitze reicht; es verhindert ein zu starkes Zurückweichen der Zunge; wenn es zu kurz ist, so beschränkt es die Bewegungen derselben. Neben dem Frenulum linguae zeigt sich zu beiden Seiten eine rundliche, von der Mündung eines Speichelganges durchbohrte Hervorragung der Schleimhaut, *Caruncula sublingualis.* An den Seitenrändern der Zunge geht die Schleimhaut ununterbrochen über theils in die Arcus glossopalatini, theils in den Überzug der Tonsillen zwischen den beiden Bögen des Gaumensegels; von dem Rücken der Zungenwurzel gelangt sie an die vordere Fläche des Kehl-

kels (Epiglottis), und bildet hier in der Mittellinie eine gitudinale Falte, *Frenulum epiglottidis* s. Lig. glosso-glotticum; und aufserdem zwei kleinere, zu den Seitendern des Kehldeckels sich erhebende Falten. Die freie rfläche der Schleimhaut hat, vorzüglich auf dem Zunrücken und an der Wurzel, ein rauhes höckeriges An-en, welches theils von den kleinen Queerrunzeln, theils den unter der Schleimhaut liegenden Schleimdrüsen, ls von den Geschmackswärzchen herrührt. Die Schleim-t wird von einem weichen *Epithelium linguae* s. Peri-tis überzogen, welches auf dem Zungenrücken vorzüg-dick ist, und wenn es von der Schleimhaut abgelöset an seiner befestigten Fläche zahlreiche Grübchen, die rücke der Geschmackswärzchen zeigt.

Die Schleimdrüsen der Zunge, *Glandulae mucosae linguae* liegen gröfstentheils unmittelbar an der angewachsenen he der Schleimhaut, zwischen dieser und den Muskel-n; sie sind vorzüglich grofs und hervorragend auf dem ken der Zungenwurzel in der Nähe des Foramen coecum, am hinteren Theile der Seitenränder neben den Gaubögen: meistens von linsenförmiger Gestalt und 1‴ breit nicht völlig $\frac{1}{2}$‴ dick, mit einfachen oder mehrfachen lungen und weiten Mündungen versehen. Einzelne sere 3‴ im Dm. haltende Glandulae aggregatae liegen r zwischen den Muskelfasern des Zungenrückens, und n mit den oberflächlichen durch Ausführungsgänge 2‴ bis 3‴ Länge in Verbindung; zwei ähnliche lie-zu jeder Seite des Frenulum linguae.

Die Geschmackswärzchen, Papillae linguales ustus, ragen auf der freien Fläche der Schleimhaut klich hervor und bestehen aus zahlreichen, büschel- und förmig sich ausbreitenden, kleinen Gefäfsen und zarten venendigungen, welche durch Zellstoff zusammengehal-und von dem Epithelium überzogen werden. Nach r Gestalt erhalten sie verschiedene Benennungen. Am reichsten finden sich dünne cylindrische Wärzchen, *illae filiformes*, und kegelförmig zugespitzte, *Papillae cae.* Beide Arten sind meistens $\frac{1}{4}$‴ lang und $\frac{1}{10}$‴ dick, Papillae conicae an ihrer Basis $\frac{1}{7}$‴ dick; nach dem hin-n Ende der Zunge hin werden sie beträchtlich kleiner,

$\frac{1}{15}'''$ lang und $\frac{1}{25}'''$ dick. Vorzüglich der vordere Theil des Rückens und der Ränder der Zunge ist mit diesen Arten von Wärzchen sehr dicht besetzt. Die *Papillae fungiformes* s. clavatae s. obtusae, stehen mehr vereinzelt zwischen den vorigen, sind weit geringer an Zahl, aber gröfser, und bestehen aus einem dünneren Stiele und einem dickeren, rundlichen, kolbigen Ende oder sog. Kopfe; sie haben eine Länge von $\frac{1}{3}'''$, einen Dm. von $\frac{1}{5}'''$ bis $\frac{1}{4}'''$ an der dünnstieligen Basis, und von $\frac{1}{4}'''$ bis $\frac{1}{3}'''$ an dem dickeren freien Ende. Von diesen drei Arten von Papillen stehen am vorderen Theile der Zunge 20 bis 24 Stück auf einer Quadratlinie. Die *Papillae vallatae* s. circumvallatae sind die ansehnlichsten Wärzchen, gewöhnlich 9 bis 14, wenigstens drei, höchstens zwanzig an der Zahl; sie stehen auf dem hinteren Theile des Zungenrückens in der Figur eines V, deren nach hinten gerichtete Spitze nahe vor dem Foramen coecum sich befindet. Das freie Ende oder Kopf jeder Papilla vallata ist abgeplattet, in der Mitte etwas vertieft, $\frac{4}{5}'''$ bis $\frac{5}{4}'''$ breit, und überall mit zarten Flocken oder Zasern besetzt und dadurch rauh; ihr dünnerer Stiel von $\frac{3}{5}'''$ bis $1'''$ Dm. steht in einer rundlichen Vertiefung der Schleimhaut, welche mit ihrem Rande den Stiel wie ein kreisrunder Wulst oder Wall von $\frac{2}{5}'''$ Breite umgibt.

Die Zunge enthält drei ansehnliche Nerven: den N. lingualis vom dritten Aste des N. trigeminus und den Stamm des N. hypoglossus, deren Äste sich mit einander verbinden und den Ramus lingualis des N. glossopharyngeus. Die Endzweige des N. lingualis dringen jedoch vorzugsweise an die Schleimhaut und die Papillen, daher dieser Nerv als der eigentliche Geschmacksnerv betrachtet wird; die Zweige vom N. glossopharyngeus vertheilen sich an die Muskeln, Schleimhaut und Drüsen der Zungenwurzel; die des N. hypoglossus gehen nur an die Muskelbündel.

Die Zunge ist Hauptorgan des Geschmackes, *Organon gustus*: ist aufserdem thätig bei der Aufnahme der Nahrungsmittel in die Mundhöhle; beim Kauen, indem sie den Bissen hin und her bewegt und ihn zwischen die Zähne schiebt; beim Schlingen, wobei zuerst ihre Spitze und Ränder, dann auch die vordere Hälfte ihres Rückens sich an den harten Gaumen legt (Wirkung der Mm. styloglossi

den Bissen durch den Isthmus faucium hinabdrückt; eich aber sich selbst verkürzt und in der Richtung n den Pharynx herabgezogen wird (Wirkung der Mm. ales und hyoglossi unter Mitwirkung der Mm. sternodei, omohyoidei und thyreohyoidei): endlich bei der Bil- der Vokale und meisten Konsonanten: beim Pfeifen, peien u. a. m.

Speicheldrüsen.

Die Speicheldrüsen (des Mundes, im Gegensatz zur sog. hspeicheldrüse) *Glandulae salivales* oris, sind acinöse en, welche paarweise, drei an jeder Seite, neben und der Mundhöhle liegen. Sie haben eine gelblich- oder röthliche Farbe und bestehen aus vielen kleinen plattlichen Läppchen von ziemlich derber Consistenz: diese aus $\frac{1}{5}'''$ bis $\frac{2}{5}'''$ grofsen Häufchen oder Träubchen er oder länglich-runder Acini von $\frac{1}{70}'''$ bis $\frac{1}{34}'''$ Dm. nmengesetzt. Die Läppchen werden unter einander h Zellstoff, durch die Wurzeln der Ausführungsgänge durch die zahlreichen Blutgefäfse ziemlich locker ver- t; die Oberfläche dieser Drüsen aber von einer dün- Schicht verdichteten Zellstoffs umgeben. Der von ı abgesonderte Speichel oder Mundspeichel, Saliva, durch die Ausführungsgänge der Speicheldrüsen, *Ducalivales*, deren äufsere Haut eine Zellhaut, die innere en eine Fortsetzung der Mundschleimhaut ist, in die lhöhle geleitet.

Die Ohrspeicheldrüse, Glandula parotis, ist nsehnlichste Speicheldrüse von unregelmäfsig dreiseiGestalt, hinten beträchtlich dicker als vorn; in der tung von oben nach unten mifst sie vorne $1\frac{3}{4}''$, n aber nur $1\frac{1}{4}''$; von vorn nach hinten ist sie $1\frac{1}{2}''$; an ihrem vorderen Theile $3'''$ bis $4'''$, am hinteren le aber $1''$ dick. Ihr absolutes Gewicht beträgt sechs hmen bis eine Unze, ihr spec. Gewicht 1,0551, ihr ımen $1\frac{1}{20}$ bis $1\frac{2}{5}$ Kub. Zoll. Sie liegt vor und unlem äufseren Ohre, mit ihrem hinteren dickeren Theile en Raum zwischen dem Ramus maxillae inferioris und Processus mastoideus eindringend; ihre äufsere convexe ıe ist von der Fascia parotideo-masseterica und dem

oberen gezackten Rande des Platysma myoides überzogen; die innere concave Fläche liegt vorne genau an der äufseren Fläche des M. masseter; hinter dem Ramus maxillae inferioris legt sie sich an die Mm. pterygoideus internus, stylohyoideus und styloglossus und an die Arteria carotis cerebralis und Vena jugularis interna: die hintere etwas convexe Fläche gränzt an den vorderen Rand der Cauda des M. sternocleidomastoideus. Der vordere, leicht concave Rand liegt auf der Mitte der äufseren Fläche des M. masseter; der obere Rand reicht vorn bis zum Arcus zygomaticus, hinten bis zum knorpeligen äufseren Gehörgange hinauf; der untere Rand reicht bis zum Angulus maxillae inferioris und zum hinteren Bauche des M. digastricus maxillae inferioris herab. Innerhalb der Masse der Parotis und von ihren Läppchen überall umgeben, läuft die Arteria carotis facialis und mehrere Äste derselben, die Vena facialis posterior und der Plexus parotideus des N. facialis. — Ihr Ausführungsgang, der Stenson'sche Speichelgang, *Ductus Stenonianus*, tritt am oberen Drittheil des vorderen Randes der Drüse, $\frac{1}{2}'''$ unterhalb des unteren Randes des Arcus zygomaticus hervor; läuft fast horizontal, nur mit einer schwachen Biegung nach oben, an der Aufsenfläche des M. masseter nach vorn; biegt sich in geringer Entfernung vor dem vorderen Rande dieses Muskels in die Tiefe der Backe; durchdringt in der Richtung von aufsen nach innen die Fettanhäufung an der äufseren Fläche des M. buccinator und diesen Muskel selbst in seinem Mittelpunkte; und durchbohrt alsdann, schräg nach vorn gerichtet, die Schleimhaut der Backe; woselbst seine länglich-runde Mündung dem ersten grofsen, oder zuweilen dem zweiten kleinen, Backenzahne der oberen Reihe gegenüber sich befindet. Die ganze Länge des Ganges mit der Biegung beträgt ungefähr $2\frac{1}{2}'''$; auswendig ist er von einer Fortsetzung der Fascia buccalis und von Fett umgeben und erscheint dadurch $1\frac{1}{2}'''$ dick; sein Lumen hat aber nur $\frac{2}{5}'''$ und seine Mündung $\frac{1}{4}'''$ zu $\frac{2}{5}'''$ Dm.

Am vorderen Rande des M. masseter findet sich öfters eine abgesonderte Nebenspeicheldrüse, *Parotis accessoria* von der Gröfse einer Mandel, welche am Ductus Stenonianus hängt und sich in diesem öffnet.

Die Unterkiefer-Speicheldrüse, Glandula
alis) submaxillaris, ist um die Hälfte kleiner als
arotis, von länglich rundlicher Gestalt, in der Rich-
von unten nach oben 9‴ hoch, von vorn nach hinten
lang, 7‴ breit; zwei bis beinahe drei Drachmen schwer;
in spec. Gewicht von 1,0487, einen räumlichen Inhalt
bis $\frac{1}{2}$ Kub. Zoll. Sie liegt in der Regio submaxilla-
nter dem M. mylohyoideus, in dem dreieckigen Raume
hen der Basis maxillae inferioris, dem Zungenbein
lem vorderen und hinteren Bauche des M. digastricus
lae inferioris: gränzt nach hinten und innen an die
stylohyoideus, styloglossus und hyoglossus, oft auch
ie Glandula parotis; ihr oberer Theil dringt aber
hen dem Unterkiefer, dem M. pterygoideus internus
dem hinteren Rande des M. mylohyoideus aufwärts;
et sich oberhalb des letztgenannten Muskels nach vorn
gränzt an das hintere Ende der Glandula sublingualis.
aufsen wird sie von der Haut des Halses, dem Pla-
myoides und der oberflächlichen Schicht der Fascia
calis, und an ihrem oberen Theile auch von dem Kör-
ler Maxilla inferior bedeckt. Sie besteht aus gröfse-
appen als die Parotis, ist ihr übrigens völlig gleich
iet. Der Ausführungsgang, *Ductus Whartonianus*, geht
vorderen oberen Theile der Drüse aus, über den Mm.
yoideus und geniohyoideus, neben den äufseren Flä-
der Mm. hyoglossus und genioglossus, unter der Glan-
sublingualis und der Schleimhaut des Bodens der Mund-
, in der Richtung von hinten nach vorn und innen:
sich neben dem Frenulum linguae, in der Caruncula
gualis, mit einer Mündung von $\frac{1}{5}$‴ zu $\frac{1}{4}$‴ Dm. öffnet.
2″ lang und $\frac{1}{2}$‴ weit, ausdehnbarer als der Ductus
nianus.

Die Unterzungen-Speicheldrüse, Glandula
alis) sublingualis, die kleinste dieser Drüsen, ist
ich platt, halbmondförmig mit zugespitzten Enden,
vorn nach hinten $1\frac{1}{2}$″ lang, in der Mitte 8‴ breit und
lick, zwei Scrupel bis eine Drachme schwer; ihr spec.
cht beträgt 1,0481, ihr Volumen $\frac{1}{9}$ bis $\frac{1}{6}$ Kub.-Zoll.
iegt auf dem Boden der Mundhöhle unter dem Seiten-
e der Zunge, oberwärts nur von der Mundschleimhaut

bedeckt, auf dem M. mylohoideus und zwischen M. genioglossus und Unterkiefer; gränzt hinten an die Glandula submaxillaris und besteht aus kleineren, härteren und mehr weifslichen Läppchen, als diese. Sie öffnet sich mit sechs bis zwölf einzelnen, sehr engen und kurzen Gängen, *Ductus Riviniani*, welche zwischen den Läppchen der Drüse verborgen liegen und die Schleimhaut des Bodens der Mundhöhle und der Caruncula sublingualis durchbohren: einige dieser Gänge vereinigen sich zuweilen unter einander und mit kleinen Ausführungsgängen der Glandula submaxillaris, zu einem frei liegenden gröfseren Gange, *Ductus Bartholinianus*, welcher abgesondert in der Caruncula sublingualis mündet, oder schon früher mit dem Ductus Whartonianus zusammenfliefst.

Der in die Mundhöhle ergossene *Speichel*, *Saliva*, ist nicht ganz rein, sondern mit dem Secret der Schleimhäute der Speichelgänge und der Mundschleimhaut vermischt; daher nicht ganz klar, sondern enthält schwach opake Flocken und kleine Schleimkörnchen von $\frac{1}{800}'''$ bis $\frac{1}{400}'''$ Dm. Reiner Speichel ist vollkommen klar, wasserhell oder schwach gelblich, dünnflüssig, wenig klebrig, meistens von 1,0074 spec. Gewicht (zwischen 1,0061 und 1,0088 variirend); während des Essens und Trinkens reagirt er alkalisch, aufser dieser Zeit sauer. Er besteht nach Mitscherlich und Gmelin's Analysen aus Wasser und ungefähr $1\frac{1}{4}$ p. C. festen Bestandtheilen:

Wasser		985,00
Chlorkalium		1,80
Milchsaures Kali		1,63
Milchsaures Natron		0,87
Natron mit Schleim		1,64
Phosphorsaurer Kalk		0,17
Kieselerde		0,15
Schwefelsaures Kali		
Schwefelcyankalium?		
Schleim	ungefähr	1,4....
Speichelstoff, Ptyalin	- -	4,5....
Wasserextracte	- -	1,5....
Alkoholextracte	- -	1,3....
		999,96

Die Absonderung des Speichels hört fast gänzlich auf n Schlafe und bei vollkommener Ruhe des Mundes, wird ärker während des Sprechens, bei dem Anblick von Speien, beim Eckel, bei manchen Gemüthsbewegungen; sehr tark aber während des Essens, vorzüglich im Anfange des ssens harter reizender Speisen. Binnen 24 Stunden werden ungefähr 7 bis 8 Unzen abgesondert, wovon auf die arotiden 5 bis $5\frac{1}{2}$ Unzen kommen. Der Speichel bereitet ie Speisen zur Verdauung vor, indem er die trockenen Jahrungsmittel anfeuchtet, erweicht und zum Theil auflöset; und erleichtert beim Reden die in der Mundhöhle tatt findenden Bewegungen.

Schlundkopf.

Der Schlundkopf, *Pharynx*, dessen vorderer mittlerer heil als sog. *Rachen, Fauces*, bezeichnet wird, ist eine ängliche, von oben nach unten gerichtete, von häutigen Wänden umgebene Höhle; welche nur oberwärts, an den eiten und hinten, vollständig geschlossen ist, vorn und nten aber mit den nahegelegenen Höhlen zusammenhängt. Oben gränzt er an die Mitte der Basis cranii, seitwärts an lie Processus styloidei und die Cornua majora des Zungenbeins und die von diesen Knochenstücken entspringenden Muskeln, auch an die Arteriae carotides communes und erebrales und an die Venae jugulares internae; hinten an las Lig. longitudinale anterius der Wirbelsäule vor den ünf obersten Halswirbeln, an die Mm. recti capitis anteriores und longi colli; und ist mit allen diesen Theilen durch schlaffes, blätteriges, fettarmes Zellgewebe verbunden: nten geht er ununterbrochen in die Speiseröhre über. Vorn steht der Schlundkopf durch die Choanae mit der Nasenhöhle in Verbindung; unterhalb der Choanae wird er durch das Gaumensegel von der Mundhöhle unvollständig geschieden und hängt mit dieser durch den Isthmus faucium zusammen; weiter abwärts gränzt er an den oberen Theil und die hintere Wand des Kehlkopfes, und

communicirt mit der Höhle desselben durch die obere Öffnung des Kehlkopfes.

Die ganze Länge des Schlundkopfes beträgt ungefähr 4″ bis $4\frac{1}{2}$″; in queerer Richtung ist er breiter, als von vorn nach hinten tief: der innere Queerdurchmesser mifst hinter den Choanae ungefähr 14‴, hinter dem Isthmus faucium 10‴, hinter dem Kehlkopfe 16‴: der Dm. von vorn nach hinten nimmt, von oben nach unten betrachtet, von 10‴ an bis zu 5‴ ab. Die Dicke der Wände beträgt 2‴ bis 3‴. Bei seinem Übergange in die Speiseröhre wird er plötzlich enger; übrigens kann er wegen der Dehnbarkeit der hinteren und Seitenwände beträchtlich erweitert werden.

Die obere Wand des Pharynx wird von der Pars basilaris oss. occipitis, von den Fibrocartilagines basilares und von den vorderen Theilen der unteren Flächen der Pyramiden der Schläfebeine gebildet: welche Theile unterwärts von der Schleimhaut des Pharynx überzogen werden. Die hintere und Seitenwände werden dagegen von einer fibröszellulösen Fascia, von einer Muskelschicht und von der Schleimhaut zusammengesetzt. Der äufsere Überzug des Pharynx an seiner oberen Hälfte ist der hintere Theil der Fascia buccopharyngea (S. 219.); an seiner unteren Hälfte das, mit der genannten Fascia zusammenfliefsende, tiefe Blatt der Fascia cervicalis (S. 225.)

Die Muskelschicht oder Muskelhaut des Schlundkopfes, *Tunica muscularis pharyngis*, besteht vorzüglich aus den Mm. constrictores pharyngis, drei Paaren dünner platten Muskeln, welche, von vorn nach hinten laufend, die Seitenwände bilden, in der Mitte der hinteren Wand von beiden Seiten her zusammenstofsen; hier in einem von oben nach unten laufenden Streifen, Raphe pharyngis, sich vereinigen; und einander von unten nach oben zum Theil bedecken. Aufserdem verweben sich die Enden der Mm. stylopharyngei mit der Muskelschicht und die Mm. pharyngopalatini (S. 439) treten aus ihr hervor, die Seitenwände des Pharynx mit dem Gaumensegel verbindend.

M. constrictor pharyngis inferior, unterer Schlundkopfschnürer, ist der ansehnlichste und oberflächlichste dieser Muskeln; entspringt mit drei einzelnen platten Bündeln oder Portionen von den Knorpeln des Kehlkopfs. Da

ntere Bündel, *M. cricopharyngeus* genannt, kommt von er äufseren Fläche des Bogens der Cartilago cricoidea nd dem Cornu inferius der Cartilago thyreoidea: das ittlere breiteste Bündel, *M. thyreopharyngeus*, von dem interen Theil der Seitenplatte der Cartilago thyreoidea nd zwar von der äufseren Fläche derselben: das oberste, hmale, und öfters nicht deutlich von dem mittleren abesonderte Bündel, *M. syndesmopharyngeus*, entsteht vom ornu superius des Schildknorpels und dem Lig. hyothyoideum laterale. Diese Bündel fliefsen bald zusammen: ie unteren Fasern des ganzen Muskels laufen horizontal, e mittleren und oberen schräg aufwärts, so dafs der obere heil des Muskels, mit dem der anderen Seite sich vernigend, an der Hinterseite des Schlundkopfes einen nach en spitzigen Winkel bildet, welcher nur $\frac{1}{2}''$ unterhalb er Pars basilaris des Hinterhauptbeins sich befindet.

M. constrictor pharyngis medius, mittlerer Schlundkopfhnürer, wird gröfstentheils von dem unteren bedeckt; ntspringt mit zwei Bündeln von dem Os hyoides: nämlich as untere Bündel, *M. ceratopharyngeus*, vom Cornu majus es Zungenbeins, das obere Bündel, *M. chondropharyngeus*, om Cornu minus jenes Knochens. Die unteren Fasern ufen abwärts, die mittleren horizontal, die oberen schräg ach oben; die von den Muskeln beider Seiten gebildete pitze ragt nur wenig höher hinauf, als die der Mm. conrictores pharyngis inferiores.

M. constrictor pharyngis superior, oberer Schlundkopfhnürer, wird seitwärts zum Theil, hinterwärts vollständig on dem vorigen bedeckt. Er entspringt mit vier Bündeln; as unterste kleinste, *M. glossopharyngeus*, vom Seitenrande er Zungenwurzel, woselbst seine Fasern mit denen der Im. styloglossus und hyoglossus zusammenhangen: ein weites gröfseres Bündel, *M. mylopharyngeus*, vom hinteren nde der Linea obliqua interna maxillae inferioris, hinter nd unter dem letzten Backenzahne: ein drittes Bündel, *M. buccopharyngeus*, von der, zwischen Oberkiefer und Unterkiefer ausgespannten, Stelle der Fascia buccopharynea, wodurch dieses Bündel mit dem M. buccinator, und lso die Seitenwand des Pharynx mit der Seitenwand der Mundhöhle zusammenhängt: endlich das oberste breiteste

Bündel, *M. pterygopharyngeus*, vom Hamulus pterygoideus und dem scharfen hinteren Rande der Lamina interna des Proc. pterygoideus. Zuweilen kommen auch einzelne Fasern von der Tuba Eustachii, M. salpingopharyngeus; von der Pyramide des Schläfebeins und der Fibrocartilago basilaris, M. cephalopharyngeus; aus dem M. geniohyoideus, M. geniopharyngeus: welche sich mit den oben genannten, beständig vorhandenen Hauptbündeln verweben. Die Fasern des M. constrictor pharyngis superior laufen gröfstentheils horizontal, die oberen anfänglich etwas nach unten; alsdann fliefsen sie mit den der anderen Seiten bogenförmig, ohne eine Spitze zu bilden, zusammen.

Da der obere Rand des M. constrictor pharyngis superior nicht bis zur Basis cranii hinaufreicht, so wird in diesem, $\frac{1}{2}''$ hohen Zwischenraume die Muskelschicht durch den M. levator veli palatini ersetzt, welcher an der Schleimhaut des obersten Theils des Schlundkopfes genau anliegt, und selbst vom M. tensor veli palatini, dieser aber von der Fascia buccopharyngea bedeckt wird: so dafs beide genannten Gaumenmuskeln zur Verstärkung der Seitenwand des Pharynx beitragen.

M. stylopharyngeus, Griffelschlundkopfmuskel: länglich rundlich; entspringt von der inneren Fläche des Processus styloideus, oberhalb des M. styloglossus; läuft an der Seitenwand des Pharynx nach innen und unten, tritt unter den oberen Rand des M. constrictor pharyngis medius, und verwebt sich mit diesem und dem M. constrictor pharyngis superior, indem seine Fasern sich pinselförmig ausbreiten.

Die Musculi constrictores pharyngis verengern beim Schlingen den Schlundkopf, der mittlere und untere ziehen ihn auch herab, wenn das Zungenbein und der Kehlkopf befestigt sind; der M. stylopharyngeus erweitert ihn und zieht ihn beim Durchgange des Bissens in die Höhe. Diese Muskeln stehen zwar im Allgemeinen unter dem Einfluss des Willens, sind aber auch unwillkührlicher Contractionen fähig.

Die Schleimhaut des Schlundkopfes, *Tunica mucosa pharyngis*, wird durch eine Lage dichten Zellstoffs (von Einigen Tunica vasculosa s. nervea s. propria pharyngis genannt), an die Muskelschicht geheftet: sie ist blafsroth

emlich glatt, im unteren Theile des Schlundkopfes dünner, n oberen dicker und hier mit sehr zahlreichen und anhnlichen Schleimbälgen versehen. Nach vorn hängt sie rch die Choanae, den Isthmus faucium und das Ostium ryngis mit der Schleimhaut der Nasen- Mund- und Kehlpfshöhle ununterbrochen zusammen: unterhalb des Ostium ryngis überzieht sie auch die vordere Wand des Pharynx, dem sie an der hinteren Wand des Kehlkopfes herabsteigt. n den Seitenwänden des Schlundkopfes überzieht sie die m. pharyngopalatini und bildet die Arcus pharyngopalani des Gaumensegels: weiter nach oben dringt sie in die achenmündung der Tuba Eustachii und hängt durch diesen Kanal mit der Schleimhaut der Paukenhöhle und der ellulae mastoideae zusammen. Das Ostium pharyngeum r Tuba Eustachii erscheint am oberen Theile der Seitenand des Pharynx als eine länglich rundliche Öffnung, elche nebst dem wulstigen Rande, welcher sie umgibt, ''' in ihrem längsten Dm. von oben nach unten mifst, rch die Schleimhaut aber beträchtlich verengert wird . 382): der Mittelpunkt dieser Mündung liegt 3''' höher s der untere Rand der Choanae und vom hinteren Rande s Nasenloches $2\frac{1}{2}$'' bis $2\frac{3}{4}$'' entfernt. Oberhalb dieser ündung, nahe unter der Basis cranii, bildet die Schleimut der Seitenwand des Pharynx noch eine blinde, einige nien tiefe Einsenkung.

Der Schlundkopf dient als Luftweg, durch welchen die mosphärische Luft nicht allein zum Kehlkopf, sondern ch zu den Paukenhöhlen dringt; der obere Theil dessen verstärkt die Stimme. Vorzüglich thätig ist aber der arynx beim Schlingen, bei dem sog. zweiten Acte der eglutition, und zwar insbesondere der vor und unterhalb r Arcus pharyngopalatini liegende Theil. Es wird nämch dieser untere vordere Theil des Pharynx durch die m. stylopharyngei erweitert und dem über die Zungenurzel herabgleitenden Bissen entgegengehoben; sobald tzterer in ihn eingetreten ist, erfolgt die von oben nach nten sich fortsetzende Verengerung und Hinabsenkung des chlundkopfes, vermittelst der Mm. constrictores pharyns, nach vorläufig vollzogenem Herabziehen des Kehlkopfes nd Zungenbeins.

Kehlkopf.

Der Kehlkopf, *Larynx*, ist ein ungleich vierseitiger, aus Knorpeln, Bändern, Muskeln und einer Schleimhaut gebildeter, ziemlich reichlich mit Gefäfsen und Nerven versehener, hohler Körper, welcher zum Durchgange der Luft zu den eigentlichen Respirationsorganen, vorzüglich aber zur Hervorbringung der Stimme, als *Stimmorgan*, *Organon vocis*, dient. Et liegt in der Mitte des vorderen Theiles des Halses, unter der Zungenwurzel und dem Zungenbein, hängt unten mit der Luftröhre ununterbrochen zusammen; seine vordere sehr schmale Fläche in der Mittellinie des Halses ist nur von den allgemeinen Bedeckungen und dem oberflächlichen Blatt der Fascia cervicalis überzogen; die Seitenflächen, welche in ihrem oberen Theile schräg nach vorn gerichtet sind, werden auch von den Mm. sternohyoidei, sternothyreoidei, thyreohyoidei und omohyoidei, von der Schilddrüse und den Ursprüngen der Mm. constrictores pharyngis inferiores bedeckt; die hintere queergerichtete Fläche gränzt an den Pharynx, die vordere Wand des untersten Theiles desselben bildend. Beim männlichen Geschlecht liegt der Kehlkopf etwas tiefer abwärts am Halse als beim weiblichen, ist meistens $1\frac{1}{2}'''$ hoch und breit und von vorn nach hinten $1\frac{1}{4}'''$ dick; beim weiblichen Geschlecht in allen Dimensionen ungefähr um ein Drittheil kleiner.

Knorpel des Kehlkopfes.

Cartilago thyreoidea s. scutiformis, der *Schildknorpel* ist unter diesen der gröfste, bildet vorzüglich den oberen vorderen Theil des Larynx, und ragt in der Mitte des Halses als sogen. Adamsapfel oder Protuberantia laryngea hervor. Er besteht aus zwei viereckigen *Seitenplatten*, *Lamina dextra et sinistra* cartilaginis thyreoideae, welche vorn in der Mitte unter einem Winkel, der in weiblichen Körpern stumpfer und mehr abgerundet ist, zusammenfliefsen: nach hinten divergiren die beiden Platten beträchtlich, haben daher eine Richtung schräg von vorn nach hinten und aufsen, und stehen hinterwärts $1''$ bis $1\frac{1}{2}''$ auf

inander, dadurch die gröfste Breite des Larynx bestim-
end. Ihre äufsere Fläche zeigt öfters erhabene Linien
ir die Muskelanheftungen, die innere ist glatter. Zuwei-
n findet sich in der einen oder der anderen Seitenplatte
n vom Perichondrium gänzlich oder gröfstentheils ver-
hlossenes Loch. Der obere Rand des Schildknorpels ist
beiden Seiten convex, in der Mitte aber, woselbst die
eitenplatten zusammenstofsen, tief ausgeschnitten, *Incisura*
yreoidea; der untere Rand zeigt drei flachere Ausschnitte,
nen in der Mitte und einen an jeder Seite, welche durch
wei kurze Hervorragungen von einander getrennt werden.
ie hinteren abgerundeten, dickeren Ränder laufen nach
en in die längeren, rundlich platten, nach hinten und
nen gebogenen, oberen Schildhörner, *Cornua superiora* s.
ajora cartilaginis thyreoideae aus, nach unten in die kür-
eren, nach vorn und innen gebogenen, unteren Schildhör-
er, *Cornua inferiora* s. *minora.*

Cartilago cricoidea s. annularis, *Ringknorpel*, liegt un-
r dem Schildknorpel und hat eine ringförmige Gestalt.
ein vorderer Theil, der Ring oder Bogen, *Arcus* cartila-
nis cricoideae, ist dünn und niedrig, in der Mitte nur
" bis 3‴ hoch, und auswendig an jeder Seite mit einer
elenkfläche für die Cornua inferiora des Schildknorpels
ersehen: der hintere dickere, viereckige, 8‴ bis 10‴ hohe
heil, die hintere Wand oder Platte, *Lamina* cartilaginis
icoideae genannt, ragt zwischen den hinteren Rändern
er Seitenplatten des Schildknorpels, ohne diese zu berüh-
en, beträchtlich empor; zeigt an ihrer hinteren Fläche
ine mittlere, senkrechte, erhabene Linie und neben dieser
wei seitliche längliche Gruben; am oberen Rande aber
wei kleine convexe Gelenkflächen.

Die beiden *Cartilagines arytaenoideae* s. pyramidales,
extra et sinistra, Giefsbeckenknorpel, haben jeder die Ge-
talt einer dreiseitigen, nach hinten gekrümmten Pyramide;
hre concave Basis ruhet auf der oberen Gelenkfläche der
latte des Ringknorpels; die äufsere Fläche ist unten con-
av; gegen die Spitze hin convex; die hintere Fläche stark
oncav; die inneren schmalen, geraden oder schwach con-
aven Flächen beider Knorpel stehen fast senkrecht und
arallel neben einander, durch einen schmalen Zwischen-

raum getrennt. Auf der nach hinten und innen gerichteten Spitze jeder Cartilago arytaenoidea sitzt ein bei Weitem kleinerer, dreieckiger, nach innen und hinten übergebogener Knorpel, *Cartilago Santoriniana* s. Corniculum. Die ganze Höhe der Cart. arytaenoidea und Santoriniana zusammen beträgt 5‴ bis 6‴.

Epiglottis, der Kehldeckel, hat die Gestalt einer dünnen, herzförmigen Platte mit nach unten verlängerter Spitze: er liegt über dem Schildknorpel, hinter der Zungenwurzel, in aufrechter etwas nach hinten gerichteter Stellung, so dafs der obere dünnere Rand nahe hinter dem Isthmus faucium frei in die Höhe ragt, während die untere dickere Spitze hinter der Basis oss. hyoidei und über der Incisura thyreoidea angeheftet ist. Die vordere obere, nach der Zunge hin gerichtete Fläche ist in der Mitte convex, die hintere untere concav, und beide mit zahlreichen kleinen Vertiefungen und selbst kleinen Löchern versehen: der obere Rand ist in der Mitte ausgeschnitten und stark nach vorn umgebogen, wodurch der obere Theil der vorderen Fläche in queerer Richtung ausgehöhlt erscheint.

Bänder des Kehlkopfes.

Die Cartilago thyreoidea wird mit dem Zungenbein verbunden durch die *Membrana thyreohyoidea* s. obturatoria laryngis; eine ziemlich schlaffe Schicht verdichteten Zellstoffs, welche zwischen der Basis und den Cornua majora ossis hyoidei und den oberen Rändern der Seitenplatten des Schildknorpels ausgespannt ist. In der Mittellinie ist in diese Membrana thyreohyoidea das dickere, länglich platte, aus elastischen Fasern bestehende *Ligamentum thyreohyoideum* s. hyothyreoideum *medium* eingewebt, welches an die Incisura thyreoidea und den oberen Rand der Basis des Zungenbeins geheftet ist, so dafs sein oberes Ende hinter der Basis des Zungenbeins sich befindet. An dem rechten und linken Ende jener Membran finden sich die rundlichen, fibrösen, beinahe 1″ langen *Ligamenta thyreohyoidea lateralia*, welche zwischen den Spitzen der Cornua majora des Zungenbeins und der Cornua superiora cartilaginis thyreoideae ausgespannt sind, und gewöhnlich einen oder mehrere kleine rundliche Faserknorpel oder Knochen enthalten.

Zwischen dem mittleren Ausschnitt des unteren Randes s Schildknorpels und dem vorderen Bogen der Cartilago icoidea befindet sich das starke, breite, von kleinen Lö-ern durchbohrte *Ligamentum cricothyreoideum medium s. noideum*, welches theils aus Sehnenfasern, theils aus ela-schen Fasern besteht. Die Cornua inferiora des Schild-orpels werden an die Seiten des Arcus cartilaginis cri-ideae durch Synovialkapseln und kurze fibröse *Ligamenta icothyreoidea lateralia* geheftet. — Die Basis der Carti-ines arytaenoideae verbinden sich durch Kapselbänder, *gamenta cricoarytaenoidea*, mit dem oberen Rande der nteren Platte des Ringknorpels; und ihre Spitzen mit den rtilagines Santorinianae durch schlaffe Kapselbänder. — e vordere Fläche der Epiglottis wird durch das *Liga-ntum hyoepiglotticum*, ein kurzes, breites, aus elastischen sern gewebtes Band, an den oberen Rand der Basis ossis oidei geheftet; ihre Spitze verbindet sich durch ein star-s, längliches, elastisches Band, *Ligamentum thyreoepi-otticum*, mit der Incisura thyreoidea.

Die *Ligamenta thyreoarytaenoidea*, *Stimmbänder*, ein eres und ein unteres Paar, sind zwischen dem Schild-orpel und den Gieſsbeckenknorpeln ausgespannt und lau-t von vorn nach hinten, etwas divergirend, durch den neren Raum des Kehlkopfes. Die unteren Stimmbänder, *gamenta thyreoarytaenoidea inferiora s. Ligg. glottidis s.* ordae vocales, sind plattlänglich, aus Sehnenfasern ge-bt, im weiblichen Geschlechte dünner und schlaffer als männlichen; sie entspringen dicht neben einander im neren des Winkels, durch welchen die Seitenplatten des hildknorpels zusammenstoſsen; und befestigen sich an r vorderen Ecke und dem äuſseren Rande der Basis der rtilagines arytaenoideae: unterwärts sind sie an den obe-n Rand des vorderen Ringes der Cart. cricoidea geheftet. e oberen Stimmbänder, oder Taschenbänder, *Ligg. thy-oarytaenoidea superiora*, sind nur aus verdichtetem Zell-off mit wenigen Sehnenfasern gebildet, schwächer und laffer; entspringen und verlaufen oberhalb der Ligg. yreoarytaenoidea superiora, und setzen sich an die Mitte s vorderen Randes der Gieſsbeckenknorpel. Der läng-he Raum, welchen die Ligg. thyreoarytaenoidea, insbe-

sondere die inferiora, zwischen sich lassen, wird die *Stimmritze*, *Glottis* s. Rima glottidis genannt: sie wird vorn durch den Winkel des Schildknorpels, seitwärts durch die Ligg. thyreoarytaenoidea inferiora und die inneren Flächen der Cartilagines arytaenoideae begränzt, hinten aber durch den M. arytaenoideus transversus geschlossen.

Muskeln des Kehlkopfes.

Aufser den Muskeln, welche den ganzen Kehlkopf bewegen (Mm. sternothyreoidei und thyreohyoidei, S. 228) besitzt derselbe kleinere eigenthümliche Muskeln, fünf Paare und einen unpaaren, welche die einzelnen Knorpel von einander entfernen oder annähern; und zwar dem Willen unterworfen sind, aber auch ohne Einflufs desselben ihre Thätigkeit ausüben können.

M. cricothyreoideus, Ring-Schildmuskel: ungleich viereckig und platt, oben dicker und breiter als unten, von dem M. sternothyreoideus und der Schilddrüse bedeckt, entspringt vom unteren Rande und der äufseren Fläche des vorderen Bogens der Cart. cricoidea, läuft aufwärts und rückwärts und befestigt sich an dem unteren Rande und der inneren Fläche der Seitenplatte der Cart. thyreoidea, indem er den seitlichen Ausschnitt jenes Randes ausfüllt. Sein vorderer Rand gränzt an das Lig. cricothyreoideum medium, der hintere an die Cornua inferiora des Schildknorpels. Öfters ist er in eine vordere und hintere Portion getheilt. Nähert die vorderen Hälften des Schild- und Ringknorpels einander, richtet die hintere Platte des Ringknorpels, vermittelst Erhebung des vorderen Bogens, weiter nach hinten.

M. cricoarytaenoideus posticus, hinterer Ring-Giefsbeckenmuskel, ist rautenförmig und platt, entspringt von der hinteren Fläche der Lamina cartilaginis cricoideae und setzt sich sehnig an den äufseren Rand und die äufsere Ecke der Basis cartilaginis arytaenoideae. Zieht die Cart. arytaenoidea nach hinten und etwas nach innen.

M. cricoarytaenoideus lateralis, seitlicher Ring-Giefsbeckenmuskel: platt und dreieckig, entspringt breit vom oberen Rande des Bogens der Cart. cricoidea, läuft schräg nach innen und oben; befestigt sich an den unteren Thei-

r äufseren Fläche der Cart. arytaenoidea und an die äu-
re Fläche des Lig. thyreoarytaenoideum inferius. Zieht
e Cart. arytaenoidea nach aufsen und vorn, das Lig. thy-
oarytaenoideum inferius nach aufsen.

M. thyreoarytaenoideus, Schild - Gieſsbeckenmuskel;
iglich platt und dünn; entspringt von der inneren Fläche
r Seitenplatte des Schildknorpels, an deren unteren und
rderen Theile, unweit des Winkels; läuft rückwärts und
was nach innen, und befestigt sich an dem äufseren Rande
d der äufseren Fläche der Cartilago arytaenoidea; ist
ch an die Ligg. thyreoarytaenoidea geheftet. Öfters kann
n an diesem Muskel eine untere und obere Portion, M.
reoarytaenoideus major et minor, unterscheiden; erstere
ft an der äufseren Fläche des unteren Stimmbandes,
ztere an der Aufsenseite des Taschenbandes. — Er zieht
Cart. arytaenoidea nach vorn, verkürzt die Ligg. thy-
oarytaenoidea.

M. thyreoepiglotticus, Schild - Kehldeckelmuskel; ist
ttlänglich, sehr dünn und schmal; entspringt unmittelbar
er dem M. thyreoarytaenoideus, von der inneren Fläche
r Seitenplatte der Cart. thyreoideae und läuft, nach hin-
gebogen, aufwärts zum Seitenrande des Kehldeckels,
lchen er herabzieht.

M. arytaenoideus transversus, queerer Gieſsbeckenmus-
; ein unpaarer Muskel, länglich viereckig und verhält-
smäfsig dick und stark: ist in queerer Richtung an die
fseren Ränder und die hinteren Flächen der Cartilagines
ytaenoideae befestigt und füllt die Concavität dieser Flä-
en aus. Die hinteren oberflächlichen Schichten des Mus-
ls, *Mm. arytaenoidei obliqui* genannt, laufen schräg von
r Basis der einen Cart. arytaenoidea zur Spitze der an-
ren und durchkreuzen einander so, dafs der von der
nken Seite aufsteigende gemeiniglich oberflächlicher liegt.
le queeren und schrägen Fasern des Muskels nähern die
rtilagines arytaenoideae einander. Von den Spitzen die-
Knorpel an, setzen sich die Mm. arytaenoidei obliqui
sehr dünne Bündel, *Mm. aryepiglottici* genannt, nach
rn und oben fort, zu den Seitenrändern des Epiglottis:
ese nähern die Cartilagines Santorinianae einander und
lfen die Ränder des Kehldeckels herabziehen.

Durch die Knorpel, Bänder und Muskeln werden die *Wände* der Larynx, welche die Höhle desselben begränzen, beinahe vollständig gebildet; und zwar die vordere Wand durch die Epiglottis, die Ligg. thyreohyoideum med. und thyreoepiglotticum, den vorderen Winkel der Cart. thyreoidea, das Lig. cricothyreoideum medium und den vorderen Theil des Arcus cartilaginis cricoideae. Jede der beiden dicken Seitenwände besteht aus der Seitenplatte der Cart. thyreoidea, den Mm. aryepiglotticus, thyreoepiglotticus, thyreoarytaenoideus und cricoarytaenoideus lateralis, den Ligg. thyreoarytaenoidea, dem Seitentheile des Arcus cartilaginis cricoideae, dem Lig. cricothyreoideum laterale und dem M. cricothyreoideus. Die ziemlich gerade hintere Wand besteht aus den Cartilagines Santorinianae und arytaenoideae, den Mm. arytaenoidei obliqui und transversus, der Lamina cartilaginis cricoideae und den Mm. cricoarytaenoidei postici: diese Wand bildet zugleich die vordere Wand des unteren Theils des Pharynx und die Schleimhaut des letzteren überzieht hinterwärts sowohl diese Wand, als sie auch in den Raum zwischen ihr und den hinteren Rändern der Seitenplatten des Schildknorpels sich einbiegt und hier die Mm. cricoarytaenoidei laterales, thyreoarytaenoidei und thyreoepiglottici theilweise bekleidet.

Die von diesen Wänden eingeschlossene *Höhle* des Kehlkopfes, *Cavum laryngis*, ist beträchtlich kleiner als der äufsere Umfang des Kehlkopfes und wird inwendig von der Schleimhaut, *Membrana mucosa laryngis*, überzogen. Letztere nimmt ihren Anfang an der Zungenwurzel, indem sie von dieser an die vordere Fläche des Kehldeckels übergeht und daselbst in der Mitte eine longitudinale Falte, *Frenulum epiglottidis* s. *Lig. glossoepiglotticum*, und zu beiden Seiten desselben zwei andere sehr niedrige Falten bildet. Sodann überzieht sie die hintere Fläche der Epiglottis und erstreckt sich von den Seitenrändern derselben schräg rückwärts und abwärts zu den Cartilagines Santorinianae in Gestalt zweier 6‴ langer Falten, *Frenula* (Ligg.) *aryepiglottica*, in welchen, von den Platten der Schleimhaut eingeschlossen, die Mm. aryepiglottici und thyreoepiglottici, zuweilen auch ein kleiner Knorpel, Cartilago Wrisbergiana, liegen. Am hinteren Ende der Fre

la aryepiglottica hangen die Schleimhaut des Larynx und
arynx zunächst zusammen. Von der hinteren Fläche des
hldeckels und der Frenula aryepiglottica an, erstreckt
h sodann die Schleimhaut des Kehlkopfes nach unten
die Höhle desselben, bekleidet unmittelbar die hinteren
ichen des Lig. thyreoepiglotticum, des Winkels des Schild-
orpels, des Lig. cricothyreoideum medium und des Bo-
ns des Ringknorpels: ferner die vorderen Flächen des
arytaenoideus transversus und der Platte des Ringknor-
s, und die inneren Flächen der Ligg. thyreoarytaenoidea
d der Cartilagines arytaenoideae: macht aber an der
hten und linken Seite, zwischen dem Lig. thyreoarytae-
deum superius u. inferius, eine schmale, von vorn nach
ten längliche Ausbiegung oder Tasche, *Ventriculus la-
gis s. Morgagnii*, deren Aufsenfläche den M. thyreo-
taenoideus berührt. Vom inneren Umfange der Carti-
o cricoidea aus geht die Schleimhaut in die Luftröhre
r. — Innerhalb der Höhle des Kehlkopfes ist die
leimhaut weifsröthlich, im Allgemeinen straff und glatt,
ht faltig, indem sie durch kurzen Zellstoff genau an die
orpel, Bänder und Muskeln geheftet ist: ihre Schleim-
sen sind meistens klein: stärkere Anhäufungen gröfserer
leimdrüsen finden sich vorzüglich in dem Raume zwi-
en den Ligg. hyoepiglotticum, thyreoepiglotticum und
reohyoideum medium, an der hinteren Fläche der Spitze
Kehldeckels, am Ventriculus Morgagnii, und an dem
deren und hinteren Ende der Stimmritze.

Der Eingang zur Höhle des Kehlkopfes, *Ostium pha-
geum laryngis*, ist von abgerundet dreieckiger Gestalt,
n 6‴ bis 7‴ breit; er wird vorn von der Spitze des
hldeckels, welcher noch oberhalb dieses Einganges und
hintersten Theils der Zungenwurzel hervorragt, be-
inzt; seitwärts aber von den Frenula aryepiglottica, hin-
von den Cartilagines Santorinianae eingefafst. Der
ere Theil der Höhle ist oval; der untere, von dem Ring-
orpel eingeschlossene, und durch das *Ostium tracheale
yngis* in die Luftröhre übergehende Theil mehr kreis-
nd. Etwas unterhalb der Mitte der Höhe des Cavum
yngis findet sich die engste Stelle, *die Stimmritze, Glot-
s. Rima glottidis*: sie wird vorn von dem Winkel der

Cart. thyreoidea, hinten von dem M. arytaenoideus transversus, seitwärts von den Ligg. thyreoarytaenoidea, insbesondere von den strafferen und weniger von einander entfernten Ligg. thyreoarytaenoidea inferiora, und von den inneren Flächen der Cartilagines arytaenoideae begränzt, aber durch die Schleimhaut noch verengert. Sie hat die Gestalt einer von vorn nach hinten gerichteten, dreieckigen hinten etwas abgerundeten Spalte, 8‴ bis 10‴ lang, in queerer Richtung vorn 1‴ bis $1\frac{1}{2}$‴, hinten 2‴ bis 3‴ breit kann aber durch die Bewegungen der Kehlkopfsknorpel und durch Anspannung und Erschlaffung der Bänder verengert und erweitert werden.

Die Bewegungen des ganzen Kehlkopfes und seiner einzelnen Knorpel beziehen sich theils und vorzugsweise auf eine Veränderung der Gestalt und Durchmesser der Stimmritze, indem diese verlängert und zugleich die Stimmbänder gespannt, oder unter Erschlaffung ihrer Bänder verkürzt, oder der Breite nach erweitert oder verengert werden kann: theils aber auf eine Bedeckung des Ostium pharyngeum des Kehlkopfes. Die Stimmritze wird verlängert durch die Mm. thyreohyoidei, indem diese den Schildknorpel nach vorn heraufziehen (wobei das Zungenbein durch die Mm. digastrici maxillae inferioris, stylohyoidei mylohyoidei und geniohyoidei fixirt sein mufs); durch die Mm. cricothyreoidei und cricoarytaenoidei postici, welche einerseits den Winkel der Cart. thyreoidea, andererseits die Lamina cart. cricoideae und die Cart. arytaenoideae von einander entfernen: — verkürzt wird sie durch die Mm. sternothyreoidei, welche den Schildknorpel herabziehen, durch die Mm. thyreoarytaenoidei und circoarytaenoidei laterales, welche die Gieſsbeckenknorpel dem Schildknorpel nähern. Schon durch die Verkürzung wird sie auch in queerer Richtung erweitert; insbesondere bewirken dies aber die Mm. cricoarytaenoidei laterales: die Verengerung in queerer Richtung geschieht durch die Mm. arytaenoideus transversus und obliqui. Nur während der Verkleinerung der Stimmritze, vorzüglich vermittelst ihrer Verlängerung und transversaler Verengerung, entsteht die Stimme, durch Schwingungen der durch die Glottis dringenden Luftsäule und vielleicht auch der Stimmbänder selbst, wenn die

rch Rückwärtsziehen der Cartilagines arytaenoideae stark spannt sind. Eine geringere Erweiterung und Verengerung der Glottis ohne Stimmbildung findet bei dem Athemen Statt.

Um während des Schlingens das Eindringen der Nahrungsmittel in den Kehlkopf zu verhüten, begibt sich der hldeckel in eine horizontale Stellung, so dafs er das ium pharyngeum des Kehlkopfs bedeckt: wobei sein rer Rand zwar die Cartilagines Santorinianae nicht völlig ührt, jedoch die Nahrungsmittel eine Richtung gegen hintere Wand des unteren Theils des Pharynx erhalten. se Veränderung der Richtung des Kehldeckels wird dach bewirkt, dafs die Zungenwurzel (bei Verkürzung der nge durch die Mm. hyoglossi und linguales) ihn rückrts drängt: zugleich erheben die Mm. thyreohyoidei, lopharyngei und constrictores pharyngis inferiores den rynx und Larynx, nähern das Ostium pharyngeum des teren dem Kehldeckel; und die Mm. thyreoepiglottici ien die Seitenränder der Epiglottis genauer an die Frea aryepiglottica. Letztere werden durch das Herabgen des Kehldeckels und Erheben des Kehlkopfes verzt und erschlafft: daher können nunmehr die Contracien der Mm. aryepiglottici die Cartilagines Santorinianae die Frenula aryepiglottica gegenseitig mehr nähern das Ostium pharyngeum des Larynx verengern. Diese egungen dauern nur einen Augenblick: bei dem darauf enden Herabsinken des Larynx und Pharynx schnellt Kehldeckel in seine aufrechte Stellung zurück.

Schilddrüse.

Die *Schilddrüse, Glandula thyreoidea* s. Corthyreoideum, ist ein Ganglion vasculare, welches, von Mm. sternothyreoidei und dem oberflächlichen Blatt Fascia cervicalis unmittelbar bedeckt, vor dem oberen le der Luftröhre und dem Kehlkopfe liegt. Sie hat eine enförmige Gestalt, und besteht aus einem mittleren klein Theile, Isthmus, und aus zwei in die Höhe steigenSeitenlappen. Der *Isthmus glandulae thyreoideae* liegt

in queerer Richtung vor dem Bogen der Cartilago cricoi dea, dem Ligamentum cricotracheale und den obersten Rin gen der Luftröhre, durch kurzen Zellstoff mit diesen Thei len verbunden; ist vorn convex, hinten concav, 8‴ brei und hoch und 4‴ dick. Von dem Isthmus erhebt sich ei rundlich zugespitzter Lappen, *Cornu medium* s. Pyrami glandulae thyreoideae, welcher mitten vor dem Schildknor pel, jedoch gewöhnlich etwas nach der linken Seite, in di Höhe steigt, und zuweilen bis zur Incisura cartilagini thyreoideae hinaufreicht. Die Seitenlappen oder Hörner *Cornua gl. thyreoideae, dextrum et sinistrum*, steigen etwa nach hinten gerichtet in die Höhe, bedecken die Seiten platten des Schildknorpels und reichen bis zum obere Rande derselben; sind nur an ihrer äufseren Fläche conve an der inneren Fläche platt, oben zugespitzt, 2″ bis 2½ lang, in der Mitte 12‴ bis 14‴ (der rechte oft 17‴) bre und 6‴ bis 8‴ dick. Die ganze Glandula thyreoidea wieg gewöhnlich etwas mehr als eine Unze; ihr spec. Gewich wechselt zwischen 1,0361 und 1.0655, ihr Volumen beträ 1¼ bis 1½ Kubikzoll. Ihre Farbe ist bläulich roth, zuwe len gelblich- oder grauroth: ihr Gewebe ist compact, au Zellstoff und verhältnifsmäfsig zahlreichen und ansehnliche Blut- und Lymphgefäfsen bestehend, deren Knauel, ve dichteren Zellstoffschichten eingewickelt, einzelne Läppche bilden: selten finden sich in diesen unregelmäfsige, ve röthlicher Flüssigkeit erfüllte, kleine Höhlungen: Aci und Ausführungsgänge besitzt die Schilddrüse nicht. Äu fserlich wird sie von einer dünnen festen Zellschicht un der Fascia cervicalis umgeben. In die letztere gehen öfte an der Stelle, woselbst sie das Cornu medium bedeck platte, dem M. thyreohyoideus angehörende Muskelbünd über, *M. levator glandulae thyreoideae* genannt. Die Fun tion der Schilddrüse ist unbekannt: im Foetus ist sie ve hältnifsmäfsig gröfser und ihr Gewebe mehr entwicke (S. Bd. II.)

Athmungswerkzeuge, Organa respirationis.

Die eigentlichen Respirationsorgane sind die *Lungen, ulmones*, zwei in der Brusthöhle liegende Organe, welche uptsächlich aus häutigen, von Luft erfüllten Kanälen und äschen, und aus sehr zahlreichen Blutgefäfsen zusammen-setzt sind, und eine gemeinschaftliche *Luftröhre, Trachea*, r den Ein- und Austritt der Luft besitzen. Zu der Luft-hre dringt aber die Luft durch die Nasen- und Mund-hle, den Pharynx und Larynx: daher diese Organe, aufser n anderen, ihnen obliegenden Functionen, auch als soge-nnte *obere Luftwege* dem Respirationsgeschäft dienen.

Luftröhre.

Die *Luftröhre, Trachea* s. Arteria aspera, ist eine orpelig häutige Röhre von ziemlich fester und steifer sschaffenheit, jedoch nach ihrer Länge und Weite aus-hnbar und sehr elastisch, vorn und an den Seiten convex, nten platt. Sie hat eine Länge von $3\frac{1}{2}''$ bis $4\frac{1}{2}''$, mifst in eerer Richtung $9'''$ bis $1''$ und von vorn nach hinten $'$ bis $9'''$; ihre Wände haben eine Dicke von beinahe $'$; daher ihr Lumen merklich kleiner ist, als ihr äufse-r Umfang. An ihrem oberen Ende hängt sie mit dem hlkopfe zusammen; steigt von hier an in der Mittellinie s Halses herab, bedeckt von dem oberflächlichen Blatte r Fascia cervicalis, den Mm. sternohyoidei und sterno-yreoidei und der Glandula thyreoidea: dringt hinter der isura semilunaris sterni in die Brusthöhle, steigt inner-lb derselben, hinter dem Manubrium sterni, der Vena onyma sinistra und Arteria carotis sinistra, bis zur Höhe s dritten Brustwirbels herab; und spaltet sich, unmittel-r hinter dem Arcus aortae, gabelförmig in zwei grössere, lbcylindrisch gestaltete *Äste, Bronchi* genannt. Diese nden sich in schräger Richtung abwärts, rechts und ks, zu den inneren Flächen der beiden Lungen: der *ronchus dexter* hat $11'''$ bis $15'''$ Länge, $8'''$ Breite, d $7'''$ im Dm. von vorn nach hinten; läuft hinter der

Vena cava superior und Arteria pulmonalis dextra, unter und vor dem oberen bogenförmigen Ende der Vena azygos, und dringt in der Höhe des vierten Brustwirbels in die sog. Wurzel der rechten Lunge mit zwei Hauptästen ein, von denen der untere beträchtlich länger ist, als der obere, und noch einen starken, abgesondert in den mittleren Lungenlappen eintretenden Ast abgibt. Der längere und etwas engere *Bronchus sinister* mifst 18‴ bis 21‴ in der Länge, 7‴ in der Breite und 6‴ von vorn nach hinten; dringt unter dem Bogen der Aorta hervor, steigt tiefer und mehr senkrecht, hinter der Arteria pulmonalis sinistra und vor der Art. aorta descendens herab, und tritt mit zwei Ästen in die Wurzel der linken Lunge, in der Höhe des fünften Brustwirbels. Beide Bronchi verbreiten sich durch baumförmige Spaltung im Gewebe der Lungen selbst: alle diese kleineren Verästelungen nennt man *Bronchia.*

Die Luftröhre und die beschriebenen Hauptäste derselben bestehen aus einer fibrösen Haut mit eingewebten Knorpelringen, aus Muskelfasern, elastischen Fasern und einer Schleimhaut. Die fibröse Haut besteht aus longitudinalen und schrägen kurzen Sehnenfaserbündeln, bildet den äufsersten Umfang der Röhre an der vorderen und den seitlichen Flächen derselben, bekleidet die Knorpelringe in der Art eines Perichondrium, und füllt die $\frac{3}{4}$‴ bis $\frac{5}{4}$‴ hohen Zwischenräume zwischen diesen Ringen aus. Die Knorpelringe, *Annuli cartilaginei tracheae*, sind nicht vollständig geschlossene Ringe, sondern hinterwärts offen, tragen nur zur Zusammensetzung der vorderen und Seitenwände bei, und erstrecken sich nicht in die hintere platte Wand: sie liegen in transversaler Richtung, sind $1\frac{1}{2}$‴ bis 2‴ hoch und $\frac{1}{2}$‴ dick, an ihrer äufseren Fläche gerade, an der inneren Fläche convex, am oberen und unteren Rande dünner; öfters gespalten und mit den benachbarten Ringen zusammenfliefsend. In der Luftröhre selbst finden sich 16 bis 20 Knorpelringe, von welchen der erste der höchste ist, und durch ein starkes ringförmiges Band, *Ligamentum cricotracheale*, mit dem unteren Rande der Cartilago cricoidea zusammenhängt: der letzte ist gleichfalls ansehnlich und von dreieckiger Gestalt. Der rechte Bronchus enthält 6 bis 8, der linke 9 bis 12 niedrigere un-

ılbkreisförmig gebogene Ringe. — An der hinteren plat-
n Wand der Luftröhre und Bronchi (welche an der er-
ren eine Breite von $5\frac{1}{2}'''$, am rechten Bronchus aber von
" und am linken von $7'''$ hat), findet sich, anstatt einer
rösen Haut mit Knorpelringen, eine schlaffe Zellhaut
d eine Muskelhaut, aus queerlaufenden blassen Muskel-
ern gewebt, die an die Enden der Knorpelringe sich
ften. An der ganzen inneren Fläche der Faserhaut, der
ıorpelringe und Muskelhaut, verlaufen lange, ziemlich
rallele, von oben nach unten gerichtete, gelbe elastische
serbündel, die durch schlaffen Zellstoff zusammengehalten
rden, und der Luftröhre und den Bronchi einen beträcht-
hen Grad von Elasticität, ihrer Länge nach, verleihen.
dlich wird der ganze innere Umfang dieser Röhren von
ıer feinen, sehr blassen Schleimhaut bekleidet; diese
igt aus dem Kehlkopfe herab, und ist unmittelbar mit
Schicht elastischer Fasern straff verwachsen. Die klein-
n Schleimdrüsen der Schleimhaut von der Gröfse eines
ndkorns liegen unmittelbar an ihrer äufseren Fläche;
meisten und ansehnlicheren von $\frac{1}{2}'''$ bis $\frac{3}{4}'''$ Dm. liegen
gegen theils zwischen den Knorpelringen an der inneren
iche der fibrösen Haut, theils an der hinteren Wand
ischen der Muskel- und Zellhaut, woselbst sie eine dicke
ammenhängende Schicht bilden: einzelne Schleimdrüsen
len sich auch an der äufseren Fläche der fibrösen Haut,
l durchbohren mit ihren kurzen Ausführungsgängen die
ıtigen Schichten der Luftröhre. — An dem äufseren
ıfange des unteren Theils der Luftröhre, vorzüglich an
Stelle ihrer Spaltung (Bifurcation) und an den Bronchi,
gen zahlreiche, ansehnliche, sehr weiche und von schwar-
n Farbstoff durchdrungene Lymphdrüsen, Glandulae
ınchiales.

Lungen.

Die Lungen, *Pulmones*, sind zwei unregelmäfsig
bkegelförmige Körper, welche die beiden Seitenhälften
Brusthöhle, mit Ausnahme des mittleren Theiles der-
ıen, genau ausfüllen, das Herz zwischen sich einschlie-
ı, und nur durch die Luftröhre und die aus dieser her-
gehenden beiden Bronchi mit einander in Verbindung

stehen. Ihre äufsere, gröfste, den Rippen zugewandte Fläche, *Superficies costalis*, ist convex; der vordere und der untere äufsere Rand sind dünn und scharf, ersterer oft eingekerbt; der hintere Rand breit und stumpf; die nach oben gerichtete Spitze abgerundet; die untere Fläche oder *Basis*, welche auf dem Zwerchfell ruhet, ist concav und schräg nach unten und innen gewendet; die innere Fläche berührt den Herzbeutel, ist beinahe senkrecht von oben nach unten gerichtet, in ihrer Mitte aber concav, vorzüglich die der linken Lunge. An dieser Fläche zeigt sich aufserdem, mehr gegen den hinteren Rand hin, eine längliche flache Vertiefung, in welcher die Bronchi, die Gefäfse und Nerven der Lungen ein- und austreten: diese Gegend ist die sog. *Lungenwurzel*, *Radix pulmonis*, und fast die einzige Stelle, an welcher jede Lunge mit anderen Theilen zusammenhängt, indem ihr ganzer übriger Umfang, mit Ausnahme des unteren Endes des hinteren Randes, frei und beweglich im Brustfellsacke liegt.

Die linke Lunge ist schmaler und länger, die rechte breiter, kürzer, überhaupt aber etwas gröfser als die linke im Verhältnifs wie 10 zu 9 im männlichen, wie 8 zu 7 beim weiblichen Geschlecht. Eine jede wird durch einen tiefen, schräg von hinten nach vorn herabsteigenden Einschnitt, *Incisura interlobularis*, in einen kleineren oberen und unteren gröfseren Lappen, *Lobi pulmonum superior et inferior*, getheilt; der obere Lappen der rechten zerfällt abermals, durch einen weniger tiefen, beinahe horizontalen Einschnitt, in einen vorderen kleineren und hinteren gröfseren Lappen: so dafs die linke Lunge nur in einen oberen und unteren, die rechte aber in einen oberen, mittleren (kleinsten) und unteren Hauptlappen abgetheilt ist. Jeder Hauptlappen besteht aus zahlreichen kleineren Läppchen, *Lobuli pulmonum*, welche aber dicht in einander gedrängt und an der Oberfläche der Lungen nicht durch Einschnitte, sondern nur durch sehr flache schmale Furchen, und im Inneren der Lungen durch Schichten von Zellstoff getrennt sind.

Die Farbe der Lungen eines Erwachsenen ist an sich weifslich oder gelblich grau: im frischen blutreichen Zustande aber rothgrau, blau und schwarz marmorirt; un

var so, dafs ein schmutziges Grauroth die Grundfarbe ist, elche von schwarzblauen Adern durchzogen, und stellenise mit rundlichen oder eckigen, eine oder einige Linien 1 Dm. haltenden Flecken besetzt ist. Diese Färbung rührt m dem in den Lungen enthaltenen und durch die Gefäfsände durchscheinenden Blute, und von schwarzen Theilen s Gewebes her.

Die Gröfse und das Gewicht sind in verschiedenen örpern überhaupt ungleich, und in jedem einzelnen Indiduum, durch die wechselnde Anfüllung und theilweise ntleerung von Luft und Blut, momentan verschieden. Die imensionen passen sich zum Theil denen der Höhle des norax an; es beträgt im Mittel

	rechte Lunge		linke Lunge	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.
e Höhe an der äufseren Fläche	10″	8″	11″	$8\frac{1}{2}$″
„ „ „ inneren „	6″	5″	$6\frac{1}{2}$″	$5\frac{3}{4}$″
r Dm. von vorn nach hinten	$7\frac{1}{2}$″	$6\frac{1}{2}$″	$6\frac{1}{2}$″	6″
r Queerdm. an der Lungenwurzel	$3\frac{1}{2}$″	$3\frac{1}{4}$″	3″	$2\frac{3}{4}$″
„ an der Basis	5″	$4\frac{1}{2}$″	$4\frac{3}{4}$″	4″

Diese Dimensionen nehmen um so mehr zu, je stärker e Lungen durch tieferes Einathmen mit Luft gefüllt und sgedehnt werden; können sich dagegen, unter den entgengesetzten Verhältnissen, noch verringern. — Das ewicht der in der Luft abgewogenen Lungen, oder das solute Lungengewicht, beträgt im Mittel für beide Lunn zusammen, wenn die Gefäfse derselben mäfsig mit Blut gefüllt sind, bei dem männlichen Geschlecht $3\frac{1}{2}$ Pfund, im weiblichen Geschlecht $2\frac{3}{4}$ Pfund, selten mehr, oft eniger. Von diesem Gewicht fallen auf die rechte Lunge i Männern 22, bei Weibern $17\frac{1}{2}$ Unzen, auf die linke nge 20 Unzen bei Männern, $15\frac{1}{2}$ Unzen bei Weibern. e absolute Schwere der Lungen im Vergleich zu der hwere des ganzen Körpers ist das sog. relative Lungenwicht: es verhält sich in den meisten Fällen wie 1 zu bis 50, ist aber sehr bedeutenden und häufigen individuellen Verschiedenheiten unterworfen, da die Gröfse und ewicht der Lungen durchaus in keinem constanten Ver-

hältnisse zu der Statur und der zu- oder abnehmenden Schwere des ganzen Körpers steht. — Das specifische Gewicht der Lungensubstanz, wenn diese von Luft vollkommen leer, ihre Gefäfse aber mäfsig angefüllt sind, übersteigt das des Wassers (daher sie in demselben zu Boden sinkt) und beträgt 1,0560. Da aber nach dem stärksten Ausathmen und nach dem Tode, eine gewisse Quantität von Luft in den Lungen zurückbleibt: so sind sie stets, nachdem sie einmal vollständig oder bis zu einem gewissen Grade mit Luft angefüllt gewesen, beträchtlich leichter als das Wasser, schwimmen auf demselben, und tauchen nur mit einem geringen Theile ihres Umfangs in dasselbe ein. Indessen findet man nach dem Tode auch das spec. Gewicht individuell verschieden, von 0,3429 bis 0,7392 wechselnd: und ist diese Verschiedenheit abhängig erstens — von der gröfseren oder geringeren Luftmenge, die in den Lungen zurückblieb; erstere verringert, letztere erhöhet das spec. Gewicht: — zweitens von der in den Lungen befindlichen Quantität von Blut; eine gröfsere Quantität desselben bewirkt eine Zunahme, eine geringere Quantität bewirkt eine Abnahme, sowohl des absoluten als des specif. Gewichts. Nach diesen Verhältnissen, besonders nach der Luftmenge, ist auch der Kubikinhalt oder das Volumen der Lungen verschieden. Das Volumen beider, von Luft völlig leeren Lungen beträgt, bei dem oben angegebenen absoluten Gewicht von $2\frac{3}{4}$ bis $3\frac{1}{2}$ Pfund und dem spec. Gewicht von 1,0560 = 47 bis $59\frac{3}{4}$ Kubikzolle: das der rechten Lunge 25 bis $31\frac{1}{3}$, das der linken 22 bis $28\frac{1}{2}$ Kubikzoll. Bei den nach dem Tode aus der Brusthöhle genommenen Lungen findet man es, wenn aus ihnen verhältnifsmäfsig viel Luft im Tode oder nach demselben entwichen ist, meistens doppelt so grofs: ist dagegen so viel Luft in ihnen zurückgeblieben, dafs ihr spec. Gewicht nur = 0,3429 ist, so haben beide Lungen zusammen ein Volumen von $144\frac{3}{4}$ bis 184 Kubikzoll, die rechte von $76\frac{3}{4}$ bis $96\frac{1}{2}$, die linke von 68 bis $87\frac{3}{4}$ Kubikzoll. — Die relative Schwere der Lungen zum Wasser, oder die Differenz zwischen ihrem absoluten Gewicht in der Luft und ihrem Gewicht, wenn sie gänzlich im Wasser untergesenkt gewogen werden, wird von Einigen respectives Lungengewicht genannt: es steht mit der

ecifischen Gewicht im Einklange: so ist z. B. eine Lunge n dem absoluten Gewicht einer Unze — wenn ihr spec. ew. 1,0560 beträgt — um $25\frac{1}{2}$ Gran respectiv schwerer, enn dagegen ihr spec. Gewicht 0,3429 beträgt — um 920 ran respectiv leichter als Wasser.

Das Gewebe der von Luft erfüllten Lungen ist sehr eich, schwammig, elastisch, ausdehnbar, unter dem Druck r Finger knisternd: auf den Schnittflächen dringt ein emenge von Luft, Blut und Wasser hervor, in Gestalt nes röthlichen Schaumes, dessen Bestandtheile unter Was- r sich trennen, indem das Blut zu Boden sinkt, die Luft er in Bläschen emporsteigt. Das Lungengewebe besteht is folgenden Theilen:

1) *Luftgefäfse, Bronchia*, und *Lungenbläschen* oder ngenzellen oder *Luftzellen, Vesiculae* s. Cellulae *pulmo- les*, s. *Cellulae aëreae.* Die Bronchia sind die, in dem ngengewebe selbst vertheilten, Zweige der Bronchi. och aufserhalb der Lungen spaltet sich der rechte Bron- us in einen oberen Ast von $4\frac{1}{2}'''$ Dm. und einen unteren n $5'''$ Dm., welcher letztere den $2\frac{1}{2}'''$ dicken mittleren t abgibt; der linke Bronchus theilt sich dagegen nur in en oberen $3\frac{3}{4}'''$ dicken, und einen unteren $4'''$ dicken t. Diese, für jeden grofsen Lungenlappen bestimmten, uptäste der Bronchi dringen in die Lungenwurzel, und lten sich, in der Substanz der Lunge verborgen, gabel- mig jeder in zwei kleinere Äste, und letztere weiter chotomisch in immer kleinere Zweige. Die gröfseren onchia besitzen einen gewissen Grad von Steifigkeit und her, auch im zusammengesunkenen Zustande der Lungen- bstanz, ein stets offenes Lumen; ihr Bau ist dem der onchi und der Luftröhre im Allgemeinen gleich, indem ch sie mit Knorpeln, elastischen Fasern und Muskelfasern rsehen sind: die Knorpel sind indessen keine Ringe, son- rn kleine, dünne, meistens eckige Platten, und liegen rzüglich an den Theilungsstellen, übrigens auch unregel- äfsig in den Wänden der Luftgefäfse zerstreut. An den onchia von $\frac{1}{2}'''$ Dm. fehlen schon die Knorpel gänzlich, doch besitzen diese noch elastische Fasern (nach Reiss- en auch Muskelfasern): die Schleimhaut wird allmählig mer feiner. Die engsten Bronchia bestehen nur aus einer

sehr dünnen durchsichtigen Zell- und Schleimhaut. Die letzten Endigungen der Bronchia werden von einem Häufchen sehr dicht an einander gedrängter Lungenbläschen umgeben, welche durch verhältnifsmäfsig weite Mündungen mit dem Ende des Luftgefäfszweiges, übrigens aber nicht unter einander communiciren. Ein solches Häufchen von Lungenbläschen oder Luftzellen, nebst dem von ihnen umgebenen kleinen Luftgefäfse, bildet ein rundliches traubenähnliches, oder ein vielseitiges, kleinstes Lungenläppchen von ungefähr $\frac{1}{2}'''$ Dm.; mehrere solcher Häufchen, die aber durch eine Zellstoffschicht von $\frac{1}{10}'''$ bis $\frac{1}{5}'''$ Dicke von einander abgegränzt sind, setzen ein gröfseres Lungenläppchen zusammen, zu welchem dann ein gröfseres mehrfach verzweigtes Luftgefäfs gehört. — Die Lungenbläschen sind rundlich eckig, haben einen Dm. von $\frac{1}{18}'''$ bis $\frac{1}{6}'''$, und werden von einer sehr zarten, ausdehnbaren, durchsichtigen, $\frac{1}{200}'''$ bis $\frac{1}{100}'''$ dicken Haut gebildet, welche mit der Schleimhaut der Bronchia ununterbrochen zusammenhängt: daher sie als blasige Erweiterungen der Enden der Bronchia angesehen werden können.

2) *Lungengefäfse, Vasa pulmonalia:* die Verzweigungen der ansehnlichen Arteriae und Venae pulmonales. Die *Lungenarterien* führen schwarzes (venöses) Blut, dringen rechterseits mit drei, linkerseits mit zwei Hauptästen in die Lungenwurzel ein; spalten sich in gröfsere Äste, welche die gröfseren Bronchia begleiten und meistens oberhalb derselben verlaufen; vertheilen sich in einzelne Zweige für jedes Lungenläppchen, und endigen an den Vesiculae pulmonales. Hier gehen sie in Capillargefäfse, und diese in die feinsten Wurzeln der *Lungenvenen* über: welche sich zu gröfseren Ästen vereinigen, die meistens unter den gröfseren Bronchia laufen, und endlich aus der Wurzel jeder Lunge mit zwei abgesonderten Stämmen hervortreten; sie besitzen keine Klappen, sondern nur sehr schmale halbmondförmige Falten an den spitzigen Winkeln der Spaltung. Das in ihnen rinnende Blut ist rothes (arterielles). Unter den Capillargefäfsen, welche den unmittelbaren Übergang der Endigungen der Arterien in die Anfänge der Venen vermitteln, sind dickere und feinere zu unterscheiden: erstere von $\frac{1}{100}'''$ Dm. umgeben die Lungenbläschen kranz-

ig und bilden ein durch ein ganzes Lungenläppchen ammenhangendes Netz, dessen Zwischenräume oder Maen denselben Dm. haben, als die Lungenbläschen selbst: ı diesen gröfseren Haargefäfsen werden sodann die feien Capillargefäfse abgegeben und aufgenommen, welche h allen Richtungen die Wände der Lungenbläschen chziehen, und ein so enges Netz bilden, dafs die Maen desselben nur eine dem Dm. der Capillargefäfse iche Weite darbieten. Diese feinen Capillargefäfse hameistens einen Kaliber von $\frac{1}{400}'''$ bis $\frac{1}{325}'''$, ja sogar zelne nur von $\frac{1}{900}'''$ bis $\frac{1}{800}'''$. Indem das Blut durch se Capillargefäfse rinnt, ändert sich die schwarze Farbe Lungenschlagaderblutes in die rothe des Lungenvenentes um.

3) *Bronchialgefäfse, Vasa bronchialia*, sind bei Weitem er und geringer an Zahl als die Pulmonalgefäfse und ören dem grofsen Blutkreislaufe an: die kleinen Stämmn der Arteriae bronchiales, 2 bis 4 an der Zahl, entngen von der Aorta oder den Arteriae intercostales weilen eine oder die andere aus den Aa. mammariae rnae oder der A. subclavia sinistra): die Venae bronles ergiefsen sich in die Vena azygos, oder in eine der ıae intercostales, oder in die Vena cava superior: zum il aber schon innerhalb der Lungensubstanz in Pulmorenen. In sehr geschlängeltem Verlaufe und weitmage Netze bildend, begleiten sie die gröfseren Bronchia, theilen sich in dem Zellstoff der Lungen und an die ura pulmonalis, und ernähren die genannten Theile, entlich auch die Schleimhaut der Bronchia und die ndulae bronchiales, verbreiten sich aber nicht an die ıgenbläschen. Sie anastomosiren vielfach, und zwar rs durch Äste von $\frac{1}{5}'''$ Dm., mit den Pulmonalgefäfsen.

4) Zahlreiche *Lymphgefäfse*, welche theils an der Oberhe der Lungen ansehnliche dichte Netze bilden und mit n Stämmchen gegen die Lungenwurzel hin sich wenden: ls tiefe, die Bronchia und Pulmonalgefäfse begleitende nphgefäfse. Ein Theil der letzteren geht durch kleine, hstens linsengrofse Lymphdrüsen, *Glandulae pulmonicae*, noch im Gewebe der Lunge selbst, nahe an den grö'en Bronchia liegen, und bei Erwachsenen meistens von

schwarzem Farbstoff durchdrungen sind. Alle Lymphgefäfse der Lungen sammeln sich zuletzt in den, aufserhalb der Lunge, längs den Bronchi und an der Theilungsstelle der Luftröhre, liegenden Glandulae lymph. bronchiales.

5) *Nerven*, die an jeder Seite aus dem, hinter dem Bronchus liegenden Plexus pulmonalis stammen, welcher aus zahlreichen, dem Nervus vagus und dem Gangliensystem angehörenden Ästen und Schlingen zusammengesetzt ist. Die von diesem Plexus ausgehenden Nerven sind zahlreich, dünn, dringen mit den Bronchia und Stämmen der Pulmonalgefäfse in das Lungengewebe ein, lassen sich auch bis an die Häute der gröfseren Bronchia verfolgen; entziehen sich aber durch ihre Feinheit der Untersuchung, noch bevor sie an die kleineren Lungenläppchen gelangt sind.

6) Ein aus feinen kurzen Fasern und Blättern bestehender, sehr dehnbarer *Zellstoff* vereinigt alle übrigen, die Lunge zusammensetzenden Theile mit einander: bildet Schichten zwischen den Lungenbläschen, die kaum so dick sind, als die Wände dieser Bläschen selbst: ferner Schichten zwischen den kleinsten Lungenläppchen von $\frac{1}{10}'''$ bis $\frac{1}{6}'''$ Dicke, und verhältnifsmäfsig ansehnlichere Schichten zwischen den gröfseren Läppchen. Dieser Zellstoff enthält niemals Fett, bei Erwachsenen lagert sich aber in ihn schwarzer Farbstoff ab, welcher aus Anhäufungen von rundlichen und länglichen, schwarzen, $\frac{1}{260}'''$ Dm. haltenden Körnchen besteht; und einzelne unregelmäfsige, gröfsere und kleinere, schwarze Flecken bildet.

7) Eine dünne seröse Haut, *Pleura pulmonalis* s. Membrana pulmonum, überzieht die ganze Oberfläche der Lungen, dringt in die Incisura interlobularis, auch in den Einschnitt zwischen dem oberen und mittleren Lappen der rechten Lunge, aber nicht zwischen die kleineren Läppchen der Lunge ein; umwickelt die Bronchi und Gefäfsstämme an der Lungenwurzel ziemlich locker; ist aber übrigens mit der Oberfläche der Lungen durch eine sehr dünne Zellstoffschicht so innig verwachsen, dafs die oberflächlichen Lungenbläschen und Gefäfse durch sie hindurch schimmern.

Bei der Inspiration dringt die atmosphärische Luft durch die etwas erweiterte Stimmritze, durch die Luftröhre

d deren gröfsere und kleinere Äste, bis in die Lungen-
schen, und dehnt die ganze Lunge stärker aus. Die
ft, insbesondere das Sauerstoffgas derselben, durchdringt
dünnen feuchten Häute der in den Wänden der Lun-
ıbläschen vertheilten Capillargefäfse, tritt mit dem in
ıen circulirenden Blute in Berührung, und geht mit
nselben neue Verbindungen ein; während das Stickstoff-
, ohne besondere Veränderungen zu erleiden, die Lun-
ıbläschen ausgedehnt erhält. Der Sauerstoff verbindet
ı nämlich zum Theil mit dem, an die einzelnen Bestand-
ile des Bluts, namentlich an das kohlensaure Natron,
ıundenen Kohlenstoff und Wasserstoff, und bildet mit
sen Kohlensäure und Wasser. Diese werden als koh-
saures Gas und wässeriger Dunst, — welcher letztere
igens grofsentheils aus den Capillargefäfsen direct in
Lungenbläschen ausgehaucht wird, — mit dem in den
ngenbläschen zurückgebliebenen Stickstoffgase gemischt,
l durch die Exspiration aus den Lungen wiederum ent-
nt. Übrigens geht auch ein Theil des Sauerstoffs mit
ı Bestandtheilen des Bluts und des demselben zu gewissen
iten beigemengten Chylus, bleibende, der Blutmischung
sentlich angehörende Verbindungen ein. Die Functio-
ı der Lungen sind daher die Bewirkung einer Verände-
ıg der Blutmasse, insbesondere Befreiung derselben von
hlensäure und Wasser, Umwandelung des schwarzen
ıösen Blutes und des Chylus in rothes arterielles Blut:
l die Unterhaltung des, für die angeführten Zwecke
gerichteten, kleinen Blutkreislaufes; welcher nur wäh-
d der Respiration frei und ungehindert vor sich geht,
;egen in von Luft nicht ausgedehnten Lungen nur in
ır beschränktem Maafse Statt findet. Zur Ausübung die-
Functionen sind die Lungen beständig von einer gewis-
ı Menge Luft, wahrscheinlich 100 bis 110 Kubikzoll bei
wachsenen, erfüllt, welche durch jede einzelne In- und
spiration nur theilweise erneuert wird. Bei ruhiger,
ht angestrengter Respiration, bei welcher in jeder Mi-
:e 16 bis 20 Athemzüge erfolgen, wird durch jede Inspi-
ion im Mittel 20 bis 25 Kubikzoll Luft aufgenommen,
l eine gleiche Menge exspirirt (Herbst): letztere enthält
gefähr $\frac{1}{3}$ Gran Wasser und besteht aus 8 p. C. Kohlen-

säuregas, 13 p. C. Sauerstoffgas und 79 p. C. Stickstoffgas (Allen u. Pepys.). Durch eine sehr tiefe, mit Anstrengung vollführte Inspiration, können aber die Lungen zu der in ihnen bereits vorhandenen Luft, 60 bis 140 K. Z. Luft aufnehmen und alsdann mit 170 bis 250 K. Z. angefüllt sein; und durch gleich kräftige, mehrmals wiederholte Exspirationen bis zu einem Inhalt von 35 K. Z. sich entleeren. Die in den Lungen zurückgebliebene Luft läfst sich aus frischen, nicht faulenden Lungen vermittelst Druckes nicht gänzlich durch die Bronchia entfernen: vielmehr dringt sie bei einem, bis zur Zerreifsung der Lungenbläschen verstärkten Drucke in den Zellstoff der Lungen.

Brusthöhle. Brustfelle.

Die äufsere schützende Umgebung der Lungen wird von den Wänden der Brusthöhle und von den Brustfellen gebildet.

Die Brusthöhle, Cavum thoracis, ist der innere Raum des knöchernen Thorax (S. 163), welcher durch verschiedene, die Zwischenräume zwischen den Knochen ausfüllende, weiche Theile vervollständigt wird. Diese sind insbesondere an der hinteren Wand die Mm. levatores costarum und intercostales externi, an den Seitenwänden die Mm. intercostales externi und interni und die Mm. infracostales, wenn solche vorhanden: an der vorderen Wand die Ligg. coruscantia und vorderen Enden der Mm. intercostales externi und interni und die Mm. triangulares sterni (S. 244 ff.). Diese Muskeln bilden eine so dicke Lage, dafs die Rippen nur in der Mitte ihrer inneren Flächen frei bleiben und nicht in die Brusthöhle hervorragen: vielmehr die der Höhle zugewandte Fläche des Thorax beinahe eben erscheint. Die untere Wand der Brusthöhle wird gänzlich vom Zwerchfell gebildet und ist sehr convex; indem sie von vorn nach hinten und nach beiden Seiten stark abfällt, in ihrem mittleren vorderen Theile in gleicher Höhe mit den Knorpeln des fünften Rippenpaares, dem oberen Rande des Mittelstücks des siebenten, und den hinteren Extremitäten des achten Rippenpaares steht: seitwärts aber zu den Knorpeln und Mittelstücken der Costae spuriae, und hinten zur Höhe des zwölften Brustwirbels und des zwölften Rip-

ıpaares herabsteigt: so dafs der hintere und seitliche eil der Brusthöhle tiefer hinabreicht, als der obere Theil · Bauchhöhle. Die obere Öffnung des Brustkastens wird ht durch eine transversale Scheidewand geschlossen, dern durch Organe beträchtlich verengert, welche meis in longitudinaler Richtung neben einander liegen und ch Zellstoff vereinigt werden: diese sind die Mm. longi li, scaleni, sternothyreoidei, die Luft- und Speiseröhre, Arteriae carotides communes, Aa. subclaviae, und Venae ımymae.

Die Brustfelle, Pleurae, sind seröse Häute, lche in jeder Seitenhälfte der Brusthöhle zu einem bederen, von dem anderen vollkommen getrennten Sack, *ccus pleurae dexter et sinister*, gestaltet sind. Jeder derben zerfällt in einen äufseren und inneren Sack; der tere bekleidet die Wände der Brusthöhle, stülpt sich r an der Lungenwurzel um, und geht in den inneren k, die sog. *Pleura pulmonalis* (S. 476) über, welcher die erfläche der Lunge überzieht. Der äufsere Sack, vorsweise *Saccus pleurae* genannt, ist an der Seitenwand · Brusthöhle durch Zellstoff genau an die Rippen und ercostalmuskeln geheftet (*Pleura costalis*), und zwar ter mit den inneren Flächen der Rippen, als mit den ıskeln verwachsen: in der oberen Öffnung des Thorax det er einen rundlichen, an die ausfüllenden Muskeln l Gefäfse gehefteten Beutel, in welchem die Spitze der nge enthalten ist. Unterwärts ist der Saccus pleurae t der oberen Fläche des Zwerchfells genau verwachsen *leura phrenica*): schickt aber von hier eine dreieckige laffe Duplicatur, *Ligamentum pulmonis*, zum hinteren nde des unteren Lappens der Lunge; diese geht in die ura pulmonalis über, und befestigt die übrigens frei liede Lunge einigermafsen in ihrer Lage. Die hintere iche des Brustbeins wird nur unvollständig von der ura überzogen: von der vorderen Wand der Brusthöhle ndet sich das Brustfell rückwärts zum Herzbeutel, hef sich an die Seitenfläche desselben und gelangt zur Lunıwurzel: auf gleiche Weise wird die Vorderfläche der irbelsäule von den Brustfellen nicht bekleidet, sondern se erstrecken sich von den Köpfen der Rippen und den

Seitenflächen der Wirbelsäule nach vorn bis zum Herz
beutel und zur Lungenwurzel. Hier umwickeln die Brust
felle erst die Bronchi und die Gefäfse und Nerven an de
Lungenwurzel, bevor sie, sich einstülpend, als Pleura pul
monalis über die Lungensubstanz sich ausbreiten. Die vo
vorn nach hinten und von hinten nach vorn durch di
Brusthöhle sich erstreckenden Theile der Sacci pleurae
welche nebst dem Herzbeutel eine Scheidewand zwische
der rechten und linken Hälfte der Brusthöhle bilden, nenn
man das *vordere* und *hintere Mittelfell*, *Media
stinum anterius et posterius*; jedes besteht aus einen
rechten und linken, dem rechten und linken Saccus pleura
angehörenden Blatte, welche aber einander nicht berühren
sondern einen von verschiedenen Organen ausgefüllten Raum
zwischen sich lassen: *Cavum mediastini anterioris et poste
rioris* genannt. Das rechte Blatt des Mediastinum anteriu
ist mit seinem vorderen Rande oben hinter den Rippen
knorpeln und Manubrium sterni, unten aber hinter de
Mitte des Corpus sterni und selbst hinter dem linken Rand
desselben angewachsen: das linke Blatt aber nur oben hin
ter dem Manubrium und den obersten Rippenknorpeln
unten dagegen an den äufseren Enden des sechsten un
siebenten Rippenknorpels befestigt: daher ist das vorder
Mittelfell nur in seinem oberen Theile senkrecht in de
Mittellinie, unterwärts aber schräg nach der linken Seit
gerichtet: sein Cavum aber hinter dem oberen Ende de
Corpus sterni am schmalsten, unten dagegen, hinter den
sechsten und siebenten Rippenknorpel, am breitesten. Da
Cavum mediastini anterioris ist von geringer Tiefe, wir
hinterwärts begränzt (und vom Cavum mediastini posterio
ris getrennt) durch die vordere Wand des Herzbeutels
durch die oberhalb desselben liegenden grofsen Gefäfse
nämlich durch die Vena cava superior und Venae anony
mae, Arcus aortae, Arteria anonyma und Aa. carotides un
Aa. subclaviae, auch durch die Luftröhre, die Bronchi un
sehr kurze Strecken der Pulmonalgefäfsstämme: — es en
hält die oberen Enden der Vasa mammaria interna, linker
seits auch die unteren Enden dieser Gefäfse; ferner Saug
adern mit den Glandulae substernales und Gl. mediastina
anteriores, die Nervi phrenici, die Glandula thymus, un

len lockeren, meistens fettreichen Zellstoff. — Die von
Seitenflächen der Wirbelsäule ausgehenden Blätter des
teren Mittelfells steigen regelmäfsig senkrecht herab:
Cavum mediastini posterioris, welches hinten von der
rbelsäule, vorn von der hinteren Wand des Herzbeutels,
Luftröhre und den grofsen Gefäfsen begränzt wird, ist
ger und geräumiger und enthält die Arteria aorta de-
ndens thoracica, die Speiseröhre, welche oberwärts an
rechten Seite, unterwärts vor der A. aorta herabsteigt
von den Plexus oesophagei der Nn. vagi umstrickt
d; die an der rechten Seite der A. aorta aufsteigende
na azygos, die hinter jener Arterie aufsteigende Vena
iiazygos, die Stämme der rechten Aa. intercostales und
rere Endigungen der Venae intercostales sinistrae, den
schen A. aorta und Vena azygos aufsteigenden Ductus
racicus, Lymphgefäfse und Glandulae mediastinae poste-
es, und die Nn. splanchnici majores.

Thymusdrüse.

Die Thymusdrüse, *Glandula thymus*, *Thymus*,
stdrüse, Briesel, ein Ganglion vasculare, findet sich in
kommener Ausbildung zwar nur während des Foetus-
andes und der ersten Lebensjahre (vgl. Bd. II.), und
indert und verkleinert sich allmählig vom dritten bis
vierzehnten Jahre: indessen ist sie sehr häufig noch
völlig erwachsenen Menschen, sehr selten aber im Grei-
lter und während der ganzen Lebensdauer vorhanden.
Sie liegt hinter dem Manubrium sterni im oberen
ile des Cavum mediastini anterioris; den oberen Theil
vorderen Wand des Herzbeutels, die Vena cava supe-
; die Venae anonymae, den Arcus aortae und dessen
unmittelbar bedeckend; und mit diesen Theilen und
Blättern des Mittelfells fester, lockerer dagegen mit
Sternum, durch Zellstoff verbunden; öfters reicht sie
hinter den Mm. sternothyreoidei bis zum unteren
ile des Halses hinauf, sogar an die Glandula thyreoidea
zend. Sie hat eine länglich platte Gestalt, besteht aus
i seitlichen Hauptlappen, die in einem schmaleren mitt-
n Theile der Thymus zusammenfliefsen, oft aber auch

nur durch Zellstoff zusammenhangen: nach oben und nach unten laufen diese Hauptlappen in zwei zugespitzte Zipfel *Cornua superiora et inferiora,* von ungleicher Gröfse aus von denen meistens die oberen länger sind als die unteren Der rechte Hauptlappen ist meistens überhaupt ansehnlicher Die Länge der Thymus von oben nach unten beträgt be Erwachsenen 2″ bis $3\frac{1}{2}$″: ihre Breite in der Mitte 1″ bi $1\frac{1}{2}$″, oben und unten $1\frac{1}{2}$″ bis $2\frac{3}{4}$″: ihre Dicke von vor nach hinten 2‴ bis 4‴: ihr Volumen $\frac{1}{5}$ bis $1\frac{1}{6}$ Kubikzoll ihr Gewicht 70 Gran bis 9 Drachmen, ihr spec. Gewich 1,0299 bis 1,0352. Ihre Farbe ist blafs grauröthlich; ih Gewebe weich, zähe, aus Zellstoff und Knaueln von Blut und Lymphgefäfsen bestehend; welche, von dichteren Zell gewebsschichten umgeben, einzelne, genau zusammenhan gende Läppchen darstellen; so wie auch die ganze Thymu von einer dünnen, aber festen Zellschicht umhüllt wird Sie ist bei Weitem weniger gefäfsreich, als die Glandul thyreoidea, und enthält bei dem Erwachsenen keine Höh lungen im Inneren. Ihre Function ist unbekannt.

erdauungsorgane, Organa digestionis.

I. Ingestionsorgane, Organa ingestionis.

Zu diesen gehören die Mundhöhle, der Schlundkopf die Speiseröhre, welche den *Tubus ingestorius*, der oberhalb des Zwerchfells befindliche Theil des zen Nahrungsschlauchs oder Speisekanals, Tubus alitarius, zusammensetzen. In der Mundhöhle (S. 432), che zuerst die Nahrungsmittel aufnimmt, geschieht durch ung, Einspeichelung und theilweise Auflösung derselben, n durch Bildung des Bissens, die erste Veränderung der nente, welche durch den ersten Act des Schlingens in Pharynx (S. 451) gebracht, und aus diesem durch den iten Act des Schlingens weiter in die Speiseröhre ge- t werden.

Speiseröhre.

Die Speiseröhre oder der Schlund, *Oesophagus s.* , ist ein häutiger Kanal, dessen oberes Ende aus dem ren Ende des Pharynx hervorgeht und durch sein un- s Ende mit dem Magen ununterbrochen zusammenhängt. beginnt hinter der Cartilago cricoidea, und steigt, durch es schlaffes Zellgewebe an die hintere Wand der Luft- e geheftet und durch diese breitere Röhre von vorn gänzlich verdeckt, hinten an die Wirbelsäule gränzend, s nach der linken Seite herab: so dafs vor ihrem Ein- in die Brusthöhle ihre linke Seitenwand mit der lin- Seitenwand der Luftröhre parallel liegt. Sodann durch bere Öffnung des Brustkastens in das Cavum mediastini erioris gelangt, läuft sie hinter dem Herzbeutel, vor vorderen Fläche der Wirbelsäule herab; anfangs in der ellinie, neben der mehr links herabsteigenden Art. aorta endens thoracica: alsdann aber wiederum mehr nach und vorn, vor die A. aorta sich wendend: — bis sie,

in der Höhe des neunten Brustwirbels, durch den Hiatus oesophageus des Zwerchfells in die Bauchhöhle dringt, und sogleich in den oberen Magenmund übergeht. Sie ist 8″ bis 9″ lang und überall von gleicher Weite, aber beträchtlich enger als der Pharynx; im zusammengezogenen leeren Zustande abgeplattet, 8‴ breit und von vorn nach hinten 4‴ dick, wobei die inneren Flächen ihrer vorderen und hinteren Wand einander berühren: bei dem Durchgang fester Körper kann sie bis zu 11‴ Dm. ausgedehnt werden.

In ihrer Zusammensetzung ist sie dem Pharynx ähnlich, indem auf die äufsere zellige Schicht eine starke Muskelhaut und eine Schleimhaut folgt. Die Muskelhaut, welche im zusammengezogenen Zustande eine Dicke von $\frac{4}{5}$‴ hat, besteht aus einer äufseren, dickeren und sehr vollständigen Schicht longitudinaler Fasern und einer, von jener bedeckten, inneren Schicht schwächerer Kreisfasern. Am oberen Ende der Speiseröhre sind beide Schichten mit den Fasern des M. constrictor pharyngis inferior innig gemischt: am unteren Ende gehen die Längenfasern in die erste, die Kreisfasern in die dritte Schicht der Muskelhaut des Magens über. Die Muskelhaut wird mit der Schleimhaut durch eine dünne, aber ziemlich feste Zellstoffschicht, Lamina cellulosa (auch Tunica nervea s. vasculosa genannt), verbunden, welche mit dem Gewebe der Schleimhaut vorzüglich genau zusammenhängt. Letztere ist die Fortsetzung der Schleimhaut des Pharynx, aber dünner als diese, blafsröthlich und in der unteren Hälfte der Speiseröhre weifslich; schlaff und dehnbar, im zusammengezogenen Zustande des Schlundes der Länge nach gefaltet; und mit einzeln stehenden, meistens kleinen Schleimdrüsen versehen, von denen die gröfseren, $\frac{1}{2}$‴ breiten, gröfstentheils in der Lamina cellulosa liegen. Ihre freie Fläche ist mit sehr kleinen und länglich schmalen Flocken oder Zasern besetzt und von einem ziemlich dicken weichen Epithelium überzogen, welches bei dem Übergange der Speiseröhre in den Magen in das dünnere Epithelium des letzteren sich fortsetzt.

Durch die von oben nach unten fortschreitende Zusammenziehung der Muskelfasern der Speiseröhre, wobei die Kreisfasern den Kanal oberhalb des Bissens verengern, die Longitudinalfasern aber die einzelnen Strecken der Röhre

rkürzen und über den Bissen hinaufziehen, werden die imente aus dem Pharynx bis in den Magen hinabgetrie- n. Diese Bewegung geschieht vollkommen unwillkühr- h und bei Weitem langsamer, als im Pharynx, indem festen trockenen Nahrungsmitteln mehrere Minuten zu sem Durchgange erforderlich sind.

Chylificationsorgane, Organa chylopoëtica.

Diese bewirken die vollständigere Auflösung und Um- ndelung der Nahrungsmittel, die Bereitung des Nahrungs- es, *Chylus*, (wie ihr Name ausdrückt), und die Aufnahme selben in den Kreislauf durch Einsaugung. Sie liegen erhalb der Bauchhöhle, in einem serösen Hautsacke, n *Bauchfell*, *Peritonaeum*, eingeschlossen, dessen äufserer chlossener Sack an die Wände der Bauchhöhle geheftet *Saccus peritonaei* s. *Peritonaeum abdominale*: — einge- pte faltenartige Verlängerungen oder Duplicaturen und chen des äufseren Sackes treten innerhalb der Höhle letzteren an die einzelnen Organe, als sog. *Peritonaeum stinale s. viscerale*; bilden den äufsersten Überzug die- Organe und befestigen sie in ihrer Lage.

Zu den Chylificationsorganen gehören der Verdauungs- al, Tubus digestorius (d. i. der unterhalb des Zwerch- liegende Theil des ganzen Nahrungsschlauchs, Tubus ıentarius), die Leber, Bauchspeicheldrüse und Milz.

Der *Tubus digestorius* s. digestivus, aus dem *gen* und dem *Darmkanal*, *Canalis intestinalis*, bestehend, im Allgemeinen weiter als der Tubus ingestorius, und et überall die Gestalt eines rundlich röhrenförmigen, tigen, ausdehnbaren Schlauches dar, dessen ganze Länge Mittel 25 Fufs beträgt: indessen ist diese an sich, so im Verhältnifs zur Länge des Körpers (im Mittel 5 : 1), hinsichtlich der Länge der einzelnen Abtheilungen des rungsschlauchs zu einander, häufigen Varietäten unter- fen. Er wird im Allgemeinen aus drei Häuten gebildet: 1) *Seröse Haut*, *Tunica serosa* s. *Peritonaeum intesti-* ; diese gelangt von der oberen und hinteren Wand der

Bauchhöhle aus zum Verdauungskanal als eine, aus zwe
Platten oder Blättern gebildete Falte; welche sich erwei
ternd den Tubus digestorius umgibt und ihm den äufserste
glatten feuchten Überzug verleihet; aber einen breitere
oder schmaleren Streifen, meistens an der hinteren Wan
des Kanals, unbedeckt läfst, an welchem die zahlreiche
zwischen den Blättern der Falte verlaufenden Gefäfse un
Nerven, in die übrigen Häute eindringen.

2) *Muskelhaut, Tunica muscularis*, eine dünne, aus blafs
röthlichen, ringförmigen und longitudinalen Fasern un
feinem Zellstoff gewebte Haut: die Längenfasern bilden d
äufsere dünnere, die ringförmigen die innere dickere un
vollständigere Schicht derselben. Mit der serösen Haut i
sie an den meisten Stellen durch kurzen straffen Zellsto
ziemlich fest verbunden; nur da, wo die von dem Sacc
peritonaei ausgehende Duplicatur desselben den Verdauung
kanal erreicht, ist die Verbindung beider Häute um Viel
lockerer. Die Muskelhaut ist bestimmt, durch unwillküh
liche Contraction den Kanal zu verengern; die Kreisfase
bringen eine Zusammenschnürung, die Längenfasern ei
Verkürzung desselben zuwege: — indem diese Contracti
nen von oben nach unten fortschreiten, geräth der gan
Kanal, eine Strecke desselben nach der andern, in die s
wurmförmige Bewegung, Motus peristalticus, durch welc
die in ihm enthaltenen Massen bis zum After hin gedrä
werden.

3) *Schleimhaut, Tunica mucosa*, bildet den ganzen in
ren Umfang des Kanals vom Ende der Speiseröhre bis z
After, bietet aber in den einzelnen Strecken eine zieml
verschiedene Beschaffenheit dar. Mit der Muskelhaut w
sie überall durch eine dicht und fest gewebte, weifsli
Zellstoffschicht, *Lamina cellulosa* s. Tunica propria s. n
vea s. vasculosa, verbunden, in welcher die gröfseren,
Schleimhaut angehörenden Gefäfse sich verästeln und Ne
bilden; auch sind die gröfseren Drüsen der Schleimh
mit einem ansehnlichen Theile ihres Umfanges in die Di
dieser Lamina cellulosa eingesenkt.

Der Tubus digestorius zerfällt in drei Hauptabtheil
gen, Magen, Dünndarm und Dickdarm.

M a g e n.

Der Magen, *Ventriculus* s. Stomachus s. Gaster, die Gestalt eines länglich kegelförmigen, oberwärts ıcav, unterwärts convex gebogenen Sackes, und liegt in ɜerer Richtung in der Regio epigastrica, erstreckt sich ɜr mit seinen Enden in beide Hypochondrien. Man ɜerscheidet an ihm den mittleren abhängigsten Theil, *rpus ventriculi;* das linke, weitere, blind geschlossene de oder Magengrund, *Fundus ventriculi* s. *Portio splenica;* l das rechte, engere, etwas nach oben gekrümmte Ende, *rtio pylorica* s. *Antrum pylori,* welches häufig durch eine hte Einschnürung von dem mittleren Theile deutlich ɜegränzt wird. Die vordere und hintere Wand liegen leeren Zustande des Magens schlaff an einander; sind ɜegen im angefüllten Zustande, erstere etwas nach oben, ɜtere nach unten gewendet. Diese Wände gehen an den ɜenförmigen Magenrändern in einander über: der obere ıd ist die sog. kleine Magenkrümmung oder Bogen, *rvatura minor ventriculi,* von der Cardia bis zum Pylorus ı erstreckend, und nach oben concav, nur in der Nähe Pylorus convex ausgeschweift: der untere Rand, die ɜfse Magenkrümmung oder Bogen, *Curvatura major ven-ɜuli,* erstreckt sich vom Fundus bis zum Pylorus und ist h unten convex gebogen; krümmt sich aber in der Nähe Pylorus wiederum nach oben, erscheint daher hier nach en concav ausgeschweift. Im angefüllten Zustande des gens werden diese Ränder breiter und stellen eine obere l eine untere Magenwand dar; die Curvatura minor ist lann mehr nach hinten, die Curvatura major mehr nach n gerichtet. — Der obere Magenmund, *Cardia* s. Ostium ophageum, liegt am oberen Magenrande, zwischen dem ndus und dem Anfange der Curvatura minor, und hängt eine trichterförmige, nach oben verengerte Öffnung mit n Oesophagus ununterbrochen zusammen: der untere genmund oder Pförtner, *Pylorus* s. Ostium duodenale, indet sich am rechten Ende des Magens, bezeichnet den ergang des Magens in das Duodenum, und ist auswendig einer Einschnürung kenntlich; innerhalb der Höhle des gens aber von einer ringförmigen Falte, *Valvula pylori,* geben.

Die Cardia liegt in der Herzgrube, unmittelbar unter und vor dem Hiatus oesophageus des Zwerchfells, hinter der Spitze des linken Leberlappens; der mittlere Theil des Magens nimmt die Regio epigastrica ein, wird aber an der Curvatura minor und dem gröfsten Theile der vorderen Wand von dem linken Lappen der Leber bedeckt; nur der untere Theil der vorderen Wand liegt frei und nahe hinter der vorderen Bauchwand: die an das Colon transversum gränzende Curvatura major ragt mit ihrem abhängigsten mittleren Theile oft in die Regio umbilicalis herab. Der Fundus liegt etwas höher als der mittlere Theil des Magens und ragt mit seinem Ende in das Hypochondrium sinistrum, an die innere Fläche der Milz gränzend; der Pylorus liegt im Hypochondrium dextrum, hinter dem Lobulus quadratus der Leber.

Der Magen mifst in seiner Länge vom Fundus bis zum Pylorus 10″ bis 12″; von der Curvatura minor bis zur Curvatura major, an seinem mittleren Theile $3\frac{1}{2}$″ bis 4″, am Fundus $4\frac{1}{2}$″, am Antrum pylori aber nur $1\frac{1}{2}$″ bis 2″; im ausgedehnten Zustande stehen seine Wände eben so weit, als die Curvaturen, von einander ab: die Cardia und der Pylorus haben eine Weite von 1″; beide sind während der Verdauung überhaupt sehr verengert, vorzüglich der Pylorus, bei welchem alsdann eine gänzliche Verschliefsung mit einer theilweisen Eröffnung wechselt; dagegen aufser der Zeit der Verdauung die Ränder dieser Öffnungen schlaff an einander liegen.

Die seröse Haut oder der Peritonealüberzug bekleidet die vordere und hintere Magenwand genau und läfst nur ziemlich schmale Streifen an den Curvaturen und am Fundus frei, woselbst die Gefäfse und Nerven verlaufen. Die Falten oder Verdoppelungen des Bauchfells, durch welche der Magen an die nahe gelegenen Theile befestigt wird, sind: 1) Das *Ligamentum phrenicogastricum dextrum et sinistrum*, welche von der oberen, mit dem Zwerchfell verwachsenen Wand des Saccus peritonaei aus, an beide Seiten der Cardia treten, bis zum Fundus und zur Curvatura minor reichen, und in die seröse Haut der vorderen Magenwand übergehen. 2) Das *Ligamentum gastrolienale* s. splenicogastricum, zwischen dem Fundus des Magens und

m Hilus der Milz, geht in die vordere und hintere agenwand über. 3) Das *kleine Netz, Omentum minus* s. *strohepaticum*, zwischen der kleinen Curvatur und der ncaven Seite der Leber ausgespannt; seine vordere Platte rbreitet sich über die vordere, seine hintere Platte über hintere Magenwand. 4) Das *Omentum gastro-colicum* er der Anfang des *grofsen Netzes, Omentum majus,* von r vorderen und hinteren Magenwand ausgehend, erstreckt h von der grofsen Curvatur zum Colon transversum.

Die Muskelhaut ist stark und dick, jedoch schwächer die der Speiseröhre; die Fasern ihrer ersten Schicht d Fortsetzungen der Longitudinalfasern des Oesophagus d verlaufen theils longitudinal an der Curvatura minor, ils strahlenförmig divergirend in der vorderen und hinen Magenwand, gegen den Fundus und Pylorus hin, in was schräger Richtung sich verbreitend. Über die von r Valvula pylori gebildete Einschnürung gehen sie hinweg, ohne in diese einzudringen. Die zweite stärkste hicht besteht aus ringförmigen Fasern, welche den Ma- n in der Richtung seines Queerdurchmessers, von der nen Curvatur zur anderen sich erstreckend, umgeben: sie am Pylorus vorzüglich stark ausgebildet, woselbst sie t engeren Ringen die Schleimhaut einschnürt und die lvula pylori bilden hilft. Die Fasern der dritten Schicht d Fortsetzungen der Kreisfasern der Speiseröhre und ifen ringförmig, vorzüglich deutlich in der linken Hälfte Magens, in der Richtung vom Fundus zur Curvatura jor und mit denen der zweiten Schicht schräg sich euzend.

Die Schleimhaut nebst der starken Zellschicht (Lamina llulosa s. Tun. vasculosa s. nervea), welche jene mit der uskelhaut verbindet, bildet im zusammengezogenen Zunde des Magens zahlreiche Falten; die ansehnlichsten rselben haben an der Cardia eine strahlenförmig diverende, im Antrum pylori aber meistens eine longitudinale chtung; die kleineren Falten laufen unregelmäfsig einander durchkreuzend. Am Pylorus ist sie, gleich der Muslhaut, dicker als am Fundus, und bildet daselbst die istens ringförmige, seltner doppelt halbmondförmige lte, *Pförtnerklappe, Valvula pylori*; zwischen deren Plat-

ten auch Fasern der zweiten Schicht der Muskelhaut eindringen und einen Schliefsmuskel des Pylorus bilden. Ihre Schleimdrüsen sind am Fundus und mittleren Theil des Magens zahlreich, aber klein und einzeln stehend: an dem oberen und unteren Magenmunde sind sie ansehnlicher, mehr an einander gedrängt, und in der ganzen Dicke der Zellstoffschicht eingesenkt. Die Schleimhaut ist sehr ausdehnbar, aber von ziemlicher Festigkeit und Stärke (läfst sich im gesunden frischen Zustande nicht durch Schaben zerstören noch von den anderen Häuten ohne schneidende Instrumente trennen): ihre Farbe ist weifsröthlich, gelblich oder weifsgrau, zuweilen bräunlich; nicht selten erscheint sie auch im gesunden Zustande, vorzüglich im Fundus, von einem Netz sichtbarer Blutgefäfse durchzogen, die ihr ein roth marmorirtes Ansehen geben: während der Verdauung ist sie ziemlich gleichförmig lebhaft rosenroth. Ihre freie innere Fläche wird von einem sehr weichen und feuchten Epithelium überzogen, welches aber bei Weitem feiner als das des Oesophagus ist; wegen dieser Bekleidung und des Überzugs von Schleim, erscheint sie im frischen feuchten Zustande dem unbewaffneten Auge glatt und glänzend: sie besitzt aber eine sehr grofse Menge schmaler länglicher Erhabenheiten, *Zottenfalten, Plicae villosae*, welche eine Höhe von $\frac{1}{28}'''$ bis $\frac{1}{19}'''$ und eine Breite oder Dicke von $\frac{1}{56}'''$ bis $\frac{1}{28}'''$ haben; diese sind durch kleine, rundliche oder rundlich-eckige, $\frac{1}{50}'''$ bis $\frac{1}{30}'''$ im Dm. haltende Vertiefungen von einander getrennt, und geben ihr ein netzartiges Ansehen.

Die innere Magenfläche sondert, aufser einer reichlichen Menge eines ziemlich zähen, klaren oder leicht opaken Schleims, während der Verdauung auch den *Magensaft, Succus gastricus,* ab: eine klare, wasserhelle oder schwach gelbliche, saure Flüssigkeit, bestehend aus Wasser, freier Chlorwasserstoffsäure und Milchsäure oder Essigsäure, und höchstens 2 p. C. fester Substanz: die aus Chlornatrium und Chlorkalium, Chlorammonium, schwefelsaurem Kali und phosphorsauren Salzen, und aus Alkohol- und Wasser-Extracten zusammengesetzt ist. Durch die auflösende und gewisse chemische Veränderungen hervorbringende Einwirkung des Magensaftes auf die Alimente, wäh-

ıd ihres Aufenthalts im Magen (wobei die gröberen teren Substanzen den Fundus, die breiartigen die Mitte ; Magens und das Antrum pylori, die flüssigen die Ge- ıd der grofsen Curvatur, vorzugsweise einnehmen): — terstützt durch die wurmförmige Bewegung, *Motus peristalticus*, des Magens (welche durch abwechselnde Contraction der Kreis- und Längenfasern hervorgebracht wird, Contenta zuerst vom Fundus nach dem Pylorus längs grofsen Curvatur, und alsdann längs der kleinen Curur, längere Zeit hindurch bewegt, dadurch ihre Berühıgen mit den Magenwänden vermehrt und ihre Mischung dem Magensafte befördert): — werden die Nahrungsıtel in den *Speisebrei*, *Chymus*, verwandelt. Dieser eine dickflüssige, meistens graue oder gelbliche, säuerı riechende Masse, deren chemische Zusammensetzung h der Beschaffenheit der Nahrungsmittel verschieden ist, r aufser den noch unzersetzten Partikeln der letzteren, weifs, Käsestoff, Faserstoff, Fleischextracte, und die in erischen Flüssigkeiten gewöhnlich vorkommenden Salze enthalten pflegt. Zugleich mit der Bereitung des Chys (Chymificatio) entwickelt sich ein aus Sauerstoffgas, ılensäuregas, Stickgas und Wasserstoffgas bestehendes gemenge. Der Chymus wird vermittelst der Contracıen des Magens in kleinen Portionen durch den Pylorus welcher zu Anfang der Magenverdauung völlig geschlos- ist, aber sobald die Chymification vorgeschritten ist, in zen Intermissionen sich öffnet — in das Duodenum geoben.

Dünndarm.

Der Dünndarm, *Intestinum tenue* s. gracile, s. Enon, auch die dünnen Gedärme, *Intestina tenuia* benannt, innt am Pylorus, geht mit einer, successiv nach rechts, h unten und wiederum nach links gerichteten Windung, ch die Regio hypochondriaca dextra in die Regio umbilis; füllt alsdann mit vielen Windungen, welche keine tändige Lage haben, die Regio umbilicalis, hypogastrica l den vorderen Theil der Regiones iliacae, auch den ren Theil der Beckenhöhle aus: und endigt im unteren eil der rechten Regio iliaca durch Einsenkung in den

Dickdarm. Jene erste Windung des Dünndarms ist das Intestinum duodenum, die folgenden bilden das Intestinum jejunum und Intestinum ileum.

Das *Intestinum duodenum*, der *Zwölffingerdarm*, Gallendarm, zerfällt in seinem bogenförmigen Verlaufe, durch welchen es nach der rechten Seite convex, nach der linken concav erscheint und das Caput pancreatis umkreiset, in drei Abtheilungen, Pars transversa superior, Pars descendens und Pars transversa inferior. Die *Pars transversa superior* ist die kürzeste Strecke, geht von der Valvula pylori an, beinahe horizontal und nach hinten, vor der Pars lumbaris dextra des Zwerchfells, hinter dem Lobus quadratus der Leber und hinter der Gallenblase, woselbst sie sich in die *Pars descendens* umbiegt, welche hinter dem rechten Lappen der Leber und vor dem inneren Rande der rechten Niere, bis beinahe zur Höhe des vierten Bauchwirbels herabsteigt: von hier an geht die *Pars transversa inferior*, die längste Strecke des Zwölffingerdarms, etwas schräg aufsteigend nach der linken Seite hinter dem Colon transversum, vor der Art. aorta und Vena cava inferior, bis vor die linke Seite des dritten Bauchwirbelkörpers, woselbst das Mesenterium mit dem Mesocolon transversum sich vereinigt. Man findet nach dem Tode häufig seine Häute von durchgeschwitzter Galle durchtränkt und gelb gefärbt. Seine ganze Länge beträgt an der convexen Seite meistens 12″, an der concaven Seite 7″, sein Dm. $1\frac{1}{4}$″; jedoch kann es bis auf eine Weite von $1\frac{3}{4}$″ ausgedehnt werden.

Das *Intestinum jejunum*, der *Leerdarm*, vom Ende des Duodenum vor dem dritten Bauchwirbel ausgehend, füllt mit unregelmäfsigen Windungen die Regio umbilicalis und den oberen und vorderen Theil der Regiones hypogastrica und iliacae aus und geht ohne deutlich bezeichnete Gränze in die folgende Strecke des Dünndarms, *Intestinum ileum*, *Krummdarm*, über, dessen Windungen man im unteren Theil der Regiones hypogastricae und iliacae, und im kleinen Becken, in der Vertiefung zwischen Harnblase und Mastdarm (Excavatio recto-vesicalis), oder im weiblichen Geschlecht in den Vertiefungen zwischen Blase und Gebärmutter und zwischen Gebärmutter

d Mastdarm (Excavatio vesico-uterina und Excavatio
:to-uterina) findet. Das Ende des Ileum erstreckt sich
s der Beckenhöhle in die rechte Regio iliaca, vor dem
:hten M. psoas schräg aufsteigend, und mündet an der
ieren Wand des Anfanges des Colon adscendens, in die-
. Theil des Dickdarms ein. Die Länge des Jejunum und
um zusammen beträgt, unabhängig von der Länge des
nzen Körpers, zwischen 13′ und 26′, meistens jedoch 17′
19′, von welchen man zwei Fünftheile für das Jejunum
l drei Fünftheile für das Ileum zu rechnen pflegt; der
. des Jejunum beträgt 1″, der des Ileum 10 bis 11‴,
iche durch Ausdehnung bis auf 17‴ und 15‴ zunehmen
nen.

Die seröse Bekleidung ist am Duodenum bei Weitem
niger vollständig, als am Jejunum und Ileum: die Pars
nsversa superior wird zwar, mit Ausnahme ihrer hinte-
. Wand, noch ziemlich genau von seröser Haut (Perito-
um), die eine Fortsetzung der serösen Haut des Magens,
kleinen Netzes und des Ligamentum hepatoduodenale
überzogen: dagegen wird die Pars descendens nur an
er vorderen Wand von dem oberen Blatte des Mesocolon
nsversum, und die Pars transversa inferior an ihrer
deren und unteren Wand von dem oberen und unteren
tte des Mesocolon transversum bekleidet. Durch diese
der hinteren Wand des Saccus peritonaei ausgehenden
tter des Queergrimmdarmgekröses, durch das Ligamen-
hepato-duodenale, insbesondere aber durch seine Ver-
:hsung mit dem Caput pancreatis, wird das Duodenum
e vor der hinteren Wand der Bauchhöhle in ziemlich
beweglicher Lage befestigt, und hängt nicht, wie die
isten anderen Strecken des Darmkanals, an einem Ge-
se. — Hingegen wird das Jejunum und Ileum sehr
lständig von der serösen Haut umgeben, welche an
vorderen Darmwand eine Dicke von $\frac{1}{16}$‴ hat, und nur
en sehr schmalen Streifen an der hinteren Wand dieser
:mstrecken unbekleidet läfst. Es stammt dieser seröse
erzug von einer ansehnlichen Falte oder Duplicatur des
ichfells, dem *Mesenterium*, *Dünndarmgekröse*, dessen
terer Rand, *Radix mesenterii*, von der hinteren Wand
Saccus peritonaei ausgeht, und von der linken Seite

des zweiten Bauchwirbelkörpers bis zum oberen Ende der rechten Symphysis sacroiliaca herabsteigt: der vordere Rand des Mesenterium ist auf dieselbe Weise gewunden, wie das Jejunum und Ileum selbst und eben so lang; indem er die hintere Wand des Darms berührt, weichen seine übrigens genau an einander liegenden Blätter aus einander und bilden den serösen Überzug desselben. Die Breite des Mesenterium von der Radix bis zur hinteren Darmwand beträgt 4″, am oberen und unteren Ende etwas weniger; es gestattet daher den einzelnen Strecken des Jejunum und Ileum beträchtliche Veränderungen ihrer Lage und der Richtung ihrer Windungen.

Die Muskelhaut des Dünndarms besteht aus einer äufseren weniger vollständigen Schicht longitudinaler, und einer inneren ununterbrochenen Schicht kreisförmiger Muskelfasern. Sie ist durch eine dünne Schicht kurzen Zellstoffs mit der serösen Haut, wo diese vorhanden, und zwar vorzüglich fest an der vorderen freien Seite des Darms, verbunden: im Mittel $\frac{1}{5}'''$ dick, am Duodenum merklich stärker: von blafsrother Farbe, und von einem rechtwinkeligen Netz von Capillargefäfsen, von denen die kleinsten nur $\frac{1}{740}'''$ im Dm. halten, durchzogen.

Die mit der Muskelhaut durch die $\frac{1}{5}'''$ dicke Lamina cellulosa verbundene Schleimhaut ist von weifsröthlicher, im Ileum beinahe weifser Farbe, während der Verdauung rosenroth, im Duodenum öfters durch Imbibition der Galle gelb gefärbt. Sie ist sehr dünn, nur $\frac{1}{10}'''$ dick, von einem weichen, schlaffen, lockeren Gewebe, sehr dehnbar; und im gesunden frischen Zustande mit der Muskelhaut so fest verbunden, dafs sie nur durch Hülfe schneidender Werkzeuge von dieser sich trennen läfst. Es sind an ihr Falten, Grübchen, Zotten und Drüsen zu bemerken.

Falten. 1) *Plicae conniventes* s. Valvulae conniventes Kerkringii sind halbmondförmige, aus zwei Blättern der Schleimhaut und zwischenliegender Lamina cellulosa gebildete Falten; stehen in transversaler Richtung; sind in der Mitte 2‴ bis 3‴ hoch, an den Enden niedriger; 1′ bis 2″ lang, so dafs keine einzelne dieser Falten an dem ganzen Umkreise des Darms festsitzt. In der Pars transversa superior duodeni und im unteren Ende des Ileum fehlen sie:

der Pars transversa inferior duodeni und im Jejunum
id sie länger und höher und stehen nur 2‴ bis 3‴ von
ander entfernt, so dafs sie mit ihren freien Rändern
ander berühren; im Ileum werden sie, gegen das untere
de desselben hin, allmählig niedriger und kürzer. Benach-
rte Falten stehen oft durch kürzere, niedrige, longitudi-
l gerichtete Fältchen mit einander in Verbindung. Durch
se Faltung wird die Oberfläche der Schleimhaut wenig-
ns noch einmal so grofs, als sie ohne diese Bildung sein
irde: bei starker Ausdehnung des Darms werden die
lten etwas niedriger und rücken weiter auseinander. —
Plica longitudinalis duodeni ist eine 5‴ lange, 2‴ breite,
nig hervorragende Falte an der Gränze der hinteren und
ieren Wand der Pars descendens duodeni, 4″ vom Pylo-
s entfernt; welche durch den Lauf des Ductus chole-
chus zwischen der Muskelhaut und Schleimhaut hervor-
drängt wird; an ihrem unteren, stärker erhabenen Ende
thält sie die über einander liegenden und durch ein
ieerfältchen getrennten Mündungen des Ductus chole-
chus und Ductus pancreaticus. Eine Höhlung (sogenann-
; Diverticulum Vateri) findet sich in dieser Falte nicht.

Valvula coli s. coeci s. Valvula Fallopii s. Bauhini s.
ilpii, die *Grimmdarmklappe*, an der Endigung des Ileum
den Dickdarm; besteht aus zwei ansehnlichen Falten der
hleimhaut des Ileum, einer oberen und unteren, welche
die Höhle des Dickdarms $\frac{1}{2}$″ weit hineinragen, und,
dem sie mit ihren einander zugewandten Flächen sich an
nander legen, den Rückweg fester und flüssiger Körper
s dem Dickdarm in den Dünndarm verhindern. An der
sis dieser Falten finden sich zwischen den Platten der
hleimhaut einige Kreisfasern der Muskelhaut des Ileum.

Zotten. Die freie Fläche der Schleimhaut des Dünn-
rms ist von einer sehr grofsen Anzahl zarter häutiger
ocken, *Zotten*, *Villi*, besetzt, daher sie auch, zum Unter-
hiede von der Schleimhaut der übrigen Strecken des Ver-
uungsrohrs, den Namen der *Zottenhaut, Tunica villosa*,
hrt. Jede Zotte hat die Gestalt eines länglichen, schma-
n, dünnen Blattes, welches mit einer etwas breiteren Ba-
s über die freie Schleimhautfläche sich erhebt, mit sehr
eränderlicher Richtung in die Höhle des Darms hinein-

ragt, und mit einer abgerundeten Spitze endigt. In der Pars transversa superior duodeni fehlen diese Zotten, und werden von niedrigeren unregelmäfsigen Zottenfalten ersetzt, welche denen des Magens ähnlich, aber etwas gröfser sind, und hin und wieder in abgerundete oder zugespitzte Blättchen auslaufen. Von der Plica longitudinalis duodeni an abwärts finden sich die Villi ununterbrochen bis zu den freien Rändern der die Valvula coli bildenden Falten, deren einander zugewandte Flächen noch von ihnen bedeckt sind; dagegen die dem Coecum und Colon zugewandten Flächen dieser Falten die Beschaffenheit der Schleimhaut des Dickdarms haben. In der unteren Hälfte des Duodenum und im Jejunum haben die meisten Zotten eine Länge von $\frac{1}{4}'''$ bis $\frac{1}{3}'''$, eine Breite von $\frac{1}{6}'''$, eine Dicke von $\frac{1}{20}'''$; viele sind aber kleiner; die meisten sitzen mit schräger Basis auf, so dafs ihr einer Rand länger ist als der andere. Im Ileum sind die meisten $\frac{1}{5}'''$ bis $\frac{1}{4}'''$ lang, $\frac{1}{8}'''$ breit und $\frac{1}{24}'''$ dick; manche aber schmaler und dicker, fast cylindrisch gestaltet, und mit einer dickeren, rundlichen, kolbigen Spitze endigend. Sie stehen fast überall so dicht beisammen, dafs sie, nach verschiedenen Richtungen sich biegend und oft halb umgerollt, einander berühren; ihre Anzahl ist in verschiedenen Individuen nicht gleich, auch stehen sie überhaupt mehr oder weniger gedrängt beisammen, je nachdem die Schleimhaut ausgedehnt oder zusammengezogen ist: im Durchschnitt findet man im Duodenum und Jejunum 50 bis 90, im Ileum 40 bis 70 Zotten auf einer Quadratlinie der Schleimhaut: da hienach die ersteren wenigstens mehr als zwei Millionen, letzteres beinahe zwei Millionen Zotten enthält, jede Zotte aber eine Oberfläche von $\frac{1}{15}$ bis $\frac{1}{7}$ Quadratlinie darbietet, so tragen sie zur Vergröfserung der inneren Darmfläche ein sehr Bedeutendes bei. Obgleich zart und weich, vertragen dennoch die Zotten eine ziemlich starke Ausdehnung: sie sind weder an ihren Enden noch an ihrer Oberfläche mit Mündungen versehen, nehmen aber durch Imbibition leicht Flüssigkeiten in ihr Gewebe, welches sehr kleine Bläschen zu enthalten scheint, auf, wodurch ihr Volumen, insbesondere ihre Dicke zunimmt. Sie werden von vielen Capillargefäfsen durchzogen: diese bilden geschlängelte, concentrische, durch Queeräste ana-

mosirende Schlingen, von denen die längste den Rändern
r Zotte am nächsten läuft: die Gefäfschen haben einen
n. von $\frac{1}{148}'''$ bis $\frac{1}{555}'''$, und sind zahlreicher und durch
inere Zwischenräume getrennt, als die Adern des Capil-
gefäfsnetzes der übrigen Fläche der Schleimhaut.

Grübchen. Zwischen den Zottenfalten im oberen
eile des Duodenum finden sich rundlich eckige Vertie-
gen, meistens von $\frac{1}{12}'''$ Länge und $\frac{1}{24}'''$ Breite, auf deren
den hin und wieder kleinere unregelmäfsige Grübchen
htbar werden. In den übrigen Theilen des Dünndarms
gen sich überall eine sehr grofse Anzahl kreisrunder
übchen, drei bis acht zwischen den Bases je zweier Zot-
, welche der freien Schleimhautfläche ein siebförmig
chlöchertes Ansehen verleihen: sie haben einen Dm.
$\frac{1}{40}'''$ bis $\frac{1}{30}'''$, eine Tiefe von $\frac{1}{20}'''$; auf ihrem Boden
len sich ein oder mehrere, oft mit weifser Flüssigkeit
üllte Bläschen von $\frac{1}{30}'''$ bis $\frac{1}{100}'''$ Dm., wahrscheinlich
fänge der Lymphgefäfse: ihre Wände sind nicht gefäfs-
cher als die umgebende Schleimhautfläche. Man nennt
se Grübchen *Cryptae* s. Glandulae *Lieberkühnianae:* ob
wirkliche Drüsen, kleine Schleimbälge und mehr zur
sonderung, — oder mehr für die Absorption und Ver-
fserung der aufsaugenden Schleimhautfläche bestimmt
l, ist unentschieden.

Drüsen. 1) *Glandulae Brunnerianae* s. Brunnianae,
nnersche oder Brunnsche Drüsen, finden sich in grofser
nge nur im Duodenum, vorzüglich in der Pars trans-
sa superior; seltner und alsdann nur in geringer Anzahl
Anfange des Jejunum. Es sind plattrundliche, $\frac{1}{8}'''$ bis
grofse, hin und wieder in Läppchen abgetheilte Glan-
ae compositae acinosae, deren Acini einen Dm. von $\frac{1}{35}'''$
$\frac{1}{70}'''$ haben; sie liegen mit dem gröfseren Theile ihres
fanges in der Lamina cellulosa. 2) *Glandulae mucosae*
tariae, einfache Schleimbälge, welche überall, im Jeju-
n in gröfster Anzahl, zerstreuet stehen; sie haben eine
öfse von $\frac{1}{4}'''$ bis $\frac{5}{4}'''$, liegen gröfstentheils in der Lamina
lulosa und drängen die Schleimhaut in Gestalt eines
inen, dicht mit Zotten besetzten Hügels hervor. Die
eite ihrer Höhle beträgt etwas mehr als die Hälfte des
t. der ganzen Drüse; sie ist mit Schleim, dessen Körnchen

$\frac{1}{530}'''$ bis $\frac{1}{450}'''$ Dm. haben, angefüllt, und mündet mit einer oder häufig mehreren, zwischen den Bases der Zotten verborgenen Öffnungen. 3) *Glandulae Peyerianae* s. agminatae, sind länglich runde oder rundlich viereckige Haufen von Schleimbälgen, deren Länge von $\frac{1}{4}''$ bis zu mehreren Zollen, deren Breite von $\frac{1}{4}''$ bis zu $\frac{3}{4}''$ variirt; sie finden sich im Ileum, vorzüglich in dessen unteren Theile; seltner und weniger ansehnlich auch im unteren Theile des Jejunum; immer aber nur an der vorderen Darmwand. Sie sind um so sparsamer vorhanden und kleiner, je mehr Glandulae solitariae in derselben Darmstrecke sich vorfinden. Durch diese Anhäufungen von Drüsen und stärkere Entwickelung der Lamina cellulosa erscheint die ganze Wand des Darms an der Stelle einer Glandula Peyeriana dicker als in der Nachbarschaft. Die einzelnen, plattrundlichen, $\frac{1}{5}'''$ bis $\frac{1}{3}'''$ breiten Schleimbälge stehen nahe beisammen und sind den Cryptae solitariae ganz ähnlich; nur sind ihre Wände etwas dünner und ihre Höhle, die bei den gröfseren einen inneren Dm. von $\frac{1}{4}'''$ hat, etwas gröfser: ihre in die Höhle des Darms etwas hervorragende Wand ist glatt, nackt, nicht mit Zotten besetzt, welche dagegen den Umfang dieser Wand kranzförmig umgeben. Selten findet sich eine oder die andere Mündung in der Mitte dieser nackten Wand: dagegen hat jeder Balg fünf bis zehn schräg durchbohrende, kreisförmig gestellte Mündungen, die in dem Kranze von Zotten, welcher den Schleimbalg umgibt, sich öffnen, und von den Cryptae Lieberkühnianae zwischen diesen Zotten durch einen weniger regelmäfsig kreisförmigen Umfang und gröfseren Dm. von $\frac{1}{20}'''$ bis $\frac{1}{13}'''$, sich unterscheiden. Der Schleim, welcher die Höhlen dieser Drüsen ausfüllt, ist dem der Glandulae solitariae gleich; nur wegen der verhältnifsmäfsig ansehnlicheren Gröfse der Höhle reichlicher vorhanden, und scheint etwas zäher und reicher an Schleimkörnchen zu sein.

Die freie Fläche der Schleimhaut nebst ihren Villi, und wahrscheinlich auch die Höhlungen der Cryptae Lieberkühnianae, werden von einem sehr zarten, feuchten und weichen Epithelium bekleidet, und von einer Lage des, von den Glandulae solitariae und Peyerianae abgesonderten, Darmschleims überzogen. Aufserdem findet während der

rdauung, und vielleicht vorzugsweise aus den Glandulae nnerianae, eine reichliche Secretion des *Darmsaftes*, *ccus entericus*, Statt: einer dem Magensaft ähnlichen, nnen, farblosen oder schwach gelblichen, säuerlichen ssigkeit, welche auf den, aus dem Magen in den nndarm gelangten Chymus, eine auflösende Einwirkung übt. Der Motus peristalticus, die wurmförmige Bewe-ig des Dünndarms, wird vermittelt durch die Contraction Kreis- und Längenfasern der Muskelhaut einer höher egenen Darmstrecke, wodurch diese verengert und ver-rzt, und ihr Inhalt in die zunächst tiefere Darmstrecke rängt wird: wegen der geschlängelten Richtung des rms, wegen seines geringen Durchmessers und beweg-ner Befestigung am Mesenterium, und der successiven rengerung und Erweiterung der einzelnen Darmstrecken, gt sich während der Verdauung diese Bewegung deut-ner, als an den anderen Theilen des Tubus digestorius, l scheint der ganze Darm nach seiner Längenrichtung chlängelt fortzukriechen. Die dünnflüssigen, völlig auf-östen (oder auch unendlich fein vertheilten in der Flüs-keit suspendirten (?) Theile des Chymus durchdringen, der Berührung desselben mit den Darmwänden, das ebe der Schleimhaut, die Wände der Grübchen, ins-ndere aber die Villi; und gelangen durch Imbibition lie Anfänge der Lymphgefäfse, — in Gestalt einer mehr r weniger opaken, weifslichen oder milchweifsen Flüs-keit, *Milchsaft*, *Chylus*, genannt. Dieser enthält zahlreiche, rundliche, weifse, undurchsichtige Körnchen $\frac{1}{1060}'''$ bis $\frac{1}{640}'''$ Dm.; aufserdem eine bald gröfsere, l geringere Anzahl von kleineren und gröfseren, bis zu ''' im Dm. haltenden, durchsichtigen, vollkommen sphä-hen Fetttröpfchen: er gerinnt aufserhalb der Gefäfse setzt ein sehr kleines, weiches, flockiges oder haut-liches Crassament, öfters auch eine, auf dem Chylus-m schwimmende, dünne Schicht von Fett (Rahm) ab. chemische Mischung des menschlichen Chylus ist nicht länglich erforscht: wahrscheinlich enthält er Faserstoff, reifs, Fett, Alkohol- und Wasser-Extracte, Kochsalz, chsaure und phosphorsaure Salze.

Dickdarm.

Der Dickdarm oder weite Darm, *Intestinum crassum s. amplum*, fängt im unteren Theile der rechten Regio iliaca mit einem blinden Ende an, umgibt bogenförmig die Windungen des Jejunum und Ileum, indem er aufwärts, dann in queerer Richtung, und alsdann abwärts läuft; und endigt im Beckenausgange durch den After. Er zerfällt in drei nicht scharf geschiedene Abtheilungen, Intestinum coecum, colon und rectum.

Intestinum coecum s. Caput coli, *der Blinddarm*, liegt unmittelbar vor der Fascia iliaca, welche die vordere Fläche des rechten M. iliacus internus überzieht und hat die Gestalt eines kurzen, weiten, rundlichen Sackes, welcher an seinem unteren Ende geschlossen ist; mit seinem oberen Ende aber, in der Höhe der an seiner inneren Wand hervorragenden Valvula coli (S. 495), in das Colon übergeht. Nahe oberhalb seines unteren Endes geht von seiner inneren hinteren Wand ein hohler, enger, röhrenförmiger Fortsatz aus, *Processus vermiformis* s. Appendix vermicularis, der *Wurmfortsatz* oder wurmförmige Anhang, welcher nach oben und innen sich krümmt, und an seinem freien Ende abgerundet und geschlossen ist.

Intestinum colon, der Grimmdarm, die längste Abtheilung des Dickdarms, geht mit seiner ersten *aufsteigenden* Strecke, *Colon adscendens s. dextrum* genannt, in der Regio iliaca dextra, aber an der hinteren Bauchwand, vor dem M. quadratus lumborum und der rechten Niere, bis in die Regio hypochondriaca dextra, bis unterhalb der concaven Fläche des rechten Lappens der Leber aufwärts; und hier, mit einer nach links gerichteten Krümmung, *Flexura coli dextra* s. prima, in das Colon transversum über. Das *Colon transversum*, *Queergrimmdarm*, läuft nach vorn gebogen aus dem rechten Hypochondrium in das linke, durch den oberen Theil der Regio umbilicalis, unter der concaven Fläche der Leber, unter der Curvatura major des Magens, vor dem Duodenum und Pancreas, unmittelbar hinter der vorderen Bauchwand; vor dem unteren Ende der Milz krümmt es sich unter einem rechten Winkel nach unten, d. i. die *Flexura coli sinistra* s. secunda; mit welcher

ümmung der *absteigende Grimmdarm, Colon descendens inistrum*, beginnt. Dieser geht in der linken Regio iliaca der hinteren Bauchwand, vor der linken Niere und M. dratus lumborum herab; krümmt sich vor der Fascia ca nach rechts, queer vor dem linken M. psoas major laufend, und sodann zwischen diesem Muskel und dem rper des fünften Lendenwirbels nach unten, um in den stdarm überzugehen: diese letzte doppelte Krümmung Colon ist die sog. *Flexura iliaca coli* s. S. romanum. *Intestinum rectum, der Mastdarm*, beginnt an vorderen und linken Seite des Promontorium, steigt inglich ein wenig nach rechts, dann aber vor der Mitte Kreuzbeins herab, genau der Biegung der Vorderfläche Kreuz- und Steifsbeins folgend; hinter den im kleinen ken liegenden Windungen des Ileum, hinter der Harn- e im männlichen Geschlecht — hinter der Gebärmutter Scheide im weiblichen Geschlecht; und endigt vor der tze des Os coccygis, unterhalb des Fundus der Harnblase n Manne, unterhalb der hinteren Wand der Scheide n Weibe, indem er durch den *After, Anus, Orificium* hinter dem Perinaeum, sich öffnet.

Das Coecum und Colon haben nicht, wie der Dünn- m, eine gleichförmig abgerundete Oberfläche, sondern heinen uneben, höckerig; man sieht an ihnen drei te, nach der Länge des Darms verlaufende, fingerbreite ifen, *Taeniae coli*, und zwischen diesen Streifen drei nen blasenartig hervorgetriebener und durch queerlau- e Einschnürungen der ganzen Darmwand getrennter eiterungen, *Cellulae* s. Haustra coli. Von jenen Strei- verläuft der eine an der hinteren Wand, die beiden ren an der äufseren und inneren, am Colon transver- an der oberen und unteren Wand des Darms. Der tdarm ist dagegen gleichförmig cylindrisch, nur ober- seines unteren Endes zuweilen etwas erweitert. Die ge des ganzen Dickdarms wechselt zwischen $3\frac{1}{2}'$ und $7'$, ägt meistens $4'$ bis $5'$, wovon auf das Coecum $2''$, auf Rectum $6''$ fallen: sein Dm. hält im Mittel $1\frac{1}{2}''$, kann auf mehr als $2''$ erweitert werden; der Mastdarm ist in seiner oberen Hälfte etwas enger. Der Wurmfort- ist $2''$ bis $3''$ lang, und $2'''$ bis $3'''$ weit.

Die seröse Bekleidung des Dickdarms ist im Allgemeinen weniger vollständig, als die des Jejunum und Ileum; und die Blätter der Duplicatur des Bauchfells, welches ihn als Gekröse befestigt und als seröse Haut über seine Wände sich ausbreitet, stehen weiter auseinander. Das geschlossene Ende des Coecum und die vordere und Seitenwände des Coecum und Colon adscendens sind von seröser Haut bekleidet, die ganze hintere Wand dieser Darmstrecken aber nicht: und werden diese durch das schmale rechte Grimmdarmgekröse, *Mesocolon adscendens* s. dextrum, fast unbeweglich an die hintere Bauchwand befestigt. Nur der Processus vermiformis ist vollständig von der serösen Haut eingewickelt und besitzt ein verhältnifsmäfsig breites, halbmondförmiges Gekröse, *Mesenteriolum processus vermiformis.* Auch das linke Grimmdarmgekröse, *Mesocolon descendens* s. sinistrum, ist schmal, gestattet keine Ortsveränderung des an ihm befestigten Colon descendens, und läfst die hintere Wand desselben unbedeckt: nur an der Flexura iliaca ist es breiter und dieser Theil des Colon etwas beweglicher. — Dagegen ist das Colon transversum vollständiger von seröser Haut überzogen, und hängt ziemlich beweglich an dem 4″ breiten Queergrimmdarmgekröse *Mesocolon transversum.* Dieses geht in queerer Richtung von der hinteren Wand des Bauchfellsackes aus: seine obere Platte beginnt hinter dem Magen, bekleidet im Herabsteigen die vordere Fläche des Pancreas und der Pars descendens und transversa inferior duodeni, hängt rechterseits (unter und hinter dem Lig. hepatoduodenale) mit der rechten Blatte des Mesocolon adscendens und der hinteren Wand des Saccus peritonaei zusammen durch eine Falte, *Ligamentum duodenorenale* genannt, von welcher eine andere Falte, *Ligamentum hepatocolicum*, zum serösen Überzuge der Leber sich erstreckt: linkerseits mit der serösen Bekleidung der Milz und dem linken Blatt des Mesocolon descendens durch eine Falte, *Ligamentum colicolienale.* Die untere Platte des Mesocolon transversum erstreckt sich, wenig schräg herabsteigend, von der hinteren Bauchwand nach vorn, am unteren Rande des Pancreas und an der untere Wand der Pars transversa inferior duodeni; hängt rechterseits mit dem linken Blatte des Mesocolon adscendens, lin

rseits mit dem rechten Blatte des Mesocolon descendens sammen, in der Mitte aber mit dem oberen Ende des senterium am Anfange des Jejunum. Alsdann liegen de Platten des Mesocolon transversum ziemlich genau einander, und lassen bei ihrer Ausbreitung über den eergrimmdarm nur einen schmalen Streifen seiner hinen Wand unbekleidet. — An mehreren Stellen geht der öse Überzug des Colon über dieses hinaus und hängt in stalt frei geendigter Duplicaturen von den Darmwänden rab: diese haben am Colon adscendens und descendens Gestalt von $\frac{1}{2}''$ bis $1\frac{1}{2}''$ langen und $\frac{1}{4}''$ bis $\frac{1}{2}''$ breiten ppen, zwischen deren Blättern oft ansehnliche Fettklumn angesammelt sind und sitzen meistens in einer Reihe gs der äufseren Taenia, oft auch längs der inneren; sie rden netzförmige Anhänge, *Appendices epiploicae*, genannt. n der oberen Taenia des Colon transversum hängt das *ofse Netz*, *Omentum majus* s. Epiploon majus, in stalt einer breiten Platte vor den Windungen des Jejun und Ileum herab, und endigt in der Regio hypogastrica, veilen im Beckeneingange, mit einem freien halbmondmigen Rande. Es beginnt an der Curvatura major venuli als Fortsetzung des serösen Überzuges des Magens, lcher mit dem Lig. gastrolienale zusammenhängt; geht der vorderen Wand des Colon transversum hin und hier an, in Gemeinschaft mit einer ganz ähnlichen rlängerung des serösen Überzuges dieser Darmstrecke, värts. Der Theil zwischen dem unteren Magenrande dem Colon transversum, ist das *Omentum gastrocolicum* besteht aus zwei Blättern des Bauchfells; der vom lon transversum herabhangende Theil ist das *Omentum icum*, und besteht aus vier Blättern, zwei vorderen, die n Magen, und zwei hinteren, die vom Colon transvern stammen. Diese Blätter gehen am freien Rande des fsen Netzes ununterbrochen in einander über und lassen dem Erwachsenen keinen freien Hohlraum zwischen h, sondern sind mit einander verklebt und überhaupt r dünn; daher das Netz an den Stellen, wo es nicht ischen seinen beiden vorderen und zwischen seinen beihinteren Blättern gröfsere Gefäfse und Fettklumpen

(letztere oft in ansehnlicher Menge und Ausdehnung) enthält, durchsichtig erscheint.

Der Mastdarm ist an seiner vorderen Wand nur bis zur Hälfte seiner Länge, an den Seitenwänden nur in einer Strecke von 2″ von seröser Haut überzogen, die eine Ausbreitung des schmalen und kurzen *Mastdarmgekröses*, *Mesorectum*, ist, welches vom Promontorium bis zur Höhe des zweiten Kreuzbeinwirbels herabsteigt, und oberwärts mit den unteren Enden des Mesenterium und des Mesocolon descendens zusammenhängt. Die hintere Wand der oberen Hälfte des Mastdarms, so wie die ganze untere, nicht in dem Saccus peritonaei eingeschlossene Hälfte desselben, sind nicht von seröser Haut bekleidet.

Die Muskelhaut des Dickdarms ist überhaupt stärker als die des Jejunum und Ileum, ihre Fasern aber auf andere Weise angeordnet. Die Longitudinalfasern bilden nämlich drei getrennte, platte, 4‴ breite Bündel, *Fasciculi longitudinales* s. Ligamenta coli, welche am unteren Ende des Coecum beginnen und an den Taeniae coli bis zum Mastdarm verlaufen: die Kreisfasern sind in den Zwischenräumen der Cellulae coli kürzer, als an den Zellen selbst, und bewirken die Einschnürungen, durch welche jene von einander abgegränzt werden. Am Mastdarm ist die Muskelhaut von sehr beträchtlicher Stärke, mehr als 1‴ dick; und ihre Longitudinalfasern, welche die ganz vollständige oberflächliche Schicht zusammensetzen, umgeben den ganzen Umfang des Darms; die Kreisfasern bewirken keine einzelnen Einschnürungen, bilden aber am unteren Ende des Mastdarms, nahe oberhalb der Afteröffnung, einen engeren, dickeren, 3‴ bis 4‴ breiten Ring: *M. sphincter ani internus*, innerer Schliefsmuskel des Afters genannt, welcher diese Öffnung vollkommen verschliefsen kann. Dieser sowohl, als das untere Ende der Longitudinalschicht, ist mit dem M. sphincter ani externus und den Mm. levatores ani verwachsen (s. unten, Beschreibung der Bauch- und Beckenhöhle und der im Beckenausgange liegenden Muskeln).

Die Schleimhaut des Dickdarms, nebst der Lamina cellulosa, ist von weifser Farbe, etwas dicker und von mehr derber und zäher Textur als die des Dünndarms; sie bildet im Coecum und Colon halbmondförmige Queerfalten, *Plicae*

moideae coli, welche in Abständen von $\frac{1}{2}''$ bis $1''$ an der lle der äufserlich sichtbaren Einschnürungen sich befin- n und daher mit ihrer Basis meistens nur an einem Drit- il des Umfanges des Darms festsitzen, hin und wieder er auch über eine Taenia hinaus sich erstrecken und mit nachbarten Falten zusammenfliefsen: sie ragen $\frac{1}{3}''$ bis $\frac{1}{2}''$ it in die Höhle des Darms hinein und berühren einander ht mit ihren freien Rändern; in ihrer Basis nehmen sie skelfasern der kreisförmigen Schicht zwischen die Du- catur der Schleimhaut auf. Die ansehnlichsten dieser ten, Frena valvulae coli, gehen von den Enden der Val- la coli aus und bilden eine Gränze zwischen der Höhle Coecum und der des Colon. Im Mastdarm finden sich nur e Queerfalte am oberen Ende desselben an der hinteren and, und eine zweite etwas tiefer an der vorderen Wand, lche aber öfters fehlen; im unteren Ende bilden sich regelmäfsige, longitudinale und queere Falten durch die ntraction der Mm. sphincteres ani, welche durch Aus- nung verschwinden. — Die Schleimhaut des Dickdarms scheint dem bloſsen Auge glatt, besitzt aber, vorzüglich Coecum, eine grofse Menge zarter, unregelmäfsig ge- llter Fältchen, ähnlich denen des Magens; und zwischen sen Fältchen sehr zahlreiche kleine Höhlungen, Cryptae; lche $\frac{1}{30}'''$ im Dm. halten und $\frac{1}{20}'''$ weit von einander stehen, und den Cryptae Lieberkühnianae des Dünndarms log zu sein scheinen. Aufserdem finden sich viele ein- n stehende (im Proc. vermiformis dicht an einander ge- ngte), plattrunde, $\frac{2}{3}'''$ im Dm. haltende, einfache Schleim- isen, welche die Schleimhaut in Gestalt kleiner Hügel rvordrängen und mit einer Mündung von $\frac{1}{10}'''$ Dm. sich nen. Diese secerniren den, die innere Fläche des Dick- rms überall überziehenden, zähen Schleim; aufserdem rd im Coecum noch ein saurer Darmsaft, *Succus enteri- s coeci*, abgesondert.

Aus dem unteren Ende des Ileum treten die mit Darm- hleim und Galle vermischten und von letzterer gelb ge- bten, übelriechenden, breiigen Reste des Chymus, wel- en die Chylusflüssigkeit durch die, im Dünndarme höchst ätige Absorption fast gänzlich entzogen worden, und wel- e in diesem Zustande *Faeces* s. *Stercora*, *Darmkoth*,

Darmexcremente, genannt werden — in den Dickdarm über. Häufig sind den Faeces auch noch unverdaute Theile der Nahrungsmittel, welche bis dahin noch nicht hinlänglich zerkleinert, verändert und assimilirt waren, beigemengt: diese erfahren die auflösende Einwirkung des im Coecum bereiteten Darmsaftes und werden zum Theil noch in chylusartige Flüssigkeit umgewandelt. Bei dem langsamen Motus peristalticus des Dickdarms verweilen die Faeces in ihm eine längere Zeit, als der Chymus im Dünndarm: der flüssige Antheil der Faeces wird grofsentheils von den Lymphgefäfsen aufgesogen, und die Faeces nehmen bei längerem Verweilen eine dunklere gelbbraune Farbe, den eigentlichen Kothgeruch, eine trocknere Consistenz, und zum Theil auch eine geballte, den Zellen des Colons, in welchen sie verweilten, entsprechende Gestalt an; und werden in diesem Zustande Scybala genannt. Endlich werden sie durch die Excretio alvina, — welche bei Ausdehnung der Mm. sphincteres ani, durch einen kräftig und rasch erfolgenden Motus peristalticus des Colon und insbesondere des Mastdarms, durch Verkürzung des letzteren vermittelst Contraction seiner Longitudinalfasern und der Mm. levatores ani, und durch die unterstützende Contraction der Bauchmuskeln und des Zwerchfells bewirkt wird, — in festweicher Consistenz und cylindrischer, dem Umfange des Mastdarms entsprechender Gestalt, ausgeleert.

Die chemische Zusammensetzung der Faeces ist, gleich der des Chylus, verschieden und von mannichfachen Verhältnissen der Nahrung und Verdauung abhängig. Berzelius fand in 1020 Theilen Excremente:

Unlösliche Rückstände von Speisen	70
Galle	9
Eiweifs	9
Eigener Extractivstoff in Wasser löslich	27
Salze (milchsaures u. schwefelsaures Natron, Chlornatrium, phosphorsaure Kalkerde u. verhältnifsmäfsig viel phosphorsaure Talkerde)	12
Unlösliche Stoffe aus dem Darmkanal (von Einigen Koprikin genannt): nämlich Schleim, Gallenharz, Fett, eigene thierische Materie u. a.	140
Wasser	753

Das im Dünn- und Dickdarm sich entwickelnde Gasmenge besteht aus Kohlensäuregas, Wasserstoffgas, Kohlwasserstoffgas und Stickstoffgas in wechselnden Verhältnissen, enthält auch oft Schwefelwasserstoffgas und vielleicht weilen Phosphorwasserstoffgas.

Leber.

Die Leber, *Hepar* s. Jecur, ist die braune, sehr grofse l schwere Drüse, welche in queerer, etwas schräg gegter Richtung, den oberen rechten Theil der Bauchhöhle füllt und die Galle absondert. Sie hat eine länglich reckige Gestalt mit schmaleren und abgerundeten Enden: obere vordere ihrer beiden Flächen, *Superficies convexa*, regelmäfsig und stark gewölbt, in der Mitte der Leber meisten erhaben; die untere hintere Fläche, *Superficies cava*, ist flach ausgehöhlt und uneben. Der nach hinten l oben liegende Rand ist breit und stumpf abgerundet, *rgo obtusus*; der längere vordere untere Rand aber ner und schärfer, *Margo acutus;* letzterer hat, nicht au in der Mitte, sondern mehr nach dem linken Ende , einen $1\frac{1}{2}''$ tiefen Einschnitt, *Incisura interlobularis.* concave Fläche der Leber ist mit drei Gruben ver- en: die tiefste dieser Gruben, *Fossa transversa* Porta hepatis, befindet sich fast in der Mitte zwischen beiden Enden, etwas mehr nach dem linken Ende hin l dem stumpfen Rande viel näher, als dem scharfen; ist nach der Längenrichtung der Leber (Queerrichtung Bauchhöhle) wenigstens 2″ lang und 1″ bis $1\frac{1}{2}''$ breit: wird links und rechts von den beiden flacheren Fossae gitudinales begränzt, welche sich von dem scharfen nde bis zum stumpfen erstrecken. Die *Fossa longitudinalis sinistra* geht am vorderen scharfen Rande die Incisura interlobularis über; ihr vorderer längerer eil, zwischen dem scharfen Leberrande und dem linken de der Fossa transversa ist die *Fossa venae umbilicalis*, d oft von einem brückenförmigen Streifen der Leberbstanz theilweise überdeckt; ihr hinterer etwas nach hts gebogener Theil wird *Fossa ductus venosi* genannt. e *Fossa longitudinalis dextra* enthält in ihrer rderen Abtheilung, *Fossa vesicae felleae*, die Gallenblase;

die hintere, kurze, aber ziemlich tiefe Abtheilung, welche den stumpfen Leberrand einschneidet, ist die *Fossa venae cavae.* Durch diese Gruben wird die Leber in Lappen getheilt, die aber an der convexen Fläche und in der Tiefe der Lebermasse verschmolzen und nicht deutlich von einander getrennt sind; der Theil der Leber links von der Incisura interlobularis und der Fossa longitudinalis sinistra ist der linke Leberlappen, *Lobus hepatis sinister*; der übrige Theil, welcher fast drei Viertheile der ganzen Masse der Leber begreift, ist der rechte Lappen, *Lobus hepatis dexter.* An der concaven Fläche des letzteren, zwischen den Fossae longitudinales, befinden sich die kleineren Leberlappen; der flache, wenig hervorragende, viereckige *Lobus quadratus* s. anterior vor der Fossa transversa, zwischen dieser, dem scharfen Rande, der Fossa venae umbilicalis und der Fossa vesicae felleae; der kleinere, höhere, rundlich eckige *Lobus Spigelii* s. caudatus s. posterior, liegt hinter der Fossa transversa, zwischen ihr und dem stumpfen Rande; nach rechts durch die Fossa venae cavae, nach links und hinten durch die Fossa ductus venosi begränzt: seine stärkste kegelförmige Erhabenheit nach links und unten wird *Tuberculum papillare* genannt; eine flachere, längliche, gegen die Fossa venae cavae gerichtete Hervorragung ist das sog. *Tuberculum caudatum.*

Die Länge der Leber beträgt 10″ bis 12″, die Breite vom scharfen zum stumpfen Rande 7″ bis $7\frac{3}{4}$″, in der Nähe der Enden nur 5″; die gröfste Dicke von der convexen zur concaven Fläche befindet sich dem stumpfen Rande näher als dem scharfen und beträgt $2\frac{1}{2}$″ bis $2\frac{3}{4}$″: in der Nähe der Enden ist die Leber beträchtlich dünner. Das absolute Gewicht beträgt, von $4\frac{1}{2}$ bis 6 Pfund wechselnd, im Mittel $5\frac{1}{4}$ Pfund; das specifische Gewicht 1,0654 bis 1,0853, im Mittel 1,0721; der räumliche Inhalt $76\frac{3}{4}$ K. Z. bis $98\frac{1}{3}$ K. Z., im Mittel 88 K. Z.

Der rechte Lappen der Leber, der gröfste Theil ihrer Masse, füllt die rechte Regio hypochondriaca beinahe völlig aus und reicht mit dem rechten Ende bis an die rechte Regio iliaca, zuweilen noch etwas in dieselbe hinein; der linke Lappen liegt in der Regio epigastrica und reicht mit dem linken Ende bis in die linke Regio hypochondrica

e convexe Fläche gränzt an die Pars costalis und Centrum
dineum des Zwerchfells, der stumpfe Rand an die Gränze
ischen Pars lumbaris und Pars costalis des Zwerchfells;
die concave Fläche bedeckt mit dem rechten Leberlap-
ı das obere Ende der rechten Niere, die Flexura coli
tra und einen Theil des Colon adscendens und Colon
nsversum, den Pylorus, die Pars transversa superior und
cendens duodeni und das Ligamentum hepatoduodenale,
h die Vena cava inferior; mit dem linken Leberlappen
kleine Netz, die Cardia, die Curvatura minor und einen
eil der vorderen Wand des Magens. Der scharfe Rand
t unter den Knorpeln der siebenten bis zehnten Rippe
hterseits etwas hervor, liegt daher beträchtlich tiefer
der stumpfe Rand; und ist daher die convexe Fläche
räg nach oben und vorn, die concave nach unten und
ten gewendet. Da das rechte Ende bis an oder in die
hte Regio iliaca reicht, das linke die Cardia bedeckt
l an die Milz gränzt, so liegt die Leber auch nach ihrer
ıgenrichtung, der Queerrichtung des Körpers, in sehr
räg geneigter Lage.

Der häutige Überzug der Leber ist eine seröse Haut,
Peritonaeum, welches den gröfsten Theil der Leber
r genau bekleidet, durch sehr kurzen Zellstoff mit ihrer
ıstanz verwachsen ist, und nur einige Stellen unbeklei-
läfst: nämlich den stumpfen Rand, und den an diesen
nzenden Theil der Fossa ductus venosi und der Fossa
ae cavae, den Boden der Fossa transversa und der Fossa
icae felleae, und einen sehr schmalen Streifen auf dem
len der Fossa venae umbilicalis. An diesen Stellen ist
Lebersubstanz von einer mehr dichten Lage Zellstoff
eckt. Durch die von dem Saccus peritonaei ausgehenden
plicaturen, welche über die Leber als ihr häutiger Über-
sich ausbreiten, wird diese in ihrer Lage befestigt;
se sind 1) das *Ligamentum coronarium hepatis*,
anzband, eine sehr schmale, von der unteren Fläche des
erchfells an den stumpfen Leberrand tretende Duplica-
; die Enden derselben, *Ligamenta triangularia, dextrum sinistrum,* werden breiter und dreieckig, reichen aber,
züglich das erstere, nicht ganz bis zu dem rechten und
ken Ende der Leber; so dafs diese Enden gänzlich frei

liegen und von dem Peritonaeum vollständig bekleidet sind. 2) *Ligamentum suspensorium hepatis*, Aufhängeband, eine lange und breite dreieckige Duplicatur; erstreckt sich von der Mittellinie der vorderen Bauchwand oberhalb des Nabels und von der Pars costalis diaphragmatis zur convexen Fläche der Leber, an welcher es die Gränze zwischen dem rechten und linken Lappen bezeichnet, — zur Incisura interlobularis und zur Fossa venae umbilicalis. In dem unteren freien Rande dieser Duplicatur, von den Blättern derselben eingeschlossen, liegt ein starker rundlicher, aus verdichtetem Zellstoff gebildeter Strang, das runde Leberband, *Ligamentum teres hepatis* s. *Chorda venae umbilicalis*, ein Rest der während des Foetusalters offenen Nabelvene: es beginnt am Nabelringe, mit welchem es fest verwachsen ist, gelangt in die Incisura interlobularis und Fossa venae umbilicalis, und verschmilzt mit dem Zellstoff am Boden der Fossa ductus venosi und des linken Endes der Fossa transversa. — Andere Duplicaturen des Bauchfells gehen von dem Überzuge der Leber zu benachbarten Organen; diese sind *das kleine Netz, Omentum minus* s. Epiploon minus s. *Omentum* (s. Lig.) *gastrohepaticum*, eine breite Duplicatur, die von dem linken Umfange der Fossa transversa, vom Lobus Spigelii und der Fossa ductus venosi, zum Theil auch von der concaven Fläche des linken Leberlappens ausgeht, an die Curvatura minor des Magens gelangt und in den serösen Überzug des letzteren sich fortsetzt: — und das *Ligamentum hepatoduodenale* s. duodenohepaticum; dieses geht von der Fossa transversa aus und in die Bekleidung der Pars transversa superior duodeni über; hängt linkerseits mit dem Omentum minus ununterbrochen zusammen und endigt rechterseits mit einem freien Rande, dessen unteres Ende in die vordere Platte des Mesocolon transversum, vor und oberhalb des Lig. duodenorenale (S. 502) sich verliert. (Zwischen diesem Lig. hepatoduodenale und dem Lig. duodenorenale bleibt ein Schlitz übrig, *Foramen Winslovii;* dieser führt in einen freien Raum, welcher vorn von dem hinteren Blatte des kleinen Netzes, dem Überzuge der hinteren Magenwand und dem hinteren Blatte des Omentum gastrocolicum bekleidet wird — hinten von der, das Pancreas

l unteren Theil des Duodenum überziehenden, oberen
tte des Mesocolon transversum — oben von dem schmalen
eil des Saccus peritonaei zwischen dieser Platte und dem
amentum coronarium hepatis — unten von der Verkle-
gg des Omentum gastrocolicum mit den hinteren Blättern
Omentum colicum begränzt wird.) Eine meistens sehr
lrige Falte zwischen der concaven Fläche des rechten
erlappens und dem Mesocolon adscendens an der Flexura
tra coli, vor dem oberen Ende der rechten Niere, wird
amentum hepatocolicum oder Lig. hepatorenale genannt;
hängt mit dem Lig. duodenorenale zusammen.

Die von dem serösen Überzuge bekleidete eigentliche
stanz oder das Gewebe der Leber ist hart, unelastisch,
ch Druck oder Dehnung ziemlich leicht zerreifsbar und
kerige Bruchflächen darbietend; von eigenthümlicher
ibrauner Farbe. Es sind in diesem Gewebe vorzüglich
eigenthümliche Anordnung und Verbreitung der Blut-
ifse, und die aus Acini zusammengesetzten Läppchen
Leber, nebst den Gallengängen, welche in diesen ihren
ang nehmen, zu betrachten.

Gefäfse der Leber. Abweichend von anderen Drü-
dringen zwei Gefäfsstämme verschiedener Art in die
er, nämlich die ansehnliche *Leberarterie*, Art. hepatica,
die noch beträchtlich dickere *Pfortader*, Vena porta-
; erstere führt ihr rothes Blut aus der Aorta zu, letz-
schwarzes Blut aus den Venen der übrigen Verdau-
swerkzeuge: welches letztere von dem Blute anderer
en durch dunklere Farbe, geringere Neigung zur Ge-
ung, geringeren Antheil von Faserstoff, Eiweifs und
en, dagegen gröfseren Antheil von Blutroth und Fett
auszeichnet (C. H. Schultz). — Beide Gefäfse treten,
n ihrem Verlaufe im Lig. hepatoduodenale, in die Fossa
sversa hepatis ein, spalten sich hier in einen rechten
linken Hauptast und werden von einer dichten Zell-
schicht, *Capsula Glissonii*, umgeben: sodann durchdrin-
sie, einander begleitend, unter fortgesetzter gabelför-
er Spaltung, die ganze Substanz der Leber, und werden
n innerhalb derselben von einer weifslichen, ziemlich
en Zellstoffscheide, einer Fortsetzung der Capsula Glis-
i, umgeben. Vorzüglich bei der Vena portarum erfolgt

die Spaltung gröfserer Äste in kleinere sehr rasch und regelmäfsig dichotomisch: aufser dieser Art von Theilung gehen aber überall von ihren gröfseren Ästen sehr zahlreiche kleine Zweige unter rechten Winkeln ab. Die kleineren Zweige, sowohl der Leberarterie als der Pfortader, treten in die Zwischenräume der Leberläppchen, als *Vasa interlobularia*, von welchen die von der Pfortader stammenden *Venulae interlobulares* zahlreicher und ansehnlicher sind: sie bilden ein zusammenhangendes Netz von $\frac{1}{200}'''$ bis $\frac{1}{160}'''$ dicken Capillargefäfsen, in welchen ein Übergang aus den Endigungen der Arterien in die der Pfortader mit grofser Leichtigkeit erfolgt. Dieses Netz von Capillargefäfsen, nebst dem sie vereinigenden ziemlich lockeren Zellstoff, welcher mit der Fortsetzung der Capsula Glissonii zusammenhängt, füllt in vielfachen Windungen sämmtliche schmale Zwischenräume der Leberläppchen aus und bildet die sog. *Tela interlobularis* s. *Substantia cellulosa-vasculosa hepatis;* welche sich im äufseren Ansehen durch dunklere Farbe, gröfsere Weichheit und geringere Festigkeit von den Läppchen unterscheidet. — Die *Lebervenen,* Venae hepaticae, nur von der Tunica intima vasorum gebildet und nicht von der Capsula Glissonii bekleidet durchziehen gleichfalls die Substanz der Leber in allen Richtungen, und entspringen theils aus dem Gefäfsnetz zwischen den Läppchen, gröfstentheils aber innerhalb eines jeden Läppchen, in dessen Inneren sie eine kleine, $\frac{1}{16}'''$ bis $\frac{1}{12}'''$ dicke, öfters abgeplattete *Venula centralis lobulorum* s. *intralobularis* zusammensetzen, die in den nächst benachbarten Zweig einer gröfseren Vena hepatica sich ergiefst. Die Richtung der gröfseren Venae hepaticae geht gegen den stumpfen Rand hin: sie treten endlich, zu mehreren Stämmen vereinigt, in der Fossa venae cavae hervor, und senken sich sogleich in die untere Hohlvene. (Nach Kiernan sollen die Endigungen der Leberarterie nur in die Endigungen der Vena portarum, nicht unmittelbar in die Anfänge der Lebervenen, übergehen.)

Die Läppchen der Leber, Lobuli (auch Acini genannt), besitzen eine hellere gelblichbraune Farbe und gröfsere Derbheit, als die Tela interlobularis; sie bilden die sog. *Substantia propria acinosa hepatis.* Sie liegen sehr

aneinander gedrängt, durch Zwischenräume von $\frac{1}{25}'''$ $\frac{1}{8}'''$ Breite getrennt, und machen daher den gröfsten il der Masse der Leber aus. Sie haben eine längliche, stens etwas plattgedrückte, oft abgerundet dreiseitige talt, eine Länge von $\frac{1}{2}'''$ bis $1'''$, eine Breite von $\frac{1}{3}'''$ $\frac{2}{3}'''$, und meistens eine geringere Dicke als Breite; an Umfange der gröfseren Läppchen sitzen oft kleinere, che zusammen einen ästigen Büschel solcher Läppchen len: die meisten sitzen aber mit ihrer Basis unmittelbar den dünneren Wänden der Venae hepaticae, in welche Venulae centrales sich ergiefsen. Jedes Läppchen ist einer grofsen Anzahl länglich runder *Acini* von gelb- unlicher Farbe zusammengesetzt: diese haben meistens Länge von $\frac{1}{70}'''$, eine Breite und Dicke von $\frac{1}{90}'''$, oft h nur einen Dm. von $\frac{1}{100}'''$ bis $\frac{1}{90}'''$, ihre Höhle aber Weite von $\frac{1}{138}'''$; und ist daher letztere verhältnifs- sig kleiner und ihre Wände dicker, als die der Acini erer acinöser Drüsen. In den sehr schmalen Zwischen- men der Acini, vorzüglich in den Wänden der letzteren st, verbreitet sich ein Netz äufserst zarter Capillarge- e, die zum Theil einen Dm. von nur $\frac{1}{554}'''$ haben.

Von den Läppchen gehen die *Gallengänge, Ductus iarii* s. *biliferi*, aus; höchst wahrscheinlich nehmen e im Inneren der Lobuli als sehr zarte häutige Kanäle, en jeder mit den Höhlen mehrerer Acini zusammenhängt, n Anfang und treten an der Oberfläche der Läppchen, it aus ihrer Basis, in die Tela interlobularis hervor. sie hier netzförmig zusammenhangen, ist ungewifs. Die nsten zwischen den Läppchen sichtbaren Gallengänge en einen Dm. von $\frac{1}{35}'''$; diese vereinigen sich zu grö- en, welche die Äste der Leberarterie und Pfortader leiten und von einer Zellstoffschicht (Fortsetzung der sula Glissonii) umkleidet werden, und im Inneren von Galle, welche sie führen, meistens gelb gefärbt sind. ch den Zusammenfluſs aller Ductus biliarii erwachsen lich zwei gröfsere Gänge; der rechte weitere und der e engere Ast des Leberganges, welche in der Fossa nsversa hepatis aus der Lebersubstanz hervortreten, und lieser Grube zu dem einfachen Stamme des Ausführungs-

ganges der Leber, zum *Lebergang*, *Ductus hepaticus*, sich vereinigen.

Der 2‴ bis $2\frac{1}{2}$‴ dicke Ductus hepaticus, welcher, so wie die gröfseren Ductus biliarii selbst, aus einer inneren Schleimhaut und einer äufseren Zellhaut zusammengesetzt ist, tritt hinter oder vor dem rechten Ast der Leberarterie aus der Fossa transversa, und läuft zwischen den Platten des Lig. hepatoduodenale nach links und unten, an der rechten Seite des Stammes der Art. hepatica, vor der hinter beiden liegenden Vena portarum. Nach einem Verlaufe von $1\frac{1}{2}$″ geht von ihm der $\frac{3}{4}$″ lange, 1‴ weite *Gallenblasengang*, *Ductus cysticus*, unter einem spitzen Winkel ab, welcher nach der rechten Seite und etwas nach vorn sich herabbiegt und zur *Gallenblase*, *Vesica fellea* s. Cystis s. Vesicula fellea, sich erweitert. Die länglich runde, 3″ bis 4″ lange, in der Mitte 10‴ weite Gallenblase ist mit ihrem vorderen oberen Umfange in die Fossa vesicae felleae der Leber eingesenkt; ihr geschlossenes, abgerundetes, $\frac{5}{4}$″ weites Ende, der *Gallenblasengrund*, *Fundus vesicae felleae*, liegt ziemlich frei am scharfen Rande der Leber, im angefüllten Zustande oft über diesen etwas hinausragend; ihr engeres, 4‴ im Dm. haltendes, nach hinten und rechts gebogenes Ende, der *Gallenblasenhals*, *Collum vesicae felleae*, findet sich nahe unterhalb und vor der Fossa transversa und geht in den Ductus cysticus über. Die Gallenblase kann im stark ausgedehnten Zustande, in welchem ihre Capacität $1\frac{2}{3}$ bis $1\frac{3}{4}$ Kubikzoll beträgt, ungefähr 9 bis 10 Drachmen Galle fassen. Sie ist, so weit sie in der Fossa vesicae felleae liegt, mit der Lebersubstanz selbst durch kurzen Zellstoff verwachsen; ihr hinterer unterer Umfang und der gröfste Theil des Fundus erhebt sich über diese Grube und wird von dem Bauchfellüberzuge der concaven Fläche der Leber bekleidet. Ihre äufsere weifsliche Zellhaut ist von beträchtlicher Stärke; ihre innere Schleimhaut meistens von der eingeschlossenen Galle gelblich oder grünlich gefärbt, bietet durch sehr zahlreiche, unregelmäfsig durchkreuzte Fältchen, und durch zwischen diesen befindliche Grübchen, ein sehr rauhes Ansehen dar, und bildet im Gallenblasenhalse mehrere einzelne, $\frac{1}{2}$‴ hohe, in schräger und spiraler Richtung laufende Falten: indem diese mit

ren Enden an einander gränzen und hin und wieder zu-
mmenfliefsen, stellen sie einen beinahe vollständig schrau-
nförmigen Gang von mehreren Windungen dar, und ge-
tten einen nur langsamen und allmähligen Ein- und Aus-
tt der Galle.

Die Fortsetzung des Ductus hepaticus unterhalb des
gganges des Ductus cysticus wird der *gemeinschaftliche*
llenabführungsgang, *Ductus choledochus*, genannt; $2\frac{1}{2}'''$
; $3\frac{1}{2}'''$ weit, $2\frac{1}{2}''$ lang, läuft er nach unten und schräg
ch links und hinten, anfänglich im Lig. hepatoduodenale
der rechten Seite der Vena portarum; gelangt alsdann
die hintere Wand der Pars descendens duodeni, von
n Läppchen des Caput pancreatis umgeben. Sodann
rchbohrt er die Muskelhaut des Duodenum und läuft
ischen dieser und der Schleimhaut eine Strecke von $\frac{1}{2}''$
rab, bildet dadurch die Plica longitudinalis duodeni (S.
5) und öffnet sich am unteren Ende derselben mit einer,
um $1'''$ im Dm. haltenden Mündung: durch diese Anord-
ng wird der Eintritt von Flüssigkeiten aus dem Duode-
m in den Ductus choledochus verhindert.

Die Leber sondert während des Lebens ununterbrochen
alle, Fel, Bilis, ab: diese gelangt aufser den Zeiten
r Verdauung aus dem Ductus hepaticus durch den Duc-
s cysticus in die Gallenblase und verweilt in dieser eine
ngere oder kürzere Zeit; während welcher flüssigere
standtheile, vorzüglich Wasser, von den Lymphgefäfsen
s ihr aufgesogen werden. Während der Verdauung wird
er sowohl die in der Gallenblase aufbewahrte, als die zu
ser Zeit von der Leber secernirte Galle in das Duode-
m ergossen. Die frisch abgesonderte Galle, wie sie in
n Ductus biliarii und im Ductus hepaticus sich findet
ebergalle), ist gelblich, reicher an Wasser und dünn-
ssiger; die in der Gallenblase aufbewahrte Galle (Blasen-
lle) mehr concentrirt, dickflüssig, von einer mehr dun-
ln, grüngelben oder bräunlichgelben, öfters auch saturirt
inen Farbe, von süfslich fadem widrigem Geruch und
rvorstechend bitterem Geschmack mit süfslichem Vor-
schmack; mit Schleim gemengt und wenige kleine Körn-
en von $\frac{1}{890}'''$ bis $\frac{1}{270}'''$ Dm. (Schleimkörnchen?) enthal-
nd. Sie hat ein spec. Gew. von 1,0352, reagirt alkalisch,

und besteht aus ungefähr 90 p. C. Wasser und 10 p. C. festen Theilen; diese sind nach Fromherz und Gugert:

Gallenfett, Cholesterine,

Gallenharz, Pikromel oder Gallenzucker } d. i. Gallenstoff, Choleïn, nach Berzelius, mit dem Gallenfett zusammen ungefähr 8 p. C.

Farbstoff, Gallenbraun,

Gallenblasenschleim,

Fleischextract, sowohl Osmazom als wässerige Extracte von eigenthümlicher Beschaffenheit,

(Speichelstoff?)

(Käsestoff?)

Cholsaures, oelsaures, margarinsaures, kohlensaures, phosphorsaures und schwefelsaures Natron mit wenig Kali,

Phosphorsaurer und schwefelsaurer (auch kohlensaurer?) Kalk,

Chlornatrium (nach Berzelius). —

Durch die Absonderung und Ausleerung der Galle wird die Blutmasse von einer ansehnlichen Menge kohlenstoff- und wasserstoffhaltiger Stoffe befreiet: die Galle selbst befördert die Verdauung, indem sie, dem Chymus beigemischt, eine vollständigere Auflösung der Bestandtheile desselben bewirkt, den Übergang der sauren Gährung des Speisebreies in faulige Gährung verhindert, und den Darmkanal zu verstärktem Motus peristalticus anregt. Der gröfsere Theil der festen Substanzen der Galle, insbesondere das Gallenharz, der Farbstoff und das Gallenfett, wird mit den Darmexcrementen ausgeleert.

Bauchspeicheldrüse.

Die Bauchspeicheldrüse, *Pancreas*, ist eine ansehnliche Glandula composita acinosa von länglich platter Gestalt, an welcher ein breiteres dickeres Ende oder Kopf, *Caput pancreatis*, ein schmaleres abgerundetes Ende, *Cauda pancreatis*, ein oberer und ein unterer Rand, eine vordere leicht convexe und eine hintere beinahe ebene Fläche, unterschieden werden. Sie liegt in queerer Richtung in der Regio gastrica, mit ihren Enden in die Regiones hypochondriacae hineinragend; an der hinteren Wand der Bauchhöhle, vor der Wirbelsäule und der Pars lumbaris

aphragmatis, der A. aorta und Vena cava inferior; hinter m Magen und dem Omentum minus und Omentum gastro-licum: das Caput wird von den Krümmungen des Duo-num umgeben und liegt zum Theil hinter der Pars de-endens und Pars transversa superior desselben: die Cauda nter dem Fundus des Magens und dem Ligamentum ga-rolienale, den Hilus der Milz berührend. Sie ist 7″ bis ′ lang, am Caput $2\frac{1}{4}$″ breit und $\frac{3}{4}$″ dick, in der Mitte eistens $1\frac{1}{2}$″ breit und $\frac{1}{2}$″ dick; die Cauda ist nur wenig hmaler und oft etwas dicker als der mittlere Theil. Das ewicht beträgt $2\frac{1}{4}$ bis $3\frac{1}{2}$ Unzen, das spec. Gew. im Mittel 0462; der räumliche Inhalt $3\frac{1}{3}$ bis $5\frac{1}{5}$ Kubikzoll.

Das Pancreas ist von gelbgrau-röthlicher Farbe und eicher, aber zäher, nicht brüchiger Consistenz; es wird ur an seiner vorderen Fläche und unterem Rande vom eritonaeum bekleidet, und zwar erstere von der oberen, tzterer von der unteren Platte des Mesocolon transversum; brigens ist es von einer Schicht schlaffen Zellstoffs um-eben und durch diese an die hintere Bauchwand geheftet, dafs nur seine Vorderfläche innerhalb des Saccus peri-naei liegt; sein Caput ist mit der inneren und hinteren Wand des Duodenum durch kurzen Zellstoff fest verwach-n. Es besteht aus gröfseren und kleineren, unregelmäfsig undlichen, durch Zellstoff ziemlich locker zusammengehef-ten Läppchen; diese sind aus runden Acini, gleich denen er Mundspeicheldrüsen, zusammengesetzt, zwischen wel-nen die Wurzeln des Ausführungsganges ihren Anfang ehmen und gegen die Mittellinie der Drüse laufen. Der tamm des dünnhäutigen Ausführungsganges, *Ductus pan-reaticus* s. Wirsungianus, läuft im Inneren der Drüse, von en Läppchen gänzlich verdeckt, der vorderen Fläche etwas äher als der hinteren, in der Richtung von der Cauda zum aput, allmählig an Weite etwas zunehmend, und im Caput ‴ im Dm. haltend; er mündet am unteren Ende der Plica ongitudinalis duodeni, unmittelbar unter der Mündung des Ductus choledochus, und von dieser durch ein kleines Queerfältchen getrennt.

Das Secret des Pancreas, *Succus pancreaticus*, pankrea-ischer Saft oder Bauchspeichel, ist eine klare wasserhelle, twas klebrige Flüssigkeit von der Consistenz des Mund-

speichels, welche eine geringe Menge heller runder Körnchen von $\frac{1}{800}'''$, auch von $\frac{1}{1000}'''$ und $\frac{1}{400}'''$ Dm. enthält. Er reagirt neutral, vielleicht zuweilen sauer, und besteht aus Wasser und mehreren noch unbestimmten festen Stoffen, unter welchen eine grofse Menge von Eiweifs, aufserdem Käsestoff, Speichelstoff (?), Osmazom, und Salze sich befinden. In das Duodenum ergossen mischt er sich mit dem Chymus und trägt wahrscheinlich ein Bedeutendes zur Auflösung und Umwandelung der Nahrungsmittel bei.

Milz.

Die Milz, *Lien* s. *Splen*, ist ein grofses Ganglion vasculare von beinahe halbeiförmiger Gestalt. Ihre äufsere Fläche ist stark convex; die innere gröfstentheils schwach concav, in der Mitte aber etwas erhaben, und hier mit einer flachen, länglichen, von oben nach unten gerichteten Vertiefung, *Hilus lienis*, versehen, welche mehrere rundliche Gruben für den Ein- und Austritt der Gefäfse enthält. Das obere und untere Ende sind abgerundet, der vordere Rand schärfer als der hintere; beide sind gewöhnlich an einer oder mehreren Stellen eingekerbt, vorzüglich der vordere. Ihre Oberfläche ist glatt und eben, öfters auch, wenn die Milz wenig Blut enthält, runzlich eingeschrumpft.

Sie liegt in der Regio hypochondriaca sinistra, von den unteren Rippen und dem Magengrunde verborgen; ihre äufsere Fläche ist zugleich etwas nach oben und hinten gerichtet, und gränzt, so wie auch das obere Ende, an das Zwerchfell; die innere Fläche an den Fundus ventriculi und hinter diesem an die Cauda pancreatis; das untere Ende an die Flexura sinistra coli und hinterwärts an die linke Nebenniere und Niere: der hintere Rand liegt an der Pars lumbaris des Zwerchfells, der vordere an dem Magengrunde. Sie ist ganz im Saccus peritonaei eingeschlossen, erhält durch eine Einstülpung desselben eine vollständige, nur am Hilus fehlende, seröse Bekleidung, und wird von zwei Duplicaturen des Bauchfells in ihrer Lage erhalten; nämlich von dem schmalen *Ligamentum phrenicolienale* s. suspensorium lienis, welches von der unteren Fläche des Zwerchfells zum oberen Ende der Milz sich erstreckt; und von dem breiten *Ligamentum gastrolienale*, welches

, schen dem Fundus ventriculi und dem Hilus lienis aus-spannt ist und unterwärts mit dem Omentum gastrocoli-um zusammenhängt; beide gehen in den serösen Überzug r Milz über. Durch diese Befestigungen folgt die Milz nigermafsen den Veränderungen der Lage des Zwerchfells id des Magens.

. Die Milz ist von weicher teigiger Consistenz, viel eicher als die Leber und das Pancreas; im frischen Zu-ande dunkel bläulichroth oder purpurroth, einige Zeit ch dem Tode grau-violet. Sie mifst von oben nach un-n 5″ bis $5\frac{1}{2}$″, vom vorderen zum hinteren Rande 3″ bis ', von der äufseren zur inneren Fläche $1\frac{1}{4}$″ bis $1\frac{2}{3}$″; ihr ewicht wechselt zwischen 7 und $10\frac{1}{2}$ Unzen, beträgt im ittel $8\frac{1}{2}$ Unze; das spec. Gewicht zwischen 1,0579 und 0625, im Mittel 1,0606; der räumliche Inhalt zwischen und 15 Kubikzoll, im Mittel $12\frac{1}{3}$ K. Z.

Das innere, sehr weiche, fast breiartige Gewebe der ilz wird von einer dünnen, aber starken, durchscheinen-n, fibrös-zellulösen Haut, *Tunica albuginea s. propria nis,* unmittelbar umgeben und zusammengehalten; diese ; mit der inneren Fläche der serösen Haut sehr genau rwachsen, und dringt am Hilus in das Innere, indem sie hrenförmige Scheiden um die gröfseren Blutgefäfse bildet. on ihrer inneren Fläche gehen zahlreiche plattrundliche den aus, *Trabeculae,* welche das innere Gewebe in allen chtungen durchziehen, unter einander und mit den Schei-n der Gefäfse sich vereinigen, und dadurch ein Netzwerk lden, zur Unterstützung des weichen Milzgewebes. Dieses steht, dem gröfsten Theil seiner Masse nach, aus Blut-d Lymphgefäfsen, vorzüglich aus ersteren. Die gröfseren te der, durch den Hilus ein- und austretenden, Arterien-d Venenstämme verzweigen sich in den einzelnen Ge-nden der Milz, in welchen sie verlaufen, mehr netz- als umförmig; die kleinsten Arterien gehen in pinselförmige apillargefäfsbüschel über, aus welchen die Venenwurzeln ren Anfang zu nehmen scheinen. Die Venenwurzeln sind n ansehnlicher Weite, und bilden, aufser sehr zahlreichen nastomosen, überall grofse schlauchartige Ausbiegungen d Erweiterungen, welche eine Ähnlichkeit mit rundlichen ellen haben: zwischen den Erweiterungen sind sie da, wo

sie sich zwischen den Trabeculae hindurchdrängen, eingeschnürt, und senken sich endlich mit verhältnifsmäfsig sehr engen Mündungen (Stigmata Malpighii) in die gröfseren Venenäste ein. Ihre Wände bestehen nur aus der Tunica intima vasorum, welche hier aufserordentlich zart und leicht zerreifsbar ist. Die Räume zwischen den Gefäfsen und Trabeculae, in welchen auch die Netze der zahlreichen und weiten Lymphgefäfse sich verbreiten, werden von einem sehr zarten, lockeren, und von dem Cruor, welcher überall in der Milz die dünnen Venenwände durchdringt, dunkelroth gefärbten Zellstoff ausgefüllt: in diesem findet man aufserdem runde, sehr weiche, weifsliche, (hohle oder solide?) Körperchen, *Corpuscula lienis*, von $\frac{1}{4}'''$ bis $\frac{2}{3}'''$ Dm., deren Anzahl veränderlich, und deren eigentliche Beschaffenheit, Bedeutung und Art des Zusammenhanges mit den Gefäfsen noch nicht hinlänglich erforscht ist.

Der Nutzen der Milz ist unbekannt.

arnwerkzeuge, Organa uropoëtica.

Nieren.

Die Nieren, *Renes*, sind zwei ansehnliche Glandulae mpositae tubulosae, welche innerhalb der Bauchhöhle, der hinteren Wand derselben, zur rechten und linken te der Wirbelsäule liegen, und den Harn absondern. le Niere hat eine bohnenförmige Gestalt; ihre vordere d hintere Fläche sind convex, die erstere aber mehr ge- lbt als die letztere; die Ränder sehr breit und gewölbt, äufsere stark convex, der innere gegen die Wirbelsäule wandte dagegen sehr concav und mit einer, von oben h unten gerichteten, tief eindringenden Grube, *Hilus alis* s. Hilus renis, versehen. Das obere und untere de ist abgerundet, ersteres etwas breiter und platter als letztere; die Oberfläche im Allgemeinen glatt, und nur einzelnen Stellen, vorzüglich am Umfange und in der efe des Hilus, flach eingekerbt, wodurch eine unvollkom- ne Abtheilung der Niere in einzelne Lappen, *Lobi renum* Renculi, angedeutet wird.

Die Nieren liegen in der Regio lumbaris, in gleicher he mit dem ersten bis dritten Bauchwirbel, die rechte ere meistens etwas niedriger als die linke; eine jede mit er hinteren Fläche an den hinteren Rand des Zwerchfells d an den M. quadratus lumborum, — mit dem oberen de an die Nebenniere, — mit dem inneren Rande an die rs lumbaris des Zwerchfells, und den M. psoas major, — t der vorderen Fläche an die hintere Wand des Saccus ritonaei gränzend. Die rechte Niere liegt hinter dem chten Leberlappen, dem Duodenum und dem Colon ad- ndens; die linke hinter dem unteren Ende der Milz, der uda des Pancreas und dem Colon descendens. Beide sind n einer Schicht lockeren fettreichen Zellstoffs, Capsula llulosa s. Fascia renum, umgeben.

Die Consistenz der Nieren ist härter, derber und fester, als die aller anderen Drüsen; die Farbe lebhaft bräunlich roth oder dunkel kupferroth; die Länge beträgt 4″ bis $4\frac{1}{2}$″, die Breite 2″ bis $2\frac{1}{3}$″, am oberen Theile oft $2\frac{2}{3}$″, die Dicke von der vorderen zur hinteren Fläche $1\frac{1}{4}$″ bis $1\frac{2}{3}$″; das Gewicht 4 bis 6 Unzen, das spec. Gew. zwischen 1,0492 und 1,0555, im Mittel 1,0520; das Volumen $5\frac{2}{3}$ bis $9\frac{1}{2}$ Kubikzoll, im Mittel $7\frac{1}{2}$ K. Z.

Die Niere wird äufserlich von einer weifslichen, dünnen, festen, fibrös-zellulösen Haut, *Tunica albuginea* s. *propria renum* überzogen; unmittelbar unter dieser findet sich das Nierengewebe, welches vorzüglich aus Secretionskanälchen, *Tubuli uriniferi*, aus eigenthümlich vertheilten Blutgefäfsen und aus einem zarten Zellstoff besteht. Man unterscheidet in ihm zwei Substanzen; die *Rinde* oder gefäfsreiche Substanz, *Substantia corticalis* s. *vasculosa*, welche durch röthere Farbe, gröfseren Gefäfsreichthum und einen gröfstentheils geschlängelten Lauf der Harnkanälchen sich auszeichnet, und nicht allein die äufsere, einige Linien dicke Schicht der Niere bildet, sondern auch im Inneren derselben die Bündel der Harnkanälchen umgibt: — und die *Röhrensubstanz* oder das *Nierenmark*, *Substantia tubulosa* s. *medullaris*, welche weniger gefäfsreich, blasser gefärbt, und fast gänzlich aus gestreckten Harnkanälchen zusammengesetzt ist. Letztere findet sich nicht an allen Stellen der Niere vor, sondern bildet einzelne, grofse, kegelförmige Bündel von Harnkanälchen, *Coni tubulosi* s. *Pyramides renales Malpighii*, 8 bis 18, meistens 12 bis 14 an der Zahl; diese sind mit ihrer breiten abgerundeten Basis nach der Peripherie der Niere gerichtet und sowohl hier, als an ihrem Umfange, von Rindensubstanz umgeben und mit dieser verschmolzen, und durch Rindensubstanz von einander geschieden. Ihre Spitzen sind convergirend gegen den Hilus renalis gerichtet und ragen frei in demselben hervor; diese kegelförmigen, stumpf zugespitzten, oft etwas plattgedrückten Enden der Pyramides Malpighii werden *die Nierenwärzchen*, *Papillae renales*, genannt; sie sind meistens von geringerer Anzahl als die Coni tubulosi selbst indem öfters zwei der letzteren in eine Papille zusammenfliefsen: sie werden weder von Corticalsubstanz umgeben

och von der Tunica albuginea überzogen, sondern von hleimhaut bekleidet, und sind mit vielen $\frac{1}{3}'''$ tiefen Grüben versehen.

Die *Harnkanälchen* beginnen, als *Tubuli uriniferi rticales* s. contorti, s. Canales corticales, in der Rindenbstanz mit blind geschlossenen, aber nicht bläschenartig geschwollenen Enden, und bilden sogleich eine grofse nzahl kurzer Windungen und Schleifen, wodurch eine nsehnliche Strecke eines Harnkanälchens in einen kleinen aum zusammengedrängt wird. Ein jedes Harnkanälchen ellt einen kleinen kegelförmigen Knauel dar, dessen Basis gen die Peripherie der Niere hingerichtet ist oder auch ehr in der Tiefe zwischen den Coni tubulosi liegt; und n der Oberfläche der Niere als eine rundliche oder länglich rundliche, flache Erhabenheit von $\frac{1}{13}'''$ bis $\frac{1}{9}'''$ Dm. scheint, wodurch die Oberfläche der Niere nach abgezogener Tunica albuginea ein körniges Ansehen darbietet. enachbarte Tubuli corticales anastomosiren ziemlich häufig mit einander. Ihr Dm. ist in verschiedenen Nieren ngleich, zwischen $\frac{1}{108}'''$ bis $\frac{1}{40}'''$; meistens jedoch bei Erwachsenen im Mittel $\frac{1}{50}'''$, und in der Nähe der blinden nden oft merklich dicker, bis zu $\frac{1}{40}'''$ Dm.: ihre Wände aben eine Dicke von $\frac{1}{216}'''$. Nach Bildung der kegelförmigen Knauel nehmen die Tubuli corticales eine mehr gereckte, nur leicht geschlängelte, convergirende Richtung n, und treten in Bündel von $\frac{1}{10}'''$ bis $\frac{1}{4}'''$, meistens $\frac{1}{6}'''$ Dicke sammen, welche *Pyramides renales Ferreinii* genannt werden und in der Corticalsubstanz als heller gefärbte Streifen rscheinen; in diesen Bündeln sind die Harnkanälchen gerade estreckt und eng an einander gedrängt, nur $\frac{1}{100}'''$ von einander entfernt. Die Ferreinschen Pyramiden gehen in die oni tubulosi oder Malpighische Pyramiden über, in welchen sie nicht mehr durch zwischenliegende Corticalsubstanz on einander getrennt werden; daher die Malpighischen yramiden beinahe gänzlich aus dicht zusammengedrängten, gestreckt gegen die Papille laufenden Harnkanälchen, *ubuli uriniferi recti* sive *Belliniani*, bestehen. Diese gestreckten Tubuli der sog. Marksubstanz sind etwas enger ls ihre gewundenen Anfänge in der Corticalsubstanz, selten ber $\frac{1}{50}'''$, meistens $\frac{1}{70}'''$ bis $\frac{1}{60}'''$ dick; indem sie aber unter

sehr spitzigen Winkeln zusammenfliefsen, verringert sich ihre Anzahl und ihre Weite nimmt zu, welche in der Papille selbst einen Dm. von $\frac{1}{30}'''$ bis $\frac{1}{12}'''$ erreicht: endlich münden sie in den Grübchen der Papillae renales aus.

Gefäfse. Die Äste der in den Hilus eingetretenen Nierenarterie dringen in der Substanz der Niere zwischen den Coni tubulosi hindurch gegen die Peripherie der Niere hin, anfänglich baumförmig verzweigt, dann aber in ein dichtes Capillargefäfsnetz sich auflösend, aus welchem die Venen in der Richtung von der Oberfläche zum Hilus zurückkehren. Kleine Arterien von $\frac{1}{160}'''$ Dm. laufen in der Substantia corticalis baumförmig verzweigt zwischen den kegelförmigen Knaueln der Tubuli corticales und umgeben in weiterer Verästelung die Basis und Seiten derselben mit einem weitmaschigen Netze; diese kleinen Arterien bilden kugelrunde oder eiförmige Gefäfsknauel, *Glomeruli* s. Corpuscula s. Acini Malpighii, deren Dm. $\frac{1}{12}'''$ bis $\frac{1}{10}'''$, bei den eiförmigen $\frac{1}{14}'''$ zu $\frac{1}{10}'''$ beträgt, (zuweilen findet man sie nur halb so grofs) — und die vorzüglich nach der Peripherie der Niere hin aufserordentlich zahlreich sind. Jeder Glomerulus ist von einer aus dem Zellstoff gebildeten Kapsel umgeben, in welcher er ziemlich locker liegt und hängt, wie eine Beere an einem Stiele, an einem Ästchen eines der baumförmigen Schlagäderchen, oder an einem Nebengefäfse des Arteriennetzes; dieses theilt sich in dem Glomerulus selbst in kleinere Gefäfschen von $\frac{1}{425}'''$ bis $\frac{1}{260}'''$ Dicke, welche vielfache kurze und eng zusammengedrängte Schlingen bilden. Aus dem Glomerulus treten zwei bis drei Gefäfschen wiederum hervor; und diese setzen nebst den unmittelbar von den Arterien entsprossenen Äderchen, ein ungemein enges Netz der feinsten Haargefäfse zusammen, in welchem arteriöse und venöse Capillargefäfse nicht mehr zu unterscheiden sind; dieses Netz verbreitet sich in dem Zellstoff, welcher die Windungen der Tubuli corticales zusammenklebt und in den Wänden der Tubuli selbst. Zwischen den gestreckten Harnkanälchen der Ferreinschen Pyramiden findet man nur noch wenige Glomeruli; und die Capillargefäfse laufen hier, so wie in den Coni vasculosi, woselbst ihre Anzahl sehr abnimmt und die Glomeruli gänzlich fehlen, meistens in longitudi-

er Richtung wie die Tubuli recti selbst, und bilden sehr gmaschige Netze.

Ausführungsgänge der Niere. Im Hilus renalis inden sich 7 bis 14 kurze häutige Schläuche, die *Nierenche, Calyces renales,* deren Anzahl meistens geringer ist die der Nierenwarzen. Sie bestehen aus einer, mit der nica albuginea renis zusammenhangenden Zellhaut und einer Schleimhaut; umfassen jeder mit seinem oberen de eine, oder auch zwei mit einander verschmolzene illae renales, so dafs diese frei in die Kelche hineinen und von der Schleimhaut der letzteren überzogen rden. Sie fangen den in den Tubuli uriniferi abgesonten, in kleinen Tröpfchen aus den Grübchen der Papilhervordringenden Harn auf. Die Calyces fliefsen zu ei bis drei weiteren Schläuchen, Äste des Nierenbeckens annt, zusammen, und diese vereinigen sich zum *Nierenken, Pelvis renalis*: einem plattgedrückten, trichterförgen, 6‴ bis 8‴ weiten Schlauche, welcher am unteren l hinteren Theile des Hilus aus demselben etwas hervort, und mit seinem unteren engeren Ende ununterbrochen den *Harnleiter, Ureter,* übergeht. Der rechte und ke Ureter sind, wie das Nierenbecken, aus einer äufseren, rken, weifslichen Zellhaut und einer inneren Schleimhaut auet, 11″ bis 12″ lang und 2‴ weit; sie laufen leicht ogen und etwas convergirend, an der vorderen Fläche Mm. psoae majores und der Vasa iliaca communia, ter dem Saccus peritonaei und den Vasa spermatica inna herab, mit den letzteren in sehr schräger Richtung h kreuzend; treten zwischen der inneren Fläche der asmuskeln und dem Mastdarm in die Beckenhöhle — d gehen in dieser, unter den Plicae semilunares Douglaimmer mehr convergirend, zur hinteren und alsdann r unteren Wand (Fundus) der Harnblase; — im männhen Geschlecht, von den Seitenwänden des Mastdarms zwischen der vorderen Wand desselben und der hinren Wand der Harnblase, hinter den Vasa deferentia rabsteigend: — im weiblichen Geschlecht, von den Seiwänden des Mastdarms an, neben dem Gebärmutterhalse, ter den Ligg. uteri lata, dann zwischen der hinteren and der Blase und vorderen Wand der Scheide verlau-

fend. Endlich durchdringen sie am Fundus oder der unteren Wand der Harnblase die Häute derselben, in schräger Richtung nach vorn; indem sie nach Durchbohrung der Muskelhaut noch eine 5‴ bis 6‴ lange Strecke zwischen dieser und der Schleimhaut laufen, bevor sie auf der freien Fläche der letzteren ausmünden.

Harnblase.

Die Harnblase oder Urinblase, *Vesica urinaria s.* urinae, ist ein in der Beckenhöhle liegender, aus einer Muskelhaut und Schleimhaut gebildeter Sack von länglich runder Gestalt, dessen vordere und hintere Wand etwas breiter sind als die Seitenwände. Der mittlere Theil der Blase wird *Corpus vesicae* genannt; die obere Wand bildet den kegelförmig zugerundeten *Blasenscheitel, Vertex vesicae*, von dessen vorderem Theile ein langer, dünner, zugespitzter Strang, *Harnstrang, Urachus*, sich erhebt; die unter dem Perinaeum zugekehrte Wand ist der *Blasengrund, Fundus vesicae*: an dem vorderen Ende desselben, da, wo er mit der vorderen Wand zusammenfliefst, verengert sich die Blase zum Übergange in die Harnröhre; diese trichterförmige Verengerung ist der *Blasenhals, Collum s. Cervix vesicae.*

Im weiblichen Geschlecht ist die Harnblase meistens breiter, vorzüglich am Fundus, aber oft von vorn nach hinten etwas mehr abgeplattet, überhaupt verhältnifsmäfsig geräumiger, als in männlichen Körpern.

Sie nimmt den vorderen Theil der Beckenhöhle ein, gränzt mit ihrer vorderen Wand an die Hinterfläche der Symphysis pubis und der vorderen Beckenwand überhaupt, mit den Seitenflächen an die Seitenwände des Beckens; der Vertex ragt im zusammengezogenen Zustande bis zum oberen Rande der Symphysis pubis, im ausgedehnten Zustande bis in den unteren Theil der Regio hypogastrica; die hintere Wand ist im männlichen Geschlecht gegen die Vorderwand des Mastdarms, im weiblichen gegen die Vorderfläche der Gebärmutter hin gerichtet, aber von dieser durch die Vertiefungen des Bauchfellsackes, Excavatio peritonaei recto-vesicalis und vesico-uterina, getrennt; unberührt diese Organe nur im sehr ausgedehnten Zustand

ch Verdrängung der in jenen Excavationen liegenden indungen des Intestinum ileum. Der Fundus ruhet vorn dem Damm, hinten an der Vorderwand des unteren eils des Mastdarms, im weiblichen Geschlecht an der rderwand der Scheide; bei leerer Blase ist er etwas h vorn abhängig, bei voller Blase sinkt er tiefer herab, rzüglich wenn der Mastdarm leer ist, und liegt alsdann horizontal. Das Collum liegt über dem vorderen eile des Dammes, und gränzt nach vorn an den unteren nd der Symphysis pubis: im männlichen Geschlecht wird von der Basis der Glandula prostata völlig umgeben. Blase ist nach der Richtung der Symphysis pubis vorrts geneigt, so dafs der Vertex weiter nach vorn liegt, der Fundus.

In dieser Lage wird die Blase durch zahlreiche Befeungsmittel erhalten. Der Fundus wird durch die Fascia vis und die Mm. levatores ani, auch durch den Mastm oder die Scheide unterstützt; das Collum durch eifen der Fascia pelvis — im männlichen Geschlecht ch die Befestigungsmittel der Prostata, Ligamenta pubostatica, bei Weibern durch die Ligg. pubovesicalia — der Symphysis pubis festgehalten (s. Geschlechtstheile u. ia pelvis). Der obere Theil der Blase wird durch drei ge aus verdichtetem Zellstoff gewebte Stränge befestigt: lich durch den *Urachus* s. *Ligamentum vesicale medium*, cher an der Gränze des Blasenscheitels und der vorderen nd von der Schleimhaut ausgeht und hinter der Linea zum Nabel heraufsteigt; und durch die beiden *Chordae eriarum umbilicalium* s. *Ligg. vesicalia lateralia*, (die te der im Foetusleben offenen Nabelarterien), welche den Arteriae hypogastricae an den Seitenwänden des kens ausgehen, an den Seitenwänden und neben dem eitel der Blase aufwärts steigen und mit der Blase durch lstoff verwachsen sind; alsdann an der vorderen Bauchd, zu beiden Seiten des Urachus convergirend hinaufen: im Nabel gehen sie, so wie der Urachus, in die ern der Linea alba über. Aufserdem trägt der, einen il der Harnblase überziehende, Saccus peritonaei zu r Befestigung bei: dieser geht von der vorderen Bauchd, hinter dem Urachus und den Chordae art. umbilica-

lium, zum Vertex vesicae, und bekleidet im Herabsteige den hinteren Theil des Scheitels der Blase, den obere Theil der Seitenwände und die hintere Wand; geht als dann an die vordere Fläche des Mastdarms oder der Gebär mutter über und bildet dabei auf jeder Seite eine halbmond förmige, von vorn nach hinten gerichtete Falte: im männ lichen Geschlecht die längeren *Plicae semilunares Douglas* s. *recto-vesicales*, im weiblichen Geschlecht die kürzere *Plicae vesico-uterinae*. Dieser Bauchfellüberzug ist in se ner Mitte fester, an seinen Rändern nur locker, durch fet reichen Zellstoff mit der Muskelhaut der Blase verwachse Die vordere und Seitenwände der Harnblase werden nu durch schlaffes Zellgewebe an die Beckenwände gehefte

Die Dm. der Harnblase sind sehr verschieden, je nach dem sie leer und zusammengezogen, so dafs ihre Wänd theilweise einander berühren — oder stark ausgedehnt is Nach diesem Verhältnifs beträgt die Höhe vom Fund zum Vertex 2″ bis $3\frac{3}{4}$″, die Breite $1\frac{1}{2}$″ bis $3\frac{1}{4}$″, die Tie von vorn nach hinten $1\frac{1}{4}$″ bis $2\frac{1}{2}$″. Im ausgedehnten Z stande fafst sie zwischen 10 und 20 Kubikzoll oder $6\frac{3}{4}$ l $13\frac{1}{2}$ Unzen Harn.

Die Muskelhaut der Harnblase hat, wenn letztere le ist, eine ansehnliche Dicke, welche die der Muskelhaut d Darmkanals übertrifft; bei ausgedehnter Blase erscheint dünner, und weichen alsdann ihre Bündel stellenweise au einander, so dafs zwischen ihnen die äufsere Fläche d inneren Schleimhaut sichtbar wird. Gröfstentheils a kreisförmigen und schrägen, einander durchkreuzend dicken Muskelfasern gewebt, enthält sie an ihrer vorder und hinteren Wand noch eine oberflächliche longitudin Schicht, welche vom Collum zum Vertex sich erstre und die Blase in ihrer Höhenrichtung vorzüglich kräf verengert; diese wird *M. detrusor urinae* genannt. D Kreisfasern bilden am Collum vesicae einen stärkeren vo ständigen Ring, welcher die Blase während ihrer allm ligen Anfüllung geschlossen hält: d. i. der Schliefsmus der Blase, *M. sphincter vesicae*. — Durch eine starke L verdichteten Zellstoffs wird die Muskelhaut mit der Schle haut vereinigt; letztere ist weifslich, ziemlich glatt, bil nur im zusammengezogenen Zustande zahlreiche unreg

fsige Falten, die durch Ausdehnung gänzlich verschwin-
: sie besitzt nur sehr kleine Cryptae mucosae, die in-
sen am Blasenhalse ansehnlicher und dichter zusammen-
äuft sind. Am Fundus wird die Schleimhaut von den
schen ihr und der Muskelhaut laufenden Enden der
rnleiter hervordrängt und dadurch zwei breite, niedrige,
erundete, $\frac{3}{4}$''' lange Falten, *Plicae uretericae*, gebildet;
se laufen convergirend nach vorn und bilden dadurch
en Winkel, welcher mit seiner nicht völlig geschlosse-
Spitze gegen den Blasenhals gerichtet ist, und eine
he dreieckige Stelle in der Mitte des Fundus, *Trigonum*
ccae genannt, einschliefst. An den vorderen Enden
ser Falten münden die Ureteren, jeder mit einer 1'''
gen Spalte, welche 6''' von einander, und 8''' hinter
n Anfange der Harnröhre sich befinden. Indem bei der
üllung der Blase der Harn auf die, zwischen den Häu-
schräg verlaufenden, Enden der Harnleiter drückt,
d der Rücktritt des Harns in die Ureteren ohne eine
ndere Klappeneinrichtung verhütet.

Harnröhre.

Die Harnröhre, *Urethra*, ist der ziemlich weite,
dehnbare Ausführungsgang der Harnblase, welcher am
senhalse beginnt, und in den äufseren Geschlechtstheilen
nündet. Im Wesentlichen wird er von einer Schleim-
tröhre gebildet, deren Länge, Weite, Verlauf und äu-
e Bekleidung aber in den beiden Geschlechtern sehr
schieden ist.

1) *Die männliche Harnröhre* ist beträchtlich
ger, aber an mehreren Stellen enger und überhaupt
niger ausdehnbar, als die weibliche. Ihr trichterförmi-
Anfang, *Pars prostatica urethrae*, durchdringt die Glan-
a prostata und ist von der derben unnachgiebigen Sub-
nz derselben überall genau umschlossen; ihre Richtung
t schräg von oben und hinten nach unten und vorn;
e Länge beträgt 10''' bis 1'', ihre Weite am oberen
le 4''', am unteren 2''' bis 3'''. An dem folgenden sog.
ttigen Theile der Harnröhre, *Pars membranacea urethrae*,
die Schleimhaut von einer dichten hautähnlichen Schicht
äfsreichen Zellstoffs bekleidet, und an ihrer oberen Wand

von einer 1‴ dicken Lage blafsgefärbter queerlaufende Muskelfasern, *M. urethralis transversus*, umgeben, welche zu beiden Seiten mit der Fascia perinaei und den unteren Enden der Mm. pubo-urethrales verwachsen sind: aufser dem wird sie von dem tiefen Blatt der Fascia perinaei und von den Mm. pubo-urethrales (den vordersten Bündeln der Mm. levatores ani) umfafst. Sie läuft in fast horizontaler nur sehr leicht nach unten gekrümmter Richtung, 4‴ bis 6‴ unterhalb des Ligamentum arcuatum inferius, und mit diesem durch das Lig. pubo-prostaticum medium und durch Zellstoff verbunden; unterwärts ruhet sie auf dem vorderen Ende des M. sphincter ani externus und der Fascia perinaei. Ihre Länge beträgt 8‴ bis 9‴, ihr Dm. $1\frac{1}{2}$‴ bis 2‴; sie bildet, nebst dem vorderen Ende der Pars prostatica, den engsten, jedoch ausdehnbaren Theil der Harnröhre, den sog. *Isthmus urethrae*. Der dritte längste Theil der Harnröhre, *Pars cavernosa* s. *spongiosa urethrae*, läuft durch den Penis, unter den Corpora cavernosa penis, von dem Corpus cavernosum urethrae genau umgeben; durchbohrt die Eichel, und mündet an der Spitze derselben mit einer longitudinalen, schmalen, 3‴ langen Spalte, *Orificium urethrae* s. Ostium cutaneum. Die Länge und Richtung der Pars cavernosa urethrae ist von der Länge und Richtung des Penis abhängig; erstere beträgt im schlaffen Zustande des Penis 4″ bis $4\frac{1}{2}$″, im ausgedehnten Zustande 7″ bis 8″; ihr Dm. ist nicht überall gleich: am Orificium und in vordersten Theile der Eichel beträgt er 2‴; im hinteren Theile der Eichel und zunächst hinter derselben findet sich eine $\frac{3}{4}$″ lange Erweiterung von 4‴ Dm., die kahnförmige Grube, *Fossa navicularis urethrae* s. Morgagnii genannt; von hier an bis zur Pars membranacea ist sie gleichförmig 3‴ weit. Alle Durchmesser der Harnröhre sind der Ausdehnung fähig, vorzüglich die der Pars cavernosa und membranacea; durch Längenausdehnung des Penis in horizontaler Richtung kann sie fast gänzlich gerade gestreckt werden; nur wird dadurch die schwache Krümmung der Pars membranacea und prostatica, unter und hinter dem unteren Rande der Symphysis pubis, nicht völlig aufgehoben: diese Krümmung ist mit der Convexität nach unten, mit der Concavität nach oben gerichtet, und bil-

nen kurzen Abschnitt eines Kreises von ungefähr $2\frac{1}{2}''$ adius.

Die Schleimhaut der Harnröhre ist ziemlich dünn, von nem dicken Epithelium bekleidet, in der Nähe des Orifium blafsröthlich, übrigens weifslich und sehr empfindlich. n der hinteren Wand der Pars prostatica bildet sie eine ''' bis 5''' lange Falte, welche an ihrem hinteren, mehr rvorragenden, abgerundeten Ende 1''' bis $1\frac{1}{2}'''$ hoch und eit ist, nach vorn aber mit einer schmalen Spitze bis in n Anfang der Pars membranacea sich verlängert: diese lte ist der sog. *Samenhügel* oder Schnepfenkopf, *Colliculus seminalis* s. Caput gallinaginis s. Veru montanum: an inem hinteren Ende finden sich zu beiden Seiten die ündungen der Ductus ejaculatorii; aufserdem enthält er, wie die Wände der Pars prostatica überhaupt, viele eine Mündungen der Ausführungsgänge der Prostata und r Schleimdrüsen. In der Pars membranacea finden sich e engen Mündungen der Ausführungsgänge der Glandulae owperi; auch zeigen sich in diesem Theile und vorzüglich der Pars cavernosa viele, zum Theil $\frac{1}{4}'''$ bis $\frac{1}{3}'''$ weite öhlungen, *Lacunae Morgagnii*, deren nach vorn gerichtete ündungen oft von einem sehr niedrigen Queerfältchen nsäumt werden; sie enthalten die Öffnungen zahlreicher hleimdrüsen, von welchen die in der Pars membranacea andulae Littrii genannt werden. Am hinteren Ende des ificium urethrae bildet die Schleimhaut eine Queerfalte, ch zuweilen eine ähnliche Falte am Anfange der Pars ostatica, hinter dem Colliculus seminalis; übrigens ist sie zusammengezogenen Zustande in der Pars cavernosa in sehnliche Längenfalten gelegt, welche durch Ausdehnung rschwinden.

2) *Die weibliche Harnröhre* läuft vom Blasenlse an, zwischen dem Lig. arcuatum inferius und der rderen Wand der Scheide, auch zwischen beiden Crura toridis, in beinahe gerader, sehr wenig nach hinten gekümmter Richtung, von oben und hinten nach unten und rn herab, und öffnet sich im sog. Vestibulum des Schamedes, unter der Clitoris, über dem Eingange der Scheide, ischen den kleinen Schamlippen. Ihr Anfang, so wie der asenhals, werden durch das platte *Ligamentum pubo-vesi-*

cale medium unterhalb der Symphysis befestigt, welches Band den Zwischenraum zwischen Blasenhals und Harnröhre, dem Lig. arcuatum inferius und den Crura clitoridis ausfüllt. — Sie hat eine verlängert trichterförmige Gestalt, ungefähr $1\frac{1}{2}'''$ Länge, am Anfange $4'''$ bis $6'''$, im ferneren Verlaufe $3'''$ im Dm.: ihr Orificium ist weiter und mehr rundlich, als im männlichen Geschlecht, und von einem wulstigen Rande umgeben. Ihre Schleimhaut wird äufserlich nur von einer dichten gefäfsreichen Zellstoffschicht und von den Mm. pubo-urethrales bekleidet; besitzt weniger Schleimhöhlen, und ist in ihrer ganzen Länge bei Weitem mehr ausdehnbar, als die der Männer.

H a r n.

Der Harn, *Urina s. Lotium*, ist eine klare, etwas klebrige Flüssigkeit von bald hellerer, bald dunklerer bernsteingelber Farbe, von einem eigenthümlichen aromatischen Geruch und salzigem Geschmack. Sein specif. Gewicht wechselt zwischen 1,005 und 1,030, beträgt aber meistens 1,010 bis 1,018. Er reagirt sauer und enthält (aufser den zufälligen, zum Theil von der Art der Nahrungsmittel abhängigen Bestandtheilen):

Wasser	933,00
Schleim	0,32
Harnstoff	30,10
Harnsäure (mit harnsaurem Natron und Ammoniak und mit Farbstoff)	1,00
Milchsäure, Milchsaures Ammoniak, Alkohol-Fleischextract, Wasser-Extracte	17,14
Schwefelsaures Kali	3,71
„ „ Natron	3,16
Phosphorsaures Natron	2,94
Doppelt phosphorsaures Ammoniak	1,65
Phosphorsaurer Kalk und Talk	1,00
Chlorkalium, Chlornatrium	4,45
Chlorammonium	1,50
Fluorcalcium, Kieselerde	0,03
	1000,00

Nach vollständig beendigter Verdauung enthält der Harn (Urina chyli) die gröfste Menge fester Bestandtheile; die dagegen in dem, bald nach reichlichem Genusse wässeriger Getränke ausgesonderten Harn (Urina potus), in sehr verringerter Menge gefunden werden. Während seines Aufenthalts in der Harnblase wird ihm der Schleim zugemischt, und etwas Wasser durch Resorption entzogen; übrigens hier, wenn er nicht sehr lange verweilt, nicht wesentlich verändert.

In den Harnkanälchen der Nieren, insbesondere in den Tubuli corticales abgesondert und die Tubuli recti der Coni tubulosi durchlaufend, tröpfelt der Harn aus den Nierenwarzen in die Calyces, und rinnt aus diesen in die Nierenbecken und durch die Harnleiter in die Blase herab. Hier sammelt er sich zuerst im Fundus vesicae an, und drückt, bei fernerer Anfüllung der Blase gegen ihr oberes Ende hin, die Enden der Harnleiter zwischen den Blasenwänden durch seine eigene Schwere zusammen, woneben auch die Muskelfasern der Blase, welche die Enden der Harnleiter zum Theil umfassen, diese verengern können: der M. sphincter vesicae und im männlichen Geschlecht auch die Muskelfasern, welche die Pars membranacea urethrae umgeben, sind während der Anfüllung der Blase contrahirt. Bei der endlichen Ausleerung des Harns erschlaffen diese Muskelbündel, so dafs Blasenhals und Harnröhre sich öffnen, indem die Austreibung des Urins durch Zusammenziehung der ganzen übrigen Muskelhaut der Blase bewirkt, und durch Contraction des Zwerchfells und der Bauchmuskeln unterstützt wird: die in der längeren männlichen Harnröhre zurückbleibenden Tropfen werden durch die Mm. bulbocavernosi ausgespritzt.

Nebennieren.

Die Nebennieren, *Renes succenturiati*, s. Glandulae s. Capsulae suprarenales s. Capsulae atrabiliariae, sind zwei über den Nieren liegende Ganglia vascularia. Eine jede hat eine platt halbmondförmige Gestalt; die vordere und hintere Fläche ist flach convex, die untere schmalere Fläche oder Basis concav, der obere, innere und äufsere Rand stark convex, ziemlich breit und abgerundet. An der vorderen und hinteren Oberfläche finden sich unregelmäfsige Furchen, an der unteren Fläche ein tieferer Einschnitt. Die untere Fläche liegt auf dem oberen Ende der Niere, die hintere an der Pars lumbaris des Zwerchfells; die vordere Fläche der rechten Nebenniere hinter der Leber, die der linken hinter dem Magengrunde.

Die Höhe der Nebenniere beträgt $\frac{3}{4}''$ bis $1\frac{1}{4}''$, die Breite $1\frac{1}{2}''$ bis $2''$, die Dicke von vorn nach hinten $1\frac{1}{2}'''$ bis $2\frac{1}{2}'''$, an der Basis $4'''$; die linke ist oft etwas höher und schmaler, als die rechte. Das Gewicht beträgt 80 bis 120 Gran, das spec. Gewicht 1,0163, das Volumen $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{3}$ Kubikzoll. Die Consistenz ist im Allgemeinen weich, schwammig, die Farbe röthlich gelbbraun. Äufserlich wird sie von einer Zellhaut umgeben: in ihrem Gewebe unterscheidet man eine festere gelbliche Rindensubstanz, in welcher eine grofse Anzahl dicker Capillargefäfse von $\frac{1}{150}'''$ bis $\frac{1}{90}'''$ Dm., in gestreckter, fast paralleler Richtung und sehr längliche Maschen bildend, gegen das Innere der Nebenniere laufen. Letzteres wird von einer dunkelbraunrothen, weichen, schwammigen Substanz gebildet, in welcher die Capillargefäfse der Rindensubstanz engmaschige unregelmäfsige Netze kleinerer Gefäfse bilden, und alsdann in die, in der inneren Substanz gewunden verlaufenden, gröfseren Venen übergehen. Zuweilen findet man, anstatt der inneren schwammigen Substanz, eine ziemlich ansehnliche, von einer dicken dunkelbraunrothen oder schwarzbraunen Flüssigkeit erfüllte Höhle, — wahrscheinlich ein krankhafter Zustand.

Der Nutzen der Nebennieren ist unbekannt.

Geschlechtsorgane, Organa genitalia.

Die *Geschlechts-* oder *Zeugungsorgane*, Geschlechtstheile, *Organa genitalia* s. sexus s. sexualia s. Partes genitales, liegen in der Beckenhöhle und am vorderen Theile des Beckenausganges, und sind in den beiden Geschlechtern wesentlich verschieden. Die männlichen Geschlechtstheile bestehen vorzüglich aus Drüsen und cylindrischen Körpern und sind zum gröfseren Theil aufserhalb der Beckenhöhle sichtbar; die weiblichen sind dagegen grofsentheils hohle Organe und in der Beckenhöhle verborgen: so dafs die Unterscheidung in *innere* und *äufsere* Geschlechtstheile vorzüglich auf letztere sich bezieht. Ihre Function ist überhaupt die Hervorbringung eines neuen Organismus: die für diese Function zunächst bestimmten Theile sind die eigentlichen *Zeugungsorgane, Organa generationis:* im männlichen Geschlecht die Hoden mit ihren Ausführungsgängen und Hüllen, die Vorsteherdrüse und die Cowperschen Drüsen, im weiblichen die Eierstöcke mit den Muttertrompeten und die Gebärmutter: — andere dienen zu der, der Zeugung vorhergehenden Vereinigung der Geschlechter; diese sind die *Begattungsorgane, Organa copulationis:* im männlichen Geschlecht die Ruthe mit der Harnröhre, im weiblichen das Schamglied und die Scheide.

I. Männliche Geschlechtstheile, Organa genitalia virilia s. maris.

Hoden.

Die Hoden, *Testes* s. *Testiculi*, sind zwei, im unteren Theile des Hodensacks liegende, tubulöse Drüsen, welche den Samen absondern: und deren jeder aus dem eigentlichen Hoden und dem Nebenhoden, einem Anhange des ersteren, besteht.

Der eigentliche *Hode* oder *Testikel*, *Testis* s. Didymus, hat eine ungefähr platt-eirunde, regelmäfsig elliptoidische Gestalt mit glatter convexer Oberfläche. Man unterscheidet an ihm das obere und untere Ende, die äufsere und innere Fläche, und den vorderen und hinteren Rand, welche sehr breiten Ränder aber mehr die Gestalt schmalerer abgerundeter Flächen haben. Die Lage des Hoden ist schräg, so dafs das obere Ende mehr nach vorn und aufsen, das untere Ende mehr nach hinten und innen gerichtet ist; die innere Fläche zugleich etwas nach vorn, die äufsere Fläche etwas nach hinten, der vordere Rand ziemlich stark nach unten, der hintere Rand nach oben sich wendet. (Daher kann das obere Ende auch als vorderes, das untere Ende als hinteres, der vordere Rand als unterer, der hintere Rand als oberer bezeichnet werden.)

Der Hode mifst vom oberen zum unteren Ende 18‴ bis 22‴, vom vorderen zum hinteren Rande 11‴ bis 15‴, von der äufseren zur inneren Fläche 9‴ bis 12‴ und wiegt 4 bis $6\frac{1}{2}$ Drachmen. Sein spec. Gewicht beträgt im Mittel 1,0435, sein Volumen $\frac{7}{10}$ bis $1\frac{1}{5}$ Kubikzoll. Selten findet man ihn beträchtlich kleiner. Öfters ist der eine Hode etwas gröfser als der andere. Die Farbe seiner Oberfläche ist weifs, meistens röthlich oder bläulich weifs; für das Gefühl bietet er eine gröfsere Weichheit und Glätte dar, als andere Drüsen.

Der äufsere Umfang des Hoden wird von der starken, fibrösen, weifsglänzenden, $\frac{1}{2}$‴ dicken *Tunica albuginea* s. *propria testis* gebildet, welche die äufsere Gestalt des Testikels bestimmt, einen völlig geschlossenen Sack bildet und in ihrem inneren Raume die eigentliche Substanz des Hoden enthält. Ihre äufsere Fläche wird, mit Ausnahme des hinteren Randes des Hoden, von einer dünnen, fest angewachsenen serösen Haut, *Tunica serosa testis*, bekleidet, welche der eingestülpte Theil der eigenen Scheidenhaut des Hoden ist. Ihre innere, mit der Substanz des Testikels in Berührung stehende Fläche wird von einer Schicht verdichteten Zellstoffs überzogen. Am hinteren Rande des Hoden ist die hier etwas dünnere Tunica albuginea von zahlreichen Löchern für Gefäfse, Nerven und Samenröhren durchbohrt: in der Mitte dieses hinteren Randes tritt von

ihrer inneren Fläche, indem sie in mehrere fibrös-zellulöse Blätter sich spaltet, die sich wiederum zur Bildung enger Zellen und Kanäle vereinigen, ein weifslicher, ungefähr dreiseitiger Strang hervor, der in den inneren Raum des Testikels hineinragt, *Corpus Highmori* s. Mediastinum testis genannt. Dieses hat von oben nach unten eine Länge von 9‴ bis 12‴, erreicht also bei Weitem nicht die Enden des Testikels; ist hinten 3‴, vorn 1‴ breit, und ragt 3‴ bis 4‴ weit in das Innere des Hoden hinein, der inneren Fläche etwas näher als der äufseren. Sowohl von dem Corpus Highmori, als überall von der inneren Fläche der Tunica albuginea aus, erstrecken sich platte zellulöse Streifen, *Septula testis*, in das Innere des Hoden, zwischen die von den Samenröhrchen gebildeten Läppchen hinein.

Die innere Substanz des Hoden, Pulpa s. Parenchyma testis, ist von gelbbrauner oder röthlich-brauner Farbe, sehr weich und leicht zerreifsbar, und macht ungefähr $\frac{7}{8}$ des ganzen Volumen des Hoden aus. Sie besteht aus Blut- und Lymphgefäfsen, Nervenendigungen, vorzüglich aber (ungefähr zu $\frac{3}{4}$ des Volumen der ganzen Pulpa) aus Samenröhrchen. Die Gefäfse, *Vasa spermatica interna*, welche durch die Löcher der Tunica albuginea am hinteren Rande des Testikels ein- und austreten, bilden im Corpus Highmori Geflechte, vorzüglich die Venen und Lymphgefäfse; die Arterien verlaufen mehr bogenförmig über das obere und untere Ende des Testikels gegen den vorderen Rand desselben; bilden aber, nebst den Venen und Saugadern, ansehnliche Netze in der Zellschicht der inneren Fläche der Tunica albuginea. Diese Netze setzen sich in den Septula fort; an den letzteren haben die gröfseren Blutgefäfschen von $\frac{1}{12}$‴ bis $\frac{1}{10}$‴ Dm. eine longitudinale Richtung, und schicken zahlreiche Seitenästchen ab, die in äufserst dichte Netze gewundener gröberer Capillargefäfse übergehen (E. H. Weber); letztere aber verfeinern sich, indem sie die Samenröhrchen umspinnen und in den Wänden derselben selbst sich verflechten, bis zu einer Dicke von $\frac{1}{300}$‴ bis $\frac{1}{400}$‴.

Die Samenröhrchen, Tubuli seminiferi s. Canaliculi seminales s. Vasa serpentina testis, sind dünnhäutige weifsliche Secretionskanälchen von $\frac{1}{12}$‴, im leeren Zustande von $\frac{1}{16}$‴ Dm., welche durch äufserst zahlreiche kurze

Windungen längliche Knauel oder *Läppchen, Lobuli testis*, bilden. Diese Lobuli haben eine kegelförmige, pyramidalische oder spindelförmige Gestalt, liegen im Inneren des Hoden eng an einander gedrängt, durch die Septula gestützt und nur unvollkommen von einander getrennt; ihre Richtung geht überall von der Peripherie des Hoden nach dem hinteren Rande gegen das Corpus Highmori hin, welchem sie ihr spitzeres Ende zuwenden. Ihre Anzahl beträgt zwischen hundert und zweihundert; ein jedes enthält mehrere (zwei bis fünf?) Tubuli, welche theils mit geschlossenen Enden anfangen, theils aber anastomosirend zusammenhangen und einer aus dem andern hervorgehen. Diese Anastomosen finden sich nicht allein zwischen den Samenröhren eines und desselben, sondern auch verschiedener Läppchen. Die Länge aller Samenröhrchen, die in dem Inneren des Testikels zusammengedrängt sind, beträgt insgesammt 850 bis 1050 Fufs. An den hinteren Enden der Läppchen vereinigen sich die Samenröhrchen zu kurzen, mehr gestreckt laufenden Röhrchen, *Tubuli seminiferi recti*, von $\frac{1}{6}'''$ Dm., die in den vorderen Rand des Corpus Highmori eintreten, in demselben leicht geschlängelt aufwärts laufen, vielfach anastomosiren, sich trennen, und wiederum zusammenfliefsen; das auf diese Weise gebildete Netz von dickeren Samenröhrchen wird *Rete vasculosum Halleri* genannt. Endlich durchbohren diese Röhrchen, von jetzt an *Vascula efferentia testis* genannt, 9 bis 17 an der Zahl, am oberen Ende des Corpus Highmori, die Tunica albuginea vollständig, und gehen in das Caput epididymidis über; aber nicht unmittelbar, sondern indem sie durch zahlreiche Windungen kegelförmige Stränge, *Coni vasculosi*, bilden. Diese sind mit ihrer Spitze nach unten, nach dem Testikel, mit ihrer Basis nach oben, nach dem Kopfe des Nebenhoden gerichtet, 4''' bis 6''' lang, durch dichten Zellstoff an einander geheftet; ein jeder enthält ein Vasculum efferens, welches 5'' bis 7'' lang, in seinem geraden oder leicht geschlängelten Laufe in der Spitze des Conus $\frac{1}{6}'''$ bis $\frac{1}{4}'''$, in seinen Windungen in der Basis aber nur $\frac{1}{10}'''$ dick ist. Zuweilen geht auch ein Vasculum efferens von der Mitte oder dem unteren Ende des Corpus Highmori in den mittleren Theil der Epididymis über.

Der Nebenhode, Epididymis s. Parastata cirsoi-
s, ist ein strangförmiger gekrümmter Anhang des Hoden,
ssen dickeres und breiteres oberes Ende der Kopf, *Caput*
idymidis, und dessen unteres Ende *Cauda epididymidis*,
nannt wird. Er liegt am hinteren Rande des Hoden,
was mehr nach der äufseren Fläche des Hoden hin, und
mit seiner concaven Vorderseite gegen den hinteren
nd des Testikels gerichtet; sein Caput ruhet mit seiner
teren ausgehöhlten Fläche auf dem oberen Ende des Ho-
n; der mittlere Theil entfernt sich etwas von dem hin-
ren Rande des Hoden; die Cauda liegt genauer an dem
teren Ende des letzteren. Die Länge der (gerade ge-
eckten) Epididymis beträgt $2\frac{1}{2}''$ bis $3''$, die Breite des
pfes $4\frac{1}{2}'''$, seine Höhe $3'''$; die Breite des mittleren Theils
d der Cauda $2\frac{1}{2}'''$ bis $3'''$, die Dicke von vorn nach hin-
n $1'''$ bis $1\frac{1}{2}'''$; öfters ist die Cauda merklich breiter und
ker als der mittlere Theil. Das Gewicht, zwischen 20
d 66 Gran wechselnd, beträgt gewöhnlich 35 Gran, das
lumen $\frac{1}{10}$ Kubikzoll. Die Farbe ist röthlich braungelb;
Oberfläche höckerig und durch Queerfurchen in Läpp-
en getheilt, von einer dichten starken Zellstoffschicht
kleidet; aufserdem aber das Caput und die Seitenränder
d ein Theil der Vorderfläche des mittleren Theils und
Cauda von seröser Haut, der eigenen Scheidenhaut des
den überzogen. — Der Nebenhode ist weniger gefäfs-
ch als der Hode, und besteht fast gänzlich aus einem
zigen Samenrohr; das Caput nimmt nämlich, indem es
t den Bases der Coni vasculosi verschmolzen ist, die
scula efferentia testis auf, die im Kopf des Nebenhoden
einem $\frac{1}{10}'''$ bis $\frac{1}{6}'''$ dicken, ungefähr 20 bis 30 Fufs lan-
n Samenrohr, *Canalis epididymidis*, zusammenfliefsen.
eses läuft unter unzähligen kurzen Windungen, die durch
llstoff zusammengeheftet werden und in gröfsere Abthei-
gen zusammengedrängt die Läppchen der Epididymis
den, bis zur Cauda herab und setzt sich hier in den
menleiter fort. Der *Samenleiter* oder Samenabfüh-
ngsgang, *Vas deferens, Ductus deferens seminis*,
der Ausführungsgang des Hoden, die unmittelbare Fort-
zung des Canalis epididymidis, aber beträchtlich dicker
dieser; sein äufserer Dm. beträgt in der gröfseren

Strecke seines Verlaufs 1‴, der Kaliber seines innere Kanals aber nur $\frac{1}{3}$‴; seine weifse aus verdichtetem Zell stoff gebildete äufsere Haut ist $\frac{1}{3}$‴ dick, und daher diese Ausführungsgang als ein harter runder Strang anzufühlen seine innere Schleimhaut macht zahlreiche, niedrige, seh schmale Queerfalten. Er läuft anfänglich von der Cauda epididymidis aus, am hinteren Rande des Hoden und an de inneren Seite des Nebenhoden, in sehr geschlängelter Rich tung aufwärts, so dafs diese Strecke 6″ lang ist: verläfs alsdann diese Theile hinter dem oberen Ende des Hoden tritt in den Samenstrang, geht durch diesen gerade aufwärt und durch den Canalis inguinalis, alsdann in bogenförmige Richtung neben der Harnblase bis zum Fundus derselben woselbst er in das Samenbläschen und den Ductus ejacula torius übergeht (S. 544).

Zuweilen geht von dem unteren Ende der Epididymi oder vom Anfange des Samenleiters ein dem Kanal de Epididymis ähnliches, häufig aber engeres Röhrchen aus *Vas aberrans Halleri* genannt: dieses läuft sehr geschlängel neben dem Vas deferens in die Höhe, erstreckt sich zuwei len, indem es mit seinen Windungen und stellenweise Erweiterungen einen dünnen Strang von $\frac{1}{2}$″ bis 2″ Läng bildet, in den Samenstrang hinauf, und endigt blind ge schlossen.

Der Hode und ein Theil des Nebenhoden sind vo einem serösen Sacke, der *eigenen Scheidenhaut de Hoden*, *Tunica vaginalis propria testis*, umgeben In dem äufseren völlig geschlossenen Sacke derselben (wel cher im Fötus aus dem Bauchfell sich bildet und mit de Höhle desselben zusammenhing) liegen der vordere Ran und die Enden des Hoden, die Seitenflächen des Hoden un Nebenhoden und der Kopf des letzteren völlig frei, da di Scheidenhaut um ein Drittheil weiter ist, als der Umfan des ganzen Hoden. An der Hinterseite des Nebenhode und Hoden stülpt die Tunica vaginalis propria sich ei schliefst den mittleren und unteren Theil des Nebenhode nebst dem Anfange des Vas deferens zwischen ihre beide Blätter ein und geht von dem mittleren Theile des Neben hoden als eine kurze Duplicatur, *Ligamentum epididymid* genannt, an den hinteren Rand des Testikels über; breit

h dann über den Kopf des Nebenhoden und über den stikel als Tunica serosa testis (S. 536) aus; läfst aber an m hinteren Rande des Hoden, namentlich an der Stelle s Corpus Highmori, die Tunica albuginea unbekleidet, selbst die zwischen ihren Blättern verlaufenden Gefäfse d Nerven des Hoden jene Haut durchbohren. Zuweilen det die Tunica serosa am Caput epididymidis oder am eren Ende des Testikels eine 2‴ bis 3‴ lange, platte, utelförmige Verlängerung, zwischen deren Blättern fett- er Zellstoff sich befindet: analog den Appendices epiploi- des Dickdarms.

Samenstrang.

Der Samenstrang, *Funiculus spermaticus*, ist ein laffer, rundlicher, $\frac{1}{2}''$ bis $\frac{3}{4}''$ dicker Strang, welcher von m Annulus inguinalis anterior bis zum hinteren Rande d unteren Ende des Hoden und Nebenhoden hinabreicht. enthält in seinem Inneren die Vasa spermatica interna, Plexus nervorum spermaticus internus, das Vas defe- s und das Rudimentum canalis vaginalis: alle diese eile, welche auch durch den Canalis inguinalis enger sammengedrängt gehen, sind von schlaffem, mäfsig fett- chem Zellstoff zusammengehalten und umhüllt, sämmt- h aber noch von der Tunica vaginalis communis und n M. cremaster eingeschlossen. Die *Art. spermatica in- na* läuft geschlängelt herab, und spaltet sich im unteren eil des Samenstrangs in einen oberen und unteren Ast: Wurzeln der *Venae spermaticae internae* treten aus dem ren und mittleren Theil des Corpus Highmori und aus Epididymis, zwischen den Blättern des eingestülpten eils der Tunica vaginalis propria hervor, bilden drei vier Stämme, die an manchen Stellen sich erweitern, andern verengern, sich vielfach winden, spalten und eder vereinigen und dadurch längs des ganzen Samen- anges ein längliches Geflecht, *Plexus pampiniformis*, nkengeflecht, bilden. Die Vasa lymphatica spermatica erna treten vorzüglich aus dem Corpus Highmori und dem Caput epididymidis hervor und bilden ein aus i bis vier Stämmchen bestehendes Geflecht: die Nerven Plexus spermaticus internus umstricken die Arteria

spermatica interna. Diese Gefäfse und Nerven nehmen den vorderen und äufseren Theil des Samenstranges ein; das Va deferens liegt, einige Linien von der Art. spermatica intern entfernt, an der hinteren inneren Seite des Samenstranges und wird nur von einer oder zwei kleinen Venen, zuwei len auch von einer kleinen Arterie, Arteria et Venae de ferentiales, begleitet. Das *Rudimentum canalis vaginalis* Ruinae processus vaginalis peritonaei, (der Rest des im Foetus und Neugebornen offenen, vom Peritonaeum aus gehenden Scheidenkanals, welcher, mit Ausnahme seine unteren Endes, der Tun. vaginalis propria, nach der Gebur obliterirt) ist ein platter, 2‴ breiter, aus verdichtetem Zell stoff bestehender Streifen, welcher vom oberen Ende de Tun. vaginalis propria ausgehend, vor den Gefäfsen in di Höhe steigt, zuweilen bis zum vorderen Leistenringe ver folgt werden kann; sehr häufig aber von dem übrigen Zell stoff des Samenstranges nicht zu unterscheiden ist. — Di *gemeinschaftliche Scheidenhaut des Samenstranges und Ho den, Tunica vaginalis communis funiculi spermatici et testis* ist eine fibrös-zellulöse, unten beutelförmig erweiterte un blind geschlossene Röhre; eine Fortsetzung der Fascia trans versalis (S. 275), welche in den Canalis inguinalis eindring und diesen auskleidet: sie tritt aus dem Annulus inguinali anterior hervor, umhüllt die Theile des Samenstranges un mit ihrem unteren Ende auch den Sack der Tun. vaginali propria; ist mit den ersteren durch lockeren Zellstoff ver bunden, mit der Tun. vaginalis propria aber und dem, vo dieser Haut nicht eingeschlossenen, hinteren Rande de Hoden und Nebenhoden genauer verwachsen: daher de Hode bei Ausdehnung der Tun. vaginalis propria imme nach hinten, an der Stelle dieser Verwachsung, gelage bleibt. Sie enthält keine freie Höhle in ihrem Inneri An ihrer äufseren Fläche wird sie von einer dünnen, plat ten Schicht von Muskelfasern bedeckt, *M. cremaster* s. Tu nica erythroïdes, der Hodenmuskel. Dieser entspringt gröfs tentheils im Canalis inguinalis, von den unteren Ränder der Mm. abdominales obliquus internus und transversu und tritt aus dem vorderen Leistenringe hervor; hie kommt noch ein inneres Bündel des M. cremaster, von de zweiten Insertion des Arcus cruralis am Tuberculum pub

springend, hinzu; alsdann laufen die Muskelfasern, einer schräg durchkreuzend und divergirend, vorzüglich der vorderen Fläche und an den Seiten des Samenstranherab, genau mit der Tun. vaginalis communis verhsen; und endigen in der Mitte der unteren beutelförgen Erweiterung dieser Haut, welche die Tun. vaginalis pria einschliefst. Sie ziehen die Hoden in die Höhe l pressen sie gelinde gegen die Schambeine an. Im M. master und der Tunica vaginalis communis (nicht im eren des Samenstranges) verbreiten sich die Art. sperica externa und der Nervus spermaticus externus.

Hodensack.

Die Hoden und Samenstränge sind im Hodensacke, *rotum*, eingeschlossen, einem weiten, schlaffen, von den gemeinen Bedeckungen gebildeten Sacke, welcher zwien den Schenkeln herabhängt. An der einen Seite ist gewöhnlich tiefer, so dafs die beiden Hoden nicht in icher Höhe in ihm liegen. Seine Cutis hängt oben mit des Schamberges, der Ruthe und der Inguinalgegenden, ten mit der des Dammes, seitwärts mit der Haut der eren Fläche der Oberschenkel zusammen; ist dünn, gezelt, mit wenigen krausen Haaren, vorzüglich an seinem ren Theile besetzt, dagegen mit zahlreichen ansehnlichen gdrüsen versehen, — und durch eine schmale hervorende Naht, *Raphe scroti*, ausgezeichnet, welche vom mme aus in der Mittellinie des hinteren und unteren eils des Hodensacks läuft, und an der vorderen Seite er dem Penis sich verliert. Die Epidermis ist dunkler ärbt, als in anderen Gegenden des Körpers. Unter der tis liegt die sog. Fleischhaut des Hodensacks, *Tunica tos*, eine weifsröthliche, gefäfsreiche, feste aber schlaffe, lulös-fibröse, nicht muskulöse Schicht, welche ansehnliche llen bildet; in diesen aber kein Fett, sondern ein blafshliches Zellgewebsserum enthält; sie hängt mit der Fas- superficialis der Bauchgegenden und des Dammes und t der Fascia penis ununterbrochen zusammen. Im Inneren s Hodensacks bildet sie, in der Richtung der Raphe, eine krechte Scheidewand, *Septum scroti*, wodurch der Hodenk in zwei, nur durch die Zellen der Tun. dartos zu-

sammenhängende Räume abgetheilt wird. Unmittelbar unter der Tun. dartos findet sich der M. cremaster und die Tun. vaginalis communis.

Samenbläschen.

Nachdem das Vas deferens (S. 539) auf beiden Seiten durch den Canalis inguinalis, in der Richtung von unten, innen und vorn nach oben, aufsen und hinten, gedrungen ist, — biegt es sich bei seinem Austritt aus dem Annulus inguinalis posterior sogleich nach hinten zur Beckenhöhle; läuft vom Peritonaeum bedeckt, bogenförmig an der Seitenwand der Harnblase, vor dem unteren Ende des Harnleiters vorbei, nach hinten, unten und innen. Dann geht es unmittelbar unter dem Fundus vesicae urinariae, bis zum hinteren Rande der Prostata, ist hier in einer Strecke von 2″ etwas geschlängelt und bis auf 4‴ Dm. erweitert, und convergirt stark mit dem anderen Samenleiter, so daſs beide an dem hinteren Rande der Prostata bis auf 1‴ bis 2‴ sich nähern. Hier geht das Vas deferens theils in den Ductus ejaculatorius, theils mit einer Öffnung an seiner äufseren Seite in das Samenbläschen über.

Die beiden Samenbläschen, *Vesiculae seminales dextra et sinistra*, haben äufserlich die Gestalt einer länglichen, platten, am hinteren Ende breiteren Blase mit ungleicher höckeriger Oberfläche; 18‴ bis 20‴ lang, 7‴ bis 8‴ breit und 4‴ dick: sie liegen in fettreiches Zellgewebe eingesenkt, zwischen dem Blasengrunde und dem Mastdarme, hinter der Prostata, an den äufseren Seiten der Enden der Samenleiter; auch neben den Einsenkungsstellen der Ureteren, vor und aufserhalb derselben. Eine jede besteht aus einem 4″ bis 5″ langen, 2‴ bis 3‴ weiten, vielfach gewundenen Kanale, mit blindem hinteren Ende und sechs bis funfzehn blinden Verlängerungen und Ausbiegungen: diese und die Windungen werden durch kurzen straffen Zellstoff vereinigt und geben der Oberfläche des Samenbläschens das höckerige Ansehen. Die äufsere Haut des Samenbläschens ist der des Vas deferens gleich, aber dünner und ausdehnbarer; die innere weifsliche Schleimhaut zeigt durch zahlreiche kleine Falten ein netzförmiges Ansehen.

Die vorderen zugespitzten Enden der beiden Vesiculae minales stehen mit den Enden der Vasa deferentia, unter em spitzigen Winkel, durch eine enge Öffnung in unttelbarer Verbindung: aus dieser Vereinigung gehen die den Samenleiter und das Samenbläschen jeder Seite geinschaftlichen Ausführungsgänge, *Ductus ejaculatorii minis*, hervor, welche 6‴ bis 9‴ lang, und an ihrem tteren Anfange 1‴ dick sind; gegen ihr vorderes Ende aber sich beträchtlich zuspitzen und verengern. Sie ten in die Basis der Prostata, und laufen innerhalb dieDrüse, hinter der Pars prostatica urethrae zum Collius seminalis; und münden in die Harnröhre, in der tte des Samenhügels, nahe neben einander, jeder mit ei- besonderen, engen, etwas länglichen Öffnung; selten einer gemeinschaftlichen unpaaren, beiden Ductus ejaatorii angehörenden Mündung.

Prostata und Cowpersche Drüsen.

Die Vorsteherdrüse, Prostata, s. Glandula proa s. Prostata superior s. Parastata adenoides, eine Glana composita aggregata, liegt unmittelbar vor dem Halse Harnblase, und hat die Gestalt eines von vorn nach ten plattgedrückten, abgestumpften, von der Harnröhre chbohrten Kegels. Ihr oberes, breiteres, etwas concaEnde oder *Basis* ist nach oben und hinten gerichtet i fest an den Blasenhals geheftet, überragt aber diesen it mit ihren hinteren und seitlichen Rändern; die abgedete Spitze liegt nach unten und vorn, hinter und undem Lig. arcuatum inferius der Schambeinfuge, und liefst sich an die Pars membranacea urethrae; die une hintere Fläche ist beinahe platt und mit einer sehr hen Längenfurche versehen; die schmaleren Seitenflän (oder breiten Seitenränder) und die obere vordere che sind convex. Die hintere Fläche ruhet auf dem de des Mastdarms, und ist mit diesem durch die fibrösulösen Fasern der Fascia pelvis, welche an beide Orie sich heftet, fest verbunden; die stumpfe Spitze, die dere und zum Theil auch die Seitenflächen sind durch amente an die Symphysis pubis befestigt. Das *Ligatum puboprostaticum medium s.* triangulare vesicae, ist

platt, ungefähr dreieckig oder halbmondförmig, gelblich und ziemlich elastisch, unterwärts dicker als oben, aus mehreren Blättern oder Schichten zusammengesetzt; es steigt vom unteren Rande des Lig. arcuatum inferius zu der Vorderfläche und Spitze der Prostata und zur Pars membranacea urethrae herab, fliefst mit der Fascia pelvis und dem tiefen Blatt der Fascia perinaei zusammen; und füllt den Raum zwischen der Symphysis pubis, der Prostata und den Schenkeln der Corpora cavernosa penis aus, an deren Vereinigungswinkel ihr vorderes Blatt sich heftet; es ist von ansehnlichen Öffnungen zum Durchgange von Gefäfsen durchbohrt. Die beiden fibrösen weifsglänzenden *Ligamenta puboprostatica lateralia* s. Ligg. vesicae anteriora, sind die vorderen Enden der Fascia pelvis, entspringen spitzig von der hinteren Fläche der Ossa pubis neben der Symphysis, oberhalb des Lig. arcuatum inferius, steigen herab und breiten sich an den Seitenflächen der Prostata aus, und hangen mit dem Lig. puboprostaticum medium zusammen.

Die Gröfse der Prostata ist ziemlich veränderlich; ihre Höhe oder Länge von der Spitze zur Mitte der Basis beträgt 10‴ bis 15‴, die gröfste transversale Breite an der Basis 14‴ bis 21‴, die Dicke von der vorderen zur hinteren Fläche 6‴ bis 10‴. Im Mittel beträgt die Höhe 1″, die Breite $1\frac{1}{2}$″, die Dicke 9‴, das Gewicht 5 Drachmen, das spec. Gewicht 1,0452, das Volumen $\frac{3}{4}$ Kubikzoll. Die Oberfläche der Prostata ist glatt, eben; ihre Seitenhälften, welche nur an der hinteren Fläche durch eine sehr flache Furche unvollkommen abgegränzt sind, werden öfter als Seitenlappen, Lobi laterales, bezeichnet, und der kleinere Theil in der Mitte des hinteren Randes, hinter dem Anfange der Harnröhre, welcher zuweilen etwas hervorragt, als ein mittlerer Lappen, Lobulus medius, angesehen. Äufserlich ist sie von einer dünnen Zellhaut bekleidet, ihr Gewebe ist fest, zähe, härtlich, von gelbbräunlicher oder röthlichbrauner Farbe, und besteht gröfstentheils aus zahlreichen rundlichen, $\frac{1}{5}$‴ bis $\frac{1}{4}$‴ langen und $\frac{1}{10}$‴ weiten, auch nicht selten rundlich eckigen Cryptae mit verhältnifsmäfsig dicken gefäfsreichen Wänden, welche in zahlreiche kurze, wenig verzweigte Ausführungsgänge, die gänzlich

n der Substanz der Drüse verborgen sind, übergehen. ie Ausführungsgänge münden mit sehr engen Öffnungen n der Pars prostatica urethrae, vorzüglich auf und neben em Colliculus seminalis.

Die Prostata wird von der Pars prostatica urethrae und en Ductus ejaculatorii (S. 529, 545) durchbohrt; erstere eht aber nicht durch die Axe der Drüse, sondern weiter ach vorn, so dafs ihre Wände im Mittel 2‴ von der vorderen Fläche der Prostata, 4‴ von der hinteren Fläche, ‴ vom hinteren Rande, 7‴ von den Seitenflächen entfernt nd. Die Ductus ejaculatorii treten am hinteren Rande, ‴ hinter dem Anfang der Harnröhre, in die Basis ein, nd laufen in fast horizontaler Richtung, nahe neben einander und convergirend, durch den hinter der Harnröhre befindlichen Theil der Drüse.

Die Cowperschen Drüsen, Glandulae Cowperi Prostatae inferiores, sind eine, zwei oder drei aggregirte rrüsen von rundlicher Gestalt mit höckeriger Oberfläche, ‴ bis 4‴ dick; sie liegen unmittelbar unter der Pars embranacea urethrae, vor der Spitze der Prostata, hinter em Bulbus urethrae, von den Mm. bulbocavernosi umgen: wenn drei vorhanden sind, so liegt die eine in der ittellinie. Sie sind von gelbröthlicher Farbe, härtlich, nd aus mehreren Läppchen zusammengesetzt, welche aus hr kleinen runden oder rundlicheckigen Cryptae von $\frac{1}{50}$‴ s $\frac{1}{25}$‴ Dm. bestehen. Die $\frac{1}{18}$‴ bis $\frac{1}{10}$‴ weiten Gänge, welche die Cryptae sich öffnen, münden zuweilen in ne gemeinschaftliche $\frac{1}{3}$‴ weite Höhlung im Inneren der rüse: von dieser geht der 1‴ bis 2‴ lange, $\frac{1}{5}$‴ weite, ters doppelte Ausführungsgang aus, welcher die untere and der Pars membranacea urethrae durchbohrt, zuweian auch, im Bulbus urethrae verlaufend, weiter nach vorn die Pars cavernosa der Harnröhre sich mündet.

Ruthe.

Die Ruthe oder *das männliche Glied, Penis Membrum virile* s. Virga, s. Coles, liegt unter der Symysis pubis vor dem Beckenausgange, und hat eine cylinische, oder vielmehr abgerundet dreiseitig prismatische estalt: im schlaffen Zustande hängt sie vor dem Hoden-

sacke zwischen den Oberschenkeln herab; bei der Erection ist sie nach vorn und oben gerichtet. Man unterscheidet an ihr das hintere, breitere, am Becken befestigte Ende oder die Wurzel der Ruthe, *Radix penis*; die vordere, von der Eichel gebildete, stumpf zugerundete Spitze; die breitere obere Fläche oder den Rücken, *Dorsum penis*; die etwas nach hinten gerichteten Seitenflächen, und die hintere schmale Fläche, welche sämmtlich unter abgerundeten Winkeln in einander übergehen. Im schlaffen Zustande ist sie ungefähr 4″ lang und 1″ breit und dick, und hat ein Volumen von 3 Kubikzoll; im erigirten Zustande beträgt ihre Länge meistens 8″, die Breite und Dicke $1\frac{1}{2}$″, der körperliche Inhalt 14 Kubikzoll: diese Dimensionen sind nicht in allen Individuen gleich. Sie besteht vorzüglich aus drei sehr gefäfsreichen schwammigen oder Zell-Körpern, zwei Corpora cavernosa penis und einem Corpus cavernosum urethrae, die von einer gemeinschaftlichen Fascia und den allgemeinen Hautbedeckungen umkleidet werden.

Die Zellkörper der Ruthe, Corpora cavernosa s. spongiosa penis s. lateralia, entstehen an der Wurzel des Penis als zwei von einander abgesonderte rundliche Schenkel, *Crura penis*, und vereinigen sich, nahe unterhalb der Symphysis pubis, in einem spitzigen Winkel, zu einem einfachen plattrundlichen Körper, welcher den gröfseren oberen Theil der Ruthe bildet und an der Basis der Eichel mit einem, in diese etwas hineinragenden, abgerundet kegelförmigen Ende endigt. An der unteren Fläche desselben läuft eine tiefere Längengrube, welche den Zellkörper der Harnröhre aufnimmt; auf der Rückenfläche eine flachere Furche für die Vasa dorsalia und Nervi dorsales penis. Der äufsere Umfang der vereinigten Zellkörper und ihrer Schenkel wird von einer sehr starken, $\frac{1}{2}$‴ dicken, weifsen, fibrösen Haut, *Tunica albuginea* corporum cavernosorum penis, gebildet, welche auch zwischen beiden Zellkörpern, als eine von mehreren grofsen Öffnungen durchbrochene Scheidewand, *Septum penis*, von der Vereinigungsstelle der Schenkel an bis zur Eichel hin sich erstreckt. Auf solche Weise bildet die Tunica albuginea zwei sehnige Röhren, welche hinterwärts als sog. Crura von einander entfernt, und an die Rami adscendentes ossium ischii sehr genau, durch

Verschmelzung der Tun. albuginea mit der Beinhaut, be-
stigt sind, und deren Vereinigungswinkel durch das
ordere Blatt des Ligamentum pubo-prostaticum medium
. 545) ausgefüllt wird: alsdann aber in einer gröfseren
trecke parallel neben einander verlaufen und durch die
ffnungen des Septum mit einander communiciren: und
ndlich in der Basis der Eichel mit vorderen geschlossenen
nden aufhören. In die inneren Räume der beiden Corpora
avernosa erstrecken sich einzelne, von der Tunica albugi-
ea ausgehende, platte Sehnenfaserbündel, *Septula fibrosa;*
ufserdem werden sie inwendig von äufserst zahlreichen
ündeln oder Balken, *Trabeculae corporum cavernosorum,*
urchzogen: diese sind platt oder rundlich eckig, aus ver-
ichtetem Zellstoff gebildet, weifslich oder blafsröthlich,
nd vereinigen sich vielfältig mit einander zu einem dich-
en Netzwerk, durch dessen Maschen die Gefäfse verlaufen.
Von den letzteren bieten die Blutadern, *Venae cavernosae,*
en bei Weitem gröfseren Umfang und Anzahl dar: sie
aben sehr dünne, nur von der Tunica intima vasorum
ebildete Wände, winden sich mit zahlreichen Krümmungen
nd Anastomosen zwischen den Trabeculae hindurch und
illen die Zwischenräume derselben mit schlauchähnlichen
usbiegungen und Erweiterungen gröfstentheils aus; so dafs
ie Trabeculae, welche diese dünnwandigen Venen stützen,
änzlich von der Gefäfshaut der letzteren umgeben und
berzogen erscheinen. Die Venen des einen Corpus caver-
osum anastomosiren durch das Septum hindurch mit denen
es anderen, und ergiefsen sich zum Theil in die Vena
orsalis penis; die aus dem hinteren gröfseren Theil der
orpora cavernosa gehen aber in die aus den Crura her-
ortretenden Venae profundae penis. An den Stellen, wo
iese Venae cavernosae mit einander anastomosiren und in
röfsere Venen einmünden, sind sie meistens enger als in
en übrigen Strecken ihres gewundenen Verlaufs: nirgends
ind sie baumförmig verästelt. — Auch die Arterien,
Arteriae profundae penis, welche durch das Netzwerk der
Trabeculae nahe am Septum laufen, haben eine eigenthüm-
iche Vertheilung; ein Theil ihrer kleineren Äste vertheilt
ich baumförmig an den Trabeculae und den Venenwänden,
nd geht durch Capillargefäfse in die Venen über: ein

anderer Theil ihrer Äste sind die *Arteriae helicinae Mülleri;* kurze Arterien von 1‴ Länge und $\frac{1}{10}$‴ Dicke, die an ihrem etwas angeschwollenen Ende gekrümmt sind; sie finden sich vorzüglich im hinteren Theil der Corpora cavernosa penis, entspringen theils einzeln, theils in Büscheln; oder eine Art. helicina spaltet sich in zwei oder drei andere: ihre Enden verästeln sich aber nicht in noch kleinere Arterien oder Haargefäfse, sondern scheinen direct in die Venen einzumünden: so dafs in den Corpora cavernosa ein freierer Übergang aus verhältnifsmäfsig gröfseren Arterien in gröfsere Venen Statt finden kann, als in allen anderen Theilen des Körpers. Die Art. profundae penis werden innerhalb der Zellkörper von Ästen der Nn. dorsales penis und aufserdem von einem, dem Gangliensysteme vorzugsweise angehörigen Nervengeflecht, Plexus cavernosus penis, begleitet.

Der Zellkörper der Harnröhre, Corpus cavernosum s. spongiosum urethrae s. inferius, ist länger, aber im Allgemeinen dünner als die Corpora cavernosa penis; sein hinteres rundlich angeschwollenes, nicht durchbohrtes Ende, *die Harnröhrenzwiebel, Bulbus urethrae*, liegt unter der Pars membranacea urethrae, zwischen den Crura penis, vor und unterhalb des vorderen Endes der Prostata, 6‴ von letzterem entfernt. Sein längster, mittlerer, dünnerer Theil liegt in der Längenfurche an der unteren Fläche der vereinigten Corpora cavernosa penis, sehr genau an diese durch Verwachsung der Tunicae albugineae geheftet, und umschliefst von allen Seiten her die Pars cavernosa der Harnröhre. Sein vorderes Ende ist die *Eichel, Glans* s. *Balanus*, Ruthenkopf, Caput penis: diese hat die Gestalt eines stumpfen Kegels mit schräg abgeschnittener Basis, und umschliefst den vorderen zur Fossa navicularis erweiterten Theil der Harnröhre; welche Röhre indessen der unteren Fläche der Eichel näher liegt als der oberen, und mit ihrem Orificium die abgerundete Spitze der Eichel durchbohrt. Die obere Fläche der Eichel ist stark convex, die untere in ihrer Mitte mit einer Longitudinalfurche versehen. Das hintere, breitere, etwas ausgehöhlte Ende oder Basis der Eichel ist durch kurzen Zellstoff mit den vorderen Enden der vereinigten Corpora cavernosa penis fest verbunden (von deren Tunica albuginea aus bei man-

hien Menschen ein kleiner konischer Knorpel, Cartilago
landis, in das Innere der Eichel sich erstreckt (Mayer) —:
ese Basis ragt über die Corpora cavernosa penis et ure-
rae mit einem wulstigen abgerundeten Rande beträchtlich
ervor: dieser Rand ist die Eichelkrone, *Corona glandis*,
nd die Furche hinter dieser der Hals der Eichel, *Collum*
landis. — Der Bau des Corpus cavernosum urethrae ist
em der Corpora cavernosa penis im Wesentlichen gleich:
ie Tunica albuginea ist aber bei Weitem dünner, enthält
eniger Sehnenfasern, überzieht den Bulbus vollständig,
en mittleren Theil des Corp. cavernosum urethrae aber
ur an dessen unteren und seitlichen Flächen, und verliert
ch ohne deutliche Gränze in den Trabeculae der nur von
r Cutis überzogenen Eichel. Die Septula fibrosa fehlen,
s Netzwerk der Trabeculae bildet engere Maschen, vor-
üglich in der Eichel; die Venae cavernosae sind nur im
ulbus urethrae, woselbst ihre Stämme austreten, von an-
lhnlicher Weite; übrigens und vorzüglich in der mehr
mpact gebaueten Eichel viel enger als in den Corpora
vernosa penis: der Bulbus urethrae, in welchen die Ar-
riae corporis cavernosi urethrae eindringen, enthält Arte-
ae helicinae; diese fehlen aber in dem mittleren Theile
nd in der sehr nervenreichen Eichel, welche die Enden
r Arteriae dorsales und Nervi dorsales penis empfängt.

Die schlaffe zellulös-fibröse *Fascia penis* umgibt den
nzen Penis ziemlich locker von der Wurzel an bis zum
llum glandis, bedeckt die Vasa dorsalia und Nn. dorsales
nis, und hängt ununterbrochen mit der Tunica dartos,
it der Fascia perinaei, und mit der Fascia superficialis
r Leistengegenden und des Schamhügels zusammen. Hinter
m Fettpolster des Schamhügels bildet sie eine stärkere
yramidalische Falte, welche von der vorderen Fläche der
ymphysis pubis zu der Stelle des Dorsum penis unmittel-
ur vor den vereinigten Crura penis herabsteigt, und zahl-
iche Sehnenfasern von den inneren Schenkeln der Mm.
cti abdominis und von den sog. inneren Schenkeln der
orderen Leistenringe (den Aponeurosen der Mm. obliqui
xterni abdominis angehörig) in sich aufnimmt: diese Falte
t das Aufhängeband der Ruthe, *Ligamentum suspensorium*
nis, und hält die Wurzel des Penis nach oben vor der

Symphysis pubis fest; es ist fester mit der Tunica albuginea verwachsen als die übrigen Stellen der Fascia penis. — Hinter dem Lig. suspensorium penis und weiter nach unten findet sich das vordere Blatt des Lig. puboprostaticum medium, welches zum Theil den Vereinigungswinkel der Crura penis ausfüllt.

Die Hautbedeckungen des Penis bestehen aus einer feinen, schlaffen, haarlosen, mit vielen Talgdrüsen versehenen Cutis und einer zarten Epidermis; erstere ist mit der Fascia penis durch lockeren fettlosen Zellstoff verbunden: nur an der Wurzel des Penis neben dem Lig. suspensorium finden sich in ihm Fettklümpchen. Von dem Collum glandis an steigt die Haut bis zur Spitze der Eichel herab und schlägt sich wieder bis zum Collum zurück, ohne mit der Eichel verwachsen zu sein: sodann geht sie abermals sehr verfeinert bis zur Spitze der Eichel, letztere bekleidend und innig mit ihrem inneren vasculösen Gewebe verwachsen, und dringt in die Öffnung der Harnröhre: indem sie mit der Schleimhaut der Urethra, die Epidermis aber mit dem dicken Epithelium derselben, ununterbrochen zusammenfliefst. Jene schlaffe, verschiebbare, gerunzelte Duplicatur der Cutis ist die *Vorhaut, Praeputium;* sie umgibt im schlaffen Zustande des Penis die Eichel sehr locker und bedeckt sie entweder vollständig oder nur zum Theil, je nachdem die Vorhaut länger oder kürzer und mit einer engeren oder weiteren vorderen Mündung versehen ist: in der Furche an der unteren Fläche der Eichel wird sie durch eine kurze, straffe, bis zur Harnröhrenmündung hinabreichende, longitudinale Falte, Bändchen der Vorhaut, *Frenulum praeputii*, genauer befestigt. Die innere Platte der Vorhaut (die beim Zurückziehen derselben nach aufsen sich wendet), so wie auch meistens der ganze Hautüberzug der Eichel, ist weich, feucht, schleimhautähnlich; am Halse der Eichel liegt eine grofse Anzahl Talgdrüsen, *Cryptae praeputiales* s. Glandulae Tysonianae, welche ein weifsliches, stark riechendes, leicht zu käseartiger Consistenz erhärtendes Sebum, *Smegma praeputii*, absondern.

Functionen der männlichen Geschlechtstheile. Die Hoden secerniren den *Samen, Semen* s. *Sperma virile,* eine Flüssigkeit, welche bestimmt ist, die in den Eierstöcken

weiblicher Körper enthaltenen Keime zur Bildung neuer Organismen anzuregen. Von den Vasa deferentia aufgenommen, wird sein Aufsteigen durch die Wirkung der Mm. cremasteres, welche die Hoden in die Höhe ziehen und gelinde gegen die Symphysis pubis andrücken, befördert. Aus den Samenleitern tritt er in die Samenbläschen, wird in diesen eine Zeitlang aufbewahrt und durch theilweise Resorption seiner wässerigen Theile verdickt und mehr ausgebildet, auch mit dem Secret der Samenbläschen (Schleim?) gemischt. Zur Zeit der Ausleerung fliefst er durch die Ductus ejaculatorii in die Harnröhre und vermischt sich hier mit dem Secret der Prostata und Cowperschen Drüsen, *Liquor prostaticus*, und mit Harnröhrenschleim: wahrscheinlich tritt er alsdann nicht allein aus den Samenbläschen, sondern auch direct aus den Hoden hervor. — Der Samen ist dickflüssig, oft in sehr hohem, der Consistenz der Gallerte sich annähernden Grade; fadenziehend, klebrig; halbdurchsichtig und von bräunlich gelber, gelb- oder grauweifser oder ganz weifser Farbe und von eigenthümlichen Geruch; sein spec. Gewicht beträgt 1,0367, seine Bestandtheile sind:

Wasser.	90 p. C.
Eigenthümliche extractart. Materie (Spermatin)	6
Phosphorsaurer Kalk	3
Natron	1
	100

Er enthält in ganz frischem Zustande einen flüchtigen Stoff, *Aura seminalis*, welche ihm den eigenthümlichen Geruch verleihet; ferner nur wenige rundliche Körnchen von $\frac{1}{550}'''$ bis $\frac{1}{325}'''$ Dm. (Schleimkörnchen?); dagegen eine grofse Anzahl lebender *Samenthierchen, Spermatozoa* s. Animalcula spermatica, (auch unrichtig Cercariae spermaticae genannt); deren Körper von gelblicher Farbe, mandelförmig, vorn zugespitzt, hinten breit, $\frac{1}{600}'''$ bis $\frac{1}{530}'''$ lang, $\frac{1}{800}'''$ breit und $\frac{1}{1060}'''$ dick ist; von dem hinteren breiteren Ende des Körpers geht ein dünner, spitzig endigender Schwanz von $\frac{1}{66}'''$ bis $\frac{1}{160}'''$ Länge aus, so dafs das ganze Samenthierchen eine Länge von $\frac{1}{190}'''$ bis $\frac{1}{125}'''$ hat. Diese Thierchen bewegen sich lebhaft, indem sie sich an dem Schwanze hin

und her schwingen, und in geschlängelter Richtung ziemlich langsam, selten schneller schiefsend, fortrücken: Spuren einer inneren Organisation sind an ihnen nicht wahrzunehmen. — Der Liquor prostaticus, sowohl das Secret der Prostata, als das der Cowperschen Drüsen, ist eine wasserhelle, klebrige, fadenziehende Flüssigkeit, mit trüben Flocken vermischt, in welchen rundliche Körnchen von $\frac{1}{900}'''$ bis $\frac{1}{370}'''$, meistens von $\frac{1}{455}'''$ Dm. sich finden.

Der Ausleerung des Samens, *Emissio seminis*, geht die Aufrichtung der Ruthe, *Erectio penis*, vorher, wobei der Penis unter einer, vorzüglich in der Eichel empfundenen Nervenaufregung, in allen seinen Dimensionen sich vergröfsert, hart, steif wird und schräg nach vorn und oben sich richtet; seine Fascia und Hautbedeckungen stark gespannt, die Vorhaut zurückgezogen, ihre innere Hautplatte nach aufsen gewendet, und die Eichel entblöfst wird. Dieser Vorgang wird vermittelt durch eine stärkere Ausdehnung und Spannung der von den Tunicae albugineae gebildeten Röhren, wodurch die Schwere des ganzen Penis überwunden und er in die Richtung der, an die Rami adscendentes ossium ischii befestigten, Crura penis gebracht wird. Die Ausdehnung der Corpora cavernosa wird bewirkt durch eine beträchtlich vermehrte Blutanhäufung in den Venae cavernosae, indem wahrscheinlich eines Theils die Arteriae helicinae eine gröfsere Menge Blutes in diese Venen ergiefsen, hauptsächlich aber die Venen im hinteren Theil der Corpora cavernosa und ihre den Penis verlassenden Stämme comprimirt, und auf diese Weise der Rückfluſs der Venenbluts aus dem Penis gehemmt wird. Letzteres geschieht durch die Mm. ischiocavernosi, welche die Wurzel des Penis herabziehen, die Crura penis verkürzen und zusammendrücken und gegen die Rami descendentes oss. pubis pressen; die Fascia penis an dem Rücken der Wurzel des Penis anspannen und die unter ihr laufende Vena dorsalis penis comprimiren: — auch durch den hinteren Theil der Mm. bulbocavernosi, welche den Bulbus urethrae zusammendrücken. Durch die Erection wird der Penis zum Eindringen in die Scheide fähig: wahrscheinlich werden gleichzeitig die Samenbläschen und Prostata durch die Mm. levatores ani etwas in die Höhe gehoben, und die

uctus ejaculatorii in eine dem Ausflusse des Samens gün-
igere Richtung gebracht; sobald dieser in den hinteren
heil der Harnröhre ergossen ist, erfolgt die eigentliche
usspritzung des Samens, *Ejaculatio seminis*, durch stofs-
eise Zusammenziehungen der Mm. bulbocavernosi.

II. Weibliche Geschlechtstheile, Organa genitalia muliebria s. feminae.

Eierstöcke.

Die Eierstöcke, *Ovaria* s. Testes muliebres, sind zwei
n Beckeneingange liegende Organe von eigenthümlichem
au, welche die menschlichen Eier, die Keime neuer Indi-
iduen, enthalten. Sie haben eine halbovale plattgedrückte
estalt, an welcher man ein äufseres breiteres abgerunde-
es, und ein inneres schmaleres, oft stumpfspitziges Ende —
ine vordere und hintere convexe Fläche, einen oberen
reiteren convexen und einen unteren fast geraden Rand
nterscheidet. Zuweilen ist die Gestalt des Eierstockes
einahe halbmondförmig, der untere Rand concav; zuwei-
en dreiseitig, so dafs man eine untere Fläche und einen
beren, vorderen und hinteren, breit abgerundeten Rand
ndet. Am unteren Rande (bei dreiseitigen Ovarien an der
nteren Fläche) zeigt sich eine längliche Furche von ver-
chiedener Tiefe, *Hilus ovarii*. Übrigens ist die Oberfläche
meistens durch rundliche Erhabenheiten und unregelmäfsige
Einkerbungen uneben und höckerig, zuweilen jedoch ganz
ben und glatt; ziemlich fest und derb, an den erhabenen
Stellen aber oft elastisch schwappend anzufühlen.

Die Ovarien liegen mit ihrem längsten Durchmesser in
queerer Richtung im Beckeneingange, — mit ihrem inneren
Ende gegen den Gebärmuttergrund gerichtet, — in den
oberen Rändern der breiten Mutterbänder, Ligg. uteri lata,
und ziemlich frei in die Höhle des Bauchfells, welche Haut
ihnen einen Überzug gibt, hineinragend; nur ihr unterer
Rand ist am breiten Mutterbande und an Gefäfsen befestigt,
die in den Hilus eintreten.

Bei vollkommen ausgebildeten Jungfrauen sind sie gröfser als bei Weibern von 35 bis 45 Jahren, welche öfters geboren hatten; bei ersteren beträgt die Länge von einem Ende zum anderen 18‴ bis 23‴, die Breite 9‴ bis 1″, die Dicke $4\frac{1}{2}$‴ bis 5‴, das Gewicht 80 bis 110 Gran, das Volumen $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{5}$ Kubikzoll: bei letzteren die Länge 12‴ bis 18‴, die Breite 6‴ bis 7‴, die Dicke 3‴ bis 4‴, das Gewicht 40 Gran, das Volumen $\frac{1}{8}$ Kubikzoll. Das spec. Gew. beträgt im Mittel 1, 0515; die Farbe ist matt weifs oder weifsröthlich oder weifsbläulich.

Der äufserste Überzug des Eierstocks ist eine seröse Haut, der Theil des Peritonaeum, welcher den oberen hinteren Rand des Lig. uteri latum bildet; diese läfst den unteren Rand oder die untere Fläche, insbesondere den Hilus, unbekleidet. Unter der serösen Haut findet sich die eigenthümliche, das innere Gewebe einschliefsende Haut des Eierstocks, *Tunica albuginea* s. *propria ovarii*: eine weifse, starke, fibröse Haut von ungefähr $\frac{1}{4}$‴ Dicke, deren innere Fläche einen mehr lockeren Bau darbietet und mit dem inneren Gewebe sehr innig zusammenhängt, mit ihm zu verschmelzen scheint. Das innere Gewebe besteht aus dem sog. *Keimlager*, *Stroma*, einer bräunlich rothen, zähen, festen Substanz, die aus vielfach durchkreuzten und innig verwebten Zellstofffasern und zahlreichen Blutgefäfsen zusammengesetzt ist: — und aus den *Graafschen Säckchen* oder Bläschen, *Folliculi Graafiani* s. *Graafii* s. *Vesiculae Graafianae* s. *Ovula Graafiana*. Letztere sind völlig geschlossene, in das Stroma eingesenkte, häutige Säcke, von $\frac{1}{2}$‴ bis 4‴ Dm.; bei Jungfrauen 12 bis 15 an der Zahl, bei älteren Weibern, besonders solchen, die mehrmals geboren haben, in geringerer Anzahl vorhanden. Die kleineren liegen meistens entfernter von der Oberfläche des Eierstocks und von dem Stroma auf allen Seiten umgeben; die gröfseren dagegen oft sehr nahe an der Oberfläche des Ovarium, an einem Theile ihres Umfangs nur von der Tunica albuginea, und sogar nur von der serösen Bekleidung des Eierstocks umgeben; und bilden alsdann die stärker hervorragenden, schwappenden Stellen an der Oberfläche des Eierstocks. Die äufsere Hülle des Folliculus Graafianus besteht aus einer dicken, in mehrere (wenigstens

ei) Schichten zerlegbaren Zellhaut, welche noch dem
oma anzugehören scheint und mit diesem durch ein
htes Blutgefäfsnetz zusammenhängt, übrigens ziemlich
cht aus dem Stroma sich herausschälen läfst: sie wird
a Baer *Theca folliculi* genannt. Die eigentliche Haut
s Folliculus, *Tunica folliculi*, ist mit der inneren Schicht
Theca genau verwachsen, dünn, aber fest, durchsichtig,
äfslos; auswendig glatt, inwendig von einem rauheren
d körnigen Ansehen (Membrana granulosa). — Die Höhle
s Folliculus wird von einer hellen, schwach graugelblichen
er weifsgelblichen, klebrigen, eiweifshaltigen Flüssigkeit
ggefüllt, *Liquor folliculorum Graafii*: diese enthält eine
mlich ansehnliche Menge weifsgelblicher rundlicher Körn-
en von $\frac{1}{360}'''$ bis $\frac{1}{90}'''$, meistens jedoch von $\frac{1}{145}'''$ Dm.,
e gröfseren mehr opaken lassen sich in kleinere theilen);
lche an einzelnen Stellen in gröfseren unregelmäfsigen
äufchen beisammen liegen, auch in einer dünnen Schicht
der inneren Fläche der Haut des Folliculus ausgebreitet
d: aufserdem finden sich in dieser Flüssigkeit einzelne
nige, gröfsere, helle Oeltröpfchen, und durch Einwirkung
s Weingeistes bilden sich in ihr zahlreiche sehr kleine
weifskügelchen. An einer Stelle der Peripherie dieser
issigkeit, nahe an der Innenfläche der Haut des Follicu-
s, findet sich ein plattes, ovales, selten kreisrundes Kör-
rchen von weifsgelblicher Farbe und von der Gestalt
ner in der Mitte vertieften, oder gänzlich durchbohrten
d daher ringförmigen Scheibe: d. i. die von Baer sog.
eimscheibe, *Discus proligerus* oder die *Eischeibe*, *Discus*
phorus oder die Zona granulosa: sie besteht nur aus
nem Haufen der im Liquor folliculorum enthaltenen
örnchen; daher sind ihre dünneren Ränder unregelmäfsig
d nicht scharf begränzt: ihre Breite beträgt meistens
$'''$ bis $\frac{1}{6}'''$. In ihrer dickeren Mitte enthält die Eischeibe
s über ihre äufsere Fläche etwas hervorragende Eichen,
elches mit einem Theile seines Umfanges die Innenfläche
r Haut des Folliculus berührt, aber nicht mit dieser ver-
nden ist, vielmehr fester an der Eischeibe hängt.

Das *Ei* oder *Eichen*, *Ovulum humanum*, ist eine
otterkugel, welche von einer eiweifsähnlichen, vollkom-
en klaren und durchsichtigen, in eine höchst zarte durch-

sichtige Haut eingeschlossenen Flüssigkeit umgeben wird: diese bildet eine $\frac{1}{55}'''$ dicke Schicht um die Dotterkugel und erscheint, wenn das Ei noch in der Eischeibe liegt, als ein ringförmiger durchsichtiger Zwischenraum (Zona pellucida) zwischen der Dotterkugel und den Körnern der Eischeibe. Die Dotterkugel ist ein durchscheinendes, nur leicht opakes weifsgelbliches Bläschen von $\frac{1}{30}'''$ bis höchstens $\frac{1}{18}'''$ Dm.; es besteht: 1) aus einer äufseren, wahrscheinlich einfachen, durchsichtigen, glatten, ungefähr $\frac{1}{200}'''$ dicken Haut, *Dotterhaut*: 2) aus einem dickflüssigen, etwas zähen Inhalt, welcher an sich wasserhell ist, aber viele sehr kleine Körnchen, und unter diesen einzelne gröfsere von $\frac{1}{180}'''$ Dm. enthält; diese Körnchen sind gröfstentheils an der inneren Fläche der Dotterhaut in einer Schicht verbreitet, auch im Inneren stellenweise mehr zusammengehäuft, und verleihen der Flüssigkeit eine leichte weifsgelbliche, nicht ganz gleichförmige Trübung. Diese Flüssigkeit ist als *Dotter* anzusehen. 3) Nach Purkinje und Valentin enthält auch das menschliche Eichen *das Keimbläschen*, *Vesicula germinativa* s. prolifera, Purkinje'sches Bläschen: ein in der Dotterkugel eingeschlossenes, nur ungefähr halb so grofses, kugelrundes oder länglichrundes Bläschen; vollkommen durchsichtig, aus einem sehr zarten Häutchen und einer klaren, ungefärbten, körnerlosen, ziemlich dünnen Flüssigkeit bestehend. Das Keimbläschen liegt mit einem Theile seines Umfangs genau an der Dotterhaut, und ist nicht hier, übrigens aber überall, von dem körnigen Inhalte des Eichens umgeben. 4) Wahrscheinlich befindet sich in dem Keimbläschen auch beim Menschen die von R. Wagner bei Thieren entdeckte *ursprüngliche Keimschicht* oder der *Keimfleck*, *Stratum germinativum* s. *Macula germinativa*, ein runder, opaker, weifsgelblicher Fleck von ungefähr $\frac{1}{200}'''$ Dm.

Zuweilen findet man an der Oberfläche des Eierstocks eine unregelmäfsige, zerrissene, von einem stärker injicirten Gefäfsnetze umgebene Öffnung, welche in die Höhle eines ansehnlicheren Folliculus Graafianus führt, der alsdann kein Ei enthält, von einer röthlichen Flüssigkeit erfüllt ist, und dessen Haut stark gerunzelt, röthlich und beträchtlich verdickt erscheint: — zuweilen findet man dagegen eine krause

tiefte Narbe, und unter dieser einen unregelmäfsig rund-
en, höckerigen Körper von röthlich weifser oder gelb-
hlicher Farbe, welcher sich durch gröfsere Härte und
ch eine mehr compacte, nicht deutlich zellfaserige und
niger gefäfsreiche Textur von dem ihn umgebenden
oma unterscheidet, und von diesem durch eine (nicht
stant vorhandene) hellgelbe Schicht abgegränzt wird:
... ein sog. *gelber Körper, Corpus luteum.* Diese Erschei-
ggen sind die Spuren einer, vor kürzerer oder längerer
t erfolgten Berstung eines Folliculus Graafianus und
lleerung des Eies. (S. Bd. II.)

Muttertrompeten.

Die Muttertrompeten, Tubae uterinae s. *Fallopia-*
, die Eileiter, Mutterröhren, sind zwei häutige, etwas
wundene, $3\frac{1}{2}''$ bis $4''$ lange Röhren, welche im Becken-
gange, vor den Ovarien, zwischen den Platten der Ligg.
ri lata, in queerer Richtung laufen, und eine Commu-
ation zwischen der Oberfläche der Eierstöcke und der
hle der Gebärmutter vermitteln. Das äufsere Ende jeder
ba liegt zwischen dem seitlichen Umfange des Becken-
ganges und dem äufseren Ende des Eierstocks, sehr nahe
dem letzteren; und enthält eine rundliche, $1'''$ weite
nung, *Ostium abdominale tubae*, welche aus der Höhle
Bauchfellsackes in den Kanal der Tuba führt. Dieses
ium abdominale wird von einem breiten schlaffen Rande
geben, welcher in zahlreiche, schmale, theils spitzige,
ils zungenförmige und ausgezackte Zipfel, *Fimbriae* s.
ciniae, gespalten ist: schlaff aneinander liegend verber-
n diese das Ostium abdominale, bilden dagegen ausge-
itet einen trichterförmigen Zugang zu jener Öffnung.
e äufseren Fimbriae sind länger als die inneren, $4'''$ bis
lang. Der mittlere Theil der Tuba läuft wellenförmig
d etwas nach unten gebogen vor dem unteren Rande des
erstocks, ist in der Nähe des Ostium abdominale $2'''$ weit,
rengert sich aber immer mehr, indem er etwas aufstei-
nd der Gebärmutter sich nähert. Das innere Ende der
ba, welches einen inneren Dm. von nur $\frac{1}{5}'''$ bis $\frac{1}{4}'''$ hat,
ft in der Substanz der Gebärmutter selbst, im äufseren

Theile des Fundus uteri, und mündet in der Gebärmutterhöhle mit einer engen Öffnung, *Ostium uterinum tubae.*

Die äufsere Bekleidung des gröfsten Theils der Tuba ist seröse Haut, nämlich die Platten der breiten Mutterbänder; die des inneren Endes dagegen das Gewebe des Uterus. Die eigenthümlichen Häute sind eine äufsere, derbe, feste, sehr gefäfsreiche Zellhaut, und eine innere Schleimhaut, welche vorzüglich in der äufseren weiteren Hälfte der Tuba zahlreiche ansehnliche Longitudinalfalten bildet.

Gebärmutter.

Die Gebärmutter, *Uterus,* die Mutter, der Fruchthälter, ist ein, in der Mitte des oberen Theiles der Beckenhöhle liegender, muskulöser hohler Körper, welcher zur Aufnahme der Eier und zur Ausbildung der Frucht, Foetus, bestimmt ist. Sie hat eine länglich rundliche, oberwärts breitere und dickere, unterwärts schmalere und dünnere, ungefähr plattgedrückt birnförmige Gestalt; an welcher man einen oberen, mittleren und unteren Theil, Flächen, Ränder und die innere Höhle unterscheidet.

Der *Gebärmuttergrund, Fundus uteri,* ist der oberste, breiteste und dickste, nach oben stark convexe Theil; der *Mutterkörper, Corpus uteri,* ist die mittlere, längere aber schmalere, nach unten verjüngt zulaufende Abtheilung: der *Gebärmutterhals, Cervix* s. *Collum uteri,* ist der untere, $\frac{2}{5}$ der ganzen Länge des Uterus betragende, schmalere und dünnere, plattcylindrische Theil, welcher unterwärts abgerundet endigt. Die Gränze zwischen Corpus und Cervix ist der dünnste und schmalste Theil der Gebärmutter. Die Vorderfläche des Uterus ist am Fundus und Corpus schwach convex und mehr abgeplattet als die hintere, stärker convexe Fläche; am Cervix sind beide Flächen fast gleichförmig flach convex: der obere stark convexe Rand begränzt den Fundus; die Seitenränder (welche im ausgedehnten Zustande des Uterus zu Seitenflächen sich ausbreiten) sind breit und abgerundet. Von der Vorderfläche des Fundus geht auf jeder Seite ein langer, runder, zugespitzter, nicht hohler Fortsatz der Gebärmutter aus; die *Crura uteri* s. *Ligamenta uteri rotunda, die runden Mutterbänder,* die aus der Substanz des Uterus selbst gebildet werden. Die *Gebär*

tterhöhle, Cavum uteri, ist im Verhältnifs zu der sehr
ehnlichen Dicke der Wände nur eng, vorzüglich in der
htung von vorn nach hinten: im Fundus und Corpus ist
dreieckig, oben breiter als unten, mit oberer concaver
l seitlicher convexer Begränzung. An der rechten und
ken Seite des Fundus, zwischen diesem und den oberen
den der Seitenränder, bildet die Gebärmutterhöhle eine
chterförmig verengerte Verlängerung, welche das Ostium
rinum der Tuba Fallopiana enthält. An der Gränze
ischen Corpus und Cervix ist die Höhle am engsten;
se Stelle ist der sog. *innere Muttermund, Orificium uteri*
ernum. Im Cervix hat die Höhle mehr die Gestalt eines
glich platten Kanals, *Canalis colli uteri,* ist weiter als
inneren Muttermunde, und mündet am unteren Ende
Cervix, mehr nach dessen hinterer Fläche hin, mit einer
erlaufenden Spalte aus; d. i. *der äufsere Muttermund,*
ficium uteri externum s. Os uteri, auch schlechthin der
ttermund genannt. Die dicken Ränder dieser Spalte
d die *Lefzen des Muttermundes, Labium anterius et poste-*
s orificii uteri, von welchen die vordere länger und etwas
ker ist, und 2‴ bis 3‴ tiefer vor dem Muttermunde
abragt.

Die Gebärmutter liegt mit dem Fundus im Beckenein-
ge, übrigens in der Beckenhöhle, zwischen der Hinter-
nd der Harnblase und der Vorderwand des Mastdarms:
Fundus und das Corpus ragen frei in die Höhle des
cus peritonaei hinein, erhalten von ihm einen Überzug,
l werden durch die Excavatio vesico-uterina und recto-
rina des Bauchfells und die, in diese Vertiefungen sich
nabdrängenden Windungen des Ileum, von der Blase und
m Mastdarm getrennt. Der Cervix liegt unterhalb des
cus peritonaei, ist mit dem oberen Ende der Scheide
nau verwachsen und wird von demselben dergestalt um-
st, dafs der untere Theil des Gebärmutterhalses frei in
r Höhle der Scheide liegt, und daher *der Scheidentheil,*
rtio vaginalis colli uteri genannt wird. Dieser Scheiden-
eil bildet einen schrägen Abschnitt, dessen Hinterseite
trächtlich länger ist; seine Vorderseite ist nämlich nur
‴ bis 3‴ lang und enthält die vordere Fläche des Labium
terius; seine 6‴ bis 8‴ lange Hinterseite enthält dagegen

die hintere Fläche des Labium anterius, das Orificium ute externum, das Labium posterius und noch eine kurze Strec der hinteren Fläche des Gebärmutterhalses.

In dieser Lage wird die Gebärmutter befestigt: durch die *Ligamenta uteri rotunda* s. *Crura uteri, die ru den Mutterbänder,* zwei aus den Muskelfasern der Gebä mutter gewebte, röthliche Stränge, die an ihrem Ursprun von der Vorderseite des Fundus uteri eine Dicke von 5 haben: sie laufen, allmählig dünner werdend und mel verdichteten Zellstoff in ihrem Gewebe enthaltend, dive girend nach vorn und etwas nach unten gegen die Inguina gegenden hin, unter und vor den Tubae Fallopianae, dur die Ligg. uteri lata und von der vorderen Platte derselb eingewickelt; treten sodann auf jeder Seite in den Annul inguinalis posterior, und aus dem Canalis inguinalis dur den Annulus inguinalis anterior hervor; wonach sie m zerstreuten Zellfaserbündeln in die Fascia superficialis d Inguinal- und Schamgegend übergehen. 2) Durch d Bauchfellüberzug und dessen Duplicaturen: nachdem nä lich das Peritonaeum den Fundus, die Vorder- und Hinte fläche der Gebärmutter bekleidet hat, geht es vorn, Boden der Excavatio vesico-uterina peritonaei, zur Hint wand der Blase, und bildet zugleich rechts und links ei niedrige Falte, *Plicae vesico-uterinae* s. Ligg. uteri an riora inferiora: — geht hinten als Boden der Excava recto-uterina zum Mastdarm, unter Bildung zweier me hervorragender, von vorn nach hinten gerichteter Falt *Plicae semilunares Douglasii* s. recto-uterinae (vgl. S. 52 und geht zu beiden Seiten der Gebärmutter in die brei Mutterbänder über. *Die breiten Mutterbände Ligamenta uteri lata,* sind zwei ansehnliche Dupli turen des Bauchfells, welche zwischen den Seitenränd des Uterus und dem seitlichen Umfange des Beckeneingan und den Seitenwänden der Beckenhöhle ausgespannt si oben 4″, unten 2″ breit, und in der Richtung der Beck axe 2″ hoch: sie hangen nach innen mit dem Peritone überzuge der vorderen und hinteren Fläche der Gebärm ter — unten mit den Plicae vesico-uterinae und Pli semilunares Douglasii — nach aufsen mit dem, in den guinalgegenden und an den inneren Seiten der Psoasmusk

gebreiteten Theile des Bauchfellsackes zusammen: ihr rer Rand ist frei, ihre Flächen nach vorn und hinten kehrt. Zwischen den Platten jedes breiten Mutterbandes gen, am oberen Rande und mehr nach hinten zu, der rstock und ein, von dem inneren Ende desselben zum ndus uteri sich erstreckender Streifen verdichteten Zellffs, *Ligamentum ovarii* genannt; mehr nach vorn und ten windet sich die Tuba Fallopiana, und wird der Theil breiten Mutterbandes zwischen dieser und dem Ovarium Fledermausflügel, *Ala vespertilionis*, genannt: unterhalb Tuba und mehr nach vorn läuft das Lig. uteri rotunm. Aufserdem verlaufen zwischen den Platten des breiMutterbandes die dem Eierstock, der Tuba und dem erus angehörenden Gefäfse, — nämlich im oberen Rande d im Fledermausflügel die Vasa spermatica interna, deren nen das ansehnliche Rankengeflecht, *Plexus pampiniformis*, den — im inneren Rande des breiten Mutterbandes aber stärkeren Vasa uterina. 3) Durch den oberen Theil r Scheide oder das Scheidengewölbe, welches das Collum eri unter genauer Verwachsung umfafst, und selbst durch Fascia pelvis und Mm. levatores ani unterstützt wird.

Die Gröfse des Uterus ist geringer bei völlig ausgechsenen Jungfrauen, ansehnlicher bei Weibern, die hrere Male geboren haben, und steht daher im umgehrten Verhältnifs zu der Gröfse der Ovarien. Bei erstea nähert sich die Gestalt des Uterus überhaupt mehr der es länglichen, an der Vorderfläche plattgedrückten Kels: die Länge von dem Fundus bis zur vorderen Lefze s Muttermundes beträgt $2\frac{3}{4}''$ bis $3''$; die Breite am Fuus $15'''$ bis $20'''$, die gröfste Dicke nahe unterhalb des ndus $8'''$ bis $12'''$: der Cervix ist $13'''$ bis $15'''$ lang, $'''$ breit und $7'''$ bis $9'''$ dick; an der Gränze zwischen orpus und Cervix, welches die schmalste und dünnste elle des Uterus ist, um $1'''$ weniger. Die vordere und intere Wand haben am Corpus und an der Mitte des ndus eine Dicke von $4'''$ bis $5'''$, am Cervix von $3'''$ bis $'''$; die Höhle ist am Fundus $10'''$, in der Mitte des orpus $3\frac{1}{2}'''$ breit und nur $1'''$ von vorn nach hinten tief; s Orificium uteri internum hat einen Dm. von $1'''$, der anal des Cervix ist in seiner Mitte $3'''$ breit und $2'''$ tief;

das Orificium uteri externum in queerer Richtung 4‴ lang und von vorn nach hinten 1‴ breit. Das Gewicht beträgt 9 bis 11 Drachmen, das Volumen $1\frac{3}{4}$ bis $2\frac{1}{2}$ Kubikzoll. Nach mehreren Schwangerschaften hat der Uterus eine mehr flaschenförmige oder birnförmige Gestalt, mifst in der Länge $3\frac{1}{4}$″ bis $3\frac{1}{2}$″, in der gröfsten Breite 2″ bis $2\frac{1}{4}$″, in der gröfsten Dicke 14‴ bis 16‴; dabei ist der Cervix kaum länger als bei Jungfrauen, jedoch 12‴ bis 14‴ breit und 9‴ bis 11‴ dick. Die Wände sind 6‴ bis 7‴, am Cervix $3\frac{1}{2}$‴ bis 4‴ dick, die Höhle im Fundus 12‴, im Corpus 5‴ breit und 1‴ bis 2‴ tief; der Kanal des Cervix 4‴ breit und $2\frac{1}{2}$‴ tief; das Orificium externum 7‴ bis 8‴ lang und 2‴ breit, zuweilen mehr von der Gestalt eines Ovals als einer Queerspalte, auch nicht selten mit unregelmäfsigen narbenähnlichen Einkerbungen versehen, die vordere Lefze häufig nicht merklich länger als die hintere. Das Gewicht beträgt $3\frac{1}{2}$ bis 4 Unzen, der räumliche Inhalt $4\frac{3}{4}$ bis $5\frac{1}{4}$ Kubikzoll.

Die Substanz der Gebärmutter ist von bräunlich rother Farbe, derber und härtlicher Consistenz, blutreich, und von 1,0552 spec. Gewicht: es ist an ihr die äufsere Bekleidung, das Gewebe der Wände des Uterus, und die Haut der Höhle zu unterscheiden. Der gröfsere Theil des Uterus wird von einer fest angewachsenen, serösen Haut, dem Bauchfell, bekleidet, nämlich der Fundus, die vordere Wand bis zum Anfang des Cervix, und die hintere Wand bis fast zur Mitte des Cervix herab: an den Seitenrändern bleibt ein schmaler Streifen zwischen den Platten der breiten Mutterbänder vom Bauchfell unbedeckt. Der mittlere Theil des Cervix wird von einer dicken, von ansehnlichen Venen durchzogenen Zellstoffschicht umgeben und durch diese mit der Harnblase und dem Mastdarm zusammengeheftet; der Umfang des unteren Theiles des Cervix ist dagegen gänzlich von dem oberen Ende der Scheide eingeschlossen, selbst fest mit dieser verwachsen, und die freie Oberfläche der Portio vaginalis mit den Muttermundslefzen von der Schleimhaut der Scheide bekleidet. — Die dicken Wände der Gebärmutter bestehen aus gröfstentheils platten, längeren und kürzeren *Muskelfasern*, welche an der äufseren und inneren Oberfläche der Wände mehr zusammengedrängt

d und vollständigere Lagen bilden, vorzüglich an der fseren Fläche, welche eine dickere Lage enthält: in der itte der Wände dagegen mehr Zwischenräume lassen. e ansehnlichsten Muskelbündel finden sich an der vorde- n und hinteren Wand und am Fundus, jene laufen in ngitudinaler, letztere in transversaler Richtung; kreis- rmige Fasern finden sich am Cervix und an den Einmün- ngsstellen der Tubae; aufserdem aber zahlreiche kleinere ndel von vielfach verschiedenen und sich kreuzenden chtungen; — in der Mitte der Dicke der Wände bilden e Fasern ein unregelmäfsiges Netzwerk, dessen Zwischen- ume von Zellstoff und vorzüglich von ansehnlichen, flechtartig verbundenen Venen ausgefüllt werden. Die ände dieser Venen sind nur aus einer sehr dünnen inne- n Gefäfshaut gebildet, stehen wegen der Derbheit und eifigkeit der Gebärmutterwände stets offen, werden aber rch Contraction der Muskelfasern verengert. — Die öhle des Uterus wird von einer weifslichen oder weifs- thlichen *Schleimhaut* bekleidet. Diese ist im Fundus und rpus sehr dünn und zart, sehr innig mit der innersten age der Muskelfasern verwachsen, enthält ziemlich viele, reinzelt und $\frac{1}{50}'''$ bis $\frac{1}{5}'''$ von einander entfernt stehende, eine Cryptae mucosae, deren Mündungen $\frac{1}{50}'''$ bis $\frac{1}{33}'''$ eit sind: sie ist glatt und nirgends gefaltet, aber mit hlreichen, platten, $\frac{1}{12}'''$ langen und $\frac{1}{50}'''$ bis $\frac{1}{30}'''$ breiten ocken, den Villi des Dünndarms nicht unähnlich, besetzt. n den Ostia uterina der Tubae geht sie in die Schleim- ut dieser Röhren über. Im Kanal des Mutterhalses ist e dicker und schlaffer, enthält gröfsere Schleimbälge, die weilen die Gestalt ausgedehnter rundlicher Säckchen aben (sog. Ovula Nabothi); sie bildet an der vorderen nd hinteren Wand des Kanals des Mutterhalses eine Lon- itudinalfalte, von welcher nach beiden Seiten viele klei- ere, queere und schräge Falten ausgehen; man nennt diese, ngefähr in der Gestalt eines Palmzweiges ausgebreiteten alten *Plicae palmatae* s. Palmae plicatae s. Arbor vitae uteri. m Muttermunde hängt die Schleimhaut des Kanals des ervix mit der Schleimhaut zusammen, welche die Ober- äche der Portio vaginalis und der Scheide überzieht.

Die ganze Höhle der Gebärmutter ist von einem zähen,

oft weifslich opaken Schleim ausgefüllt, während der Menstruation auch von transsudirtem Blute. Während der Schwangerschaft enthält sie das Ei und die Frucht, Foetus, und nimmt während des Wachsthums derselben allmählig sehr beträchtlich an Gröfse zu: so dafs sie am Ende der Schwangerschaft einen abgeplattet eiförmigen oder elliptoidischen Körper von ungefähr 12″ Höhe, 8″ Breite und 5″ Dicke darstellt, welcher nebst seinem Inhalte einen Raum von 250 bis 260 Kubikzollen einnimmt; wovon auf die Gebärmutter selbst, deren Wände am Fundus und Corpus bis auf 1″ verdickt sind, ungefähr 50 Kubikzoll bei einem absoluten Gewichte von mehr als 2 Pfund fallen. (Genauere Beschreibung der übrigen Veränderungen der Beschaffenheit der Gebärmutter in der Schwangerschaft s. im II. Bande.)

Mutterscheide.

Die Mutterscheide, *Vagina*, die Scheide, der Muttergang, ist eine gekrümmte, von vorn nach hinten abgeplattete häutige Röhre, welche den Muttermund mit dem Schamgliede in Verbindung setzt. Sie fängt am Beckenausgange, zwischen den kleinen Schamlefzen, mit einer rundlichen Öffnung an, *dem Scheideneingange*, *Ostium s. Orificium s. Introitus vaginae;* und steigt von hier an, nach der Axe des Beckens gebogen, bis zur Mitte der Beckenhöhle hinauf. Ihr oberes weiteres Ende, *der Scheidengrund oder Scheidengewölbe*, *Fundus vaginae*, umgibt den Cervix uteri, ist mit dessen Umfange durch kurzen straffen Zellstoff sehr innig verwachsen, und enthält in seinem inneren Raume die Portio vaginalis cervicis uteri mit dem äufseren Muttermunde. Die vordere Wand der Scheide ist kürzer, endigt unmittelbar über der vorderen Muttermundlefze, ist an ihrer vorderen Fläche der Länge nach concav und gränzt an den Harnblasengrund und die Harnröhre; die hintere, um $\frac{1}{2}$″ bis $\frac{3}{4}$″ längere Wand steigt noch über die hintere Muttermundlefze empor; ihre hintere Fläche ist der Länge nach convex und gränzt an den Mastdarm; seitwärts wird die Scheide von einer gefäfsreichen Zellstoffschicht, von der Fascia pelvis und von den Enden der Mm. levatores ani umgeben, welche sämmtlich auch die Verbindung der Scheide mit der Blase und dem Mastdarm ver-

tteln. Der Scheideneingang und ein kurzes Stück der heide oberhalb desselben wird vom M. constrictor cunni ıfafst.

Die Länge der gerade gestreckten Mutterscheide beigt $3\frac{1}{2}''$ bis $4''$, die Weite im Mittel $1''$; der Queerdurchesser meistens $\frac{5}{4}''$, der Dm. von vorn nach hinten um so eniger, je mehr die Blase und der Mastdarm ausgedehnt ıd. Der Scheidengrund ist etwas weiter, der Eingang er enger, als der mittlere Theil des Kanals; die Scheide erhaupt, und besonders ihr Eingang, ist enger bei Jungıuen, beträchtlich weiter nach öfterem Beischlafe und eburten. Die Wände der Scheide sind $1'''$ dick, sehr sdehnbar und elastisch, und bestehen aus einer äufseren, ir dichten und starken Zellhaut, unter welcher eine atte Schicht sehr zahlreicher, vielfach gewundener und astomosirender Venen (denen der Clitoris nicht unähnh) sich findet: und aus einer inneren röthlichen Schleimut. Letztere bildet bei Jungfrauen am Scheideneingange ne halbmondförmige queerlaufende Falte, die *Scheideklappe* er das *Jungfernhäutchen*, *Valvula vaginae* s. *Hymen*; elche hinten und zu beiden Seiten mit der Schleimhaut rschmolzen und befestigt ist, nach vorn aber mit einem eien concaven Rande endigt: so dafs sie den Scheideneinng von hinten und unten her bis auf einen Dm. von $6'''$ rengert. Nach Zerreifsung des Hymen (meistens durch ischlaf, selten erst durch eine Geburt oder auch durch dere Ursachen), erscheinen an der Stelle desselben drei s vier oder mehrere, plattrundliche, eingekerbte, weniger rvorragende Duplicaturen der Schleimhaut, *Carunculae yrtiformes*, die zum Theil Rudimente des Hymen, zum heil ursprünglich vorhanden sind. Im Inneren der Scheide lbst bildet die Schleimhaut an der vorderen und hinteren Vand eine Reihe zahlreicher eingekerbter Queerfalten, *olumnae rugarum, anterior et posterior*, welche ihr eine auhe derbe Beschaffenheit verleihen: nach öfteren Ausdehungen der Scheide verschwinden diese Falten und das nere des Kanals wird glatter und weicher. Am Scheiengewölbe geht die Schleimhaut an die Oberfläche der ortio vaginalis des Gebärmutterhalses und in den Mutterund über. Sie ist mit zahlreichen und ansehnlichen

Cryptae mucosae versehen und stets im Inneren von einer Lage zähen Schleims überzogen, welcher um die Zeit der Menstruation, während des Beischlafs, der Schwangerschaft und der Geburt in vermehrter Menge abgesondert wird.

Schamglied.

Das weibliche Schamglied, die weibliche Scham, *Pudendum muliebre* s. *Vulva* s. Cunnus, liegt am Beckenausgange zwischen den inneren Flächen der Oberschenkel und besteht aus den grofsen und kleinen Schamlefzen mit der Schamspalte, aus der Clitoris, dem Vorhofe und den Mündungen der Harnröhre und der Mutterscheide.

Die grofsen oder äufseren Schamlefzen, Labia pudendi majora s. externa, sind zwei ansehnliche Falten der äufseren Haut, welche vor dem unteren Theile der Symphysis pubis, unter dem Mons pubis, anfangen und neben einander, in der Richtung von vorn und oben nach hinten und unten, bis zum vorderen Ende des Perinaeum sich erstrecken. Vorn fliefsen sie durch die *Commissura labiorum anterior*, hinten durch die *Commissura labiorum posterior* in einander über, sind übrigens aber durch die *Schamspalte, Rima pudendi s. vulvae*, getrennt. Nach aufsen werden sie durch eine Furche der Cutis von der Inguinalgegend und den Oberschenkeln abgegränzt; ihre vordere und äufsere Fläche ist gewölbt und mit Schamhaaren, Pubes, jedoch in geringerer Menge als der Schamhügel, besetzt. Die inneren weniger gewölbten Flächen der grofsen Schamlefzen liegen dicht neben einander und verdecken die übrigen in der Schamspalte liegenden Theile; jedoch nach öfteren Ausdehnungen, vorzüglich durch Geburten, klaffen sie mehr oder weniger auseinander und die Schamspalte erscheint breiter. An der Commissura posterior sind die inneren Flächen beider grofsen Schamlefzen durch eine queerlaufende niedrige Falte, *Frenulum labiorum* vereinigt: eine vor und oberhalb dieser Falte nach hinten gegen den Damm und Mastdarm hin, sich einsenkende Vertiefung ist die sog. *Fossa navicularis vulvae*, welche bei sehr ausgedehntem und erschlafftem Zustande der Schamspalte nicht wahrzunehmen ist. — Die Cutis der grofsen Schamlefzen ist fein, weich, dunkler gefärbt, und enthä

ſser den Haarbälgen viele Cryptae sebaceae; an der inne-
n Fläche der Lefzen ist sie um so weicher und feuchter,
ehr schleimhautähnlich, je genauer die Lefzen an einander
gen: und geht in die Schleimhaut über, welche die klei-
n Schamlefzen bildet und überhaupt die Tiefe der Scham-
alte überzieht. Unter der Cutis, im inneren Gewebe der
ofsen Schamlefzen, finden sich ziemlich starke platte
ellstoffstreifen, die mit der Fascia superficialis der be-
chbarten Gegenden zusammenhangen; und ansehnliche,
sehr lockeres Zellgewebe eingesenkte Fettklumpen.

Die kleinen oder inneren Schamlefzen, Labia udendi minora s. interna s. Nymphae, sind zwei kürzere,
hmale und niedrige Schleimhautfalten, welche in der
iefe der Schamspalte, an der inneren Fläche der Labia
ajora, 3‴ bis 6‴ hoch hervorragen. Mit ihren vorderen
nden reichen sie nicht bis zur Commissura labiorum an-
rior, sondern nur bis zur Glans clitoridis, bilden das
enulum derselben und fliefsen als Vorhaut der Clitoris
sammen: von hier an gehen sie, zu beiden Seiten des
estibulum, bis zum seitlichen Umfange des Scheideneins
nges herab, woselbst sie in den inneren Flächen der gro-
en Lefzen sich allmählig verlieren. Ihr freier Rand,
eistens auch ihre Flächen, sind eingekerbt und runzlich,
wischen ihren Hautplatten liegt ein schlaffer, fettloser,
hr gefäfsreicher Zellstoff.

Die Clitoris oder *der Kitzler* ist ein cylindrischer,
em Penis ähnlicher, aber nur 1″ langer und 3‴ dicker
örper, im vorderen Theile des Schamgliedes. Er beginnt
it zwei Schenkeln, *Crura clitoridis,* von den Rami adscen-
entes ossium ischii: diese vereinigen sich unter dem Lig.
rcuatum inferius der Symphysis pubis, — indem ihr Zwi-
chenraum von dem vorderen Blatt des Lig. pubovesicale
nedium und von der Harnröhre ausgefüllt wird — zum
Corpus clitoridis; welches in abwärts geneigter Richtung,
nter der Haut, die den Boden der Schamspalte nahe un-
erhalb der Commissura anterior überzieht, seine Lage hat
nd von Zellstoff und Fett umgeben wird. Das vordere
nde der Clitoris, *die Eichel, Glans clitoridis,* ragt als ein
undlicher undurchbohrter Vorsprung von 2‴ bis 3‴ Dm.
n dem oberen Theile der Schamspalte frei hervor, wird

oberwärts und an den Seiten von einer halbringförmigen Hautfalte, der Vorhaut des Kitzlers, *Praeputium clitoridis*, umgeben, welche die Vereinigungsstelle der beiden Labia minora ist: aufserdem geht von jeder kleinen Schamlefze ein Fältchen, das doppelt vorhandene *Frenulum clitoridis*, an die untere Fläche der Glans über. Der Bau der Clitoris kommt mit dem des oberen Theiles des Penis überein; sie besteht aus zwei, durch ein Septum getrennten *Corpora cavernosa clitoridis*, deren hintere Enden die Crura sind: diese Zellkörper werden von einer dünnen Tunica albuginea umgeben und enthalten im Inneren Trabeculae, Venae cavernosae und Arteriae profundae (auch Arteriae helicinae?): sie werden auswendig von einer Fascia clitoridis umhüllt und durch ein Ligamentum suspensorium befestigt; die Eichel aber nur von Schleimhaut bekleidet. (Vergl. S. 548 ff.)

Der Vorhof, Vestibulum (vaginae) s. Pronaus, ist der Theil des Bodens der Schamspalte hinter der Clitoris, zwischen den Labia minora, vor dem Scheideneingange: 3‴ bis 4‴ hinter der Glans clitoridis enthält er die von einem wulstigen Rande umgebene Mündung der Harnröhre (S. 531) und geht allmählig, ohne bestimmte Gränze, in den vorderen Umfang des Orificium vaginae über.

Der Scheideneingang (S. 566) nimmt die hintere gröfsere Hälfte der Schamspalte ein, ist vorn vom Vestibulum, seitwärts von den Enden der kleinen Schamlefzen und von den grofsen Schamlippen umgeben, und gränzt hinten an die Fossa navicularis, welche bei engem Scheideneingange und unverletztem Hymen tiefer erscheint, bei starker Erweiterung des Orificium vaginae aber den hinteren Umfang dieser Öffnung bildet, so dafs alsdann der Scheideneingang unmittelbar an die Commissura posterior gränzt.

Die in der Tiefe der Schamspalte liegenden Theile sind von der Membrana mucosa genito-urinaria bekleidet, welche an den inneren Flächen der grofsen Schamlefzen beginnt. Sie besitzt sehr zahlreiche und ansehnliche Schleimdrüsen, vorzüglich im Vorhofe und in der Fossa navicularis, und wird von einer dünnen Schicht eines, öfters eigenthümlich riechenden Schleimes überzogen.

Functionen der weiblichen Geschlechtstheile.

ei dem fruchtbaren Coitus nimmt die Schamspalte und
e Scheide den eindringenden Penis auf, unter lebhafter
ervenaufregung, welche vorzüglich in der, durch ver-
ehrte Blutanhäufung erigirten Clitoris und in den an-
hwellenden kleinen Schamlefzen ihren Sitz hat. Der
amen, oder wenigstens sein flüchtiger Bestandtheil, die
ura seminalis, dringt durch das Orificium uteri in die
ebärmutter, die Aura seminalis vielleicht auch in die
ubae. Während das Ostium abdominale einer der Tubae
urch Ausbreitung der Fimbriae sich öffnet und letztere
ı die Oberfläche des Eierstocks sich anlegen, platzt ein
olliculus Graafianus und läfst das Ovulum austreten (s.
. 559). Dieses wird von der Tuba aufgenommen, verweilt
ı derselben eine kurze Zeit, und wird sodann durch eine
rt von peristaltischer Bewegung der Muttertrompete in
ie Gebärmutter geleitet. Hier und zum Theil schon in
er Tuba, bildet sich das, aus Häuten, Flüssigkeiten und
efäfsen bestehende *Ei, Ovum humanum*, und innerhalb des-
lben die zuerst an der Dotterkugel des Ovulum sich ent-
ickelnde *Frucht, Embryo,* späterhin *Foetus* genannt, wäh-
nd der 280 Tage dauernden *Schwangerschaft, Graviditas*
Gestatio, weiter aus. (s. Bd. II.) Dabei nimmt die Ge-
ärmutter an Masse und Umfang beträchtlich zu; zieht
ch aber zur Zeit der *Geburt, Partus,* kräftig zusammen,
nd treibt die Frucht und das geplatzte Ei durch die
cheide und Schamspalte hervor; woran die Scheide, durch
ıre Contractilität und durch reichliche Schleimabsonde-
ung, einigen befördernden Antheil nimmt. Schon in den
rsten Wochen nach der Geburt nehmen die Genitalien fast
ganzlich ihre frühere Beschaffenheit wieder an.

Allgemeine Betrachtung der Bauch- und Beckenhöhle, des Dammes und des Bauchfells.

Die Bauchhöhle, Cavum abdominis, nimmt den mittleren und unteren Theil des Stammes ein und ist an sich die gröfste Höhle des Körpers, aufserdem aber, wegen des gröfstentheils muskulösen Baues ihrer Wände, beträchtlicher Erweiterung und Verengerung fähig. Sie hat im Allgemeinen eine eiförmige Gestalt, ist oben breiter als unten und ihre vordere Hälfte geräumiger als die hintere. Die weibliche Bauchhöhle ist, sowohl im Verhältnifs zur Brusthöhle als zur Gröfse des Körpers überhaupt, länger und weiter, und dabei in ihrem oberen Theile schmaler, im unteren breiter, als die männliche.

Die vordere, längste und stark nach vorn gewölbte Wand der Bauchhöhle wird, aufser von den allgemeinen Bedeckungen und der Fascia superficialis, von der Linea alba, den Fasciae rectae abdominis und Mm. pyramidales, von den Mm. recti abdominis und den Aponeurosen der Mm. obliqui externi, obliqui interni und transversi abdominis, und von den vorderen Enden der Fasciae transversales gebildet. Die Seitenwände laufen von den unteren Rippen bis zu den Hüften etwas nach innen gebogen herab und bestehen aus den fleischigen Theilen der Mm. obliqui externi, obliqui interni und transversi abdominis und der Fasciae transversales: unterhalb der Hüftbeinkämme convergiren sie stärker und werden von den Darmbeinen, den Mm. iliaci interni, psoae majores, und den Fasciae iliacae gebildet. Die hintere Bauchwand enthält in der Mitte die Wirbelsäule, die Schenkel des Zwerchfells und die Ursprünge der Psoasmuskeln, und springt stark nach vorn hervor: nach beiden Seiten hin tritt sie etwas zurück, und besteht hier aus den hinteren Enden der Fasciae transversales, den Mm. quadrati lumborum und den Fasciae lumbodorsales, mit den in den letzteren eingeschlossenen gemeinschaftlichen Bäuchen der Mm. sacrolumbales und longissimi dorsi. Die obere Bauchwand wird nur von dem Centrum tendineum und der Pars sterno-costalis des Zwerchfells ge

ldet und ist stark nach oben gewölbt. Alle diese Wände hen allmählig, ohne scharf bezeichnete Gränze, in einder über: nach unten geht die Bauchhöhle durch den eckeneingang in die Höhle des kleinen Beckens über.

Die Dimensionen der Bauchhöhle sind individuell verhieden und überhaupt veränderlich, ergeben sich indessen is den äufseren Dimensionen des Bauchs, wenn man auf e Dicke der vorderen und seitlichen Wände ungefähr ′ bis 1″, auf die Dicke der hinteren Wand in der Mitllinie $3\frac{1}{2}$″ bis 4″, zu beiden Seiten der Wirbelsäule aber, den Regiones lumbares, $2\frac{1}{3}$″ bis $2\frac{2}{3}$″ rechnet.

Die Bauchhöhle enthält den Magen, den gröfsten Theil es Dünndarms, das Coecum und Colon, die Leber, das ancreas und die Milz, die Gekröse und Netze; die Nebenieren, die Nieren und die oberen Hälften der Harnleiter, en Urachus und die Ligg. vesicalia lateralia, die Arteria orta abdominalis und Vena cava inferior nebst den Ästen ieser Gefäfse, ansehnliche Geflechte von Lymphgefäfsen nd Lymphdrüsen, Nervenplexus und Nervenstämme: die ervenstämme und ein Theil der Gefäfse gehören nicht en Baucheingeweiden selbst an, sondern gehen nur zu den auchwänden und durch die Bauchhöhle zu den unteren xtremitäten.

Die Beckenhöhle, Cavum pelvis, enthält, aufser efäfs- und Nervenstämmen und Geflechten, einen Theil es Intestinum ileum, den Mastdarm, die unteren Hälften er Harnleiter, die Harnblase; im männlichen Geschlecht uch lange Strecken der Samenleiter, die Samenbläschen nd die Prostata; im weiblichen Geschlecht die Eierstöcke, ie Tubae Fallopianae, die Gebärmutter mit den runden nd breiten Mutterbändern und den gröfseren Theil der cheide. Nach oben ist sie offen und hängt durch den eckeneingang mit der Bauchhöhle ununterbrochen zusamnen: ihre vordere, hintere und seitlichen Wände werden on Knochen und Bändern gebildet, deren Gröfsenverhältisse und Richtung die in beiden Geschlechtern verschiedene Gestalt des Beckens bestimmen (S. 186 ff.). In der Mitte der vorderen und hinteren Wand liegen die Symphysis pubis und die Mitte des Os sacrum und Os coccygis frei; der übrige Theil der vorderen und hinteren Wand,

so wie die Seitenwände, werden von den Mm. obturatores interni und den Ursprüngen der Mm. pyriformes bedeckt. Diese Muskeln verengern daher die Beckenhöhle von den Seiten her um ungefähr 1″ des Queerdurchmessers, und werden von der dünnen Fascia pelvis überzogen.

Die *Fascia pelvis* hängt an beiden Seiten des Beckeneinganges mit dem Ligamentum cristae pubis, der Fascia transversalis und Fascia iliaca zusammen; heftet sich vorn zu beiden Seiten der Symphysis pubis an, hinten aber an die Vorderflächen des Steifsbeins und der beiden untersten Wirbel des Kreuzbeins. Von der vorderen Beckenwand nahe neben der Symphysis pubis herabsteigend, bildet sie die *Ligg. puboprostatica* oder *Ligg. pubovesicalia lateralia* von welchen die ersteren bei Männern an die Prostata, die letzteren bei Weibern an den Blasenhals gehen: beide aber mit dem Lig. puboprostaticum oder pubovesicale medium dessen hinteres Blatt gleichfalls der Fascia pelvis angehört zusammenhangen (S. 546. 545. 531). Der an jeder Seite vom Ligamentum cristae pubis herabsteigende Theil der Fascia pelvis, welcher die obere Hälfte des M. obturator internus überzieht, bildet über dem oberen Rande dieses Muskels den trichterförmigen *Canalis obturatorius*, welcher durch den oberen äufseren Winkel des Foramen obturatum aus dem Becken zum Oberschenkel führt und den Vas obturatoria und Nervus obturatorius zum Durchgange dient. Der hintere dünnere Theil der Fascia pelvis, welcher die vordere Fläche des M. pyriformis bekleidet, steigt von der Fascia iliaca herab, und endigt vor den drei ersten Foramina sacralia anteriora mit einem bogenförmigen, nach innen concaven Rande, hinter welchem die Vasa glutea und ischiadica und die Nerven des Plexus ischiadicus in die Incisura ischiadica superior treten. Diese seitlichen und hinteren Theile der Fascia pelvis steigen nicht völlig bis zum Beckenausgange herab, sondern endigen an der Seitenwand der Beckenhöhle mit einem stärkeren sehnigen Streifen, *Arcus tendineus fasciae pelvis*, der vom Lig. puboprostaticum laterale bis zur Spina ischii, in der Richtung von vorn nach hinten läuft. Von diesem Streifen an wendet sich die Fascia pelvis, in queerer und schräg nach unten herabsteigender Richtung, gegen die Mitte des Beckenaus-

nges hin, heftet sich an die vordere Fläche des Steifsbeins, die Seitenwände des Mastdarms, an den Fundus vesicae d die Prostata, in weiblichen Körpern an die Scheide d den Blasenhals; und fliefst zwischen diesen Theilen t der Fascia pelvis der anderen Seite zusammen. Auf ese Weise bilden die rechte und linke Fascia pelvis eine nne, von dem Mastdarm, der Scheide und dem Blasen- lse durchbohrte Scheidewand, welche die genannten Theile it einander verbindet, sie in ihrer Lage befestigt und mit nen zusammen den Beckenausgang vollständig schliefst. nterhalb dieser Scheidewand liegen der After, die äufse- n Geschlechtstheile, und zwischen beiden der *Damm* oder s *Mittelfleisch*, *Perinaeum* s. Interfemineum, wel- es bei Männern vom After bis zum Hodensack, bei Wei- rn vom After bis zur Commissura labiorum posterior icht, und bei letzteren selten mehr als 1″ von vorn nach nten mifst; dagegen seine gröfsere Breite durch den wei- ren Abstand der Tubera ischii von einander bestimmt wird. e Mittellinie des Damms wird durch einen hervorragen- n narbenähnlichen Streifen der Cutis, die *Mittelfleisch- th*, *Raphe perinaei*, bezeichnet.

Im Perinaeum selbst und überhaupt in dem Raume rischen den Ossa ischii und pubis, dem After und den fseren Geschlechtstheilen, finden sich die, den genannten ganen eigenthümlich angehörenden Muskeln. Von unten trachtet liegt am meisten nach hinten und sehr oberfläch- h der M. sphincter ani externus; zwischen diesem und n Tubera und Rami adscendentes ossium ischii zeigt sich f jeder Seite die tiefe dreieckige *Mittelfleischgrube*, *Fossa rinaei*, welche hinten von dem Lig. sacrotuberosum be- änzt wird, vorn bis zu den äufseren Geschlechtstheilen icht, unterwärts von der Haut und Fascia superficialis berzogen und von einem ansehnlichen Fettpolster ausge- illt ist: in der Tiefe dieser Gruben, dieselben nach oben egränzend, zeigen sich die Mm. levatores ani. Durch den orderen Theil der Mittelfleischgruben verlaufen oberfläch- ch, in schräger Richtung nach vorn, die Mm. transversi erinaei: vor denselben liegen zu beiden Seiten, nahe an en Rami adscendentes ossium ischii, die Mm. ischiocaver- osi; dagegen unmittelbar neben der Mittellinie die nur

beim männlichen Geschlechte vorhandenen, an einande gränzenden Mm. bulbocavernosi; an deren Stelle in weib lichen Körpern der M. constrictor cunni vorhanden ist.

Die Fascia superficialis tritt von den unteren Ränder der Mm. glutei maximi und den inneren Flächen der Ober schenkel aus an das Perinaeum, ist über die Mittelfleisch grube hingespannt, heftet sich an den M. sphincter ani ex ternus, überzieht die Mm. transversi perinaei, und vereinig sich an diesen Stellen mit der eigentlichen Fascia perinae geht endlich nach vorn in die Tunica dartos des hintere Theiles des Hodensackes, oder in den Zellstoff der Lab majora pudendi über. Die dünne, aber ziemlich starl *Fascia perinaei* entspringt auf jeder Seite am untere Rande der Ligg. sacrotuberosa, an den Tubera und Ra adscendentes ossium ischii und an den Rami descendent ossium pubis; steigt aufwärts, indem sie die untere Hälf der Mm. obturatores interni überzieht, bis zu den Arc tendinei der Fasciae pelvis, welche sie, mit den Fasci pelvis hieselbst verwachsend, bilden hilft: von hier wendet sie sich unter einem spitzigen Winkel wiederu abwärts, indem sie die unteren Flächen der Mm. levato ani, bis zum M. sphincter ani externus herab, bekleide weiter nach vorn wickelt sie, in Gemeinschaft mit d Fascia superficialis, die Mm. transversi perinaei, ihre Spar muskeln, vollständig ein, und spaltet sich sodann in e oberflächliches oder unteres, und ein tieferes oder obe Blatt. Das oberflächliche Blatt bedeckt die Mm. ischi cavernosi und die Mm. bulbocavernosi oder den M. co strictor cunni, und verliert sich in der Fascia des Pe oder der Clitoris. Das tiefe Blatt dringt zwischen d Schenkeln des Penis oder der Clitoris, über dem Bull urethrae bei Männern oder dem Vestibulum bei Weibe bis zum vorderen Ende der Prostata und zum unte Rande der Symphysis pubis; umfafst die Harnröhre, u geht in das *Ligamentum puboprostaticum medium* bei M nern, oder *Lig. pubovesicale medium* bei Weibern, — au Lig. triangulare vesicae s. urethrae genannt — über: d ses ist das ungefähr dreieckige oder halbmondförmige Ba welches von mehreren, der Fascia pelvis und Fascia pe naei angehörenden Blättern gebildet wird, auch elastis

sern zu enthalten scheint; zwischen dem Lig. arcuatum erius, der Vereinigungsstelle der Crura des Penis oder Clitoris, der oberen Wand der Harnröhre und dem rderen Ende der Prostata oder des Blasenhalses ausgemmt ist (S. 527. 531. 545. 552. 569), und von der Vena rsalis des Penis oder der Clitoris durchbohrt wird.

M. levator ani s. intestini recti, Afterheber, ist dünn d platt, liegt unmittelbar unter der Fascia pelvis, zwinen dieser und der Fascia perinaei; entspringt auf jeder ite von der unteren Fläche der Fascia pelvis und vorglich längs des Arcus tendineus fasciae pelvis, vom Ras descendens ossis pubis an bis zur Spina ischii. Die rch schmale Spalten hin und wieder getrennten Muskelndel laufen convergirend nach innen und unten, gegen Mitte des Beckenausganges hin, fliefsen mit der Musihaut des Mastdarms nahe über dem After zusammen; ften sich auch, theils unmittelbar, theils vermittelst der scia pelvis, an die Prostata, den Blasengrund und die ände der Scheide; und fliefsen zwischen den genannten neilen mit den Fasern des Afterhebers der anderen Seite sammen. Er zieht den unteren Theil des Mastdarms bei r Ausleerung des Darmkoths in die Höhe; hebt und mprimirt den Blasengrund, die Samenbläschen und die heide, welche er auch erweitern kann, bei der Ausleerung s Harns und bei der Begattung.

Der hintere Rand des M. levator ani vereinigt sich it dem M. coccygeus (S. 280). Der vordere Rand läuft Lig. puboprostaticum (oder pubovesicale) laterale herab, s zur Seitenwand des Anfanges der Harnröhre bei Weirn, der Pars membranacea urethrae bei Männern: fliefst nterwärts neben den Seitenwänden der Harnröhre mit em (unpaaren) M. urethralis transversus (S. 530) zusamen, und verbindet sich mit diesem und mit der Stelle des efen Blattes der Fascia perinaei, welche unter der Harnhre sich erstreckt. Dieses, öfters von dem übrigen Theil es Afterhebers etwas abgesonderte, schmale platte Muskelündel ist der sog. *M. pubo-urethralis* oder Wilson's Harnhrenmuskel: er spannt die genannte Fascia an und hebt e aufwärts, comprimirt dadurch die Harnröhre von unten

und von den Seiten, während der M. urethralis transversu sie von oben zusammendrückt.

M. sphincter ani externus, äufserer Afterschliefser, ei unpaarer Muskel, hat die Gestalt eines platten ovalen Rin ges, welcher hinten durch einen dünnen sehnigen Streife an die Spitze des Os coccygis geheftet ist: von diese Streifen aus laufen die beiden Seitenhälften des Ringes, a den Seiten des Afters nach vorn, vereinigen sich vor dem selben in eine stumpfe Spitze (bei Weibern durchkreuze sie öfters einander): hangen an ihren oberen Rändern g nau mit dem M. sphincter ani internus (S. 504), an ihre äufseren Fläche mit der Fascia perinaei, an ihrem untere Rande nur mit der, den After umgebenden, Cutis zusamme Der Muskel hält, in Gemeinschaft mit dem M. sphinct ani internus, schon in seinem ruhigen Zustande den Aft geschlossen, durch stärkere Contraction verschliefst er il so genau, dafs die Haut des Afters stark sich runzelt.

M. transversus perinaei, queerer Dammmuskel. E kleiner, plattlänglicher oder dreieckiger Muskel, der v der inneren Fläche des Tuber und des Ramus adscende oss. ischii entspringt, schräg nach innen und vorn läu von der Fascia superficialis und Fascia perinaei eingewick wird — und in der Mitte des Dammes mit dem der ander Seite, mit der vorderen Spitze des M. sphincter ani exte nus und mit dem hinteren Ende des M. bulbocavernos oder des M. constrictor cunni bei Weibern, zusammenflie Häufig besteht er aus einem hinteren und vorderen Bünc (M. transversus perinaei posterior s. superficialis und an rior s. profundus). Spannt das oberflächliche und tiefe Blatt der Fascia perinaei in der Mitte des Dammes an, fördert dadurch die Wirkung der Mm. bulbocavernos urethralis transversus und constrictor cunni.

M. ischiocavernosus s. erector s. sustentator penis, Sitzbe zellkörpermuskel oder Aufrichter der Ruthe, ist längl platt, entspringt sehnig von der inneren Fläche des Tul und Ramus adscendens oss. ischii, bekleidet mit sein dünnen fleischigen Bauche die untere Fläche des Crus pen biegt sich sodann um die äufsere Fläche desselben ge den Rücken der Wurzel des Penis herauf — und inser sich, mit einer in zwei Blätter von ungleicher Länge

eilten Aponeurose, theils in die Tunica albuginea des rus penis, theils in den Theil der Fascia penis neben und ihe vor dem Lig. suspensorium penis; woselbst der rechte id linke M. ischiocavernosus einander begegnen und sich ereinigen. Der M. ischiocavernosus in weiblichen Körern, oder M. erector clitoridis, ist beträchtlich kleiner nd geht an die Clitoris, verhält sich übrigens ganz wie i männlichen Körpern. — Die beiden Mm. ischiocavernosi ewirken überhaupt einen Druck auf den hinteren Theil es Penis oder der Clitoris, theils durch Anspannung der unica albuginea, vorzüglich aber, indem sie die Crura enis rückwärts ziehen und verkürzen, sie von unten her egen die Rami descendentes ossium pubis andrücken; und urch transversale Anspannung der Fascia penis, die Vena orsalis der Ruthe oder Clitoris nahe vor ihrem Durchange durch das Lig. puboprostaticum medium comprimien. Auf diese Weise hemmen sie den Rückflufs des Bluts urch die Hauptvenenstämme des Penis oder der Clitoris, ringen eine Blutanhäufung in den Venae cavernosae und adurch Erection des Penis oder der Clitoris zu Stande.

Nur als seltene Varietät bei Männern findet sich (nach . Müller) ein M. pubocavernosus s. levator penis, Aufheber er Ruthe: ein kleines länglich rundliches Muskelbündel, elches von der vorderen Fläche der Symphysis pubis entpringend, nach vorn zum Rücken des Penis läuft und in ie Tunica albuginea sich inserirt.

M. bulbocavernosus s. accelerator urinae s. ejaculator eminis, Harn- und Samenschneller, ist nur beim männlihen Geschlecht vorhanden; von platter, länglich viereckier Gestalt, hinten breiter, und vorn in eine Spitze auslaufend. Entspringt von dem oberflächlichen Blatt der Fascia perinaei, von welcher er bekleidet wird, und nimmt in seinem hinteren Ende Fasern von den vorderen Enden ler Mm. sphincter ani externus und transversi perinaei auf. Beide Mm. bulbocavernosi vereinigen sich mit ihren innen Rändern vermittelst einer Naht, bekleiden in schräg nach vorn aufsteigender Richtung die untere Fläche und die Seiten des Bulbus urethrae und des Anfangs der Pars cavern. der Harnröhre, und heften sich mit ihren äufseren Rändern und auswärts gerichteten vorderen Spitzen an die

Tunica albuginea der Corpora cavernosa penis. Comprimiren den Bulbus und den hinteren Theil der Pars cavernosa urethrae, wirken wahrscheinlich bei der Erection mit, und schnellen die letzten Tropfen des Harns oder den Samen aus der Harnröhre.

M. constrictor cunni, Schamschnürer, ein unpaarer, ovaler, ringförmiger Muskel, der nur im weiblichen Geschlecht vorhanden ist und den Eingang der Scheide umgibt. Er nimmt an seinem hinteren Ende Fasern von den Mm. sphincter ani externus und transversi perinaei auf, läuft an beiden Seiten unmittelbar oberhalb der Labia pudendi minora, hängt nach oben mit den Mm. levatores ani zusammen, und endigt vorn mit zwei dünnen Muskelbündeln an den unteren Flächen der Crura clitoridis, hinter und unter den Insertionen der Mm. ischiocavernosi. Verengert den Eingang der Scheide.

Bauchfell.

Das Bauchfell, *Peritonaeum*, ist die gröfste seröse Haut im Körper, und bildet zunächst einen grofsen äufseren Sack, der fast überall genau an die inneren Flächen der Bauchwände geheftet ist: *Saccus peritonaei* s. *Peritonaeum abdominale*. An mehreren Stellen ist dieser Sack nach innen eingestülpt und gibt durch diese Taschen oder Einsenkungen, unter Bildung von platten Duplicaturen oder Ligg. serosa, den Viscera chylopoëtica und einem Theile der Harn- und inneren Geschlechtsorgane ihre, mehr oder weniger vollständige, äufsere seröse Bekleidung, d. i. das *Peritonaeum viscerale* s. *intestinale*.

Der äufsere Sack ist vollständig geschlossen (mit Ausnahme der Ostia abdominalia tubarum Fallopii im weiblichen Geschlecht), und enthält in seiner Höhle den Magen und Darmkanal, die Leber, Milz und Vorderfläche des Pancreas, die Ovarien, Tubae Fallopianae, den Fundus und das Corpus der Gebärmutter: indessen liegen die hintere Wand der Pars descendens und transversa inferior duodeni und des Pancreas, des Coecum, des Colon adscendens und des oberen Theiles des Colon descendens, so wie die hintere Wand und das ganze untere Ende des Mastdarms, frei und aufserhalb der Höhle des Bauchfells. Der äufsere Sack

fester und stärker, vorzüglich in den Regiones lumbares d hypogastrica, aber meistens nur locker an die Bauchinde geheftet, und bildet bei seiner grofsen Ausdehnbarit leicht abnorme sackförmige Verlängerungen: der innere ngestülpte Theil des Bauchfells ist dagegen dünner und ingt mit der Oberfläche der Eingeweide inniger zusammen.

Die vordere und seitlichen Wände des Saccus peritonaei lgen dem Laufe der Fascia recta abdominis und Fascia ansversalis, mit welchen sie durch schlaffes, öfters fettiches Zellgewebe sich verbinden: seine obere Wand ist rch kurzen Zellstoff fest an die untere Fläche des Zwerchlls geheftet. Von der Mittellinie der vorderen und obeı Wand, — oberhalb des Nabels, durch die Regio epistrica bis zur Mitte des Zwerchfells, — geht das Ligaentum suspensorium hepatis (S. 510) hervor und zur conxen Fläche und Incisura interlobularis der Leber hin. — on der Regio pubis aus laufen durch die Regio hypogarica drei Falten der vorderen Wand des Saccus peritonaei, nvergirend und allmählig niedriger werdend, bis zum abel: die mittlere Falte, *Plica urachi*, umkleidet den rachus (S. 527): die beiden seitlichen *Plicae pubo-umbililes* überziehen die Chordae arteriarum umbilicalium oder igg. vesicalia lateralia (S. 527): nahe oberhalb der Symhysis pubis vertieft sich das Bauchfell zwischen diesen alten, an jeder Seite der Plica urachi, zu einer länglich reieckigen Grube, *Fossa inguinalis interni peritonaei* geannt. In der Stelle der vorderen Bauchwand vor dieser rube befinden sich der äufsere Schenkel des M. rectus bdominis, der M. pyramidalis, das Crus internum annuli nguinalis anterioris, und der innere Winkel des Annulus nguinalis anterior. — Nach aufsen von jeder Plica pubombilicalis bildet der Bauchfellsack in der Inguinalgegend lie gröfsere und wichtigere *Fossa inguinalis externa peritonaei:* diese wird durch eine schräg aufsteigende niedrigere alte des Bauchfells, *Plica epigastrica peritonaei*, welche om Laufe der Vasa epigastrica herrührt, in zwei kleinere ruben, Foveae inguinales, getheilt. Die innere Leistenrube des Bauchfells, *Fovea inguinalis interna peritonaei* s. ossa inguinalis media, befindet sich zwischen der Plica ubo-umbilicalis und der Plica epigastrica: ihr oberer

innerer Theil liegt hinter dem Annulus inguinalis anterior, durch die Fascia transversalis und die Aponeurosen der Mm. obliquus internus und transversus abdominis von ihm getrennt: ihr unterer äufserer Theil befindet sich unmittelbar über dem Lig. Gimbernati und dem Annulus cruralis. Die flachère äufsere Leistengrube des Bauchfells, *Fovea inguinalis externa peritonaei*, liegt unmittelbar hinter dem Annulus inguinalis posterior, an der äufseren Seite der Plica epigastrica peritonaei und über der Stelle des Arcus cruralis, unter welchem die Lücke für die Schenkelgefäfse sich befindet.

Die hintere Wand des Bauchfellsackes läuft vor den Schenkeln des Zwerchfells, vor den Mm. quadrati lumborum und Psoasmuskeln, vor den Nebennieren, Nieren und Harnleitern, vor der Aorta, der unteren Hohlvene, vor den Abdominalgeflechten des Gangliensystems und den Plexus lymphatici lumbares herab; und wird von diesen Theilen an den meisten Stellen durch eine dicke Lage fettreichen lockeren Zellstoffs getrennt. Von dieser hinteren Wand des Bauchfellsackes gehen die taschenähnlichen Einstülpungen und Duplicaturen aus, welche den Verdauungsorganen ihren serösen Überzug geben und sie in ihrer Lage befestigen. Die erste dieser Einstülpungen schliefst die Leber, den Magen, die Pars transversa superior des Zwölffingerdarms und die Milz zwischen ihre Blätter ein: sie beginnt an der Gränze der oberen und hinteren Wand des Bauchfellsackes, unter Bildung des Lig. coronarium und der Ligg. triangularia hepatis (S. 509), der Ligg. phrenicogastrica (S. 488) und Lig. phrenicolienale (S. 518), und breitet sich als seröse Bekleidungen der vorderen und hinteren Fläche der genannten Organe aus, indem sie zwischen Leber, Duodenum und Magen das Lig. hepatoduodenale und Omentum minus, zwischen dem Magen und der Milz das Lig. gastrolienale bildet (S. 488. 510. 518): alsdann geht sie noch weiter über den Magen hinaus, als Omentum gastrocolicum und als die beiden vorderen Blätter des Omentum colicum (S. 489. 503), an dessen freiem Rande endigend. — Die zweite Einstülpung oder Tasche schliefst das Colon ein: sie bildet zuerst das Mesocolon transversum, dessen obere und untere Platte ziemlich weit von einander getrennt von

er hinteren Wand des Bauchfellsackes ausgehen; die obere elangt oberhalb und vor der unteren Hälfte des Duodenum nd dem Pancreas, die untere Platte unterhalb dieser Organe um Colon transversum; beide gehen zu beiden Seiten in as Mesocolon adscendens und Mesocolon descendens, letzres fernerhin in das Mesorectum über. Nach Umkleidung ieser Darmstrecken endigt diese Einstülpung in Gestalt der eiden hinteren Blätter des Omentum colicum und als Apendices epiploicae (S. 502. 503). — Die dritte gröfsere instülpung oder Tasche ist das Mesenterium (S. 493), welches, von der hinteren Wand des Saccus peritonaei vor er Wirbelsäule ausgehend, an seinem oberen Ende mit er unteren Platte des Mesocolon transversum, an seiner Wurzel mit den inneren Platten des Mesocolon adscendens nd descendens zusammenhängt, und das Jejunum und Ileum nschliefst. — Bei der Continuität aller Flächen, Einsakungen und Duplicaturen des Bauchfells, gehen die beschriebenen gröfseren Einstülpungen in einander über: die erste nd zweite durch die Ligg. duodenorenale, hepatocolicum nd colicolienale (S. 502. 511) und durch den freien Rand es grofsen Netzes, an welchem die Enden seiner beiden orderen und beiden hinteren Blätter zusammenfliefsen: die weite und dritte durch den Zusammenhang des Mesocolon ransversum mit dem oberen Ende des Mesenterium, durch as Gekröse des Processus vermiformis und den Zusammenang des Mesenterium mit den inneren Platten des Mesolon adscendens und descendens.

Die erste und zweite Einstülpung können auch vereinigt ls ein einziger, ansehnlicher, in die Höhle des grofsen auchfellsacks hineinragender Beutel mit doppelten Wänen betrachtet werden; welcher Beutel aber nicht, wie ndere Einstülpungen seröser Häute, von einem Organ völig ausgefüllt wird, sondern eine freie, von glatten serösen lautflächen begränzte Höhle enthält. Die äufsere Wand les doppelten Beutels besteht, nach dieser Ansicht, aus den Überzügen der vorderen Fläche der Leber, des Magens, ler Pars transversa superior duodeni und der Milz, aus lem vorderen Blatt des Lig. hepatoduodenale, des Omentum minus, des Lig. gastrolienale, des Omentum gastrocolicum, lem vordersten und hintersten der vier Blätter des Omen-

tum colicum, dem serösen Überzuge des Colon transversum und der unteren Platte des Mesocolon transversum. Die innere Wand des doppelten Beutels enthält dagegen den Überzug des Theils der concaven Leberfläche hinter der Fossa transversa, die hintere Bekleidung des Magens, der Pars transversa superior duodeni und der Milz, das hintere Blatt des Lig. hepato-duodenale, des Omentum minus, des Lig. gastrolienale und Omentum gastrocolicum, die beiden mittleren der vier Blätter des Omentum colicum und die obere Platte des Mesocolon transversum. Die genannten Eingeweide sind also zwischen den doppelten Wänden des Beutels eingeschlossen; die Höhle des Beutels ist nach oben und rechts durch das Foramen Winslovii (S. 510) offen und communicirt mit der Höhle des grofsen Bauchfellsackes; unten dagegen durch die Verwachsung der Blätter des grofsen Netzes mit einander bei Erwachsenen geschlossen; sie wird vorn von der Leber, dem Magen, dem oberen Queerstücke des Duodenum, dem Lig. hepatoduodenale, Omentum minus und Omentum gastrocolicum umgeben, links von der Milz, — unten vom Colon transversum und dem unteren Queerstücke des Duodenum, — hinten von der Pars descendens duodeni und dem Pancreas umgeben. Man gelangt in diese hinter dem Magen befindliche Höhle an der rechten Seite durch das Foramen Winslovii, von vorn durch Zerreifsung des kleinen Netzes oder des Oment. gastrocolicum und Lig. gastrolienale.

Da das Colon transversum nahe an der vorderen Bauchwand liegt, und das Mesocolon transversum von der hinteren Bauchwand nach vorn sich erstreckt, so bilden diese Theile eine Art von beweglicher Scheidewand zwischen dem oberen und unteren Raume der Bauchhöhle: in dem oberen Raume, oberhalb des Mesocolon transversum, liegen die Leber, der Magen, das Duodenum, das Pancreas und die Milz; in dem unteren Raume der Dünndarm, zu beiden Seiten vom Colon adscendens und descendens eingefafst. —

Die untere Wand des Saccus peritonaei nimmt, indem sie aus der Regio hypogastrica und Regiones inguinales hinter dem Urachus und den Chordae arteriarum umbilicalium herabsteigt, einen in beiden Geschlechtern etwas verschiedenen Verlauf. Bei Männern bekleidet sie den hinteren

heil des Vertex und der Seitenwände und die ganze Hinrwand der Harnblase, auch eine Strecke der Vasa defentia, und steigt von der hinteren Blasenwand zur vordeen Wand des Mastdarms wiederum in die Höhe; bildet adurch zwischen Blase und Mastdarm eine tiefe weite rube, *Excavatio recto-vesicalis peritonaei*, die seitwärts on den Plicae semilunares Douglasii (S. 528) begränzt wird. ber die vordere und seitlichen Wände des Mastdarms ch verbreitend, wird das Bauchfell hinter dem oberen heile desselben zum Mesorectum, welches mit dem Mesolon descendens und der hinteren Wand des Bauchfellsackes asammenfliefst. — Im weiblichen Geschlecht bedeckt der auchfellsack auf gleiche Weise die obere und hintere Blamwand, und hinter der Inguinalgegend auch die Ligg. uteri otunda (S. 562); steigt sodann an der vorderen Fläche des terus hinauf und bildet dadurch zwischen Harnblase und ebärmutter die flachere *Excavatio vesico-uterina peritonaei*, elche seitwärts von den runden Mutterbändern und den licae vesico-uterinae (S. 528. 562) begränzt wird. Alsdann berzieht das Bauchfell den Fundus und die hintere Fläche er Gebärmutter und bildet zu beiden Seiten der letzteren ie Ligg. uteri lata (S. 562), welche die Eierstöcke, Tuben, nd einen Theil der Ligg. uteri rotunda zwischen ihre latten einschliefsen: bevor hiernach der Saccus peritonaei n der vorderen Fläche des Mastdarms hinaufsteigt, macht r eine sehr tiefe, seitwärts von den Plicae semilunares ouglasii begränzte Einsenkung, *Excavatio recto-uterina eritonaei.*

Brüste.

Die Brüste oder Milchdrüsen, *Mammae*, sind in ihrer ollständigen Ausbildung zwei ansehnliche acinöse Drüsen, elche in den Regiones mammillares, an den vorderen Flächen der Mm. pectorales majores, von vielem Fett umhüllt nd von der Haut bedeckt liegen, aber nur in erwachsenen eiblichen Körpern vollkommen entwickelt sich vorfinden: ei diesen reichen sie gewöhnlich von der dritten bis zur echsten Rippe herab, und lassen in der Regio sternalis eine Vertiefung zwischen sich, *der Busen, Sinus*, genannt.

Jede Mamma hat eine ungefähr halbkugelförmige, jedoch mehr ovale Gestalt, mit ungleicher, höckeriger Oberfläche, vorn convex, hinten platt; von einer ansehnlichen Menge Fett umgeben und an der vorderen Fläche von weicher und zarter Cutis bedeckt. Ihre Gröfse ist verschieden, im Mittel beträgt ihr längster schräg-transversaler, dem unteren Rande des M. pectoralis major paralleler Dm. $4\frac{3}{4}''$, der Dm. von oben nach unten $3\frac{3}{4}''$, die Dicke von vorn nach hinten $1''$, das Gewicht 8 Unzen, das Volumen $11\frac{1}{4}$ Kubikzoll. In der Mitte der vorderen Fläche ragt die von zarter, aber runzlicher Cutis überzogene, kegelförmige (zuweilen auch cylindrische oder halbkugelförmige) *Brustwarze* oder Zitze, *Papilla mammae*, mehr oder weniger stark hervor; diese ist, — so wie das kreisrunde Hautstück, welches sie zunächst umgibt und der *Warzenhof*, *Areola mammae*, genannt wird, — von röthlicher oder braunrother Farbe und mit vielen, zum Theil sehr grofsen Cryptae sebaceae versehen; der Umfang der Areola oftmals auch mit einzelnen Haaren besetzt. Die Masse der Drüse selbst, *Corpus mammae*, besteht aus vielen einzelnen, gröfseren und kleineren, unregelmäfsig gestalteten, meistens platten Lappen, welche äufserlich nur von einer dichten Zellstoffschicht überzogen werden, durch tiefe mit Fett gefüllte Gruben von einander getrennt sind, vorzüglich an der vorderen Fläche der Drüse; und zum Theil an der Peripherie der Drüse, oft ziemlich weit, in den benachbarten Panniculus adiposus sich erstrecken. Zwischen den Lappen dringen die Gefäfse an verschiedenen Stellen ein und aus, insbesondere am oberen inneren Rande und der hinteren Fläche. Die Lappen haben eine derbe Consistenz und eine weifsröthliche Farbe und enthalten jeder einen Ausführungsgang, *Milchgang*, *Ductus lactiferus* s. galactophorus, dessen Äste von traubenförmig zusammengehäuften häutigen Bläschen, *Acini mammae*, umgeben sind. Bei säugenden Weibern sind diese Acini sehr eng an einander gedrängt, dafs ihr Zwischenraum nur $\frac{1}{130}'''$ und weniger beträgt, von rundlich eckiger, selten länglicher Gestalt, und haben einen Dm. von $\frac{1}{27}'''$ bis $\frac{1}{14}'''$, meistens von $\frac{1}{18}'''$; sind also gröfser als die Acini aller anderen acinösen Drüsen des Menschen: sie werden von dichten Capillargefäfsnetz

nsponnen. Die kleineren Ductus an der Peripherie der rüse anastomosiren hin und wieder, jedoch selten, mit nachbarten Gängen, laufen dann gegen den Mittelpunkt r Drüse, und vereinigen sich hinter der Areola und in r Basis der Papille zu 12 bis 20 Stämmen der Milchinge, die im Mittel einen Dm. von $\frac{3}{4}'''$ bis $1'''$ haben, n und wieder Erweiterungen, Sinus s. Sacculi ductuum ctiferorum, von $2'''$ bis $3'''$ Dm. bilden, aber nicht mit nander anastomosiren. Sodann laufen sie neben einander ich vorn, innerhalb der Papille, deren innere Substanz ur von diesen Gängen nebst fettlosem Zellstoff und Gefäen gebildet wird; daher die sehr empfindliche Warze rch stärkere Anfüllung der Milchgänge und der Gefäfse Umfang zunimmt, stärker hervorragt und härter wird, ich nebst der Areola lebhafter gefärbt erscheint. Die Milchgänge münden an der Spitze der Warze, zwischen en Runzeln und Fältchen der Cutis derselben, mit engen, ngefähr $\frac{1}{4}'''$ im Dm. haltenden Öffnungen, in welchen zueilen zwei oder drei Gänge zugleich endigen. Inwendig erden die Milchgänge von einer sehr zarten weifslichen chleimhaut, auswendig von Zellhaut umkleidet.

Aufser den Zeiten der Milchsecretion, und insbesondere ei Jungfrauen, hat die Mamma überhaupt einen geringeren mfang, ein mehr dichtes, festes und härtliches, oder auch in weicheres zähes Gewebe; die Milchgänge und Acini nd bei Weitem enger, letztere oft kaum zu erkennen, er Blutreichthum geringer. Dagegen bildet sich in der egel das Gewebe der Brüste schon während der Schwanerschaft vollkommener aus; und sondert in den letzten eiten der Gestation, sehr reichlich aber während des äugens oder Stillens, *Lactatio*, die zur Nahrung des Neugebornen bestimmte Milch ab. Die Frauenmilch, *Lac feninum*, ist rein weifs oder bläulich weifs, dünnflüssig, eruchlos, von mildem süfslichen Geschmack, hat ein spec. Gewicht von 1,020 bis 1,025, und enthält eine sehr grofse Anzahl kleiner runder halbdurchsichtiger Kügelchen, von welchen die kleinsten $\frac{1}{1000}'''$, die gröfsten $\frac{1}{266}'''$, die meisten aber $\frac{1}{800}'''$ im Dm. halten; wahrscheinlich bestehen diese aus Käsestoff und Butter und sind keineswegs nur im Wasser suspendirte Fetttröpfchen. Die Milch reagirt sauer

und besteht aus Wasser, Käsestoff, Butter, Milchzucker, freier Milchsäure; aus Alkohol-Fleischextract mit milchsaurem Kali, Natron, Kalk und Talk; aus (schwefelsaurem) kohlensaurem und phosphorsaurem Kali und Natron, Chlorkalium und Chlornatrium, phosphorsaurer Kalk- und Talkerde mit einer Spur von phosphorsaurem Eisenoxyd, in folgenden mittleren Verhältnissen (nach Meggenhofen):

Wasser	87,80
Käsestoff, coagulirt, ...	1,94
Butter, Alkoholextract, Milchsäure, milchsaure Salze, Kochsalz und etwas Milchzucker . . .	8,97
Milchzucker und in Wasser lösliche Salze . . .	1,21
	99,92

Die Frauenmilch ist an Wasser und Milchzucker reicher, an Käsestoff und vorzüglich an Butter ärmer, als die Milch der Thiere; gerinnt daher schwer und nicht durch Zusatz von Säuren. Die während der Schwangerschaft und in den ersten Tagen nach der Geburt abgesonderte Milch, *Colostrum* genannt, ist dünner, wässeriger, molkenähnlich, und enthält sehr wenig Käsestoff und Butter; bei längerer Andauer des Säugens nimmt das Verhältnifs der letztgenannten Bestandtheile zu.

Im männlichen Geschlecht sind die Brüste sehr unvollständig entwickelt; die Areola und Papille zwar vorhanden, letztere aber nur 1‴ bis 2‴ hoch: der Drüsenkörper 5‴ breit und 2‴ dick, von weifslicher Farbe und zäher Consistenz; in diesem sind einzelne Läppchen von $\frac{1}{4}$‴ bis $\frac{1}{2}$‴ Dm. und sehr enge Gänge, meistens jedoch nur weifsliche etwas glänzende, die Richtung der Gänge andeutende Zellstoffstreifen, überall aber keine hohle Acini zu erkennen

Literatur

zur

zweiten Abtheilung des ersten Bandes.

Gesammte Eingeweidelehre.

741. *R. J. Croissant de Garengeot* Splanchnologie, l'anatomie des viscères. à Paris 1742. 2 Vol. 12.

742. *C. Flurant* Splanchnologie raisonnée. à Paris 52. 2 Vol. 12.

743. *A. R. Vetter* anat. Grundbegriffe von den Eingeweiden des Menschen und ihren Verrichtungen. Wien 88. 8.

744. *H. Gavard* Traité de splanchnologie. à Paris 09. 8.

745. *F. Meckel* (Nr. 56.) 4r Bd.

746. *A. C. Bock* Darstellung der Organe der Respiration, des Kreislaufs, der Verdauung, des Harns und der Fortpflanzung. Leipz. 1823. 8. (Nr. 60. 8r Bd.)

747. *E. H. Weber* vierte Ausgabe von Hildebrandts Handbuch der Anatomie (Nr. 38) 4r Bd.

S. auch die Schriften über die Drüsen, S. 357, insbesondere *J. Müller* (Nr. 551).

Über mehrere Sinnesorgane.

748. *H. Fabr. ab Aquapendente* de visione, voce, auditu. Venet. 1600. u. in Opp. (Nr. 123.)

749. *J. Casserius* Pentaestheseion, h. e. de quinque sensibus liber. Ven. 1609. Fol. Fcoft. 1610. Fol. — und Fr. 1039.

750. *C. H. le Cat* Traité des sens. à Paris 1767. Vol. 8.

Ohr.

751. *G. J. Duverney* Traité de l'organe de l'ouie à Paris 1683. 8. — Tractatus de organo auditus. Lugd. B 1730. 8.

752. *A. M. Valsalva* de aure hum. tractatus. Bonon 1704. 4. u. in Opp. (Nr. 137.)

753. *R. Vieussens* Traité de la structure de l'oreille à Toulouse 1714. 4.

754. *J. F. Cassebohm* Tractatus quatuor, quintus e sextus de aure humana. Hal. et Magd. 1734 u. 1735. 4

755. *J. B. Morgagni* in Epist. an. III—VII. XII. XIII

756. *B. S. Albinus* de aure humana interiore, in An not. (Nr. 145) Lib. IV.

757. *A. Scarpa* Disquisitiones anatom. de auditu e olfactu. Ticin. 1789 u. 1792. Fol. — Deutsch von Th Schreger. Nürnb. 1800. 4.

758. *J. Cunningh. Saunders* the anatomy of the hu man ear, illustrated by engravings. Lond. 1806. 8. — ib. 1817. 8.

759. *S. Th. Sömmering* Abbildungen des menschliche Gehörorgans. — Icones organi auditus hum. — Fcft. a. M 1806. Fol.

760. *J. F. Schröter* das menschliche Ohr, nach Söm merings Abbild. Weimar 1811. Fol.

761. *Th. Buchanan* an engraved representation of th ear. Hull 1823. Fol.

762. *A. Fischer* Tract. anat. phys. de auditu homini Mosq. 1825. 8.

763. *D. Todd* the anatomy and physiology of the o gan of hearing. Lond. 1832. 8.

764. *G. Breschet* Etudes anat. et phys. sur l'orga de l'ouie et sur l'audition. à Paris 1834. Vergl. Mülle Archiv. 1834. p. 18 ff.

Äufseres Ohr.

765. *J. D. Santorini* de aure exter., in Obs. (Nr. 134

766. *A. F. Walther* anat. musc. tener. c. h. (Nr. 651

767. *B. S. Albinus* de cartilagine auriculae, in Annc ac. (Nr. 145) Lib. VI.

768. *Th. Buchanan* physiological illustrations of the an of hearing. Lond. 1828. (Meckels Arch. für Anat. Phys. 1828.)

Pauke.

769. *C. Folius* nova internae auris delineatio. Ven. 5. in Haller Disp. (Nr. 138.) Vol. IV.

770. *B. Eustachius* de org. auditus, in Opusc. (Nr. 108.)

771. *A. Scarpa* Obs. anat. de structura fenestrae rodae auris et de tympano secundario. Mutin. 1772. 8.

772. *F. Arnold* über zwei Knochenkanälchen, in Tiemann u. Treviranus Zeitschr. (Nr. 173) Bd. IV.

773. *A. F. Walther* Diss. de membrana tympani, in ller Disp. (Nr. 138) Vol. IV.

774. *J. Brugnone* Observat. anatomiques sur l'origine la membrane du tympan et de celle de la caisse; in m. de l'acad. de Turin, 1803. 1804.

775. *E. Home* on the structure and uses of the memna tympani of the ear, in Philos. Transact. 1800. P. 1. berts Annalen der Phys. 1809. — Derselbe on the diffeice of structure between the human membrana tympani ! that of the elephant. Philos. Transact. 1823. P. 1.

776. *H. J. Shrapnell* on the structure of the memna tympani, in London medical Gazette, April 1832.

777. *H. F. Teichmeyer* Diss. de ossiculis auditus, in ller Disp. (Nr. 138) Vol. IV.

778. *A. Carlisle* the physiology of the stapes, in Phil. ansact. 1805.

779. *F. Tiedemann* Varietäten des Steigbügelknochens, Meckel d. Archiv (Nr. 170) Bd. V.

780. *F. Magendie* sur les organes qui tendent ou lâchent la membrane du tympan et la chaine des osselets, dess. Journal (Nr. 172) Vol. I. u. in Meckels deutsch. rchiv. Bd. VIII.

781. *F. W. Chevallier* on the ligaments of the human sicula auditus, in Med. chir. Transact. Vol. XIII. P. I. 1825.

782. *H. J. Shrapnell* on the structure of the incus, Lond. med. Gaz. June 1833.

783. *E. Hagenbach* Disq. anat. circa musculos auris ternae hominis etc. Basil. 1833. 4.

Labyrinth.

784. *A. Monro II.* three treatises on the brain, the eye and the ear. Edinb. u. Lond. 1797. 4.

785. *Brugnone* Observations anat. phys. sur le labyrinthe de l'oreille, in Mém. de l'acad. de Turin 1805—1808.

786. *Ribes* Recherches sur quelques parties de l'oreille interne, in Magendie Journal de physiol. exp. Vol. II. und Meckels deutsch. Arch. (Nr. 170) Bd. VIII.

787. *A. Meckel* Bem. über die Höhle des knöchernen Labyrinths, in Meckels Arch. f. A. u. Ph. (Nr. 171) 1827.

788. *K. Steifensand* Unters. über die Ampullen des Gehörorgans, in Müllers Archiv 1835. Heft 2.

789. *D. Cotunni* Dissert. de aquaeductibus auris humanae intern. Nap. 1761. 8. u. in Sandifort Thesaur. diss. Vol. II.

790. *Ph. F. Meckel* Diss. de labyrinthi auris contentis Argent. 1777. 4.

791. *W. Krimer* chemische Untersuch. des Labyrinthwassers, in dessen physiol. Abh. Leipz. 1820.

792. *E. Huschke* über die Ohrcrystalle, in Froriep Notizen 1832. Nr. 707, Isis 1833. Heft 7. u. 1834. Heft 1.

793. *J. G. Brendel* de auditu in apice cochleae — u. Analecta de concha auris humanae, in Opusc. ed. Wrisberg. Tom. I. Gött. 1769. 4.

794. *J. G. Zinn* Observationes anat. de vasis subtilioribus oculi et cochlea auris internae. Gött. 1753. 4.

795. *J. G. Ilg* anat. Beob. über den Bau der Schnecke u. s. w. Prag 1821. 4.

796. *F. Rosenthal* über den Bau der Spindel, in Meckels deutsch. Arch. (Nr. 170) Bd. VIII.

Functionen.

797. *G. C. Schelhammer* de auditu liber unus et Lgd. Bat. 1684. 8. u. in Manget Bibl. (Nr. 19).

798. *J. B. Morgagni* in Epist. an. XIII.

799. *J. H. F. Autenrieth und Kerner* Beob. über die Function einzelner Theile des Gehörs, in Reils Arch. (Nr. 168) Bd. IX.

800. *Esser* über die Verrichtungen einzelner Theile des Gehörorgans, in Kastners Arch. f. d. Naturlehre Bd. XI

801. *E. Home* (Nr. 775).

802. *F. Savart* sur les fonctions de la membrane du pan et de l'oreille externe, in Annales de chimie et de sique. T. XXVI. s. Meckels deutsch. Archiv Bd. VIII.

803. *J. Köllner, J. D. Herholdt u. C. Bressa* über Nutzen der Eustachischen Röhre, in Reils Archiv (Nr. Bd. II. III. IV. VIII.

804. *A. H. L. Westrumb* über die Bedeutung der Eu- hischen Trompete, in Meckels Archiv (Nr. 171) 1828.

805. *E. H. Weber* de utilitate cochleae, in Annotat. t. de pulsu, resorptione, auditu et tactu. Lips. 1834. 4. Vergl. auch Chladni's Akustik, Leipz. 1804. 4. u. neue räge zur Akustik, 1817. E. H. Weber u. W. Weber llenlehre, Leipz. 1835. 8., u. m. a. Abh. von F. Savart Annales de chim. et de phys. u. in Schweiggers Journal hemie u. Physik.

Auge.

806. *V. F. Plempius* Ophthalmographia s. tractatio de lo. Ed. III. Lovan. 1659. Fol.

807. *G. Briggs* Ophthalmographia. Lugd. Bat. 1686. . in Manget Bibl. (Nr. 19.)

808. *J. D. Santorini* de oculo, in Obs. anat. (Nr. 19.)

809. *F. P. du Petit* sur plusieurs découvertes faites s les yeux etc. in Mém. de l'acad. de Par. 1726. 1732.

810. *J. P. Lobé* Diss. de oculo humano. L. B. 1742. in Haller Disp. anat. Vol. VII.

811. *P. Camper* Diss. de quibusdam oculi partibus. B. 1746. u. in Haller Disp. an. Vol. IV.

812. *J. G. Zinn* Descriptio anat. oculi hum. iconibus strata. Gött. 1755. 4. Ed. altera c. H. A. Wrisberg. tt. 1780. 4.

813. *W. Porterfield* a treatise on the eye, the manner l phenomena of vision. Edinb. 1759. 2 Vol. 8.

814. *J. Janin* Mémoires et observations anat. physiol. physiques sur l'oeil et sur ses maladies. à Lyon 1772. 8. utsch, Berlin 1776. 8.

815. *M. Horrebow* Tractat. de oculo humano ejusque rbis. Hafn. 1792. 8.

816. *A. Monro II.* (Nr. 784).

817. *S. Th. Sömmering* Abbildungen des menschliche Auges. Fkft. a. M. 1801. Fol. — Lateinisch das. — Franz v. A. P. Demours, in dessen Traité des maladies des yeux à Par. 1818. 4.

818. *J. L. Angely* de oculo organisque lacrymalibu ratione aetatis, sexus, gentis et var. animalium. Erl. 1803. 8

819. *D. G. Kieser* Diss. de anamorphosi oculi. Göt 1804. 4.

820. *J. F. Schröter* das menschl. Auge (nach Sömm rings Abb. vergröfsert). Weimar 1810. Fol.

821. *C. H. Th. Schreger* Vers. e. vgl. Anatomie d Auges u. der Thränenorgane des Menschen, nach Alte Geschlecht, Nation u. s. w. Leipz. 1810. 8.

822. *J. Döllinger* Illustratio ichnographica fabric oculi humani. Wirceb. 1817. 4.

823. *D. W. Sömmering* de oculorum hominis anim liumque sectione horizontali commentatio. Gött. 1818. F

824. *A. K. Hesselbach* Bericht von der k. anat. Anst zu Würzburg, mit e. Beschr. des menschl. Auges u. Anl tung zur Zergliederung desselben. Würzb. 1820. 8. au in Radius scriptores ophthalm. minores Vol. I.

825. *E. Home* (*u. F. Bauer*) on the anatomical str ture of the eye, in Philos. Transact. 1822. u. in Meck deutsch. Arch. Bd. VIII.

826. *A. Jacob* Inquiries respecting the anatomy the eye, in Med. chir. Transactions Vol. XII. 1823.

827. *M. J. A. Schön* pathol. Anatomie des mensc Auges. Hamb. 1828. 8.

828. *M. J. Weber* über die wichtigsten Theile menschl. Auges, in Gräfe u. Walthers Journal Bd. XI.

829. *G. R. Treviranus* Beiträge zur Anatomie u. P siologie der Sinneswerkzeuge des Menschen u. der Thi Heft I. Bremen 1828. Fol.

830. *F. A. v. Ammon* Zeitschrift für die Ophthal logie. Dresden 1830 ff. Bd. I—IV.

831. *C. F. T. Krause* Bemerk. über den Bau und Dimensionen des menschl. Auges, in Meckels Archiv f. u. Phys. Bd. VI. 1832.

832. *F. Arnold* anat. u. physiol. Untersuchungen ü das Auge des Menschen. Heidelb. u. Leipz. 1832. 4.

833. *E. Huschke* Untersuchungen über einige Streitnkte in der Anatomie des menschl. Auges, in Ammons itschrift f. d. Ophthalmologie Bd. III. Heft 3. 4. Bd. IV. 3. 4.

834. *J. Dalrymple* the anatomy of the human eye. nd. 1834. 8.

Augenlieder.

835. *B. Eble* über den Bau und die Krankheiten der ıdehaut des Auges. Wien 1828. 8.

836. *J. Jacobson* Dissert. de tunica conjunctiva oculi mani. Berol. 1828. 8.

837. *B. N. Schreger* von den Saugadern der Conjunca, in Beiträgen (Nr. 306).

838. *B. S. Albin* de ciliis, in Annot. acad. L. III.

839. *H. Meibom* de vasis palpebrarum novis epistola. lmst. 1666. 4.

840. *E. H. Weber* über die Meibomschen Drüsen, in ckels Archiv f. A. u. Ph. 1827.

841. *Zeis* anat. Unters. der Meibomschen Drüsen, in Ammon Zeitschrift, Bd. IV. H. 3. 4. 1835.

Thränenorgane.

842. *N. Stenonis* observationes anat. de glandulis ocuım novis, in Manget Bibl. T. II. (Nr. 19.)

843. *A. Vater*, Diss. epist. de ductuum lacrymalium palpebralium vera constitutione etc., iu Miscellanea Beinens. Vol. IV.

844. *J. B. Morgagni* in Advers. an. I. VI.

845. *J. D. Santorini* in Observ. anat. (Nr. 134) c. 4.

846. *J. C. Rosenmüller* partium externar. oculi hum., primis organ. lacrymal. descriptio anat. Lips. 1797. 4.

847. *Horner* Beschreibung eines mit dem Auge verndenen Muskels, aus dem Lond. med. Repository Vol. 18, Meckels deutsch. Arch. Bd. VIII.

Angely Nr. 818. Schreger Nr. 821.

Häute des Augapfels.

848. *C. N. le Cat* Description anat. des tuniques commes de l'oeil, in Mém. de l'acad. de Par. 1739.

849. *Fränzel* die drei Häute des m. Augapfels, Sclerotica, Choroidea u. Retina, in Ammon Zeitschr. Bd. I. Hft. 1.

Hornhaut.

850. *P. Demours* observations sur la cornée, in Mém. de l'acad. de Paris 1741.

851. *B. D. Mauchart* (resp. Georgi) Diss. de cornea oculi humani, in Haller Disp. anat. Vol. IV.

852. *J. C. Loder* Progr. arteriolarum corneae brevis expositio. Jen. 1801. 4.

853. *A. Clemens* Diss. sist. tunicae corneae et humoris aquei monographiam. Gött. 1816. u. in Radius scriptores ophthalm. min. Vol. I.

854. *M. J. Chelius* über die durchsichtige Hornhaut des Auges u. s. w. Karlsr. 1818. 8.

855. *C. F. Riecke* Diss. de tunica cornea. Ber. 1829. 8.

856. *M. J. Weber* (Nr. 828).

857. *v. Ammon* (über den Annulus conjunctivae), in Rusts Magaz. Bd. 30. Heft 2.

Arachnoidea oculi.

858. *C. N. le Cat* in Nr. 750.

859. *F. Arnold* in Salzb. med. chir. Zeit. 1831. und Ammons Zeitsch. Bd. II. Heft 3. u. Nr. 832.

860. *F. Schlemm* im Berliner encykl. Wörterbuch der med. Wiss. Bd. IV.

Choroidea u. Corpus ciliare.

861. *F. Ruysch* Responsio in epist. XIII. de oculorum tunicis u. Thesaurus anat. II., in Opp. (Nr. 127).

862. *L. Heister* de tunica oculi choroidea. Helm. 1746. 4.

863. *B. S. Albin* de tunica Ruyschiana et choroidea oculi, in Annot. ac. L. VII.

864. *B. A. Stier* praes. *Büchner* Diss. de tunica quadam oculi novissima detecta. Hal. 1759. 4.

865. *S. Th. Sömmering* über das feinste Gefäfsnetz der Aderhaut im Augapfel, in Denkschriften der k. Akad. der Wissensch. München 1821. Bd. VII.

866. *J. G. Zinn* Diss. de ligam. ciliar. Gött. 1753

867. *F. Ribes* Mémoire sur les procès ciliares et leur tion sur le corps vitré, le crystallin et l'humeur aqueuse, Mémoires de la societé d'émul. Vol. 8. 1817. Meckels utsch. Arch. Bd. IV.

868. *B. Eble* über das Strahlenband im Auge, in v. nmons Zeitschr. Bd. II. Heft 2.

869. *v. Ammon* Beiträge zur Anatomie, Physiologie u. thologie des Orbiculus ciliaris, in dessen Zeitschr. Bd. II. eft 2.

870. *J. Hovius* (Circulus venosus) in Nr. 915.

871. *F. Fontana* (nouveau canal de l'oeil) in Nr. 208.

872. *F. Schlemm* (Canalis Schlemmii) im Berliner en- kl. Wörterbuch der med. Wiss. Bd. VI.

873. *F. Arnold* (Nr. 859 u. Nr. 832).

874. *A. Retzius* über den Circulus venosus im Auge Müllers Arch. f. An. u. Phys. 1834. Heft 3.

Iris.

875. *J. P. Maunoir* Mém. sur l'organisation de l'iris l'opération de la pupille artificielle. à Paris 1812. 8.

876. *R. B. Sabatier* Rapport sur un mém. de Mau- ir, in Mém. de l'institut national Vol. II.

877. *J. Cloquet* Mém. sur la membrane pupill. et sur formation du petit cercle arter. de l'iris. à Par. 1818. 8.

878. *E. Home* Nr. 825.

879. *A. Jacob* Nr. 826.

880. *E. H. Weber* Tract. de motu iridis. Lips. 1821. 4.

881. *M. J. Weber* Nr. 828.

Pigment.

882. *H. F. Elsaesser* Diss. de pigmento oculi nigro etc. üb. 1800. 8.

883. *L. Gmelin* Dissert. sist. indagationem chemicam igmenti nigri oculorum taurinorum. Gött. 1812. 8.

884. *M. Mondini* osservazione sul pigmento nero del cchio (s. Archiv. gén. de Méd. 1824. Juillet).

885. *C. Krause* in Nr. 831 (Pigmenthaut).

886. *Th. Wharton Jones* Notice relative to the Pig- ientum Nigrum of the Eye. Edinb. med. and surg. Journal Nr. 116. July 1833.

Jacobsche Haut.

887. *A. Jacob* an account of a membrane in the eye now first described. Phil. Transact. 1819. Meckels deutsch. Arch. Bd. VI. — u. in Nr. 826.

888. *J. Döllinger* in Nr. 912.

889. *M. J. Weber* in Nr. 913.

890. *E. Huschke* in Nr. 833.

Retina.

891. *J. H. Moeller* praes. *J. Juncker* Diss. exhibens nonnullas observationes circa tunicam retinam et nervum opticum. Hal. 1749. 4. u. in Haller Disp. an. Vol. VII.

892. *F. Fontana* in Nr. 208.

893. *B. S. Albin* de membrana quam vocant retinam, in Annot. ac. L. III.

894. *C. G. Ehrenberg* in Poggendorfs Ann. 1833. St. 7

895. *G. R. Treviranus* in Nr. 980.

Hinteres Ende.

896. *S. Th. Sömmering* de foram. centr. retinae hum limbo luteo cincto, in Comm. soc. reg. Gött. Vol. XIII

897. *Ph. Michaelis* über einen gelben Fleck und ei Loch in der Nervenhaut des m. Auges, im Journal de Erfind. St. 15.

898. *E. Home* an account of the orifice in the retina in Phil. Transact. 1798. Reils Archiv Bd. IV.

899. *J. M. Wantzel* über das Loch, die Falte und de gelben Fleck, in Isenflamm und Rosenmüllers Beiträge (Nr. 167) Bd. I.

900. *Leveillé* sur le trou central de la rétine, u *J. L. Moreau* Exposé etc., in Mém. de la soc. d'émul. Vol.

901. *J. C. Reil* die Falte, der gelbe Fleck und d durchsichtige Stelle in der Netzhaut des Auges, in dess Archiv Bd. II.

902. *K. A. Rudolphi* über den gelben Fleck und d sog. Centralloch, in Abhand. der k. Akad. der Wissensc zu Berlin. 1815—1817.

903. *F. A. v. Ammon* de genesi et usu maculae lute in retina oculi h. obviae. Vinar. 1830. 4. und in dess Zeitschrift Bd. I. H. 1.

904. *K. W. Stark* über den gelben Fleck, das Cenalloch u. die Falte u. s. w. in v. Amm. Zeits. Bd. I. H. 4.

905. *E. Huschke*, in Nr. 833.

906. *L. Jacobson* über eine wenig bekannte Augenissigkeit, in Meckels deutsch. Arch. Bd. VIII.

Vorderes Ende und Strahlenblättchen.

907. *E. Schneider* das Ende d. Nervenhaut im menschl. uge. München 1827. 4.

908. *R. Wagner* über einige neuere Entdeckungen in r Anat., in Heusingers Zeitschr. (Nr. 175) Bd. III. H. 3. ntersuchungen über das Ende der Netzhaut u. s. w., in Ammons Zeitschr. Bd. III. H. 3. 4.

909. *C. Krause* in Nr. 831.

910. *E. Huschke* in Nr. 833.

911. *K. A. Rudolphi* in anat. phys. Abh. (Nr. 161).

912. *J. Döllinger* über das Strahlenblättchen im m. A., Nov. act. acad. nat. cur. Vol. IX.

913. *M. J. Weber* über d. Strahlenblättchen im m. A. nn 1827. 8., u. in Nr. 826.

914. *F. A. v. Ammon* der Orbiculus capsulo-ciliaris s. w., in dessen Zeitschr. Bd. I. H. 1.

Gefäfse des Augapfels.

915. *J. Hovius* de circulari humorum motu in oculis. igd. B. 1716. 8. Das. 1740.

916. *J. B. Morgagni* in epistol. an. XVII.

917. *J. G. Zinn* Obs. de vasis subtilioribus oculi et chlea auris internae. Gött. 1753. 4.

918. *B. S. Albin* de vasis humoris vitrei et crystallini, Annot. ac. L. VII.

919. *J. G. Walter* Epist. ad G. Hunterum de venis uli summatim etc. Berol. 1778. 4. — Sendschreiben von n Blutadern des Auges u. s. w. 1778. 4.

920. *J. C. Loder* Nr. 852.

921. *F. Ribes* Nr. 867.

922. *S. Th. Sömmering* Nr. 865.

923. *J. Döllinger* Nr. 912.

924. *F. Arnold* Nr. 832.

925. *T. G. J. Henle* Comm. de membrana pupillari iisque oculi membranis pellucentibus. Bonn. 1832. 4.

Strahlenbrechende Theile.

926. *F. P. du Petit* Mém. sur les yeux gélés etc. — sur les differentes manières de connaître la grandeur des chambres de l'humeur aqueuse — sur le crystallin — sur la capsule du crystallin etc.: in Mém. de l'acad. de Paris 1723. 1728. 1730.

927. *Th. Young* Remarks on the vision — on the mechanism of the hum. eye: in Phil. Transact. 1793 u. 1801.

928. *D. W. Sömmering* in Nr. 823.

929. *Ch. Chossat* Mém. sur le pouvoir réfringent des milieux de l'oeil, und Mém. sur la courbure des milieux réfringens de l'oeil chez le boeuf, in Bulletin des sciences p. la soc. philomatique de Paris, Juin 1818; u. Annales de chimie et de phys. T. VIII. 1818. u. Tom. X. 1819.

930. *D. Brewster* in Edinb. Phil. Journal 1819. Nr. 1.

931. *G. R. Treviranus* in Nr. 829 u. 980.

932. *C. Krause* in Nr. 831.

Glaskörper.

933. *P. Demours* Observ. anat. sur la structure cellulaire du corps vitré, in Mém. de l'ac. de Paris 1741.

934. *F. Martegiani* novae observ. de oculo humano Neap. 1814. 8.

935. *S. Th. Sömmering* in Salzb. med. chirurg. Zeit. 1823. Bd. 3.

936. *G. Valentin* zur Anatomie des Foetusauges der Säugethiere in v. Ammons Zeitschr. Bd. III. H. 3. 4.

Linse.

937. *A. v. Leeuwenhoek* Observations on the crystalline humor. Phil. Transact. 1693.

938. *A. F. Walther* Diss. de lente crystallina oculi humani. Lips. 1712. 4. u. in Haller Disp. an. Vol. IV.

939. *J. B. Morgagni* in Advers. (Nr. 129) VI. Epistol. XVIII.

940. *P. Camper* in Nr. 811.

941. *J. C. Reil* resp. *Sattig* Diss. de lentis crystallinae structura fibrosa. Hal. 1784. 8.

942. *J. Hunter* on the structure of the crystalline humor. publ. by E. Home, in Phil. Transact. 1794.

943. *B. F. Baerens* Diss. sist. systematis lentis cryst. onographiam phys. path. Tüb. 1819. 4. und in Radius cript. ophth. m. Vol. I.

944. *V. Leiblein* Bem. üb. d. System der Krystallinse i Säugeth. u. Vögeln. Würzb. 1821.

945. *Gräfe* über die Bestimmung der Morgagnischen uchtigkeit, der Linsenkapsel und des Faltenkranzes, in eils Arch. Bd. IX.

946. *E. Huschke* in Nr. 833.

947. *W. Werneck* mikroskopisch-anatom. Betrachtung er die Wasserhaut und das Linsensystem, in v. Ammons eitschr. Bd. IV. H. 1.

Humor aqueus.

948. *F. P. du Petit* Mém. sur les deux espaces que umeur aqueuse occupe dans l'oeil, in Mém. de l'acad. de r. 1723.

949. *L. Heister* de humore oculi aqueo, in Ephem. . C. Cent. VII.

950. *B. Duddel* Treatise of the diseases of the horny at in the eye. Lond. 1729. 8.

951. *J. Descemet* (praes. Vallun) Diss. an sola lens ystallina cataractae sedes? à Par. 1758. — Mém. sur la oroide, in Mém. prés. à l'ac. par des savans étrangers ol. V. 1768.

952. *P. Demours* Lettre à Mr. Petit. à Par. 1767. 8. - Nouvelles réflexions sur la lame cartilagineuse de la rnée. à Par. 1770. 8.

953. *S. Sawrey* Account of a newly discovered membrane in the human eye etc. Lond. 1807. 4.

Augenmuskeln.

954. *J. B. Morgagni* Epist. an. XVI.

955. *W. Porterfield* Essay, concerning the motion of ur eyes, in Edinb. medical essays and observ. Vol. III. IV.

956. *J. G. Zinn* de tunicis et musculis oculorum, in Comment. Soc. Reg. Götting. Vol. III.

957. *A. Portal* Obs. s. les muscles des yeux, in Mém. le l'acad. de Paris 1770.

958. *J. Hunter* in Nr. 155.

959. *Ch. Bell* on the motions of the eye, in Philos. Transact. 1823.

Mechanismus und Functionen.

960. *J. Kepler* Paralipom. ad Vitellionem. Fcft. 1604. 4.

961. *C. Scheiner* Oculus s. instrumentum opticum etc. Oenip. 1619. 4.

962. *E. Mariotte* Nouvelles découvertes sur la vue, in Mém. de l'ac. de Par. 1669. 1682.

963. *P. de la Hire* Mém. sur les differens accidens de la vue, in Mém. de l'acad. de Paris 1694. — Obs. sur la rétine, das. 1709.

964. *R. Smith* a compleat system of optiks, with *J. Jurins* Essay upon distinct and indistinct vision. Cambridge 1738. 4. Deutsch v. A. G. Kästner. Altenb. 1755. 4.

965. *P. Camper* Diss. de visu — Diss. de quibusdam oculi partibus — Lgd. B. 1746. u. in Haller Disp. Vol. IV

966. *W. Porterfield* Nr. 813 u. 955.

967. *J. Janin* Nr. 814.

968. *H. W. M. Olbers* Diss. de oculi mutationibus interns. Gött. 1780. 4.

969. *G. F. Hildebrandt* Com. de motu irid. Brsv. 1786. 8

970. *J. F. Blumenbach* Com. de oculis leucaethiopum et iridis motu. Gött. 1786. 4.

971. *Th. Young* remarks on vision — on the mechanism of the eye, in Phil. Transact. 1793. 1801.

972. *E. Home* on muscular action, in Phil. Transact. 1795. (Reils Archiv Bd. II.) — on the power of the eye to adjust itself when deprived of the crystalline lens, in Phil. Transact. 1802.

973. *J. C. Reil* resp. *Krüger* Diss. de oculi mutationibus internis. Hal. 1797. 8.

974. *E. H. Weber* Tract. de motu iridis. Lips. 182

975. *F. Magendie* sur l'insensibilité de la rétine, Journal de physiol. (Nr. 172) Vol. V. 1825.

976. *J. E. Purkinje* Beob. u. Versuche zur Physiolog der Sinne. Zur Kenntnifs des Sehens in subjectiver Hi sicht. Prag u. Berl. 1823—1825. 2 Bde. 8.

977. *J. Müller* Zur vergleichenden Physiologie d Gesichtssinnes u. s. w. Leipz. 1826. 8.

978. *J. J. Hiort* de functione retinae, 2 Part. Chri-an. 1826. 1830. 8.

979. *G. R. Treviranus* Nr. 829.

980. *Derselbe* Beiträge zur Aufklärung der Erschei-ngen u. Gesetze des organischen Lebens. Bd. I. Heft 1. emen 1835.

981. *A. Hueck* das Sehen seinem äufs. Processe nach. rpat u. Gött. 1830. 8.

982. *A. A. Berthold* das Aufrechterscheinen der Ge-htsobjecte. Gött. 1830. 2 Aufl. 1834.

983. *D. Brewster* a treatise on optics. Lond. 1831. 8. mehrere Abh. in London and Edinb. Philosophical Mag. Edinb. Journal of sciences 1819. ff.

984. *C. M. N. Bartels* Beiträge zur Physiologie des sichtssinnes. Berl. 1834. 8.

N a s e.

985. *C. N. Schneider* de catarrhis libri IV. Viteb. 50—1664. 4.

986. *C. Bartholinus* Disquis. anat. de olfactus organo. vn. 1679. 4.

987. *G. J. Duverney* Obs. an. sur l'organe de la vue de l'odorat, in Mém. de l'ac. de Par. 1678.

988. *J. B. Morgagni* in Advers. I. (Nr. 129.)

989. *J. D. Santorini* de naso, in Obs. anat. u. Tab. I. (Nr. 134.)

990. *S. Aurivillius* resp. *Ziervogel* (Nr. 621).

991. *J. G. Haase* de nervis narium internis. Lips. 79. 4. u. in Ludwig scriptor. neurol. min. Tom. IV.

992. *J. Hunter* in Nr. 155.

993. *A. Scarpa* Disq. an. de aud. et olfactu (Nr. 757) Annot. anat. (Nr. 152) Lib. II.

994. *S. Th. Sömmering* Abbildungen der menschlichen rgane des Geruchs. Fkft. a. M. 1809. Fol.

995. *J. F. Schröter* die menschl. Nase od. d. Geruchs-gan, nach Sömmerings Abbildungen. Leipz. 1812. Fol.

996. *H. Cloquet* Diss. sur les odeurs, sur le sens et organes de l'olfaction. à Par. 1815. 8. — Osphresio-gie, a. d. Franz. Weimar 1824. 8.

997. *D. F. Eschricht* de functionibus nervorum faciei et olfactus organi. Hafn. 1826. 8.

Mundhöhle.

998. *J. Weitbrecht* Obs. anat. ad historiam et actionem musculorum labiorum, ossis hyoidei, faucium, linguae, laryngis pertinentes, in Comment. Acad. Petropolit. Vol. IX

Gaumen.

999. *J. H. Slevogt* Diss. de gurgulione, Jen. 1696, i Haller Disp. an. T. I.

1000. *A. F. Walther* Pr. de uvula. Lips. 1729.

1001. *L. Heister* tonsillarum nova et accuratior d scriptio, in Ephem. N. C. Cent. III. IV.

1002. *J. B. Morgagni* in Epist. an. VIII. u. X.

1003. *J. D. Santorini* in Obs. anat. c. VII. u. Tabul posth. IV. VII.

1004. *B. S. Albin* de palato nonnulla, in Ann. ac. L. I

1005. *F. Rosenthal* über das von Jacobson in der N senhöhle entdeckte Organ, in Tiedemann und Treviran Zeitschrift, Bd. II. 1827.

1006. *K. H. Dzondi* die Functionen des weichen Ga mens. Halle 1831. 4.

Zunge.

1007. *M. Malpighi* Epistola de lingua, in Opp. u. Manget Bibl. Vol. II.

1008. *L. Bellini* gustus organon novissime depreh sum. L. B. 1711. 4. u. in Manget Bibl. Vol. II.

1009. *A. v. Leeuwenhoek* microscopical observati upon the tongue, in Phil. Trans. 1706. u. in Opp.

1010. *L. Heister* de lingua humana et praesertim ejus glandulis in superficie etc. in Act. ac. N. C. Vol. I

1011. *A. F. Walther* de lingua humana etc. Lip 1724. 4. u. in Haller Disp. an. Vol. I.

1012. *B. S. Albin* de periglottide et corpore ret lari linguae — de diversitate papillarum linguae huma — de fabrica papillarum linguae humanae — in Annot L. I.

1013. *H. F. Isenflamm* Diss. de motu linguae. Erlang. 3. 8.

1014. *E. Home* Observations on the structure of the gue, in Phil. Transact. 1803.

1015. *S. Th. Sömmering* Abbildungen d. menschlichen chmacks- und Sprachorgane. Fkft. a. M. 1806. Fol.

1016. *C. J. Baur* über den Bau der Zunge, in Meckels tsch. Archiv Bd. VII.

1017. *P. N. Gerdy* Recherches, discussions et propo- ons d'anatomie et de physiologie. à Paris 1823. 4.

1018. *P. F. Blandin* sur la structure de la langue, in hives gén. de Méd. 1823.

1019. *E. H. Weber* über die einfachen Drüschen oder ge der Zunge, in Meckels Archiv f. A. u. Ph. 1827.

1020. *J. E. Gabler* Diss. de linguae papillis earumque olucro tam sano quam aegrotante. Berol. 1827. 4.

1021. *R. Froriep* de lingua anatomica quaedam et se- otica. Bonn. 1828. 4.

1022. *P. Luchtmaus* Diss. de saporibus et gustu. L. 1758. 4.

1023. *B. Panizza* Ricerche sperimentali sopra i nervi. via 1834. 4.

Speicheldrüsen.

1024. *Th. Wharton* Adenographia (Nr. 540), c. 21.

1025. *J. van Horne* de ductibns salivalibus (4 Disp. p. J. Nuck, N. Stenonis u. a.). L. B. 1655, 1657 u. 1661.

1026. *N. Stenonis* Diss. de glandulis oris. Lgd. B. 1661. Observ. anat., quibus varia oris, oculorum et narium sa describuntur, novique salivae, lacrumarum et muci ites deteguntur etc. L. B. 1662. 12. u. in Mang. Bibl. T. II.

1027. *A. Q. Rivinus* de dyspepsia. Lips. 1678. 4.

1028. *C. Bartholinus* de ductu salivali hactenus non scripto observatio anat. Havn. 1684. 4.

1029. *A. Nuck* Sialographia. Lgd. B. 1695. 8.

(Streitschriften über neue Speichelgänge von A. Vater, F. Walther (Nr. 1011), L. Heister (Nr. 1010), G. D. schwitz, A. v. Haller (opp. min. T. I.) u. Ch. J. Trew.)

1030. *J. B. de Siebold* Historia systematis salivalis ysiologice et pathologice considerati. Jen. 1797. 4.

1031. *E. H. Weber* über den Bau der Parotis des Menschen, in Meckels Arch. f. A. u. Ph. 1827.

1032. *L. Gmelin* (Analyse des Speichels) in Nr. 1232.

1033. *C. G. Mitscherlich* über die chem. Zusammensetzung des Speichels, in Rust's Magazin f. d. ges. Heilk. Bd. 38. Heft 3.

Schlundkopf.

1034. *J. B. Morgagni* in Epist. an. VIII. X. XI.

1035. *J. D. Santorini* in Obs. an. c. 7. — Tab. post. VI.

1036. *J. Weitbrecht* in Comment. academ. Petropol. Vol. IX. (Nr. 998.)

1037. *J. G. Haase* Myotomiae specimen, quo muscul. pharyngis etc. continentur. Lips. 1784. 4.

1038. *J. Sandifort* deglutitionis mechanismus vertical sectione narium, oris, faucium illustratus. L. B. 1805. 4.

Kehlkopf.

1039. *H. Fabricius ab Aquapendente* in Nr. 748.

1040. *J. Casserius* de vocis auditusque organis histori anat. Ferr. 1600. Fol.

1041. *L. Heister* de interiore laryngis facie et prae sertim ejus ventriculis, in Acta Ac. Nat. Cur. Vol. I.

1042. *J. B. Morgagni* in Advers. I.

1043. *J. D. Santorini* de larynge, in Obs. an. c. V.

1044. *J. G. Günz* Obs. sur la cartilage cricoide — Obs. sur quelques muscles du larynx etc. in Mém. de mat. et de phys. Vol. I.

1045. *J. Weitbrecht* Obs. an. ad historiam musculoru etc. (Nr. 998) — De pituita glutinosa laryngis, in Com. a Petropol. Vol. XIV.

1046. *F. Vicq. d'Azyr* Mém. sur la structure des o ganes, qui servent à la formation de la voix, in Mém. l'ac. de Paris 1779.

1047. *A. Richerand* Recherches sur la grandeur de glotte, in Mém. de la soc. d'émulation Vol. III.

1048. *S. Th. Sömmering* (Nr. 1015).

1049. *F. Magendie* Mémoires sur l'usage de l'épiglo dans la déglutition. à Par. 1813. 8. Deutsch von Dittm Bremen 1814. 8.

1050. *L. Mende* über die Bewegung der Stimmritze
n Athemholen — und die Verrichtung des Kehldeckels.
ifswalde 1816. 8.

1051. *C. T. F. Reichel* de usu epiglottidis. Berol. 1816.

1052. *F. G. Theile* Diss. de musculis nervisque laryn-
. Jen. 1825. 4. c. tab.

1053. *D. Dodart* Mém. sur les causes de la voix de
mme et des différents tons, in Mém. de l'acad. de Par.
0. Supplémens, das. 1706. 1707.

1054. *A. Ferrein* de la formation de la voix dans
mme, in Mém. de l'ac. de Paris 1745.

1055. *R. A. Vogel* de larynge humano et vocis forma-
ie, in Opusc. Gött. 1768. 4.

1056. *G. R. Lefebure* Remarques phys. sur les organes
la voix et sur l'intonation. à Paris 1789. 8.

1057. *J. Beattie* the theory of language. Lond. 1789.
ol. 8.

1058. *W. van Kempelen* Mechanismus der menschl.
nme etc. Wien 1791. 8.

1059. *H. Dutrochet* Essai sur une nouvelle théorie
la voix. à Paris 1806. 4.

1060. *C. F. S. Liskovius* Theorie d. Stimme. Leipz.
4. 8.

1061. *F. Savart* Mémoire sur la voix humaine, in
gendie Journal de phys. Tom. V. Annales de chimie
le phys. Tom. XXX.

1062. *F. Bennati* Études physiol. et pathol. sur les or-
es de la voix humaine. à Paris 1833. 4.

Schilddrüse.

1063. *P. Evertzen* Diss. de glandula thyreoidea. Lgd.
1708. 4. u. in Haller Disp. an. Vol. IV.

1064. *J. D. Santorini* in Obs. an. c. VI.

1065. *J. B. Morgagni* in Epist. an. IX.

1066. *P. Lalouette* Recherches anatom. sur la glande
yréoide, in Mém. de math. et de phys. prés. à l'acad. de
r. Vol. I. 1750.

1067. *J. G. Günz* Obs. an. sur la glande thyr., ebend.

1068. *J. A. Schmidtmüller* über die Ausführungsgänge
r Schilddrüse. Landsh. 1804. 4.

1069. *J. F. Meckel* über die Schilddrüse, Nebennieren u. einige ihnen verwandte Organe, in dess. Abh. (Nr. 162.)

1070. *B. Hofrichter* über den Nutzen der Schilddrüse, in Meckels deutsch. Archiv. Bd. VI.

1071. *A. G. Hedenus* Tractatus de glandula thyreoidea tam sana quam morbosa etc. Lips. 1822. 4.

1072. *G. Moehring* Anatomia normalis, physiologica et pathologica glandulae thyreoideae, Berol. 1825. 8.

Respirationsorgane.

1073. *H. Fabricius ab Aquapendente* de respiratione et ejus instrum. lib. II. Patav. 1615. 4. u. in Opp. (Nr. 123.)

1074. *M. Malpighi* de pulmonibus epist. II. ad Borellum, in Opp. u. in Manget Bibl. an. Vol. II.

1075. *Th. Bartholinus* de pulmon. substantia et motu diatribe, acc. M. Malpighi de pulmonibus observ. anatom. Havn. 1663. 8.

1076. *Th. Willis* de respirationis organis et usu, in Opp. omn. Gen. 1676. 4. u. in Manget Bibl. Vol. II.

1077. *A. Kaauw Boerhaave* perspiratio etc. (Nr. 474)

1078. *J. A. Wohlfahrt* Dissert. de bronchiis vasisque bronchialibus. Hal. 1748. u. in Haller Disp. an. Vol. VI

1079. *A. Portal* Obs. sur la structure et sur les altérations des glandes du poumon etc. in Mém. de l'acad. d Paris, 1780.

1080. *G. F. Hildebrandt* Diss. de pulmonibus. Göt 1783. 4.

1081. *S. Th. Sömmering* u. *F. D. Reisseisen* über d Structur, die Verrichtung und den Gebrauch der Lunge Zwei Preisschriften. Berl. 1808. 8.

1082. *G. Pearson* on the colouring matter of the bla bronchial glands and of the black spots of the lungs, Phil. Transact. 1813.

1083. *F. D. Reisseisen* Com. praem. orn. de fabri pulmonum c. tabb. VI. Berol. 1822. Fol.

1084. *F. Magendie* Mém. sur la structure du poum de l'homme etc. in dessen Journal de phys. exp. Vol. I.

1085. *E. Home* an examination into the structure the cells of the human lungs etc., in Phil. Transact. 18

Respiration.

1086. *R. Boyle* Experimenta nova phys. math. de grate et elatere aëris. Oxon. 1661. 4.

1087. *J. Swammerdam* de respiratione usuque pulmon. B. 1667. 8.

1088. *J. Mayow* Tractatus de respirat. Oxon. 1668. 8. Tractatus V. Oxon. 1674. 8.

1089. *J. A. Borelli* de motu animalium (Nr. 730).

1090. *St. Hales* in statical essays (Nr. 229).

1091. *G. E. Hamberger* (Nr. 693).

1092. *A. de Haller* (Nr. 694).

1093. *Lavoisier* Expériences sur la respiration des animaux, u. m. a. Mém. in Mém. de l'acad. de Par. 1777. 1780. 82. 1783.

1094. *Lavoisier et Seguin* Obs. gén. sur la respiration la chaleur animale, in Mém. de l'ac. de Par. 1789. 1790.

1095. *R. Menzies* Diss. de respiratione. Edinb. 1790. 4.

1096. *H. Davy* Researches chemical and physiological efly concerning nitrous oxyde etc. London 1800. 8. — utsch, Lemgo 1814. 8.

1097. *L. Spallanzani* Mém. sur la respiration, trad. J. Senebier, à Genève 1803. 8. — Deutsch, Leipz. 1808.

1098. *J. Bostock* an essay on respiration. Liverpool 04. 8. Deutsch v. Nolde, Erf. 1809. 1817.

1099. *Allen* and *Pepys* on respiration, in Phil. Trans. 08. 1809. Meckels deutsch. Arch. Bd. III.

1100. *W. Prout* in Thomsons Annals of philosophy l. II. XIII.

1101. *C. F. Nasse* üb. d. Athmen, in Meckels deutsch. chiv Bd. II.

1102. *E. F. G. Herbst* über die Capacität der Lungen, Meckels Arch. f. A. u. Ph. 1828.

Vgl. auch die Lehrbücher der Chemie von L. Gmelin id Berzelius, und Tiedemanns, Gmelins u. Mitscherlichs ersuche über das Blut in Tiedem. u. Treviranus Zeitschr. d. V. Heft 1. 1834.

Brusthöhle und Brustfelle.

1103. *G. Hoffmann* de thorace ejusque partibus commentarius. Fcft. 1627. 4.

1104. *J. D. Santorini* in Obs. an. c. VIII.

1105. *J. E. Hebenstreit* de mediastino postico. Lips. 1743. 4.

1106. *C. F. Ludwig* Icones cavitatum thoracis et abdominis a tergo apertarum. Lips. 1780. Fol.

1107. *A. W. Otto* von der Lage der Organe in der Brusthöhle, mit Abb. Breslau 1829. 4.

1108. *J. H. Schürmayer* die Krankheiten der Pleura, erste (pathol. anatom.) Abtheilung. Karlsr. 1830. 8.

Thymus.

1109. *J. G. Duvernoy* Obs. circa structuram thymi in Comment. Petrop. Vol. VII.

1110. *A. L. de Hugo* Diss. de glandulis et speciatim de thymo. Gött. 1740. 4.

1111. *W. Hewson* Account of the use of the spleen thymus, lymphatic glands etc., in Edinburgh med. and phil los. Comment. Vol. I.

1112. *J. F. Meckel* (Nr. 1069).

1113. *S. C. Lucae* anat. Untersuchungen des Thymus 2 Hfte. 4. Fkft. a. M. 1811. 1812.

1114. *F. W. Becker* Diss. de glandulis thoracis lymphaticis atque thymo, c. tabb. Berol. 1826. 4.

1115. *A. Cooper* the anatomy of the Thymus Gland London 1832. 4.

1116. *F. C. Haugsted* Thymi in homine ac per series animalium descriptio anat. phys. Hafn. 1832. 8.

Verdauungsorgane.

Schlund, Magen, Darmkanal.

1117. *H. Fabricius ab Aquapendente* de gula, ventriculo et intestinis. Pat. 1618. u. in Opp. (Nr. 123.)

1118. *Th. Willis* primarum viarum descr., in Mang Bibl. Vol. I. u. in Opp. Lond. 1679. Fol.

1119. *F. Glisson* Tractatio de ventriculo et intestin Lond. 1676. 4. u. in Manget Bibl. Vol. I.

1120. *D. Dodart* Observation sur l'usage du Coecu in Mém. de l'ac. de Paris Vol. I.

1121. *W. Cole* on the structure of the fibres of the estines, in Phil. Transact. 1676.

1122. *J. T. Kerkring* in Spicileg. anat. Amst. 1670. r. 120.)

1123. *J. C. Peyer* de glandulis intestinorum. Scaph. 77, u. in Manget Bibl. Vol. I. u. Miscell. ac. N. C. 1687.

1124. *J. C. Brunner* (*a Brunn*) novarum glandularum estinalium descriptio, in Miscell. ac. N. C. 1686. — andulae duodeni seu pancreas secundarium. Fcoft. et idelb. 1725. 4.

1125. *J. C. Wolf* Epist. an. de intestinorum tunicis, ndulis etc., cum *F. Ruyschii* responsione, in F. Ruysch p. (Nr. 127.)

1126. *A. a Leeuwenhoek* microscopical observations the bloodvessels and membranes of the intestines, in il. Transact. 1706, u. in Arcana nat. (Nr. 126.)

1127. *J. B. Winslow* Obs. sur la membrane interieure l'oesophage, in Mém. de l'acad. de Paris 1712.

1128. *J. Fantoni* de gula et ventriculo — de intesti- — in Diss. VII. prioribus renovatis. Turin 1745. 8.

1129. *L. Heister* pylori delineatio et descriptio, in hem. ac. N. C. cent. V. — Diss. de valvula coli, in ller Disp. an. Vol. I.

1130. *J. B. Morgagni* in Adv. III. u. in Epist. XIV.

1131. *L. Helvetius* Observations sur la membrane in- ne des intestines grêles etc., in Mém. de l'ac. de Paris 31.

1132. *A. Vater* resp. Berger Dissert. qua novum bilis erticulum proponit. Viteb. 1720. — Haller Disp. an. l. III.

1133. *C. B. Albin* Specimen anat. exhibens novam in- tinorum tenuium hominis descriptionem. L. B. 1722. 4.

1134. *J. D. Santorini* Tabula XII., in Tabb. posth. r. 134.)

1135. *D. G. Galeati* de cribriformi intestinor. tunica de carnea ventriculi et intestinorum tunica — in Com. non. Vol. I. II. 1731. 1746.

1136. *A. Monro I.* the description and uses of the in- stinum duodenum, in Edinburgh. med. essays and observ. ol. IV. 1735.

1137. *B. S. Albin* de arteriis et venis intestinorum hominis c. icon. col. d. L. B. 1737. 4. — De intestinorum tunica nervea et cellulosa — de valvulis intestinorum — de modo, quo arteriae et venae per tunicas intestinorum pertinent — de valvula coli — in Annot. ac. L. II. III.

1138. *A. de Haller* de valvula coli etc. in Opp. min. Vol. I.

1139. *H. de Bosch* Dissert. de intestinorum crassorum usu et actione. L. B. 1743. 4.

1140. *J. G. Duvernoy* de ventriculo et intestinis, in Com. ac. Petropol. Vol. IV.

1141. *J. N. Lieberkühn* Dissert. de fabrica et actione villorum intestin. tenuium hominis, c. icon. L. B. 1745. 4. — Diss. quatuor, cur. J. Sheldon, c. figg. Lond. 1782. 4.

1142. *J. Vosse* Diss. de intestino caeco ejusque appendice vermiformi. Gött. 1759. in Haller Disp. an. Vol. VII.

1143. *E. J. Bertin* Description des plans musculeux de la tunique charnue de l'estomac, in Mém. de l'acad. de Paris 1761.

1144. *H. P. Leveling* Pylorus anatomico-physiologice consideratus. Argent. 1764. 4. u. in Sandifort Thesaurus Vol. III.

1145. *J. M. Roederer* de valvula coli spec. in. Argent. 1768. 4.

1146. *E. Sandifort* Tabulae intestini duodeni. L. B. 1780. 4.

1147. *J. Bleuland* Obs. de sana et morbosa oesophagi structura, c. tab. L. B. 1785. — Icon tunicae villosae intestini duodeni. Traj. ad Rh. 1789. 4. — Vasculorum in intestinorum tenuium tunicis descriptio c. icon. Traj. ad Rh. 1797. 4.

1148. *B. E. Beling* Disq. de intestino recto c. h. anat. path. 1786. 8.

1149. *J. D. Metzger* Ventriculus humanus anatom. et phys. consideratus, in Exercit. acad. anat. et phys. argum. (Nr. 159.)

1150. *R. A. Hedwig* Disquisitio ampullarum Lieberkühnii physico-microscopica. Lips. 1797. 4. c. tabulis. — Bemerkungen über die Darmzotten, in Isenflamm u. Rosenmüllers Beiträge n (Nr. 167) Bd. II.

1151. *K. A. Rudolphi* Beob. über die Darmzotten, in at. phys. Abh. (Nr. 161) u. in Reils Archiv Bd. IV. — ıer die Peyerschen Drüsen, in anat. phys. Abh.

1152. *V. Malacarne* sull' esofago, sulle intestine e so- a alcune valvule del tubo alimentare. Padov. 1803. 8.

1153. *J. C. G. Meissner* praes. *B. W. Seiler* Dissert. ıatomen, physiologiam et pathologiam ventriculi sistens. ıteb. 1811. 4.

1154. *J. Jelloly* Observations on the vascular appea- ıce in the human stomach etc. in Med. chir. Transact. ol. IV. 1813.

1155. *G. v. d. Busch* Dissert. anat. phys. de intestino ıeco ejusque processu vermiformi. Gött. 1814. 4. c. tabb.

1156. *E. Home* Observations on the structure of the ımachs of different animals — on the gastric glands of ı human stomach — in Phil. Transact. 1817. Meckels ıtsch. Arch. Bd. IV.

1157. *H. Bürger* Spec. in. continens villorum intesti- ılium examen microscopicum. c. tabb. Hal. 1819. 8.

1158. *S. Th. Sömmering* Bemerkungen über den Ma- ı des Menschen, in Denkschriften der k. Akad. d. Wiss. München. 1821—1822. Bd. VIII.

1159. *A. Meckel* über die villosa des Menschen und ıiger Thiere, in Meckels deutsch. Arch. Bd. V.

1160. *H. Robbi* der Magen, seine Structur und Ver- ıhtungen. Leipz. 1823. 8.

1161. *C. Billard* de la membrane muqueuse gastro- ıestinale etc. Paris 1825. 8.

1162. *Lelut* (über die Drüsen des Schlundes) im Jour- l hebdomadaire. 1833. Mai.

1163. *J. Müller* (über die Darmzotten und Grübchen) Poggendorfs Annalen 1832. Heft 8.

L e b e r.

1164. *F. Glisson* Anatomia hepatis etc. Lond. 1654. 8. in Manget Bibl. Vol. I.

1165. *M. Malpighi* de viscerum structura exercitatio ınon. 1666. 4. in Opp. (Nr. 122) und in Manget Biblioth. ol. I.

1166. *A. Vater* (Nr. 1132).

1167. *J. Fantoni* de jecore, liene et pancreate, in Diss. (Nr. 1128.)

1168. *J. J. Huber* Animadversiones de vesicula fellea, de vena umbilicali atque de lig. suspensorio hepatis, in Act. ac. N. C. Vol. IX.

1169. *J. B. Morgagni* in Advers. III. Epist. anat. I. II.

1170. *J. D. Santorini* in Tabb. post. Tab. XI.

1171. *J. C. Bianchi* Historia hepatica, ed. III. Genev. 1725. 2 Vol. 4.

1172. *A. Ferrein* Observ. sur la structure des viscères nommés glanduleux, et particulièrement sur celle des reins et du foie, in Mém. de l'ac. de Paris 1733. 1749.

1173. *A. Portal* Obs. sur la situation du foie, in Mém. de l'ac. de Paris. 1773.

1174. *J. F. Lobstein* Diss. de hepate. Argent. 1775. 4.

1175. *F. Vicq. d'Azyr* Obs. sur les glandes de la vesicule de fiel, in Hist. et mém. de la soc. roy. de méd. de Paris 1777. 1778.

1176. *C. F. Wolff* de vesiculae felleae humanae ductusque cystici et choledochi superficiebus internis, — de usu plicarum vesiculae felleae — in Act. ac. Petrop. 1779 P. I. II.

1177. *R. T. Loewel* praes. *J. C. A. Meyer* Diss. de ductibus hepatico-cysticis. c. tab. Traj. ad Vind. 1783. 4.

1178. *F. A. Walter* de hepate in Annot. ac. (Nr. 153.

1179. *W. Saunders* a treatise on the structure, oeconomy and diseases of the liver, together with an inquiry into the properties and component parts of the bile and biliary concretions. Lond. 1793. — Deutsch, Dresd. u. Leipz. 1795. 8.

1180. *J. H. F. Autenrieth* über die Rindensubstanz der Leber, in Reils Archiv Bd. VII.

1181. *J. M. Mappes* Diss. de penitiori hepatis humani structura. Tub. 1817. 8. u. in Meckels d. Archiv Bd. VI.

1182. *F. Kiernan* the anatomy and physiology of the liver, in Phil. Transact. 1833. Part. II. London med. Gazette January 1835.

1183. *C. H. Schulz* über das Pfortaderblut, in Rust Magazin f. d. g. H. Bd. 44. Heft 1.

Pancreas.

1184. *J. G. Wirsing* Figura ductus noviter in pan-
ate observati. Padov. 1643. Fol.
1185. *R. de Graaf* Tractatus de succi pancreatici na-
ı et usu. L. B. 1664. 12. Manget Bibl. Vol. I.
1186. *J. C. Brunner* Experimenta nova circa pancreas
Amst. 1682. 8. — Lgd. B. 1722. 8.
1187. *J. Fantoni* (Nr. 1128).
1188. *J. D. Santorini* in Tabb. posth. Tab. XIII.
1189. *A. C. Mayer* in Meckels deutsch. Arch. Bd. I. III.
1190. *F. Tiedemann* über die Verschiedenheiten des
führungsganges der Bauchspeicheldrüse, in Meckels d.
h. Bd. IV.
1191. *Barruel* (Analyse des Succus pancreat.), Müllers
hiv 1834. Heft 2.

Milz.

1192. *M. Malpighi* (Nr. 1165).
1193. *F. Ruysch* Epist. resp. ad J. J. Campdomercum,
glandulis, fibris cellulisque lienalibus, in Opp. (Nr. 127.)
1194. *J. Fantoni* (Nr. 1167).
1195. *A. van Leeuwenhoek* microscopical observ. on
structure of the spleen etc., in Phil. Transact. 1706.
1196. *J. Douglas* Observation on the glands in the
ıan spleen etc. in Phil. Transact. 1714.
1197. *J. T. Eller* Diss. de liene. L. B. 1716. in Hal-
Disp. an. Vol. III.
1198. *G. Stuckeley* the spleen, its description, uses
diseases. Lond. 1723. Fol.
1199. *J. Lieutaud* Obs. sur la grosseur naturelle de la
, in Mém. de l'ac. de Par. 1738.
1200. *B. S. Albin* de liene, in Annot. ac. Lib. VII.
1201. *J. M. F. de la Sône* Historia anat. de la rate,
Mém. de l'ac. de Paris 1754.
1202. *A. F. Hecker* (Nr. 272).
1203. *L. J. P. Assolant* Recherches sur la rate. à Par.
X. 8.
1204. *A. Moreschi* del vero e primario uso della milza.
l. 1803. 8. — Commentar. de urethrae corporis glandis-

que structura; acc. de vasorum splenicorum in animalibus constitutione. Mediol. 1817. Fol.

1205. *C. H. Schmidt* Com. de pathologia lienis per anatomen indagata. Gött. 1817. 4.

1206. *C. F. Heusinger* über den Bau und die Verrichtung der Milz. Thionv. 1817. 8.

1207. *F. Tiedemann* u. *L. Gmelin* Versuche über die Wege, auf welchen Substanzen aus dem Magen und Darmkanale in das Blut gelangen, über die Verrichtung der Milz u. die geheimen Harnwege. Heidelb. 1820. 8.

1208. *C. F. Hopfengärtner* Diss. sist. annot. ad structuram lienis. Tüb. 1821. 4.

1209. *E. Home* on the valves in the branches of the vas breve and on the structure of the spleen, in Philos. Transact. 1821.

1210. *Th. Hodgkin* on the uses of the spleen, in Edinburgh med. and surg. Journal, Vol. XVIII. 1822.

1211. *J. Müller* über die Structur der eigenthüml. Körperchen in der Milz einiger pflanzenfressender Säugethiere, in dessen Archiv f. A. u. Ph. 1834. Heft 1.

Verdauung.

1213. *A. Deusing* Exercitationes de nutrimenti in corpore elaboratione, chylificatione etc. Gron. 1660. 12.

1214. *J. Viridet* Traité des causes de la production du bon chyle. à Paris 1735. 2 Vol. 12.

1215. *A. Pitcairn* Diss. de motu, quo cibi in ventriculo rediguntur in formam sanguini reficiendo idoneum. L. B. 1693. 4.

1216. *J. Astruc* Traité de la digestion. à Toulouse 1714. 8.

1217. *P. Hecquet* Traité de la digestion. à Par. 1730. 2 Vol. 12.

1218. *B. Rush* Diss. de coctione ciborum in ventriculo. Edinb. 1768. 8.

1219. *E. Stevens* Diss. de alimentorum concoctione. Edinb. 1777. 8.

1220. *L. Spallanzani* Expérimens sur la digestion, trad. par Senebier. à Genève 1784. 8. Deutsch von Michael. Leipz. 1785. 8.

1221. *J. Hunter* in Obs. (Nr. 155.)

1222. *L. Brugnatelli* über die chem. Zergliederung Magensäfte, in Crells chem. Annalen, Beiträge Bd. I. 5 u. 1787.

1223. *B. Carminati* Ricerche sulla natura del suco rico. Milan. 1785. 8. — Deutsch, Wien 1785.

1224. *G. Fordyce* a treatise on the digestion and the d. Lond. 1796. 8. — Deutsch v. Michaelis. Leipz. 3. 8.

1225. *J. Dömling* ist die Leber Reinigungsorgan? en 1798. 8.

1226. *C. L. Werner* praes. *Autenrieth* Experimenta a modum, quo chymus in chylum mutatur. Tübingen 0. 8.

1227. *F. Hildebrandt* über den Zweck des Pancreas, Abh. der ph. med. Soc. zu Erlangen. Bd. I. 1810.

1228. *F. Magendie* Mémoire sur le vomissement. à Par. 3. 8.

1229. *W. Prout* Experiments on the gastric juice, in l. Transact. 1824.

1230. *Leuret et Lassaigne* Recherches phys. et chim. r servir à l'histoire de la digestion. à Par. 1825. 8.

1231. *F. Tiedemann* u. *L. Gmelin* die Verdauung nach rsuchen. Heidelb. 1826. 2 Bde. 4.

1232. *E. A. Lauth* du mécanisme, par lequel les ma-es alimentaires parcourent leur trajet de la bouche à us. à Strasbourg. 1833. 4.

1233. *W. Beaumont* Experiments and observations on gastric juice and the physiology of digestion. Boston. 4. 8. — Deutsch von Luden. Leipz. 1834. 8.

1234. *C. H. Schultz* de alimentorum concoctione ex-imenta. Berol. 1834. 4.

1235. *J. A. Eberle* Physiologie d. Verdauung. Würzb. 4. 8.

Über die Galle vgl. insb. Tiedemann u. Gmelin (Nr. 1231), rzelius u. L. Gmelins Lehrbücher der Chemie. Über die chaffenheit des Chylus, Untersuchungen von Emmert in ls Arch. Bd. VIII. Vauquelin, Marcet, Brande, in Meckels rch. Bd. II., Tiedemann u. Gmelin (Nr. 1231), J. Müller Poggendorf Annalen 1832. H. 8.

Harnwerkzeuge.

Nieren.

1237. *B. Eustachius* de renibus libellus. Ven. 1563. 4. u. in Opusc. (Nr. 108.)

1238. *L. Bellini* Exerc. an. de structura et usu renum. Flor. 1662. 4. — ed. Blasius, L. B. 1711. 4.

1239. *Olaus Wormius* Diss. de renum officio. Havn. 1669. 4.

1240. *M. Malpighi* de renibus in Exerc. de viscerum structura (Nr. 1165) Opp. (Nr. 122).

1241. *M. Tiling* Nephrologia. Fcft. a. M. 1709. 12.

1242. *J. Fantoni* de renibus et primum de succenturiatis, de ureteribus et vesica, in Diss. (Nr. 1128).

1243. *J. B. Morgagni* in Epist. an. XX.

1244. *W. Rutty* a treatise of the urinary passages. Lond. 1726. 4. Franz. Paris 1745. 8. Deutsch von Huth. Nürnb. 1759. 8.

1245. *E. J. Bertin* Mém. pour servir à l'histoire des reins, in Mém. de l'ac. de Paris, 1744.

1246. *A. Ferrein* Obs. sur la structure des viscères glanduleux etc. ebendas. 1749.

1247. *A. Schumlansky* Diss. de structura renum c. tabb. Argent. 1782. 4.

1248. *K. W. Eysenhardt* Diss. de structura renum obs. microscopicae. Berol. 1818. 4. u. in Meckels d. Archiv Bd. VIII.

1249. *E. Huschke* über die Textur der Nieren, in Isis 1828.

1250. *C. G. Gmelin* Diss. sistens analysin chemicam renum hominis, vaccae et felis. Tüb. 1814. 8.

Harnblase und Harnröhre.

1251. *A. Littre* Description de l'urétre de l'homme in Mém. de l'ac. de Paris 1700.

1252. *J. B. Morgagni* in Advers. I. III. IV.

1253. *J. D. Santorini* Tab. posth., Tab. XV.

1254. *J. Parsons* a description of the human urinary ıdder and parts belonging to it. Lond. 1742. 8. Deutsch t *Ruttys* Abh. (Nr. 1244).

1255. *A. F. Walther* Diss. de collo virilis vesicae etc. ps. 1745. 4. u. in Haller Disp. an. T. V.

1256. *J. P. Werne* Structura urethrae. L. B. 1752. 8.

1257. *J. Lieutaud* Obs. anat. sur la structure de la ssie, in Mém. de l'ac. de Paris 1753.

1258. *J. Weitbrecht* de figura et situ vesicae urinae, in Comment. Petropol. Vol. V.

1259. *B. S. Albin* de uracho pervio in provectioribus ıiltisque, in Annot. ac. L. I.

1260. *P. A. Böhmer* Epistola de uracho in adulto hoıne aperto. Hal. 1763. 4.

1261. *A. Portal* Mémoire sur la structure et sur les ages de l'ouraque dans l'homme, in Mém. de l'acad. de rris. 1769.

1262. *Ch. Bell* Account of the muscles of the ureters, Med. chir. Transact. Vol. III. — A treatise on the urera, vesica urinaria, prostata and rectum, with notes by *Shaw*. Lond. 1820. 8.

1263. *J. Wilson* Lectures on the structure and the ysiology of the male urinary and genital organs. Lond. 21. 8.

1264. *Amussat* in Archives gén. de Méd. 1824. Janv. ril.

1265. *L. Senn* Thèse sur diverses espèces de tailles rinéales. à Paris 1824. 8.

1266. *J. Leroy d'Etioles* Exposé de divers procédés ur guérir la pierre. à Paris 1825. 8.

H a r n.

1267. *Th. Willis* Diss. epist. de urinis, in Opp. Lond. 79. Fol.

1268. *L. Bellini* de urinis et pulsibus. Bonon. 1683. 4.

1269. *E. H. Wedel* Physiologia urinae. Jen. 1703. 4.

1270. *F. Lauth* praes. *Spielmann* Diss. de analysi urie et acido phosphorico. Argent. 1781. 4.

1271. *A. F. Fourcroy u. N. Vauquelin* in Mém. de Institut national, sc. math. et phys. T. IV. — über die

natürl. chem. u. medic. Geschichte des menschl. Harns, in Harles u. Ritter neuem Journal der ausl. med. ch. Journalistik. Bd. VI. VII. 1806. 1807.

1272. *W. H. Wollaston* in Philos. Transact. 1810. Meckels d. Arch. Bd. II.

1273. *P. H. Nysten* in Recherches de physiologie et de chimie experimentales. à Paris 1811. 8.

1274. *Ch. Chossat* in Magendie Journal de phys. T. V.

1275. *W. Prout* in Med. chir. Transact. Vol. VIII. 1817. Meckels d. Arch. Bd. IV.

1276. *Tiedemann u. Gmelin* (Nr. 1207).

1277. *F. Wöhler* Versuche über den Übergang von Materien in den Harn, in Tiedemann u. Treviranus Zeitschrift Bd. I.

1278. *Berzelius u. Wöhler's* Untersuchungen s. in Berzelius Lehrb. d. Chemie Bd. IV.

Vgl. auch die Schriften über Harnsteine, insbesondere *A. Marcet* Essay on the chemical history and med. treatment of calculous discorders, Lond. 1817. 8. *F. Magendie* Recherches physiol. et méd. sur les causes, les symptômes et le traitement de la gravelle, à Par. 1818. 8. *W. Prout* a practical inquiry into the nature and treatment of calculus. Lond. 1821. 8.

Nebennieren.

1279. *C. L. Welsch* Examen renum succenturiatorum. Lips. 1691. 4.

1280. *A. M. Valsalva* Diss. ad excretorios ductus renum succenturiatorum, in Opp. (Nr. 137).

1281. *G. B. Morgagni* in Epist. XX.

1282. *J. Fantoni* (Nr. 1242).

1283. *J. G. Duvernoy* de glandulis renalibus Eustachii, in Comment. Petropol. Vol. XIII. 1751.

1284. *J. F. Meckel* (Nr. 1069).

1285. *Jacobson et Reinhard* Recherches sur les capsules surrénales, in Bullet. des scienc. méd. 1824. I.

1286. *G. Heim* Diss. de renibus succenturiatis. Berol. 1824. 4.

Geschlechtsorgane.

Beider Geschlechter.

1287. *W. Rolfink* Ordo et methodus generationi dica-
um partium per anatomen cognoscendi fabricam. Jen.
64. 4. — De sexus utriusque partibus genitalibus speci-
n. Lips. 1675. 12.

1288. *R. de Graaf* Histoire anat. des parties génitales
l'homme et de la femme, trad. p. N. P. av. pl. à Bâle
9. — Epist. ad L. Schacht, de nonnullis circa partes
itales inventis novis, — partium genitalium defensio —
Opp. (Nr. 130).

1289. *J. v. Horne* Prodromus obs. suarum circa par-
genitalés in utroque sexu. L. B. 1668. 12.

1290. *L. Barles* Les nouvelles découvertes sur les par-
princip. de l'homme et de la femme. à Lyon 1673. 8.
Traité raisonné sur la structure des organes des deux
es, destinés à la génération. à Paris 1696. 12.

1291. *J. B. Morgagni* in Advers. I. III. IV.

1292. *A. C. Gautier d'Agoty* Anatomie des parties de
génération de l'homme et de la femme. à Paris 1773.
Vol. Fol.

1293. *J. C. Rosenmüller* über die Analogie der männl.
weibl. Geschlechtstheile, in Abh. der phys. med. Soc. zu
langen Bd. I. 1810.

1294. *A. Meckel* Diss. de genitalium et intestinorum
logia. Hal. 1810. 4. u. in Meckels Beiträgen (Nr. 162)
. II.

Männliche Geschlechtstheile.

1295. *J. T. Schenk* resp. *Schröter* Diss. de partibus
nerationi inservientibus masculis. Jen. 1662. 4.

1296. *R. de Graaf* de virorum organis generationi
servientibus. c. fig. L. B. 1668. 8. u. in Opp. u. Manget
bl. Vol. I.

1297. *J. D. Santorini* de virorum naturalibus, in Obs.
. (Nr. 134).

1298. *J. G. Röderer* Pr. de genitalibus virorum. Gött. 1758. 4.

1299. *S. Götz* Prodr. neurologiae partium genit. masculinarum. Erlang. 1823. 4.

Hoden, Nebenhoden, Samenleiter, Samenbläschen.

1300. *M. Schurig* Spermatologia historico-medica. Fcft. a. M. 1720. 4.

1301. *B. S. Albin* de teste humano — de epididymide — de vasis deferentibus, vesiculis seminalibus etc. — in Annot. ac. Lib. II. IV.

1302. *A. v. Haller* Obs. de vasis seminalibus. Gött. 1745. 4. in Opp. min. Tom. II.

1303. *F. Fontana* Osserv. intorno al testiculo umano, in Atti di Siena, Vol. III. — Lettera sul' epididimide. Siena 1767. 8.

1304. *A. Monro I.* Remarks on the spermatic vessels and scrotum with its contents, in Edinburgh med. essays and obs. Vol. V.

1305. *A. Monro II.* Description of the seminal vessels in Edinb. essays and obs. phys. and litterary, Vol. I. — Diss. de testibus et de semine in variis animalibus. c. tabb. Edinb. 1755. 8. (in Smellie's Thes. Diss. Vol. II.) Observations anatomical and physiol. etc. Edinb. 1758. 8.

1306. *J. Warner* Account of the testicles etc. Lond. 1774. 8.

1307. *J. Hunter* Obs. on the glands called vesiculae seminales, in Obs. (Nr. 155).

1308. *G. Prochaska* Observationes de vasis seminalibus etc. in Act. ac. med. chir. Vindob. Vol. I. 1788.

1309. *J. Brugnone* Observations an. sur les vesicules seminales, in Mém. de l'ac. de Turin 1794.

1310. *A. Cooper* Observations on the structure and diseases of the testis, with plat. Lond. 1830. 4.

1311. *E. A. Lauth* Mém. sur le testicule humain, Mémoires de la soc. de l'hist nat. de Strasbourg. Tom. Liv. 2. 1833.

Hüllen der Hoden.

1312. *J. Gaubius* u. *J. J. Rau* Epistolae de artificiosa oti humani induratione etc. — de inventoribus septi oti etc. — *F. Ruysch* Responsiones — in F. Ruysch p. (Nr. 127).

1313. *J. E. Neubauer* Dissert. de tunicis vaginalibus is et funic. sperm. Giess. 1767. 4. u. in Opp. (Nr. 154).

1314. *J. B. Palletta* nova gubernaculi testis Hunteriani tunicae vagin. an. descr. Mediol. 1777. — *J. Brugnone* testium in foetu positu etc. L. B. 1788. — in Nr. 158.

1315. *G. Tumiati* Ricerche anat. intorno alle toniche testicoli. in Venez. 1790. 8. u. in Kühn u. Weigel ital. d. Bibl. Bd. II.

Vgl. die Schriften über die Entwickelung der Genita- u. Descensus testiculi (Bd. II): u. die Schriften Nr. l. 716. 717. 721.

Prostata und Cowpersche Drüsen.

1316. *W. Cowper* Glandularum quarundarum nuper ectarum, ductuumque earum excretoriorum descr. et fig. nd. 1702. 4. — Phil. Transact. 1699.

1317. *J. G. Busse* Adstatae viriles. Erford. 1715. 4.

1318. *L. Terraneus* de glandulis universim et spec. ad thram virilem novis. L. B. 1729. 8.

1319. *G. A. Haase* de glandulis Cowperi mucosis com- ntarius, c. tab. Lips. 1803. 4.

1320. *E. Home* on the discovery of a middle lobe of prostata, in Phil. Transact. 1806. — Pract. obs. on treatment of the prostate gland. Lond. 1822. 2 Vol. 8.

1321. *Ch. Bell* in Nr. 1262.

Penis.

1322. *F. Ruysch* Glandis in pene vera structura noviter tecta, in Opp. (N. 127).

1323. *B. S. Albin* de Ruyschiano involucro penis ner- so externo — de tunica cellul. penis — de integumentis andis penis — in Annot. ac. L. I. III. IV.

1324. *J. l'Admiral* Icon penis humani cera praeparati. nst. 1741. 4.

1325. *J. Hunter* in Observ. on certain parts (Nr. 155).

1326. *T. G. A. Roose* über das Anschwellungsvermögen des männlichen Gliedes, in dessen physiol. Untersuch. Braunschw. 1796. 8.

1327. *J. H. Thaut* Diss. de virgae virilis statu sano et morbosa. Virceb. 1808. 4. Deutsch v. Eyerel. Wien 1813.

1328. *F. Tiedemann* über den schwammigen Körper der Ruthe des Pferdes, in Meckels deutsch. Arch. Bd. II.

1329. *A. Moreschi* Commentar. de urethrae corporis glandisque structura. Mediol. 1817. Fol.

1330. *B. Panizza* in Osservazioni antropo-zootomico-fisiologiche, c. tav. Pavia 1830. Fol.

1331. *J. Müller* Anat. Notizen in d. Medic. Vereinszeitung, Berl. 1833. Nr. 48. — Artikel Erectiles Gewebe im Encykl. Wörterb. der med. Wissensch. Berlin. Bd. XI. 1834. — Entdeckung der bei der Erection des männlichen Gliedes wirksamen Arterien, in dess. Archiv f. A. u. Phys. 1835. Heft 2. — Jahrsbericht, das. Heft 1. — Unters. üb. d. cavernösen Nerven des männl. Gliedes, in d. Medic. Vereinszeitung. Berlin 1835. Nr. 18.

1332. *C. F. T. Krause* Anatomische Bemerkungen, in Heckers Annalen d. ges. Heilk. 1834. Febr.

1334. *A. F. J. C. Mayer* Über die Struktur des Penis in Frorieps Notizen 1834. Nr. 883.

Samen.

1335. *D. Assmann* Diss. de seminis virilis generation et vitiis. Traj. ad Rh. 1696. 4.

1336. *A. v. Leeuwenhoek* in Arcan. (Nr. 126).

1337. *M. Schurig* Spermatol. (Nr. 1300).

1338. *J. L. v. d. Asch* Diss. de natura seminis obs micr. indagata. Gött. 1756. 4.

1339. *L. Spallanzani* Opuscoli di fisica animale e ve getabile. Med. 1776. 8. Vol. II.

1340. *W. F. v. d. Gleichen*, gen. *Rußwurm* Abh. übe die Samen- und Infusionsthierchen. Nürnb. 1778. 4.

1341. *Prévost u. Dumas* (über die Samenthierche mehrerer Thiere) in Annales des sc. nat. Tom. III. 182 — Meckels deutsch. Arch. Bd. VIII.

1342. *J. J. v. Czermak* Beiträge zur Lehre von den ›ermatozoen. Wien 1833. 4.

1343. *Vauquelin* (chem. Analyse) in Annales de chim. de phys. Tom. IX.

Weibliche Geschlechtstheile.

1344. *G. Harvey* Exerc. de generatione animalium etc. ›nd. 1651. 4.

1345. *R. de Graaf* de mulierum organis generationi ›servientibus tractatus novus, c. fig. L. B. 1672. 8. u. in anget Bibl. Vol. I.

1346. *J. Palfyn* Desc. anat. des parties de la femme i servent à la génération etc. à Leide 1708. 4.

1347. *J. D. Santorini* in Obs. an. c. XI.

1348. *M. Schurig* Muliebria, h. e. part. genitalium ilieb. consideratio. Dresd. et Lips. 1729. 4.

1349. *A. Portal* Observ. sur la structure des parties la génération de la femme, in Mém. de l'acad. de Paris 70.

1350. *J. G. Walter* Betr. über die Geschlechtstheile s weibl. Geschl. Berl. 1726. 4. — 1793. 4.

1351. *J. H. F. Autenrieth* üb. die eigentl. Lage der neren weibl. Geschlechtstheile, in Reils Arch. Bd. VII.

Vgl. die ausführlicheren Lehrbücher der Entbindungs-nst, u. d. Abb. v. Maygrier, Kilian, Siebold u. a.

Eierstöcke.

1352. *G. Fallopia* in Obs. anat. (Nr. 106).

1353. *M. Malpighi* Epistol. in Opp. (Nr. 122).

1354. *N. Stenonis* Obs. an. spectantes ova viviparorum, Act. soc. Havn. Vol. II. u. Manget Bibl. Vol. I.

1355. *C. Bartholin* de ovariis mulierum et generatio-s historia epistolae. Rom. 1677. Amst. 1678. in Manget ibl. Vol. I. — De tubis uteri, Lgd. B. 1684. 12.

1356. *C. Drelincourt* de feminarum ovis hist. et phys. cubrationes. L. B. 1684. 12.

1357. *A. Littre* Conjecture sur l'ovaire etc. in Mém. l'ac. de Paris 1703.

1358. *D. G. Galeati* de muliebrium ovariorum vesiculis, in Commentar. Bonon. Vol. I.

1359. *H. A. Wrisberg* Exper. et obs. anat. de utero gravido, tubis, ovariis etc. Gött. 1782. 4. und in Sylloge (Nr. 156).

1360. *J. Brugnone* de ovariis eorumque corpore luteo obs. anat. in Mém. de l'acad. de sc. de Turin 1790. u. in Kühn u. Weigel ital. Bibl. Bd. III.

1361. *J. Haighton* über die Befruchtung der Thiere (Phil. Transact. 1797) in Reils Archiv Bd. III.

1362. *W. Cruikshank* Versuche u. s. w. ebendas.

1363. *T. G. A. Roose* üb. d. gelben Körper im weibl. Eierstocke. Braunschw. 1800. 8. u. in dessen Beiträgen zur öff. u. ger. Arzneikunde. Stück 2. 1802.

1364. *E. Home* on corpora lutea, in Phil. Transact. 1819. Meckels d. Arch. Bd. V.

1365. *Prévost u. Dumas* de la génération dans les Mammifères etc. in Annales des sc. natur. T. III. 1824.

1366. *J. E. Purkinje* (Blumenbachio gratulatur) Symbolae ad ovi avium historiam ante incubationem. Vratisl. 1825. 4. c. tabb. — Artikel Ei im Encykl. Wörterb. der med. Wissensch. Berlin. Bd. X. 1834.

1367. *C. E. v. Baer* de ovi mammalium et hominis genesi epistola. c. tab. Lips. 1827. 4. — Commentar zu dieser Schrift in Heusinger Zeitschrift für organ. Physik Bd. II. Heft 2.

1368. *B. W. Seiler* die Gebärmutter und das Ei des Menschen in den ersten Schwangerschafts-Monaten. m. K. Dresd. 1832. Fol.

1369. *Coste* Recherches sur la génération de Mammifères, suivies par des recherches sur la formation des embryons par Coste et Delpech. à Paris 1834. 4.

1370. *A. Bernhardt* Symbolae ad ovi mammalium historiam ante praegnationem. c. tab. Vratisl. 1834. 4.

1371. *G. Valentin* Handb. der Entwickelungsgeschichte des Menschen. Berlin 1835. 8.

1372. *R. Wagner* über das Keimbläschen, in Müllers h. f. A. u. Ph. 1835. Heft 4. — Mittheilungen aus e. he v. Unters. über die Zeugung, in Frorieps Notizen 994. 1835.

Gebärmutter.

1373. *J. Swammerdam* Miraculum naturae s. uteri iiebris fabrica. L. B. 1672. 4. Lond. 1685. 8.

1374. *C. Drelincourt* in Nr. 1356.

1375. *M. Malpighi* Epist. de uteri structura, in Opp.

1376. *A. Nuck* in Adenographia (Nr. 542).

1377. *M. Naboth* resp. Krusch Diss. de sterilitate mul. s. 1707. in Haller Disp. Vol. V.

1378. *R. Vieussens* de structura uteri et placentae liebris. Col. 1712. 4.

1379. *F. Ruysch*, *A. Vater* u. *P. Hecquet* Epist. in ysch Opp.

1380. *A. v. Haller* Icones uteri in Opp. min. T. II.

1381. *J. J. Sue* Recherches sur la matrice, in Mém. s. à l'ac. p. d. savans étrang. Tom. V.

1382. *J. Weitbrecht* de utero mul. obs. an., in Novi ment. Petrop. Vol. I. 1750.

1383. *J. G. Günz* Pr. sist. obs. de utero et naturalibus minarum. Lips. 1753. 4.

1384. *J. G. Roederer* Icones uteri humani obs. illustr. tt. 1759. Fol.

1385. *A. Petit* Descr. an. de deux ligamens de la matrice, in Mém. de l'ac. de Par. 1760.

1386. *G. Azzoguidi* Observ. ad uteri constructionem. on. 1773. 4. u. in Nr. 158.

1387. *J. C. Loder* resp. Hauenschild Diss. de muscusa uteri structura. Jen. 1782. 4.

1388. *J. D. Metzger* de controversa fabrica musc. eri, in Exercit. an. (Nr. 159).

1389. *G. R. Böhmer* (resp. Weisse) Diss. de structura eri non musculosa. Viteb. 1784. 4.

1390. *O. F. Rosenberger* Diss. de viribus partum efficientibus etc. c. tabb. (von J. F. Meckel) Hal. 1791. 4.

1491. *L. Calza* (üb. den Mechanismus der Schwangerschaft) in Reils Archiv Bd. VII.

1392. *H. Ribke* über die Structur der Gebärmutter. Berl. 1791. 8.

1393. *J. F. Lobstein* Fragment an. phys. sur l'organisation de la matrice. à Par. 1803. 8.

1394. *J. C. G. Jörg* über das Gebärorgan des Menschen u. der Säugeth., m. Abb. Leipz. 1808. Fol.

1395. *J. F. Osiander* Com. a. phys. qua edisseritur, uterum nervos habere. Gött. 1809. 4.

1396. *Ch. Bell* on the muscularity of the uterus, in Med. chir. Transact. Vol. IV. 1813.

1397. *J. B. Palletta* in Exercit. pathol. Vol. II. Praef.

Vgl. d. Schriften üb. d. schwangeren Uterus Bd. II.

Schamglied.

1398. *A. Louis* de partium externarum generationi in serv. in mulieribus dispositione. à Par. 1754. 4.

1399. *B. S. Albin* Ora et compositio virginalis — de hymene — in Annot. ac. L. VII. IV.

1400. *T. Tronchin* Diss. de nympha (Clitoris). L. B. 1730. 4.

1401. *J. E. Neubauer* de triplici nympharum ordine in Opp. (Nr. 154).

1402. *L. Heister* de membrana hymene, in Ephem. N. C. Cent. VII.

1403. *A. Vater* Diss. de hymene. Viteb. 1727. 4.

1404. *J. J. Huber* Dissert. de hymene, c. fig. Gött. 1742. 4.

1405. *J. G. Tolberg* Com. de varietate nympharum Hal. 1791. 4.

1406. *F. B. Osiander* Abhandlung über die Scheide-
ppe, in dessen Denkwürdigkeiten für die Geburtshülfe
II.

1407. *L. Mende* Com. an. phys. de hymene s. valvula
inali. c. tab. Gött. 1827. 4.

Bauch- und Beckenhöhle.

1408. *C. F. Ludwig* Icones cavitatum thoracis et ab-
ninis a tergo apertarum. Lips. 1789. Fol.

1409. *L. F. v. Froriep* über die Lage der Eingeweide
Becken, nebst einer neuen Darstellung derselben. m. Ab.
eimar 1815. 4.

Über d. Zwerchfell u. Bauchmuskeln s. S. 367. 368.

Fascien und Muskeln am Beckenausgange.

1410. *J. D. Santorini* in Observ. anat. c. X. XI. u.
bb. posth. XVI. XVII.

1411. *P. Camper* in Demonstrat. anat. pathol. Lib. II.

1412. *C. J. M. Langenbeck* Abh. üb. e. Methode des
einschnitts, mit Abb. Würzb. 1802. 4.

1413. *J. Wilson* Descr. of two muscles surrounding
membranous part of the urethra, in Lond. med. chir.
ansact. 1806.

1414. *A. Colles* in Treatise on surgical anatomy.
ond. 1811. 8.

1415. *J. Cloquet* Nr. 717.

1416. *L. J. Sanson* des moyens de parvenir à la vessie
ar le rectum. à Paris 1817. 4.

1417. *D. Carcassone* Rech. sur le manuel de l'opéra-
on de la taille souspubienne. à Montpell. 1821. 8.

1418. *B. W. Seiler* Nr. 721.

1419. *A. Scarpa* Saggio d'osservazioni sul taglio retto-vesicale. Pavia 1823. 8.

1420. *H. Bouvier* Thèse sur quelq. points d'anatomie. à Par. 1823. 8.

1421. *J. Houston* an account of two newly discovered muscles, in Dublin Hospital Reports and Commun. Vol. V. 1830.

Bauchfell.

1422. *G. W. Wedel* de usu peritonaei, in Misc. N. C. 1683.

1423. *M. Malpighi* de omento et adiposis ductibus epist., in Opp. (Nr. 122).

1424. *Th. Wharton* de mesenterio, in Manget Bibl. Vol. I.

1425. *A. Q. Rivinus* resp. Zieger, Diss. de omento. Lips. 1717. 4.

1426. *J. Douglas* Description of the peritonaeum etc. Lond. 1730. 4. — Lat. L. B. 1737. 8.

1427. *C. G. Büttner* resp. Scheiba Diss. an. de peritonaeo. Regiom. 1738. 4. u. in Haller Disp. an. Vol. I.

1428. *J. Fantoni* de musc. abdominis, peritonaeo, vasis umbil. et omento, in Diss. renov. Taur. 1745. 8.

1429. *A. v. Haller* Omenti icones, in Opp. min. Vol. I.

1430. *R. S. Henrici* praes. *Buchwald* Descr. omenti c. icone. Havn. 1748. 4. u. in Haller Disp. Vol. VII.

1431. *R. Buchhave* Diss. de peritonaeo. Havn. 1767. 4.

1432. *H. A. Wrisberg* resp. Rudolphi de peritonaei diverticulis etc. Gött. 1780. 4.

1433. *F. Chaussier* Essai d'an. sur la structure et les usages des epiploons, in Mém. de Dijon 1784.

1434. *J. G. Walter* de morbis peritonaei et apoplexia Berol. 1787. 4.

1435. *A. Vaccà Berlinghieri* Mém. sur la structure du péritoine, in Mém. de la soc. méd. d'émul. Vol. III.

1436. *L. Caldani* Dissert. de chordae tympani officio e pecul. periton. structura, in Saggi di Padov. Vol. II.

1437. *L. F. v. Froriep* üb. d. Vortrag d. Anat., nebst r neuen Darstell. des Gekröses und der Netze. Weim. . 4.

1418. *C. J. M. Langenbeck* Com. de structura peri- ei etc. Gött. 1817. Fol.

1439. *G. S. Rath* das Mesenterium, dessen Structur Bedeut. Würzb. 1823. 8.

1440. *B. W. Seiler* Nr. 721.

1441. *J. Müller* über den Ursprung der Netze und Verhältnifs zum Peritonealsack, in Meckels Arch. für . Ph. 1830.

1442. *Hansen* Peritonaei humani anatomia et physio- a. c. tabb. Berol. 1834. 4.

Brüste.

1443. *J. B. Morgagni* in Advers. IV. V.

1444. *J. D. Santorini* Tabb. posth. Tab. VIII. — bb. Cuboli (J. B. Covolo) u. Tab. Girardi, daselbst.

1445. *J. G. Günz* de mammarum fabrica et lactis eratione. Lips. 1734. 4.

1446. *P. A. Böhmer* Epist. de mammarum ductibus l. 1742. 4. u. in Haller Disp. Vol. V.

1447. *B. S. Albin* de papillis mammae et papillae liebris in Annot. ac. L. III.

1448. *A. B. Kölpin* Schediasma de structura mamma- m. Gryph. 1765. 4. Deutsch. Berl. u. Strals. 1767. 8.

1449. *J. G. Walter* de anastomosi tubulorum lactife- rum, in Obs. an. (Nr. 148).

1450. *J. G. Klees* üb. die weibl. Brüste. Fkft. a. M. 98. 8.

1451. *A. Joannides* Physiologiae mamm. spec. c. tab. Hal. 1801. 8.

Milch.

1452. *G. Schübler* Untersuchungen über die Milch und ihre näheren Bestandtheile, in Meckels deutsch. Arch. Bd. IV.

1453. *C. A. Meggenhofen* Dissert. sist. indagationem lactis muliebris chemicam. Fcft. a. M. 1826. — Chem. Unters. üb. die Frauenmilch, in Tiedemann u. Treviranus Zeitschrift Bd. III.

Handbuch

der

menschlichen Anatomie.

Durchaus nach eigenen Untersuchungen,

und mit

besonderer Rücksicht auf das Bedürfnifs der Studirenden, der praktischen Ärzte und Wundärzte und der Gerichtsärzte

verfafst

von

Carl Friedr. Theod. Krause M. D.

Kön. Hannov. Medicinalrathe und Professor der Anatomie.

Erster Band

in drei Abtheilungen,

welcher die gesammte allgemeine und specielle Anatomie des Erwachsenen enthält.

Mit Tabellen und Registern.

Hannover 1838.

Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.

Handbuch

der

menschlichen Anatomie.

Durchaus nach eigenen Untersuchungen,

und mit

besonderer Rücksicht auf das Bedürfnifs der Studirenden, der praktischen Ärzte und Wundärzte und der Gerichtsärzte

verfafst

von

Carl Friedr. Theod. Krause M. D.

Hannov. Medicinalrathe und Professor der Anatomie, Mitglied der K. ärztlichen Prüfungsbehörde und Landphysikus zu Hannover, m. g. G. M.

Ersten Bandes dritte Abtheilung.

Hannover 1838.

Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.

Inhalt.

Seite

…rtes Buch. Von dem Herzen, den Blut- und Lymphgefäſsen 635—825

Herz 635
Gestalt, Gröſse, Lage 636
Herzbeutel 636
Höhle, Capacität 637
Bau 639
Rechter Vorhof 642
Rechte Herzkammer 644
Linker Vorhof 645
Linke Herzkammer 646
Schlagadern d. groſsen Kreislaufs, Aortensystem 648
A. aorta 648
A. aorta adscendens 649
Arcus aortae, A. anonyma 650
A. carotis communis 651
A. carotis externa 652
A. carotis interna 662
A. subclavia 666
A. subclavia 667
A. axillaris 676
A. brachialis 679
Aa. antibrachii et manus 681
A. aorta descendens thoracica 691
A. aorta descendens abdominalis 693
A. iliaca communis 701
A. hypogastrica 701
A. cruralis 708
A. iliaca externa 708
A. femoralis 711
A. poplitea 716
Aa. cruris et pedis 719
Übersicht der Anastomosen im Aortensystem 727
Anastomosen in d. Mittellinie d. K. 727

Seite

Anastomosen in d. Longitudinalrichtung 730
Varietäten der Schlagadern des Aortensystems 738
Varietäten der A. aorta 739
Varietäten der A. anonyma 741
Varietäten der A. carotis u. ihre Äste 742
Varietäten der A. subclavia u. ihrer Äste 744
Varietäten der Arterien in der Brusthöhle 749
Varietäten der Arterien in der Bauchhöhle 749
Varietäten der A. hypogastrica u. ihrer Äste . . . 751
Varietäten der A. cruralis u. ihrer Äste 753

Blutadern des grofsen Kreislaufes, Hohlvenensystem 756
Blutadern des Herzens 757
Vena cava superior, descendens 759
Venae anonymae 760
Blutadern d. Kopfes u. Halses 760
V. jugularis communis 760
V. jugularis interna 760
V. facialis communis 760
Oberflächliche Halsvenen 770
Tiefe Halsvenen 770
Blutadern d. oberen Extremität 770
Blutadern d. Brustkastens u. d. Brusthöhle 770
Blutadern d. Rückgratshöhle 770
Vena cava inferior, adscendens 780
Venae iliacae communes 780
Blutadern d. unteren Extremität 780
Blutadern d. Beckens 780
Blutadern zum Stamm d. V. cava inf. 780
Blutadern der Chylificationsorgane 780
Pfortadersystem 780
Venae hepaticae 790

Gefäfse des Lungenkreislaufes, Vasa pulmonalia 790
A. pulmonalis communis, dextra, sinistra 790
Venae pulmonales 790

Lymphgefäfssystem 7
Hauptstämme 7
Drüsen und Saugadern d. Kopfes u. Halses 7
Drüsen u. Saugadern d. oberen Extrem., d. Brust- u. Bauchwände 8
Drüsen u. Saugadern in der Brusthöhle 8
Drüsen u. Saugadern der unteren Extremität 8
Drüsen u. Saugadern in der Beckenhöhle 8
Drüsen u. Saugadern in der Bauchhöhle 8

Literatur der Gefäfslehre . . . . . 815—8

Seite

ftes Buch. Vom Nervensystem . . . . . 827—1000

Centrum encephalospinale 829
Rückenmark 829
Hirn, Encephalon 833
Mittelgehirn, Mesencephalon 833
Medulla oblongata 834
Pons Varolii 837
Eminentia quadrigemina 839
Kleines Gehirn, Cerebellum 840
Hemisphären, Lappen, Markkörper, Schenkel 842
Mitteltheil, Wurm, Marksegel, vierte Hirnhöhle 846
Grofses Gehirn, Cerebrum 849
Hemisphären 852
Betrachtung d. Oberfläche, Lappen u. s. w. 852
Zusammensetzung d. Inneren, Pedunculus, Hirnganglien, Markblätter, Markkörper, Seitenhöhle 855
Mitteltheil, Corpus callosum, Fornix, Septum, Commissuren, Conarium, Tuber cinereum, Hypophysis, Chiasma opt., dritte Hirnhöhle 866
Systeme der vorderen, mittleren, hinteren Stränge . . . 874
Häute des Rückenmarkes und Hirns 875

Nerven 886
Hirn-Rückenmarksnerven, Klassification 886
Sinnesnerven 890
N. olfactorius 890
N. opticus 891
N. acusticus 892
Nerven vom System der vorderen Stränge 893
N. oculomuscularis communis 893
N. oculomuscularis externus 894
N. hypoglossus 894
Nerven vom System der mittleren Stränge 896
N. oculomuscularis superior 896
N. facialis 897
N. glossopharyngeus 901
N. vagus 902
N. accessorius 908
Nerven vom System d. vorderen u. hinteren Stränge 909
N. trigeminus 909
Nn. spinales 922
Nn. spinales cervicales 927
Plexus cervicalis 929
Plexus brachialis 932

Vom Herzen und den Gefäſsen. Gefäſslehre. Angiologia.

Herz.

Das Herz, *Cor*, (*Cardia*) ist ein hohler muskulöser
rper von unregelmäſsig kegelförmiger, an einer Fläche
eplatteter Gestalt, dessen oberer, breiter und dickerer
eil, *Basis cordis* genannt, mit den groſsen Gefäſsstäm-
n, die hier theils aus dem Herzen entspringen, theils in
selbe sich einsenken, ununterbrochen zusammenhängt;
egen das untere, schmalere, abgerundete Ende, *Apex* s.
ro cordis, frei liegt. Die vordere obere Fläche ist stark
vex, die hintere untere platt; sie werden durch den
deren rechten und den hinteren linken Rand von einan-
getrennt: ersterer ist kürzer, schärfer und mehr gerade,
terer länger, mehr abgerundet und seiner Länge nach
hr convex. Über beide Flächen läuft eine Längenfurche
der Basis zur Spitze, durch welche die letztere einge-
bt wird, *Sulcus longitudinalis:* rings um den mittleren
eil des Herzens, aber der Basis näher als der Spitze,
ft die tiefere Kreisfurche, *Sulcus circularis* s. *atrio-ven-
cularis*, welche besonders deutlich an der platten Fläche
d den Rändern sich zeigt. Zuweilen hat das Herz eine
hr kurze und rundliche, zuweilen eine mehr längliche
tze Form, und die Spitze bald mehr, bald weniger tief
gekerbt.

Die Gröfse des Herzens ist veränderlich: im Zustande
ifsiger und gleichförmiger Ausdehnung aller seiner Höh-
mifst es im Mittel der Länge nach von der oberen
and des linken Atrium zur Spitze des linken Ventrikels
"; in der Breite an den meisten Stellen 3", an der

Spitze weniger; an dem oberen Ende der Ventrikeln, nahe unterhalb des Sinus circularis, dagegen 4″, und ist hieselbst von der platten zur convexen Fläche 3¼″ dick. Im entleerten und mäfsig zusammengezogenen Zustande beträgt seine Länge ungefähr 4¾″, seine gröfste Breite 3½″, seine Dicke 2½″; das Gewicht 7 bis 15 Unzen, im Mittel 10 Unzen; das Volumen 11 bis 18, im Mittel 13½ Kubik-Zoll. Beim weiblichen Geschlechte ist das Herz im Allgemeinen kleiner, als beim männlichen: überhaupt richtet sich seine Gröfse sehr nach der Statur und dem mehr oder weniger robusten Körperbau: bei sehr zartgebildeten kleinen Weibern wiegt es zuweilen nur zwischen 6 und 7 Unzen.

Es liegt in der Mitte der Brusthöhle, jedoch mehr in der linken Hälfte derselben und grofsentheils in der Aushöhlung der inneren Fläche der linken Lunge, in schräger Richtung: die Basis nach der rechten Seite, nach oben und hinten, in der Höhe des 6ten Brustwirbels, hinter dem Corpus sterni und den Knorpeln der 4—5ten rechten Rippen; die Spitze nach der linken Seite, nach vorn und unten, nahe hinter den vorderen Enden und Knorpeln der 6—7ten linken Rippen: der linke Rand ist mehr nach oben und hinten gekehrt, die platte Fläche und der nach unten und vorn gerichtete rechte Rand ruhen auf dem Centrum tendineum des Zwerchfells. Zu beiden Seiten und zum Theil auch vorn und hinten von den Lungen umgeben, liegt, bei der geringen Tiefe des Cavum mediastini anterioris, der rechte Theil seiner Vorderfläche nahe hinter dem Brustbein und den Rippenknorpeln; der hintere Theil der Basis wird durch die im Cavo mediastini posterioris befindlichen Theile (S. 480) von der Wirbelsäule getrennt; oberhalb der Basis befinden sich die grofsen, mit dem Herzen unmittelbar verbundenen Gefäfsstämme und die Spaltungsstelle der Luftröhre. Nach der wechselnden stärkeren und geringeren Wölbung des Zwerchfells und in Folge der Vorwärts- oder Rückwärtsneigung des Körpers kann das Herz seine Lage um ein Weniges verändern: sowie seine Lage überhaupt zuweilen mehr als gewöhnlich der senkrechten oder der wagerechten Richtung sich annähert.

In dieser Lage wird das Herz von dem Herzbeutel umhüllt und befestigt. Der *Herzbeutel, Pericardium*, ist ein

llständig geschlossener häutiger Sack, ungefähr von der stalt des Herzens, aber etwas weiter als der gröfste Umg desselben, so dafs es ganz frei im Herzbeutel liegt, er durch die Verwachsung der äufseren Fläche des letzren mit den benachbarten Theilen in seiner Lage gesichert rd. Er besteht aus einem äufseren fibrösen und einem neren serösen, innig mit einander vereinigten Blättern; teres ist an der unteren Wand des Herzbeutels mit dem ntrum tendineum des Zwerchfells durch Zellstoff und rch Sehnenfasern sehr fest verwachsen; vorn durch schlafn Zellstoff nur locker mit dem Sternum, zu beiden Seiten er genauer mit dem rechten und linken Blatt der Mittelle, hinten mit der Speiseröhre und der Aorta descendens oracica locker verbunden. Am oberen Ende des Herzutels, welches vorn von der genau angehefteten Thymus deckt wird, ist das fibröse Blatt mit der Tunica externa r grofsen Gefäfsstämme verwachsen, und zwar mit dem eren Ende der Aorta adscendens, der concaven Seite und rderen und hinteren Fläche des Arcus aortae, mit der altungsstelle der Art. pulmonalis communis und der rechn und linken Lungenarterie, mit den Endigungen der unren Hohlvene und der Lungenvenen, und mit der oberen ohlvene nahe unterhalb der Einmündungsstelle der Vena ygos. — Das seröse Blatt bekleidet die innere Fläche des rösen Blattes, stülpt sich an den Stellen, woselbst das letzre mit den grofsen Gefäfsen verwächst, nach unten ein, d überzieht nicht allein die ganze Oberfläche des Herzens, ndern auch jene grofsen Gefäfse, soweit sie unterhalb der heftungsstellen des fibrösen Blattes in der Höhle des Herzutels sich befinden: und zwar umhüllt es die A. aorta scendens und A. pulmonalis communis gemeinschaftlich, e Enden der Venen aber einzeln. Der Herzbeutel enthält wei Drachmen bis höchstens $\frac{1}{2}$ Unze eines dünnen, klaren, elblichen Serum, Herzbeutelwasser, *Liquor pericardii*, welches die innere Fläche des Herzbeutels und die Oberfläche es Herzens feucht und schlüpfrig erhält und das Zusamenkleben dieser Flächen verhütet.

Die Höhle des Herzens wird durch die Scheidewand, *eptum cordis*, deren Richtung äufserlich durch den Sulcus ngitudinalis bezeichnet wird, in die rechte vordere und

linke hintere Abtheilung — rechtes oder Lungenherz und linkes oder Aortenherz — vollständig abgetheilt. Jede Herzenshälfte enthält eine Herzkammer, Ventriculus cordis, und eine Vorkammer oder Vorhof, Atrium cordis. Die Atria, deren Abgränzung von den Ventrikeln an der Aufsenfläche des Herzens durch den Sulcus circularis angedeutet wird, bilden den oberen, an der Basis liegenden, kleineren Theil des Herzens, und werden von einander durch den oberen Theil der Scheidewand, *Septum atriorum*, getrennt. Jeder Vorhof zerfällt in einen weiteren Schlauch, *Sinus*, und eine engere, zipfelförmige, nach vorn gekrümmte Verlängerung, Herzohr, *Auricula* genannt: der Sinus ist mit Öffnungen zur Aufnahme der grofsen Venenstämme versehen und communicirt mit dem Ventrikel seiner Herzenshälfte durch eine weite Mündung. Die Ventrikeln nehmen den unteren gröfseren Theil des Herzens, von dem Sulcus circularis bis zur Spitze ein: ihre Wände sind beträchtlich dicker als die der Atria: sie werden durch den unteren dickeren Theil der Scheidewand, *Septum ventriculorum*, von einander geschieden. Jeder Ventrikel hat an seinem oberen breiten Ende oder Basis, die an den Sulcus circularis grenzt, zwei weite Mündungen: die eine dient zur Communication mit dem Vorhofe, wird *Ostium venosum ventriculi* s. *atrioventriculare* genannt und ist länglich rund, 11‴ zu 15‴ im Dm. haltend, von einem etwas wulstigen Rande umgeben, an welchem eine in mehrere Zipfel getheilte, in die Höhle des Ventrikels hineinragende Klappe befestigt ist: die andere fast kreisrunde, ungefähr 13‴ im Dm. haltende Öffnung, *Ostium arteriosum ventriculi*, führt in einen der Hauptarterienstämme und ist mit drei halbmondförmigen, in dem inneren Raume der Arterie sich öffnenden Klappen besetzt.

Die Capacität des inneren Hohlraumes des Herzens beträgt im stark ausgedehnten Zustande zwischen 27 und 41 Kub.-Zoll, im Mittel aus vielen Untersuchungen 32 Kub.-Zoll: die vier Höhlen sind gleich geräumig (wenn man den von den Klappen der Ostia venosa eingeschlossenen trichterförmigen Raum als den Atria zugehörig betrachtet), jede kann 8 Kub.-Zoll oder etwa 5½ Unzen Blut fassen. Hiebei ist aber zu bemerken, dafs man niemals die Höhlen überhaupt von einer solchen Menge Blutes ausgedehnt und

mals gleichförmig angefüllt findet: in der Regel enthält
h dem Tode das rechte Herz viel mehr Blut als das
ke, und zwar das rechte Atrium die gröfste, der linke
ntrikel die geringste Quantität. Wegen der geringeren
ke der Wände und leichteren Ausdehnbarkeit der rech-
Hälfte des Herzens, und in Folge gewisser Todesarten
l gewisser, dem Tode längere Zeit vorhergehender krank-
ter Zustände, erscheint nicht selten das rechte Herz über-
ipt geräumiger als das linke.

Das Herz wird äufserlich von dem eingestülpten Theil
serösen Blattes des Herzbeutels überzogen, welcher die
ne, glatte und durchsichtige äufsere Haut des Herzens
det. Unter derselben liegt eine gröfsere oder geringere
nge, in lockeren kurzen Zellstoff eingeschlossenen Fettes,
i älteren Menschen mehr), welches vorzüglich in den
lci und an der Spitze sich anhäuft: da, wo das Fett man-
lt, hängt die seröse Haut der Oberfläche des Herzens
r fest an. Sodann folgen die dunkelrothen, in Scheiden
n sehr zartem Zellstoff eingeschlossenen und zu platten
er rundlichen Bündeln vereinigten Muskelfasern, welche
rar nach bestimmten Hauptrichtungen, theils mehr longi-
dinal von der Basis zur Spitze, theils mehr queer von der
nen zur anderen Seite des Herzens verlaufen, immer aber
ehr oder weniger gekrümmt und gewunden sind. Sie ha-
n keine bestimmten Ursprungs- und Insertionspunkte,
alten sich häufig und vereinigen sich, indem sie mit ihren
nden an andere Muskelbündel sich anlegen und in ihre
heiden eingehen: und verflechten sich vielfältig mit ein-
der, indem queere Fasern zwischen longitudinale, ober-
ichliche zwischen tiefere sich einschieben. Die Muskel-
sern gehen zum Theil von der einen Herzenshälfte zur
nderen hinüber, zum Theil gehören sie den einzelnen Hälf-
n und Höhlen eigenthümlich an, indem sie, nachdem sie
m eine gewisse Strecke der Peripherie einer Höhle verlau-
n sind, in das Septum sich einsenken: wobei hinsichtlich
es Septum ventriculorum, welches ungefähr die Dicke der
Vände des linken Ventrikels hat, zu bemerken ist, dafs
eine meisten Muskelbündel dem linken Ventrikel angehö-
en. — An den dünnwandigen Vorhöfen, an welchen die
Muskelsubstanz an den Auriculae stärker als an den Sinus

entwickelt und hier 1‴ bis 1½‴ dick ist, lassen sich zwei Lagen von Muskelbündeln unterscheiden. Die äufsere enthält queere und schräge Fasern, die zum Theil von dem einen Atrium zum anderen übergehen; aufserdem auch longitudinale an der oberen Wand der Vorhöfe, und kreisförmige an den Mündungen der Venen. Die innere Lage bildet zum Theil, besonders in den Sinus, eine ebene glatte Schicht, zum Theil aber queere und longitudinale, in der Höhle der Vorhöfe hervorragende, plattrundliche Bündel: zum Theil auch netzförmig einander durchkreuzende und von einer Wand zur anderen frei durch die Höhle verlaufende, rundliche Bündel, die man *Trabeculae carneae atriorum* nennt: diese finden sich nur in den Auriculae. — In den Wänden der Ventrikeln finden sich drei Lagen von Muskelfasern. Die *äufsere* ziemlich dünne Lage besteht aus schrägen, theils platten, theils rundlichen, von der Basis der Ventrikel zur Spitze und von der rechten nach der linken Seite (des Herzens) herablaufenden Bündeln, die am rechten Ventrikel mehr der queeren, am linken mehr der longitudinalen Richtung sich nähern, zum Theil in das Septum sich einsenken, zum Theil aber von einem Ventrikel zum andern über den Sulcus longitudinalis hinübergehen und an der Spitze des linken Ventrikels einen Wirbel bilden, in welchen sie einzudringen und in die tiefste longitudinale Schicht der zweiten Lage überzugehen scheinen. — Die *mittlere* Lage enthält am rechten Ventrikel platte Bündel von beinahe queerer, etwas schräg von der Basis zur Spitze und von der linken zur rechten Seite sich windende Fasern. Am linken Ventrikel ist diese Lage sehr dick, so dafs von ihr vorzüglich die gröfsere Stärke der Wände dieser Kammer abhängt: es lassen sich in ihr von der Oberfläche nach der Tiefe drei Schichten unterscheiden: eine beinahe queere, von der Basis zur Spitze und von rechts nach links gewundene; eine zweite gleichfalls beinahe transversale, von der Basis zur Spitze und von links nach rechts gekrümmte; und eine dritte von derselben, aber mehr longitudinalen Richtung. Diese mittlere Lage gehört da, wo sie in die Zusammensetzung des Septum eingeht, jedem der beiden Ventrikel eigenthümlich an; die queeren Schichten fehlen an der Spitze des linken Ventrikels da, wo die Fasern

äufseren Lage den Wirbel bilden. — Die *innere* Lage teht aus plattrundlichen und runden Muskelbündeln, lche grofsentheils an der Innenfläche der Kammern frei gen, sich vielfältig spalten und wieder vereinigen, dadurch unregelmäfsiges Netzwerk von kleineren und gröfseren schen bilden: gröfstentheils haben diese Bündel eine lon- idinale Hauptrichtung von der Spitze zur Basis, aber en häufig, besonders in der Spitze der Ventrikeln, schräg einer Wand zur anderen hinüber: man nennt sie *Tra- carneae ventriculorum.* Aus dieser inneren Schicht gehen h stärkere, kurze, kegelförmige Muskelbündel hervor, Warzenmuskeln, *Mm. papillares*, welche oft mit mehre- Köpfen beginnen, von den Wänden der Ventrikel aus in die Höhle derselben hineinragen und gegen die Ostia osa gerichtet sind: jeder ist an seinem Ende mit mehre- dünnen, runden, fadenförmigen Sehnen, *Chordae tendi- e*, versehen, welche an die freien Ränder der Klappen Ostia venosa sich anheften.

Die Ostia der Ventrikel werden jedes von einem festen fslichen Ringe umgeben, die mit den Muskelfasern innig wachsen sind, und an welche die Klappen sich festheften: stens bestehen diese Ringe aus verdichtetem Zellstoff, halten aber zuweilen, besonders in Herzen älterer robu- Männer, einen unvollständig ringförmigen Streifen von erknorpel, der am öftersten am Ostium arteriosum der ken Herzkammer, aber auch an den Ostia venosa ange- ffen wird.

Inwendig werden die Höhlen von der Tunica intima orum genau ausgekleidet, welche die freiliegenden Tra- und Trabeculae, die Mm. papillares und Chordae ten- eae überzieht und durch Verdoppelung die Klappen bil- Letztere erhalten durch eine, zwischen den beiden tigen Platten ausgebreitete Schicht straffen Zellstoffs, e gröfsere Festigkeit und weifsliche Farbe, dagegen die nne Haut sonst überall die rothen Muskelfasern, mit wel- en sie innig verwachsen ist, durchscheinen läfst. An den nnwandigen Vorhöfen lassen die Muskelfasern an manchen llen Spalten zwischen sich, woselbst die äufsere und in- e Haut des Herzens einander unmittelbar berühren und wachsen.

Das Herz ist sehr reich an Blutgefäfsen, Kranzadern des Herzens, Vasa coronaria cordis; besitzt an seiner Oberfläche und im Herzbeutel viele Lymphgefäfse und erhält ziemlich viele dünne Nerven, Nn. cardiaci, die gröfstentheils vom Gangliensysteme herstammen.

Rechter Vorhof.

Der rechte Vorhof oder Vorkammer, *Atrium dextrum* s. anterius, nimmt den rechten vorderen Theil der Basis des Herzens ein und hat, von hinten nach vorn betrachtet, eine unregelmäfsig kegelförmige Gestalt, indem die nach vorn gerichtete Auricula den spitzigeren Theil bildet; am Sulcus circularis ist er äufserlich stark eingeschnürt. Der Sinus, Hohlvenensack, *Sinus venarum cavarum*, hat nach allen Richtungen einen Dm. von ungefähr 2″, seine rechte, hintere und obere Wand sind stark gewölbt und liegen frei; die linke etwas nach hinten gekehrte Wand ist mehr gerade, gränzt mit ihrem vorderen Theile an die Wurzel der Aorta, wird dagegen in ihrem hinteren gröfseren Theile von dem Septum atriorum gebildet. Die untere, nach vorn und links gerichtete Wand hängt mit der Basis des rechten Ventrikels zusammen und ist vom Ostium venosum des letzteren durchbrochen. Nach vorn geht der Sinus in das platt-kegelförmige, an seinem oberen und unteren Rande und an seiner Spitze eingekerbte, rechte Herzohr, *Auricula dextra*, über, welches sich nach links, vor der Wurzel der A. aorta hinkrümmt, mit seiner Spitze die Art. pulmonalis communis fast berührt, und von allen Theilen des Vorhofes am meisten nach vorn, oben und links liegt. Am hinteren Theile des Sinus münden die Hohlvenen ein: die Vena cava superior durchbohrt den hinteren Theil der oberen Wand des Sinus, die Vena cava inferior die hintere Wand des Sinus ungefähr in der Mitte ihrer Höhe und nahe am Sulcus longitudinalis, so dafs die Mündungen beider Hohlvenen nur um ¾″ von einander entfernt sind, und ihre Wände in einander überzugehen scheinen. Am hinteren Umfange der Mündung der Vena cava superior findet sich äufserlich ein meistens von dem Atrium sinistrum ausgefüllte Einschnürung.

In der Höhle des Atrium dextrum zeigen sich wiederum nach hinten und oben die Mündungen der beiden Hol-

en, von denen die der unteren 15‴, der oberen 10‴ im
. hält; zwischen beiden verläuft ein von rechts nach
s gerichteter Vorsprung, *Tuberculum Loweri*, welcher
äufserlichen Einschnürung der hinteren Vorhofswand
pricht. Am rechten (vorderen) und unteren Umfange
Mündung der Vena cava inferior ist eine halbmondför-
e, 3 bis 5‴ breite, häufig netzförmig durchbrochene
ppe, *Valvula Eustachii*, angeheftet, deren inneres Ende
Horn in das Septum atriorum übergeht: diese Klappe
nach links und oben in das Atrium hinein, kann die
te Mündung der unteren Hohlvene nicht verschliefsen,
nt sie aber von der Gegend des Ostium venosum des
iten Ventrikels, welches 1″ weiter nach unten, links
vorn sich befindet. — An der linken, vom Septum atrio-
gebildeten Wand des rechten Vorhofs, welche im All-
einen glatt ist, zeigt sich eine ovale flache Vertiefung,
eiförmige Grube, *Fossa ovalis*, deren Dm. von oben nach
en 9‴, deren Queerdm. 6‴ beträgt: sie wird von einem
stigen Rande, *Limbus fossae ovalis* s. Isthmus Vieussenii,
geben, der am unteren vorderen Umfange der Grube stär-
hervorspringt und hier das innere Horn der Valvula
tachii aufnimmt. In der Fossa ovalis ist das Septum atrio-
am dünnsten: sie ist die Andeutung des im Fötuszustande
handenen Foramen ovale der Scheidewand, durch wel-
die beiden Vorhöfe mit einander communiciren. Zu-
len findet sich noch bei Erwachsenen eine kleine, das
tum schräg durchbohrende Öffnung in der Fossa ovalis,
che von dem linken Atrium her durch einen klappen-
gen Streifen geschlossen wird, ohne Störung der Blut-
isläufe. — An der Gränze der hinteren und linken Wand
Vorhofs, unterhalb der Mündung der Vena cava inferior
des inneren Horns der Valvula Eustachii, zwischen
sen und dem Ostium atrio-ventriculare, zeigt sich die
le, 4‴ zu 6‴ weite Mündung der Vena coronaria magna
dis: ihr rechter Umfang wird durch eine halbmondför-
ge Klappe, *Valvula Thebesii*, verengert, aber nicht ver-
lossen. An vielen anderen Stellen der Vorhofswände,
züglich am Septum und am unteren Theile der rechten
and, befinden sich kleinere Öffnungen, Mündungen klei-
er Venen des Herzens, *Foramina Thebesii* genannt. —

Die innere Fläche der rechten Wand, bis in die Auricula hinein, erscheint uneben durch die sog. Kammmuskeln, *Mm. pectinati:* diese bestehen aus einem oberen und unteren queerlaufenden starken Muskelbündel, von denen das erstere von den Mündungen der Hohlvenen durch die obere Wand, das letztere längs der hervorspringenden unteren Gränze der rechten Wand verläuft; zwischen beiden erstrecken sich zahlreiche schwächere Muskelbündel von oben nach unten und von unten nach oben. Die Auricula enthält zahlreiche, in verschiedenen Richtungen einander kreuzende Trabeculae.

Rechte Herzkammer.

Die rechte oder vordere oder Lungen-Herzkammer, *Ventriculus dexter* s. anterior s. pulmonalis, befindet sich nach vorn und rechts zwischen dem Sulcus circularis und der Spitze des Herzens, welche er nicht ganz erreicht. Er hat die Gestalt einer dreiseitigen, mit der Spitze nach unten und links gerichteten Pyramide, deren vordere convexe Fläche der convexen Seite des Herzens angehört und sogleich nach geöffnetem Herzbeutel, nebst der Auricula dextra und der rechten Wand des rechten Vorhofs, sich darbietet: die hintere Wand ist schwächer convex und gehört der Superficies plana des Herzens an; die linke Wand ist nach links concav (in der Höhle des Ventrikels convex), wird vom Septum ventriculorum gebildet und umfafst den rechten Umfang des linken Ventrikels, so dafs der Rand der rechten Kammer am Sulcus longitudinalis die linke Kammer überragt. Seine Länge beträgt vorn 4″, hinten 3⅛″, sein Durchmesser an der Basis 3¼″; von der Basis verengert er sich nach allen Seiten beträchtlich, vorzüglich von rechts nach links. Seine Wände sind 2‴ bis 3‴ dick. Im Innern zeigen sich die beiden Ostia: das *Ostium venosum* s. *atrio-ventriculare dextrum* befindet sich mehr nach rechts und hinten: an seinen Umfang ist die dreizipfelige Klappe, *Valvula tricuspidalis*, geheftet, die mit ihren Zipfeln tief in die Höhle des Ventrikels hinabragt. Der vordere rechte Zipfel ist der ansehnlichste; der hintere und der innere, welcher letzterer am Septum liegt, sind beträchtlich kleiner. Zum vorderen Zipfel gehören vier bis fünf Mm. papillares, die von der vorderen Wand entspringen: einige kleinere Mm. papillares

die anderen Zipfel gehen aus der hinteren Wand und dem Septum hervor: die Chordae tendineae sind zahlch, dünn, und entspringen zum Theil nicht von freien arzenmuskeln, sondern unmittelbar aus der inneren Muslage und von den Trabes carneae, die in der Spitze der nmer am meisten entwickelt, dagegen am sparsamsten Septum vorhanden sind. — Das *Ostium arteriosum pulnale* befindet sich weiter nach vorn und links, nahe am tum und überhaupt am vordersten obersten Theil der hten Kammer: es führt in die A. pulmonalis communis ist mit drei halbmondförmigen Klappen, *Valvulae semires pulmonares*, besetzt, deren längerer und mehr gemmter Rand an den vorderen rechten, am vorderen lin- und am hinteren Umfang des Ostium angewachsen sind, egen ihr freier, leicht concaver Rand in das Innere der . pulmonalis communis hineinragt: sie bilden bauchige, en die Arterie hin offene Taschen und berühren sich im gedehnten Zustande mit ihren freien Rändern so genau, s sie den Zugang von der Arterie zum Ventrikel vollndig schliefsen. In der Mitte des freien Randes jeder ppe zeigt sich eine, oft kaum wahrnehmbare, verdickte lle, *Nodulus Morgagnii* s. *Arantii*.

Linker Vorhof.

Der linke Vorhof oder Vorkammer, *Atrium sinistrum posterius*, liegt von den vier Abtheilungen des Herzens weitesten nach hinten und oben. Sein Sinus, der Lunvenensack, *Sinus venarum pulmonalium*, von dessen vorer Wand die Auricula ausgeht, hat eine abgerundet hsseitige Gestalt; seine Höhe beträgt hinten $2\frac{1}{4}''$, vorn $1\frac{3}{4}''$, die übrigen Dm. $1\frac{3}{4}''$. Seine Wände sind gröfstheils convex, glatt; die rechte wird vom Septum atrion gebildet, die untere vom Ostium atrio-ventriculare chbohrt; die vordere gränzt auch an die Wurzel der rta. An der Gränze der oberen und hinteren Wand fin sich die vier Mündungen der Venae pulmonales, von nen die beiden rechten und die beiden linken nahe beinmen liegen, zuweilen sogar zusammenfliefsen: dagegen rechten von den linken durch einen Zwischenraum von " bis 1" getrennt sind. Das linke Herzohr, *Auricula*

sinistra, krümmt sich von der vorderen Wand des Sinu an, neben den Wurzeln der Aa. aorta und pulmonalis com munis, nach links, vorn und oben, hat eine Länge von 1½ und eine gewundene, vielfach eingekerbte Gestalt: sein Spitze ist an der Vorderfläche des Herzens an der linke Seite der Lungenarterie sichtbar. In der Höhle des linke Vorhofs erscheinen die 2‴ dicken Wände des Sinus gla und die Stelle des Septum, welche der Fossa ovalis des rech ten Vorhofs entspricht, kaum 1‴ dick: dagegen die Aur cula von zahlreichen Trabeculae carneae durchzogen wir

Linke Herzkammer.

Die linke, hintere oder Aorten-Herzkammer, *Ventric lus sinister* s. posterior s. aorticus, ist die am meisten nac links, hinten und unten gelegene Abtheilung des Herzen von der Gestalt eines oben abgestutzten Eies: seine Läng von der Basis bis zur Spitze, welche den hervorragendst Theil der Apex cordis bildet, beträgt 3½ ″, seine gröfst Dm. unterhalb der Basis, welche nicht, wie beim recht Ventrikel, die geräumigste Gegend ist, 2½ ″. Seine Wän sind, da das Septum nach rechts gebogen ist, überall conv und 5‴ bis 6‴ dick. In seiner Höhle zeigen sich an d Basis die grofsen Mündungen: das *Ostium venosum* s. *atri ventriculare sinistrum* mehr nach links und hinten: von se nem Umfange ragt die zweizipfelige oder mützenförmi Klappe, *Valvula mitralis* s. bicuspidalis, in die Höhle hera der eine Zipfel ist mehr nach links und hinten, der ande mehr nach rechts und vorn angeheftet. In die freien Rä der der Zipfel gehen die starken Chordae tendineae der bis 5 starken, länglich kegelförmigen Mm. papillares übe welche von der linken und hinteren Wand der Kamm nicht vom Septum entspringen. Das *Ostium arteriosum. ac ticum* befindet sich mehr nach vorn und rechts, vor de rechten Zipfel der Valvula mitralis und hinter dem Osti arteriosum pulmonale; est ist mit drei *Valvulae semiluna aorticae* besetzt, die am vorderen, am rechten hinteren u linken hinteren Umfange des Ostium angeheftet sind, üb gens sich gleich denen im rechten Ventrikel verhalten, doch stärker sind und dickere Noduli Morgagnii besitze Starke Trabes carneae zeigen sich an allen Wänden,

lreichsten in der Spitze, am sparsamsten am oberen Theile
Septum ventriculorum. —

Das Herz befindet sich während des Lebens in einem
tande wechselnder Ausdehnung, *Diastole*, und Zusam-
nziehung, *Systole*, wodurch die Höhlen in allen Punkten
erweitern und verengern: diese wiederholen sich bei
achsenen 60 bis 80 mal in der Minute, öfterer bei weib-
en und jüngeren, seltener bei männlichen und älteren
ividuen. Während der Diastole der Vorhöfe und Herz-
mern strömt das Blut aus den Hohl- und Lungenvenen
lie ersteren und aus den Vorhöfen in die Herzkammern,
gegen die Ostia arteriosa durch die Valvulae semilunares
hlossen sind. Sodann folgt zuerst die Systole der Vor-
, durch welche eine noch gröfsere Menge Blut in die
trikeln getrieben wird: unmittelbar nachher und fast
nahe gleichzeitig erfolgt auch die Systole der Ventrikel,
che das von ihnen aufgenommene Blut in die Aorta und
genarterie pressen, indem der Rücktritt desselben in die
höfe durch die Valvula tricuspidalis und mitralis gehin-
wird, welche die Ostia venosa gegen die Vorhöfe ver-
ieſsen und in ihrem Widerstande gegen den starken
rang des Bluts von den Mm. papillares unterstützt wer-
. Die Diastole dauert ungefähr drei bis viermal so lange
t, als die Systole: bei der Systole verkleinert, bei der
stole vergröfsert sich das Herz. Die starke Contraction
der Systole, namentlich die der Ventrikeln, bewirkt
Erschütterung der Wände des Thorax an der Stelle,
elbst die Spitze des Herzens diese berührt: diese Er-
itterung wird am lebhaftesten zwischen der 5ten und
linken Rippe, bis zu welchem Interstitium intercostale
Spitze des Herzens bei der Systole sich erhebt, gefühlt:
i. der sog. Herzschlag, Pulsus cordis, welcher dem der
erien um eine kaum merkliche Zeit vorhergeht. Viel-
ht trägt die Anfüllung, Spannung und Streckung der Aorta
l Pulmonalarterie bei der Systole der Ventrikel dazu bei,
Spitze des Herzens stärker gegen die Wand des Thorax
drängen und den Herzschlag zu verstärken.

Schlagadern des grofsen Kreislaufs, Aortensystem.

Arteria aorta.

Die Aorta ist der einfache Hauptstamm der Körperarterien, aus welchem alle übrigen Pulsadern des grofsen Kreislaufs unmittelbar oder mittelbar entstehen. Aus dem linken Ventrikel entspringend steigt sie anfänglich in der Brusthöhle aufwärts, biegt sich sodann bogenförmig nach links und hinten, steigt gestreckt an der hinteren Wand des Thorax herab, tritt durch den Hiatus aorticus des Zwerchfells in die Bauchhöhle, und läuft an deren hinteren Wand bis vor den vierten Lendenwirbel herab, woselbst sie durch eine gabelförmige Spaltung endigt. Durch diesen Verlauf zerfällt sie in vier Abtheilungen oder Strecken:

1) *A. aorta adscendens*, die aufsteigende Aorta, 2″ bis 2½″ lang, 12½‴ dick. Ihr Anfang am Ostium arteriosum des linken Ventrikels wird ihre Wurzel oder Zwiebel, *Bulbus aortae*, genannt: er ist dicker und bildet drei, den Valvulae semilunares entsprechende taschenförmige Erweiterungen, *Sinus Valsalvae*, die durch flache Einkerbungen getrennt werden. Dieser Anfang liegt unmittelbar hinter der Wurzel der A. pulmonalis communis: von hier an steigt sie mit leichter Biegung, schräg nach rechts und vorn herauf, hinter der Auricula dextra und dem Corpus und Manubrium sterni, an der rechten Seite der A. pulmonalis communis, an der linken und vorderen Seite der Vena cava superior, so dafs sie zwischen diesen beiden Gefäfsen in der Mitte liegt; vor der A. pulmonalis dextra, den rechten Lungenvenen und dem rechten Bronchus. Sie liegt fast in ganzer Länge innerhalb des Herzbeutels und wird an der vorderen und den Seitenflächen von dem serösen Blatte desselben bekleidet.

2) *Arcus aortae*, der Aortenbogen, 1½″ bis 2″ lang, in der Mitte seines Verlaufs 10½‴ dick, hat eine queere und von vorn nach hinten gehende Richtung, ist nach oben convex, nach unten concav. Sein vorderer rechter Theil

liegt nahe hinter dem Manubrium sterni, sein linkes hinteres Ende an der linken Seite des dritten Brustwirbelkörpers: er läuft vor der Spaltungsstelle der Luftröhre und über den Bronchus sinister hin. Das fibröse Blatt des Herzbeutels ist mit seiner concaven Wand verwachsen.

3) *A. aorta descendens thoracica*, absteigende Brustaorte, 7″ bis 8″ lang, oben 10‴, unten 9‴ dick: ihr oberes Ende liegt an der linken Seite des dritten und vierten Brustwirbelkörpers, ihr unteres Ende vor dem zwölften Brustwirbelkörper neben der Mittellinie nach links: sie steigt also etwas schräg in dem linken Theile des Cavum mediastini posterioris, hinter dem Herzbeutel herab. Sie gränzt links an das linke Blatt des hinteren Mittelfells, rechts an den Ductus thoracicus und die Vena azygos, auch in der ersten Hälfte ihres Verlaufs an die Speiseröhre; in der zweiten Hälfte ihres Laufs liegt sie hinter der Speiseröhre. Indem sie durch den schräg gerichteten Hiatus aorticus des Zwerchfells geht, bleibt ihre hintere Wand in der Strecke beinahe eines Zolls länger in der Brusthöhle, als ihre vordere Wand.

4) *A. aorta descendens abdominalis*, absteigende Bauchaorte, 5½″ lang, oben 9‴, unten 7½‴ dick, läuft an der vorderen Fläche der Bauchwirbelkörper, fast in der Mittellinie, jedoch etwas mehr linkerseits; ihr Anfang wird seitwärts von den inneren Schenkeln des Zwerchfells eingefafst: übrigens geht sie hinter dem Saccus peritonaei herab und zwar hinter der Cardia, dem Corpus pancreatis, der Pars transversa inferior duodeni und der Radix mesenterii: rechterseits wird sie von der unteren Hohlvene begleitet. Sie endigt vor dem vierten Bauchwirbel, selten vor dem Fibrocartilago zwischen dem 4ten und 5ten Bauchwirbel, indem sie in die beiden Aa. iliacae communes und die A. sacralis media sich spaltet.

Verästelung der Aorta:

Arteria aorta adscendens.

Aus dieser entspringen, aufser kleinen Vasa vasorum für die A. pulmonalis und Vena cava superior, nur die beiden Kranzarterien des Herzens, Aa. coronariae cordis, welche in der Muskelsubstanz sich vertheilen.

1) *A. coronaria cordis dextra* s. anterior, $1^3/_5$‴ dick entspringt aus dem vorderen Sinus Valsalvae, läuft im Sulcus circularis zwischen Atrium dextrum und Ventriculus dexter, zuerst nach rechts unter der Auricula dextra und schlingt sich alsdann um den vorderen rechten Rand des Herzens nach der platten Seite des Herzens hin: giebt kleinere Äste an den Vorhof, schickt aber ihre meisten Äste die Wände des rechten Ventrikels, auch einen ansehnlichen Ast, *Ramus posterior*, der im Sulcus longitudinalis der platten Fläche bis zur Spitze herabläuft und zu beiden Herzkammern Zweige giebt; und endigt mit kleineren Ästen der platten Fläche des linken Herzens.

2) *A. coronaria cordis sinistra* s. posterior, $1^1/_4$‴ dick entspringt aus dem hinteren linken Sinus Valsalvae, geht nach vorn und links zwischen A. pulmonalis communis und Auricula sinistra, welche Zweige von ihr erhalten: giebt einen *Ramus anterior*, der im Sulcus longitudinalis der convexen Herzenswand zwischen den Ventrikeln, ihnen Äste gebend, zur Spitze läuft und hier mit dem Ramus posterior der A. coronaria dextra anastomosirt: — schlägt sich dann im Sulcus circularis um den linken hinteren Rand des Herzens, giebt Zweige an die linke Wand der linken Herzkammer, und fliefst an der platten Fläche mit den Endigungen der A. coronaria dextra zusammen.

Beide Aa. coronariae bilden also kranzförmige Anastomosen im Sulcus longitudinalis und circularis.

Arcus aortae.

Aus der nach oben gerichteten Convexität des Aortenbogens entspringen die Hauptstämme für den Kopf, Hals und die obere Extremität, Aa. carotides und subclaviae, und zwar die der rechten Seite vermittelst eines gemeinschaftlichen Stammes, A. anonyma: diese folgen in der Richtung von rechts und vorn nach links und hinten in folgender Ordnung aufeinander:

1) *A. anonyma* s. Truncus innominatus s. Truncus communis a. carotidis et subclaviae dextrae, unbenannte Schlagader; ein nur $^3/_4$″ langer, 6‴ dicker Stamm, welcher schräg nach rechts aufsteigt und noch hinter dem Manubrium sterni in die *A. carotis communis dextra* und *A. subclavia dextra* sich spaltet. Sie wird vorn von der V

nyma sinistra, rechts von der Vena anonyma dextra bekt, gränzt hinten und links an die Luftröhre.

2) *A. carotis communis sinistra*, linke gemeinaftliche Kopfschlagader, entspringt aus der Mitte des ens und geht an der linken Seite der Luftröhre fast krecht, nur wenig schräg nach links, aufwärts.

3) *A. subclavia sinistra*, linke Schlüsselpulsader, t neben der vorigen mehr nach links schräg aufwärts.

Aus der concaven Seite und hinteren Wand des Bogens pringen einige sehr kleine *Rami tracheales* und *bronchia*- für das untere Ende der Luftröhre und die Glandulae nchiales: zuweilen die eigentlichen Aa. bronchiales.

Arteria carotis communis.

Die rechte und linke gemeinschaftliche Kopfschlagader halten sich einander gleich, nur dafs die rechte, von der anonyma entspringende, etwas kürzer und 4‴ dick, die te länger und $3^4/_5$‴ dick ist. Beide steigen durch die re Öffnung des Brustkastens an den Hals herauf, hinter t Ursprunge des M. sternothyreoideus und dem inneren ile der Articulatio sternoclavicularis; die rechte vor dem ten Umfange der Luftröhre, die linke etwas mehr rückts an der Seitenwand der Trachea und hinter der Vena nyma sinistra. Am Halse läuft die rechte Carotis neben Luftröhre, die linke neben dem Oesophagus, gestreckt nur leicht nach aufsen und hinten sich biegend aufts; zwischen diesen Röhren und dem M. scalenus ante-, vor den Mm. longus colli und rectus capitis anterior or, vorn vom M. sternocleidomastoideus, vom äufseren de des M. sternothyreoideus, von dem Tendo intermedius l oberen Bauche des M. omohyoideus bedeckt, an der seren und vorderen Seite von der Vena jugularis comnis, an der äufseren und hinteren Seite vom N. vagus leitet: überall zwischen dem oberflächlichen und tiefen tte der Fascia cervicalis, welche für sie, nebst der genten Vene und Nerven, eine vollständige Scheide bilden. Trigonum cervicale angelangt liegen beide gemeinschaften Carotiden neben dem hinteren Rande des Schildknors und der Seitenwand des Pharynx, vorn vom Seitenlapn der Schilddrüse etwas überragt, übrigens oberflächlich,

von der Haut, dem Platysma myoides, und dem oberflächlichen Blatte der Fascia cervicalis bedeckt. In der Höhe des oberen Randes des Schildknorpels spaltet sich jede A. carotis communis gabelförmig in die A. carotis externa und interna.

I. *A. carotis externa s. facialis.*

Die äufsere Kopfschlagader geht, in fortgesetzter Richtung der A. carotis communis und leicht geschlängelt aufwärts bis in die Gegend unter dem äufseren Ohre, ist an ihrem Anfange $2\frac{1}{2}'''$, an ihrem Ende $2'''$ dick. Im Trigonum cervicale wird sie nur von dem Platysma myoides dem oberflächlichen Blatte der Fascia cervicalis und der Vena facialis communis bedeckt und giebt hier von ihrem vorderen Umfange die Aa. thyreoidea superior, lingualis und maxillaris interna, von ihrer inneren Wand die A. pharyngea adscendens, von ihrer hinteren Wand den Ramus sternocleidomastoideus ab. Sodann verbirgt sie sich unter dem hinteren Bauche des M. digastricus maxillae inferioris und dem M. stylohyoideus und schickt hier von ihrer hinteren Wand die A. occipitalis ab: geht alsdann zwischen den genannten Muskeln und dem M. styloglossus hindurch, etwas nach hinten und innen sich wendend, längs des hinteren Randes des Ramus maxillae inferioris aufwärts, von den Läppchen der Glandula parotis gänzlich umgeben: und giebt in dieser Strecke die von ihrer hinteren Wand entspringende A. auricularis posterior, auch Rami parotidei, masseterici und pterygoidei ab, und spaltet sich hinter dem Collum processus condyloidei des Unterkiefers in die A. temporalis superficialis und A. maxillaris interna, womit sie endigt.

1) *A. thyreoidea superior*, obere Schildschlagader $1\frac{1}{2}'''$ dick, entspringt ganz nahe über der Theilungsstelle der A. carotis communis, läuft im Trigonum cervicale bogenförmig nach vorn und oben; alsdann, vom oberen Bauche des M. omohyoideus bedeckt, geschlängelt nach vorn und unten.

a) *A. laryngea superior*, obere Kehlkopfschlagader $\frac{3}{4}'''$ dick, geht zwischen Cornu majus oss. hyoidei und dem oberen Rande der Seitenplatte des Schildknorpels nach vorn, vom M. thyreohyoideus bedeckt, dringt durch die Membrana hyothyreoidea, und vertheilt sich im Innern des Kehlkop-

nders an die Epiglottis, Stimmritzenbänder, Mm. thy-
rytaenoidei, cricoarytaenoidei laterales und arytaenoideus
sversus und an die Schleimhaut.

b) *Rami musculares*, $\frac{1}{2}$‴ bis 1‴ dick, an die Mm.
ıocleidomastoideus, omohyoideus, sternothyreoideus und
eohyoideus und sternohyoideus. Der längste dieser Äste,
ricothyreoidea, $\frac{1}{4}$‴ bis $\frac{1}{2}$‴ dick, geht zum M. crico-
eoideus und queer vor dem Lig. cricothyreoidum me-
i, mit dem der anderen Seite anastomosirend, und Äste
h die Löcher dieses Bandes in das Innere des Kehlkopfs
bend.

c) *Rami thyreoidei*, zahlreich, $\frac{1}{2}$‴ bis 1‴ dick, zur
ldrüse.

2) *A. pharyngea adscendens*, aufsteigende Schlund-
schl., $\frac{3}{4}$‴ dick, läuft an der inneren Seite der Carotis
rna und interna und des M. styloglossus, dicht an der
nwand des Pharynx aufwärts, giebt Äste an den M.
trictor pharyngis inferior, und theilt sich in die

a) *A. pharyngobasilaris*, $\frac{1}{2}$‴ dick, steigt an der seit-
n und hinteren Wand des Pharynx bis zur Basis cranii
ie Höhe, vertheilt sich in die Mm. constrictor phar.
us und superior, stylopharyngeus, levator und tensor
palatini, Tuba Eustachii; giebt ein durch den Fibrocar-
o basilaris dringendes Ästchen an die Dura mater;
tomosirt mit der A. Vidiana.

b) *A. pharyngopalatina* s. *palatina adscendens*, Schlund-
gaumenschl. oder aufsteigende Gaumenschl., $\frac{2}{3}$‴ dick,
mehr nach vorn und geschlängelt am M. constrictor
yngis medius herauf, diesem und dem M. stylopharyn-
Äste gebend, und dringt dann in dem befestigten Rande
Arcus pharyngopalatinus zum Gaumensegel, mit der A.
ygopalatina anastomosirend.

3) *A. lingualis*, Zungenschlagader, $1\frac{1}{2}$‴ dick, ent-
ngt in der Höhe des Cornu majus des Zungenbeins, läuft
ittelbar oberhalb desselben nach vorn, zwischen M. hyo-
sus und dem Ursprunge des M. constrictor pharyngis
lius, vom ersteren bedeckt, dringt dann nach oben, innen
vorn in das Muskelfleisch der Zunge.

a) *Ramus hyoideus*, $\frac{1}{4}$‴ dick, läuft an der äufseren
te des Cornu majus oss. hyoidei nach vorn und giebt an

die hieselbst sich befestigenden und entspringenden Muskeln Zweige ab.

b) *A. dorsalis linguae*, Zungenrückenschl., oft zwei- bis dreifach vorhanden, $^1/_4$‴ bis $^1/_2$‴ dick, geht an der inneren Fläche des M. hyoglossus aufwärts, giebt Äste zu diesem Muskel, zum M. styloglossus, glossopalatinus, und zur Schleimhaut des Zungenrückens an der Wurzel der Zunge.

c) *A. sublingualis*, Unterzungenschl., $^3/_4$‴ dick, entsteht am vorderen Rande des M. hyoglossus, geht auf dem Boden der Mundhöhle nach vorn, neben dem M. genioglossus, über den Mm. genio- und mylohyoideus, unter der Glandula sublingualis und etwas nach aufsen vom Ductus Whartonianus: giebt allen diesen Theilen Äste und anastomosirt durch Zweige, welche den M. mylohyoideus durchbohren, mit der A. submentalis.

d) *A. ranina* s. *profunda linguae*, tiefe Zungenschl., $^5/_4$‴ dick, Fortsetzung des Stammes, steigt zwischen Mm. lingualis und genioglossus nach oben und läuft alsdann zwischen den Muskelbündeln der Zunge stark geschlängelt nach vorn, im mittleren Theile der Zunge $^1/_2$″ tief unter dem Zungenrücken. Giebt nach allen Seiten sehr zahlreiche kleine Äste: in der Zungenspitze anastomosirt sie bogenförmig mit der der anderen Seite.

4. *A. maxillaris externa* s. facialis anterior, äufsere Kiefer- oder Antlitzschlagader, $1^3/_4$‴ dick, entspringt nahe oberhalb der A. lingualis, nahe unter dem hinteren Bauche des M. digastricus maxillae inferioris: läuft anfänglich an der inneren Seite desselben etwas nach oben und alsdann durch die Regio submaxillaris horizontal nach vorn, an der inneren Seite der Basis maxillae inferioris, von aufsen und unten durch die Glandula submaxillaris verdeckt. Am vorderen Rande der Insertion des M. masseter biegt sie sich über den Unterkiefer aufwärts in das Gesicht und geht stark geschlängelt nach vorn und oben, gegen die Seitenwand der Nase hin, anfangs zwischen den Mm. masseter und depressor anguli oris, nur vom M. risorius Santorini bedeckt; verbirgt sich aber später unter den Mm. zygomaticus major und minor. Sie versorgt den ganzen vorderen Theil des Gesichts bis zur Nasenwurzel hin.

Äste von der horizontalen Strecke:

a) *Rami submaxillares*, von $^1/_4$‴ bis $^1/_2$‴ Dicke, zur Glandula submaxillaris, Mm. stylohyoideus, pterygoideus internus und masseter; häufig entspringt unter diesen auch die A. pharyngopalatina.

b) *A. submentalis*, Unterkinnschl., läuft unter dem M. mylohyoideus, zwischen der Basis des Unterkiefers und dem vorderen Bauche des M. digastricus maxillae inferioris nach vorn gegen das Kinn hin, anfänglich noch von der Gland. submaxillaris, späterhin nur vom Platysma myoides bedeckt. Giebt den genannten Theilen Zweige, anastomosirt mit der durch den M. mylohyoideus von ihr getrennten A. sublingualis; neben dem Kinn biegt sie sich aufwärts, giebt der Haut desselben, den Mm. quadratus und levator menti Äste und anastomosirt mit der der anderen Seite, mit der A. mentalis und mit Zweigen der A. coronaria labii inferioris.

Äste von der schräg aufsteigenden Strecke:

c) *Rami buccales inferiores*, zahlreich, $^1/_4$‴ bis $^1/_3$‴ dick, an die Mm. masseter, buccinator, depressor anguli oris.

d) *A. coronaria labii inferioris*, s. labialis inferior, Kranzschl. der Unterlippe, $^3/_4$‴ dick, entspringt in der Höhe des Alveolarrandes des Unterkiefers, tritt unter den M. depressor anguli oris und läuft in dem Fleische des M. orbicularis oris bis zur Mitte der Unterlippe, woselbst sie mit der der anderen Seite zusammenfliefst: sie versorgt die Unterlippe und den oberen Theil der Kinngegend.

e) *A. coronaria labii superioris*, s. labialis superior, Kranzschl. der Oberlippe, $^1/_2$‴ bis $^2/_3$‴ dick, entspringt zwischen den Caudae der Mm. zygomaticus major und minor, tritt unter den M. levator labii superioris, versieht Mundwinkel und Oberlippe, indem sie in der Substanz des M. orbicularis oris bis zur Mittellinie läuft und hier mit der der anderen Seite zusammenfliefst: von hier schickt sie die öfters auf einer oder beiden Seiten doppelte *A. septi mobilis* von $^1/_4$‴ Dicke aufwärts zum unteren Theile der Nasenscheidewand. — Beide Lippenarterien bilden, durch ihre $^1/_3$‴ starken Anastomosen mit denen der anderen Seite, und mit den zwischen ihren Ursprüngen befindlichen Strecken der Aa. maxillares externae, einen weiten Kranz um die Mundspalte. Sie laufen sehr geschlängelt und liegen im rothen Rande der Lippen der Schleimhaut näher als der äufsern Haut.

f) *Rami buccales superiores*, zahlreiche, $^1/_4$‴ dicke Äste zum oberen Theile des M. buccinator, den Mm. zygomatici, levator anguli oris und orbicularis palpebrarum, die mit den Aa. infraorbitalis, transversa faciei und buccinatoria anastomosiren.

g) *A. nasalis lateralis* s. *angularis*, seitliche Nasenschl., $^3/_4$‴ dick, ist das Ende der A. maxillaris externa, krümmt sich hinter dem Nasenflügel nach vorn und oben, und vertheilt sich an der Seitenwand der Nase mit *Rami alares* s. pinnales an den Nasenflügeln, mit *Rami dorsales* gegen den Nasenrücken hin: letztere anastomosiren mit der A. dorsalis nasi aus der A. ophthalmica. Sehr häufig, aber nicht immer, steigt ein stärkerer Ast der A. nasalis lateralis ziemlich gestreckt an der Seitenwand der Nase bis zum inneren Augenwinkel herauf, um diese Anastomose einzugehen: dieser ist die eigentlich sog. A. angularis.

5. *Ramus sternocleidomastoideus*, ein ziemlich beständiger, $^1/_2$‴ bis $^3/_4$‴ dicker Muskelast, welcher in gleicher Höhe mit der A. maxillaris externa entspringt, durch den oberen Theil des Trigonum cervicale nach hinten und unten läuft und in den vorderen Rand des M. sternocleidomastoideus sich einsenkt.

6. *A. occipitalis*, Hinterhauptschl., $^5/_4$‴ dick, entspringt etwas höher als die A. maxillaris externa; läuft, von dem hinteren Bauche des M. digastricus maxillae inferioris und der Cauda des M. sternocleidomastoideus bedeckt, unter der Incisura mastoidea nach hinten und oben, sodann nahe unter dem Hinterhauptbein und über dem Proc. transversus atlantis nach hinten und innen, bedeckt von den Mm. trachelomastoideus und splenius capitis, und wendet sich dann nach oben: ihr Lauf ist sehr geschlängelt.

a) *A. meningea posterior externa*, ein $^1/_8$‴ dicker Ast, der durch das For. mastoideum oder jugulare zur Dura mater hinter der Pyramide des Schläfenbeins geht.

b) *Rami cervicales*, $^1/_2$‴ dick, an die oberen Enden der Nackenmuskeln der zweiten, dritten und vierten Schicht; der stärkste derselben steigt zwischen Mm. splenius capitis und complexus abwärts, ein anderer dringt zu den Mm. recti posteriores und obliqui capitis.

c) *Ramus occipitalis*, ist die $^3/_4$‴ dicke Fortsetzung

des Stammes, dringt, $1\frac{1}{4}''$ vom Lig. nuchae entfernt, zwischen den oberen Enden des M. cucullaris und splenius capitis an die Oberfläche und läuft geschlängelt zwischen Galea aponeurotica und Haut durch die Hinterhauptgegend gegen den Scheitel hinauf, nach beiden Seiten ansehnliche Äste an die Bedeckungen des Schädelgewölbes gebend.

7. *A. auricularis posterior*, hintere Ohrschl., $\frac{3}{4}'''$ dick, entspringt vom M. stylohyoideus und der Parotis bedeckt, läuft hinter der A. carotis aufwärts, am vorderen Rande des Proc. mastoideus und hinter dem äufseren Ohre, und giebt

a) Äste zu den Mm. digastricus max. inf., stylohyoideus, styloglossus, sternocleidomastoideus, Gland. parotis und dem knorpeligen äufseren Gehörgange.

b) *A. stylomastoidea*, Griffellochschl., $\frac{1}{4}'''$ dick, dringt in den Canalis Fallopii, giebt Äste an die Cellulae mastoideae, M. stapedius, den hinteren Theil der Paukenhöhle und einen an die Membr. tympani, welcher hinter dem Manubrium mallei herabsteigt: auch ein Ästchen, welches durch die Fenestra rotunda in die Scala tympani der Schnecke dringt.

Hinter dem Ohre theilt sich die A. auric. post. in den

c) *Ramus auricularis* s. anterior, $\frac{1}{2}'''$ dick, versorgt nicht allein die hintere Fläche des äufseren Ohres, sondern schickt auch einen Ast an die vordere Fläche desselben, welcher die Concha des Ohrknorpels durchbohrt.

d) *Ramus occipitalis* s. posterior, $\frac{1}{2}'''$ dick, läuft hinter dem Ohre bis in die Scheitelgegend gerade aufwärts, versorgt die Mm. auriculares posteriores und occipitalis, und anastomosirt nach hinten mit der A. occipitalis, nach vorn mit der A. temporalis superficialis posterior.

8. *Rami parotidei*, *masseterici* und *pterygoidei*, zahlreich, $\frac{1}{4}'''$ bis $\frac{1}{2}'''$ dick, für die Parotis, Mm. masseter und pterygoideus internus.

9. *A. temporalis superficialis*, oberflächliche Schläfenschl., der eine Endast der A. carotis facialis, $1\frac{1}{4}'''$ dick, wird an ihrem Ursprunge von der Gland. parotis bedeckt, nimmt ihren Lauf nach oben und aufsen, kommt vor dem Tragus oberflächlich unter der Haut und der Fascia parotideo-masseterica zu liegen, steigt über die Wurzel des

Proc. zygomaticus oss. temporum aufwärts in die Schläfengegend, woselbst sie dicht auf dem oberflächlichen Blatte der Fascia temporalis liegt, zum Theil vom M. auricularis superior bedeckt wird und $\frac{1}{2}$'' oberhalb des Jochbogens in zwei Endäste, Aa. temp. superf. anterior und posterior, sich theilt. Äste:

a) *A. transversa faciei* s. facialis transversa, queere Antlitzschl., $\frac{1}{2}$''' bis $\frac{3}{4}$''' dick, geht queer nach vorn über das Collum proc. condyloidei des Unterkiefers hinweg zwischen Parotis und M. masseter, alsdann längs der äufseren Fläche dieses Muskels, $\frac{1}{2}$'' unterhalb des unteren Randes des Jochbogens und sehr nahe oberhalb des Ductus Stenonianus: giebt Äste an die Parotis, Mm. masseter, zygomatici, levator anguli oris, orbicularis palpebrarum und die Wangenhaut: anastomosirt mit den Rami buccales superiores der A. maxillaris externa, mit der A. buccinatoria und infraorbitalis.

b) *A. auriculares anteriores inferiores*, vordere untere Ohrschl., zwei bis drei, $\frac{1}{4}$''' dick, zum unteren und vorderen Theile des äufseren Ohrs, zum Tragus und äufseren Gehörgange.

c) *A. temporalis media*, mittlere Schläfenschl., $\frac{1}{2}$''' dick, durchbohrt unmittelbar über dem Arcus zygomaticus die Fascia temporalis, vertheilt sich in den äufseren Schichten des Schläfenmuskels und anastomosirt mit den Aa. temporales profundae.

d) *A. auricularis anterior superior*, vordere obere Ohrschl., $\frac{1}{3}$''' dick, biegt sich nach hinten, zum Helix und Mm. auriculares anterior und superior.

e) *Ramus supraorbitalis* s. zygomatico-orbitalis, $\frac{1}{2}$''' dick, läuft schräg durch die Schläfengegend nach vorn gegen den oberen Augenhöhlenrand hin zum M. orbicularis palp. und Stirnhaut.

f) *A. temporalis superficialis anterior* s. Ramus anterior s. frontalis, $\frac{2}{3}$''' dick, läuft geschlängelt in der Richtung gegen das Tuber frontale hin und steigt oberhalb desselben durch die Vorderhauptsgegend gegen den Scheitel hinauf, anastomosirt mit der A. frontalis.

g) *A. temporalis superficialis posterior* s. Ramus posterior s. occipitalis, $\frac{3}{4}$''' dick, steigt fast senkrecht gegen

die Scheitelgegend aufwärts, anastomosirt mit der vorigen, der A. auricularis posterior und occipitalis.

10. *A. maxillaris interna* s. facialis profunda, innere Kieferarterie, der stärkere Endast der A. carotis facialis, 2‴ dick, ist vorzüglich für die tieferen seitlichen Theile des Gesichts, die Zähne, Nasenhöhle, den harten Gaumen und die harte Hirnhaut bestimmt. Sie verläuft, von der Parotis, dem M. masseter, dem Ramus maxillae inferioris und Arcus zygomaticus und der Cauda des M. temporalis bedeckt, geschlängelt in schräger Richtung nach vorn, oben und innen, bis in die Fossa pterygopalatina. Sogleich nach ihrem Ursprunge geht sie an der inneren Seite des Proc. condyloideus des Unterkiefers, unterhalb des M. pterygoideus externus nach vorn und giebt hier die Aa. auricularis profunda, tympanica und alveolaris inferior ab; läuft sodann geschlängelt nach vorn und innen, in der Furche zwischen der äufseren Fläche des M. pterygoideus internus und dem unteren Rande des M. pterygoideus externus und giebt nach einander die Aa. meningea media, masseterica, temporalis profunda posterior, pterygoideae, buccinatoria, alveolaris superior und temporalis profunda anterior ab, von welchen Arterien mehrere oft gemeinschaftlich mit anderen entspringen. Sodann dringt sie, kaum noch 1‴ dick, nach innen in die Fossa pterygopalatina, giebt am Eingange dieser Grube die A. infraorbitalis ab und spaltet sich in der Tiefe derselben in die Aa. pterygopalatina und sphenopalatina.

a) *A. auricularis profunda*, tiefe Ohrschl., ⅓‴ dick, an den äufseren Gehörgang.

b) *A. tympanica*, Paukenschl., ¼‴ dick, giebt Äste an das Kiefergelenk und den M. mallei externus, dringt durch die Fissura Glaseri in die Paukenhöhle, in deren vorderem Theile sie sich verästelt, mit der A. stylomastoidea anastomosirend.

c) *A. alveolaris inferior* s. maxillaris inferior, s. dentalis inferior, untere Zahnschl., ⅔‴ dick, läuft abwärts und nach vorn zwischen dem Aste des Unterkiefers und dem Lig. maxillare internum, dringt durch das For. maxillare posterius in den Canalis maxillaris, giebt so viele *Rami dentales*, als Zahnwurzeln vorhanden; ihr ½‴ dickes Ende, *A. mentalis*, Kinnschl., kommt aus dem For. mentale hervor,

vertheilt sich an die Mm. depressor anguli oris und quadratus menti und das Zahnfleisch des Unterkiefers, und anastomosirt mit den Aa. submentalis und coronaria labii inferioris.

d) *A. meningea media* s. spinosa, entspringt meistens der vorigen gegenüber vom inneren Umfange der A. maxillaris interna, deren stärkster, 1‴ dicke Ast sie ist: geht unter dem M. pterygoideus externus nach innen und alsdann an seiner inneren Fläche aufwärts: giebt Äste an diesen M. und an die Mm. tensor und levator veli palatini: dringt durch das Foramen spinosum in die Schädelhöhle: giebt den *Ramus petrosus superficialis*, welcher zum M. mallei internus und zum oberen Theil der Paukenhöhle geht, und durch den Hiatus can. Fallopii in den Canalis Fallopii gelangend, der A. stylomastoidea anastomosirend begegnet. — Sodann theilt sie sich in einen vorderen gröfseren Ast, der an der inneren Fläche der Ala magna oss. sphen. und am Angulus sphenoidalis des Os parietale nach vorn und oben sich krümmt: und einen hinteren kleineren Ast, der mehr senkrecht und nach hinten an der inneren Fläche der Pars squamosa oss. temporum aufsteigt: beide verästeln sich baumförmig in der Dura mater an der Seitenwand und dem Gewölbe des Schädels, liegen aber mehr an der äufseren Fläche dieser Haut und sind mehr oder weniger in den Sulci meningei der genannten Knochen eingebettet, streckenweise sogar ganz von der Knochenmasse umschlossen.

e) *A. masseterica*, Kaumuskelschl., ½‴ dick, dringt nach aufsen durch die Incisura semilunaris des Ramus maxillae inferioris in die innere Fläche des M. masseter.

f) *Aa. temporales profundae, posterior et anterior*, hintere und vordere tiefe Schläfenschl., ½‴ bis ¾‴ dick, laufen aufwärts in den M. temporalis und anastomosiren mit der A. temporalis media. Die hintere liegt oberflächlicher, die vordere tiefer, dicht auf der Ala magna oss. sphen. und schickt oft durch den Canalis zygomaticus einen kleinen Ast in die Augenhöhle, der mit der A. lacrymalis anastomosirt.

g) *Aa. pterygoideae*, Flügelmuskelschl., kleine Arterien von unbestimmter Anzahl für die Mm. pterygoidei internus und externus, die oft aus den vorgenannten Muskelarterien oder der A. buccinatoria entspringen.

h) *A. buccinatoria* s. *buccalis*, Backenschl., ⅔‴ dick,

steigt anfangs abwärts und läuft dann zwischen Mm. masseter und buccinator nach vorn, vertheilt sich an letzteren Muskel, an die Schleimhaut der Mundhöhle, das obere Zahnfleisch und die Mm. zygomatici und levator anguli oris, anastomosirt mit den Ästen der Aa. maxillaris externa, transversa faciei und infraorbitalis.

i) *A. alveolaris superior* s. dentalis superior, obere Zahnschl., $^1/_2$‴ dick, dringt nach unten und vorn durch die For. maxillaria superiora in die Kanäle der Superficies facialis des Oberkieferbeins, versorgt die Schleimhaut des Sinus maxillaris, die oberen Backenzähne und das Zahnfleisch derselben.

k) *A. infraorbitalis*, Unteraugenhöhlenschl., $^1/_2$‴ bis $^2/_3$‴ dick, geht nach vorn durch die Fissura orbitalis inferior und den Canalis infraorbitalis, giebt hier Rami orbitales an die Periorbita und die Mm. rectus inferior und obliquus inferior des Augapfels; ferner Zweige an die Schleimhaut des Sinus maxillaris; einen oder zwei *Rami dentales superiores anteriores* für den oberen Eckzahn und die Schneidezähne. Sodann tritt sie aus dem Foramen infraorbitale in der Wangengegend hervor, bedeckt vom M. levator labii superioris, giebt Äste an diesen, an das Zahnfleisch, an die Mm. levator anguli oris, levator labii supér. alaeque nasi, compressor nasi und orbicularis palpebrarum: und anastomosirt mit den Aa. alveolaris superior, buccinatoria, Rami buccales superiores der A. maxillaris externa, Aa. nasalis lateralis, dorsalis nasi und palpebralis inferior.

l) *A. pterygopalatina* s. *palatina descendens*, absteigende Gaumenschl., $^2/_3$‴ dick, giebt zuerst die kleine *A. Vidiana* s. pharyngea suprema ab, die durch den Canalis Vidianus oder einen Nebenkanal desselben zur oberen Wand des Pharynx, zur Tuba Eustachii und dem M. levator veli palatini geht, mit der A. pharyngobasilaris anastomosirt. Sodann steigt sie im Canalis pterygopalatinus abwärts und tritt mit drei Ästen durch die Foramina palatina posteriora: der hintere Ast zum Pharynx, der mittlere zum Velum palatinum und zur Tonsille, beide mit der A. pharyngopalatina anastomosirend. Der vordere, stärkste, $^1/_2$‴ dicke Ast, *A. palatina anterior*, läuft nach vorn längs des harten Gaumen, dessen Schleimhaut nebst Zahnfleisch versorgend; schickt

auch Äste durch den Canalis incisivus zum Boden der Nasenhöhle, und anastomosirt hinter den Schneidezähnen mit der der anderen Seite.

m) *A. sphenopalatina* s. nasalis posterior communis, Nasenhöhlenschl., $^3/_4$‴ dick, dringt nach innen durch das For. sphenopalatinum in die Nasenhöhle; giebt Zweige an den Sinus sphenoidalis, und theilt sich in die zwei bis drei *Aa. nasales posteriores*, $^1/_4$‴ bis $^1/_2$‴ dick, die an der Seitenwand der Nasenhöhle in der Schleimhaut der Conchae und Meatus sich vertheilen: und in die $^1/_4$‴ dicke *A. septi narium posterior* s. nasopalatina, die mit mehreren Ästen an der Scheidewand nach vorn herabläuft und mit den Zweigen der A. palatina anterior und A. septi mobilis anastomosirt.

II. *A. carotis interna s. cerebralis.*

Die $2^3/_4$‴ dicke innere Kopfschlagader macht, im Trigonum cervicale von der gabelförmigen Spaltung der A. carotis communis ausgehend, zuerst eine schwache Biegung nach hinten und innen, und steigt alsdann gerade aufwärts, ganz in der Tiefe der Regio infraauricularis, nahe an der Seitenwand des Pharynx, vor dem M. longus colli und der Vena jugularis interna, an der inneren und hinteren Seite der A. carotis facialis: auswärts von der inneren Fläche der Gland. parotis und von den Mm. styloglossus und stylopharyngeus unmittelbar bedeckt, und durch diese Muskeln von der A. carotis facialis geschieden. Bevor sie in das Foramen caroticum externum dringt, macht sie noch eine Biegung nach innen; zuweilen ist ihr Lauf noch mehr geschlängelt. Im Canalis caroticus, woselbst sie einen kleinen Zweig rückwärts in die Paukenhöhle schickt, steigt sie anfänglich aufwärts, sodann beinahe horizontal nach vorn und innen; tritt durch das For. caroticum internum aus diesem Kanale in den, zwischen den Blättern der Dura mater befindlichen Sinus cavernosus, woselbst sie nach aufsen, oben und unten von der dünnhäutigen Vene dieses Sinus und von Nerven genau umgeben wird, und diesen Theilen, dem Hirnanhange und der harten Hirnhaut kleine Äste giebt. Innerhalb des Sinus cavernosus geht sie, dem Sulcus caroticus des Corpus ossis sphenoidei folgend, gebogen nach oben und nach vorn, alsdann nach oben und hinten, indem sie unter dem Proc. clinoideus anterior, hinter dem For. opticum und

neben der Sella turcica, einen dritten kurzen, nach vorn gerichteten Bogen beschreibt, von dessen convexer Vorderwand die A. ophthalmica entspringt. Nunmehr tritt sie, in der Richtung nach hinten, durch einen Spalt in der oberen Wand des Sinus cavernosus, neben und über der Sella turcica, in die von der Dura mater gebildete Höhle, giebt die A. communicans posterior und die A. choroidea ab, und spaltet sich in die A. corporis callosi und A. fossae Sylvii.

Die A. carotis interna macht sonach, aufser zwei oder mehreren Windungen am Halse, in der Basis cranii drei constante Biegungen: die erste mit ihrer convexen Seite nach hinten und oben gerichtete im Canalis caroticus; die zweite auf dieselbe Weise gekrümmte im unteren hinteren Theile des Sinus cavernosus, und die dritte stark nach vorn convexe im oberen vorderen Theil dieses Sinus, neben und vor der Sella turcica.

1. *A. ophthalmica,* Augenschl., $^3/_4$‴ dick, ist nicht allein für die Theile in der Augenhöhle, sondern auch für die Stirngegend, den vorderen Theil der Nasenhöhle und den Nasenrücken bestimmt. Sie geht durch das Foramen opticum nach vorn in die Augenhöhle, läuft anfänglich an der unteren und äufseren Seite des Nervus opticus und giebt hier die A. centralis retinae, A. lacrymalis und Aa. musculares oculi ab: geht alsdann queer über den N. opticus nach innen, woselbst die A. supraorbitalis und Aa. ciliares posteriores von ihr entspringen: schlängelt sich sodann an der inneren Wand der Augenhöhle, unter dem M. obliquus superior oculi, nach vorn und giebt die Aa. ethmoidales ab; und spaltet sich zwischen der Trochlea des M. obliquus superior und dem Lig. palpebrale internum in die Aa. palpebrales, frontalis und dorsalis nasi.

a) *A. centralis retinae,* Netzhautschl., $^1/_8$‴ dick, durchbohrt die äufsere oder untere Wand der Scheide der Sehnerven und läuft mitten in dem Marke desselben zur Retina (S. 416.)

b) *A. lacrymalis,* Thränenschl., $^1/_3$‴ dick, läuft zwischen den Mm. rectus superior und externus des Augapfels an der äufseren Wand der Augenhöhle nach vorn, giebt dem letzteren Äste, auch einige Aa. ciliares; anastomosirt durch kleine, in den Canalis zygomaticus dringende Zweige

mit der A. temporalis profunda anterior und A. transversa faciei; versorgt die Thränendrüsen und tritt am äufseren Augenwinkel in die Augenlieder, in welchen sie sich verbreitet und die Arcus tarsei bilden hilft.

c) *Aa. musculares oculi*, Augenmuskelnschl., gemeiniglich eine $^1/_4$''' dicke A. musc. superior und eine $^1/_3$''' dicke A. musc. inferior, die hinter dem Augapfel zu den Augenmuskeln gehen, auch einige Aa. ciliares abgeben: andere kleinere Muskeläste kommen von den Aa. lacrymalis, supraorbitalis und ethmoidalis.

d) *Aa. ciliares posteriores*, *breves* et *longae*, hintere Ciliar- oder Blendungsschl., vier bis sechs, $^1/_8$''' bis $^1/_4$''' dicke Stämmchen, die theils von der A. ophthalmica selbst, theils von den Aa. lacrymalis, supraorbitalis und musculares stammen und geschlängelt mit dem N. opticus zum hinteren Umfange des Augapfels laufen: bevor sie die Sclerotica durchbohren, spalten sich die breves in überhaupt 15 bis 20 Ästchen. (S. 409. 411.)

e) *Aa. ciliares anteriores*, vordere Blendungsschl., von unbestimmter Anzahl und sehr dünn, entspringen nur zum kleineren Theile von der A. ophthalmica, gröfstentheils aus den Aa. lacrymalis, musculares, supraorbitalis und ethmoidalis. (S. 411.)

f) *A. supraorbitalis*, Oberaugenhöhlenschl., $^1/_3$''' dick, läuft geschlängelt unter dem Dache der Augenhöhle, über dem M. levator palpebrae superioris und ihm Zweige gebend, nach vorn, gelangt durch das For. supraorbitale auf den Arcus supraciliaris, vertheilt sich an die Mm. orbicularis palpebrarum, corrugator supercilii und frontalis, von welchen Muskeln bedeckt sie gegen das Tuber frontale hin aufsteigt; anastomosirt mit der A. frontalis und dem Ramus supraorbitalis der A. temporalis superficialis.

g) *Aa. ethmoidales* s. ethmoideae, posterior et anterior, Siebbeinschl., dringen nach Abgabe von Muskelästen und einiger Aa. ciliares in das For. ethmoideum posterius et anterius. Die $^1/_4$''' dicke *A. ethm. posterior* vertheilt sich in den Cellulae ethmoideae, die $^1/_2$''' dicke *A. ethm. anterior* geht auf die obere Fläche der Lamina cribrosa, giebt die kleine *A. meningea anterior* an die harte Hirnhaut; dringt durch eins der Löcher der Lamina cribrosa zwischen die

Lamina perpendicularis und den Labyrinth des Siebbeins, dessen vorderen Zellen und den Sinus frontales sie Zweige giebt: läuft sodann als *A. nasalis anterior* an dem vorderen Theil der Seitenwand und Scheidewand der Nasenhöhle herab, an deren Schleimhaut sie sich vertheilt und mit den Ästen der A. sphenopalatina und A. septi mobilis anastomosirt.

h) *Aa. palpebrales, superior et inferior*, Augenliedschl., eine obere und untere, $^1/_3$ ‴ dick, oft aus einem Stämmchen, A. palpebralis communis, entspringend. Beide laufen nach aufsen, die inferior hinter dem Lig. palpebrale internum herabsteigend, zu den Augenliedern; geben Äste an diese, an den M. lacrymalis, Thränensack, Thränenkarunkel und die Conjunctiva, und bilden mit den Ästen der Aa. lacrymalis, infraorbitalis, frontalis und dorsalis nasi ein Netz in den Augenliedern. Der stärkste, $^1/_4$ ‴ dicke Ast jeder A. palpebralis ist der *Ramus tarseus* s. marginalis; dieser läuft nahe an dem freien Augenliedrande vor dem Tarsus, und bildet mit einem Ast der A. lacrymalis einen, der Augenliedspalte parallelen Gefäfsbogen, *Arcus tarseus superior et inferior.*

i) *A. frontalis*, Stirnschl., $^1/_2$ ‴ dick, schlägt sich um den Margo supraorbitalis, durch die Incisura supraorbitalis, in die Höhe, vom M. orbicularis palpebrarum bedeckt und nach innen von der A. supraorbitalis: steigt ziemlich senkrecht, jedoch geschlängelt, in der Stirngegend aufwärts, nach innen vom Tuber frontale; versorgt Muskeln und Haut der Stirn und Augenbraue, anastomosirt mit den Aa. dorsalis nasi, supraorbitalis und temporalis superficialis anterior.

k) *A. dorsalis nasi* s. nasalis, Nasenrückenschl., $^1/_3$ bis $^1/_2$ ‴ dick, durchbohrt über dem Lig. palpebrale internum den M. orbicularis palpebrarum, verästelt sich an Haut und Muskeln der Glabella und Nasenwurzel und läuft neben dem Nasenrücken herab, indem sie mit der A. nasalis lateralis, sowohl mit den Rami dorsales derselben, als mit der eigentlichen A. angularis, wenn eine solche vorhanden, anastomosirt. (S. 656).

2. *A. communicans posterior*, hintere Verbindungsschl., $^2/_3$ ‴ dick, geht neben dem Infundibulum, dem

Tuber cinereum und den Bulbi fornicis nach hinten, giebt diesen Theilen und den Pedunculi cerebri kleine Zweige und senkt sich in die A. cerebri profunda.

3. *A. choroidea*, Schl. des Adergeflechts, $^2/_3$ ‴ dick, geht unter dem Tractus opticus und an der äufseren Seite des Pedunculus cerebri nach hinten, aufsen und oben, dringt zwischen diesen Theilen und der Basis pedis hippocampi majoris in das Cornu descendens des Ventriculus lateralis cerebri, gelangt auf diese Weise in den Plexus choroideus lateralis und giebt an das hintere Hirnganglion und alle, den Seitenventrikel umgebende Theile zahlreiche Äste.

4. *A. corporis callosi* s. cerebralis anterior, Balkenschl., $^5/_4$ ‴ dick, geht oberhalb des N. opticus nach vorn und innen, giebt ihm, dem Chiasma opticum und der Caruncula mammillaris Äste, so wie auch Zweige, welche die Lamina cribrosa cerebri durchbohren und in das Corpus striatum gelangen; convergirt mit der der anderen Seite und anastomosirt mit ihr durch einen $1^1/_2$ ‴ bis 3 ‴ langen, $^1/_2$ ‴ dicken Queerast, *A. communicans anterior*, vordere Verbindungsschl.; und schickt Zweige an die untere Fläche des vorderen Hirnlappens. Sodann schlägt sie sich in der Scissura longitudinalis cerebri, nahe vor dem Genu corporis callosi in die Höhe, läuft auf der oberen Fläche des Balkens nach hinten, und vertheilt sich in das Corpus callosum, vorzüglich aber an die inneren Flächen und oberen Ränder beider Hemisphaerae cerebri.

5. *A. fossae Sylvii* s. cerebralis media, mittlere Hirnschl., 2 ‴ dick, geht nach aufsen und schickt zahlreiche Äste durch die Lamina cribrosa zu dem vorderen und hinteren Hirnganglion; steigt dann in der Fossa Sylvii nach aufsen und hinten aufwärts bis zur äufseren Fläche der Hemisphaerae cerebri, und giebt den vorderen und hinteren Hirnlappen zahlreiche Äste, die mit denen der A. corporis callosi und der A. profunda cerebri anastomosiren.

Arteria subclavia.

Die Schlüssel- oder Unterschlüsselbein-Pulsader ist der Hauptstamm für die obere Extremität, versorgt aber auch das kleine Gehirn, Rückenmark und den hinteren Theil des

grofsen Gehirns, den gröfsten Theil des Halses, die Vorderwand des Brustkastens und die obersten Interstitia intercostalia. Dieser grofse Arterienstamm tritt aus der oberen Öffnung des Brustkastens hervor und biegt sich nach aufsen, zwischen den Mm. scaleni anterior und medius hindurchgehend: läuft dann nach aufsen und unten durch die Achselhöhle und an der inneren Seite des Oberarms herab bis zur Plica cubiti. In diesem Verlaufe erhalten die einzelnen Strecken des Stammes verschiedene Benennungen: der Anfangstheil vom Ursprunge bis zum äufseren Rande des M. scalenus anterior wird vorzugsweise A. subclavia genannt: die folgende Strecke bis zum unteren Ende der Achselhöhle heifst A. axillaris: die am Oberarm herablaufende Fortsetzung ist die A. brachialis, welche durch Spaltung in die Aa. radialis und ulnaris, die mit ihren Ästen für den Vorderarm und die Hand bestimmt sind, endigt.

I. A. subclavia.

Die rechte aus der A. anonyma entspringende A. subclavia ist etwas kürzer und dicker und liegt mit ihrem Anfangstheile etwas weiter nach vorn, als die linke, welche vom Arcus aortae entspringt, hinter der Vena anonyma sinistra aufsteigt und hinten an das untere Ende des M. longus colli gränzt. Die rechte hat an ihrem Anfange 5‴, an ihrem Ende 4‴ Dm., die linke ist meistens um ½‴ dünner. Von der oberen Öffnung des Brustkastens an haben beide Aa. subclaviae gleiche Lage und Richtung. Sie steigt zwischen dem oberen stumpfen Ende des Saccus pleurae und der A. carotis communis, hinter dem äufseren Theile der Articulatio sternoclavicularis, schräg aufwärts und beschreibt, von der A. carotis sich entfernend, am unteren vorderen Theile des Halses einen nach oben convexen Bogen über der ersten Rippe: dieser wird vorn von den Ursprüngen der Mm. sternocleidomastoideus und sternothyreoideus und von der Vena subclavia bedeckt, sein nach aufsen gerichtetes Ende auch vom Ursprunge des M. scalenus anterior verborgen, indem die Arterie durch den Spalt zwischen diesem und dem M. scalenus medius hindurchgeht.

In der Brusthöhle giebt die A. subclavia aufser einigen kleinen Zweigen an die Thymus keine Äste ab: erst oberhalb des Schlüssel-Brustbeingelenks entspringen von ihr

ansehnliche Arterien: nämlich von ihrer oberen hinteren Wand die A. vertebralis, von ihrer unteren Wand die A. mammaria interna; etwas weiter nach aufsen, nahe am inneren Rande des M. scalenus anterior entsteht von ihrer oberen vorderen Wand der Truncus thyreocervicalis, welcher sogleich in die Aa. thyreoidea inferior, cervicalis adscendens, cervicalis superficialis und transversa scapulae sich theilt: endlich hinter dem M. scalenus anterior entspringt von ihrem hinteren Umfange der Truncus costocervicalis, der in die Aa. cervicalis profunda und intercostalis suprema sich spaltet, und von ihrer oberen Wand die A. transversa colli. (Über die häufigen Verschiedenheiten des Ursprungs dieser neun Arterien s. unten: Varietäten der Arterien.)

1) *A. vertebralis,* Wirbelschl., 2‴ dick, steigt am äufseren Rande des M. longus colli, hinter und nach aufsen von der A. carotis communis, fast senkrecht, nur leicht nach hinten gebogen, aufwärts. Nach einem Laufe von 1″ bis 1½″, in welchem sie keine namhafte Äste abgiebt, tritt sie durch das For. transversarium des sechsten Halswirbels in den Canalis vertebralis ein, und steigt in diesem bis zum Epistropheus aufwärts. Zwischen Epistropheus und Atlas macht sie eine Biegung nach hinten und innen, welche zwischen den Mm. trachelomastoideus und obliquus capitis inferior sich befindet, steigt dann nach aufsen zum For. transversarium atlantis herauf und senkrecht durch dieses Loch: windet sich alsdann nach hinten und innen, hinter der Massa lateralis atlantis und dem Proc. condyloideus des Hinterhauptbeins, indem sie hier zwischen den Mm. obliquus capitis superior u. rectus capitis posterior minor, und dem Lig. obturatorium posterius liegt. Sodann geht sie über dem Arcus posterius atlantis durch das erste For. intervertebrale (S. 155), indem sie jenes Ligament und die Dura mater durchbohrt und tritt am hinteren seitlichen Umfange des Foramen magnum occipitale in die Schädelhöhle ein. Auf diesem Wege durch den Canalis vertebralis giebt sie zahlreiche kleine Äste an sämmtliche, an die Proc. transversi der Halswirbel befestigte Muskeln, welche mit Zweigen der Aa. occipitalis, cervicalis adscendens und cervicalis profunda anastomosiren; auch *Rami spinales* von

¼‴ Dm., die durch die For. intervertebralia in den Canalis spinalis eindringen, an die Wirbel und ihre Ligamente, an die Dura mater und an das Rückenmark selbst gehen; endlich die kleine *A. meningea posterior interna*, welche durch das For. magnum occipitale zu der Dura mater der Fossae occipitales inferiores sich begiebt.

In der Schädelhöhle steigt die A. vertebralis anfangs an der Seite, alsdann vor der Medulla oblongata schräg aufwärts und nach innen, mit der der anderen Seite convergirend, giebt die Aa. spinalis posterior und anterior und die A. cerebelli inferior posterior ab, und vereinigt sich unter einem spitzen Winkel, vor dem For. magnum occipitale, mit der der anderen Seite zu einem unpaaren, 2‴ dicken Stamme, *A. basilaris*, Zapfen- oder Grundschl. Diese läuft auf dem Clivus, unter und vor dem Pons Varolii, aufwärts und vorwärts, giebt kleine Äste an das verlängerte Mark und den Pons, ferner auf jeder Seite die Aa. cerebelli inferior anterior, auditiva interna und cerebelli superior ab; und spaltet sich nach einem Verlaufe von 1½″, vor dem vorderen Rande des Pons Varolii, unter der Substantia perforata media des grofsen Gehirns, über den Proc. clinoidei posteriores, in zwei seitwärts divergirende ansehnliche Endäste, Aa. cerebri profundae, dextra et sinistra.

a) *A. spinalis posterior*, hintere Rückenmarksschl., ⅓‴ dick, läuft geschlängelt in der Pia mater an der hinteren Fläche des Rückenmarks bis zu dessen Ende herab, parallel mit der der anderen Seite und durch viele Queeräste mit ihr anastomosirend.

b) *A. spinalis anterior*, vordere Rückenmarksschl., ¼‴ dick, vereinigt sich meistens schon im For. magnum occip. mit der der anderen Seite zu einem unpaaren Stämmchen, welches an der vorderen Fläche des Rückenmarks geschlängelt herabgeht, sich häufig spaltet und wieder zusammenfliefst und bis zum Ende des Filum terminale im Canalis sacralis herabsteigt. — Die Aa. spinales anastomosiren vermittelst zahlreicher Queeräste mit einander, wodurch sie das Rückenmark umgebende Gefäfskränze bilden, vereinigen sich aufserdem mit den, durch die For. intervertebralia und sacralia eindringenden, Rami spinales

der Aa. vertebralis, intercostales, lumbares und sacrales laterales, durch welche sie verstärkt werden.

c) *A. cerebelli inferior posterior*, hintere untere Schl. des kleinen Gehirns, $^1/_2$ ''' dick, wendet sich nach aufsen und verbreitet sich an der unteren Fläche des Lobus cerebelli inferior posterior, an die Tonsilla cerebelli, den unteren Theil des Vermis, und schickt Äste zum Plexus choroideus ventriculi quarti.

d) *A. cerebelli inferior anterior*, vordere untere Schl. des kl. Gehirns, $^1/_2$ ''' dick, vertheilt sich an den Lobus cerebelli inferior anterior und den Flocculus: giebt oft die folgende ab.

e) *A. auditiva interna*, Schl. des innersten Ohrs, $^1/_4$ ''' dick, zuweilen doppelt, geht nach aufsen in den Meatus auditorius internus, anastomosirt mit der A. stylomastoidea, und spaltet sich in mehrere für den häutigen Labyrinth bestimmte Äste, von denen 2 bis 3 an die Säckchen des Vorhofs und die Tubuli semicirculares, 4 bis 5 durch den Tractus spiralis in die erste Windung der Schnecke, und ein stärkerer Ast durch den Tubulus centralis modioli zur zweiten Windung und zum Scyphus geht.

f) *A. cerebelli superior*, obere Schl. des kleinen Gehirns, $^3/_4$ ''' dick, läuft am vorderen Rande des Pons Varolii nach aufsen und hinten, alsdann neben und hinter der Eminentia quadrigemina zur oberen Fläche der Hemisphaera cerebelli; giebt Äste dem Pons, der Eminentia quadrigemina und dem Velum medullare anterius; vertheilt sich alsdann an die Lobi superiores und den oberen Theil des Vermis, anastomosirt mit beiden Aa. cerebelli inferiores.

g) *A. profunda cerebri s.* cerebralis posterior, tiefe Hirnschl., $^5/_4$ ''' dick, läuft anfangs etwas nach vorn und aufsen, nimmt die A. communicans posterior von der A. carotis interna auf (S. 665) und giebt Äste, welche zu den Bulbi fornicis und durch die Substantia perforata media zu den Vierhügeln, dem hinteren Hirnganglion und zum Plexus choroideus ventriculi tertii gehen: biegt sich sodann um den Pedunculus cerebri, oberhalb des Tentorium cerebelli verlaufend nach hinten, giebt Zweige an den Pedunculus und Splenium corporis callosi, an die Plexus choroidei, welche durch die Fissura magna cerebri dringen, und versorgt

die untere und innere Fläche des Lobus cerebri posterior.

Circulus arteriosus Willisii, der Willis'sche Kranz, ist ein durch ansehnliche Anastomosen der vorderen und hinteren Arterien des grofsen Gehirns gebildeter Gefäfskranz, welcher oberhalb und neben der Sella turcica das Chiasma opticum, das Tuber cinereum und die Bulbi fornicis umfafst. Er wird gebildet durch die Aa. cerebri profundae, (welche selbst durch ihren Ursprung aus der A. basilaris mit einander communiciren), durch die Aa. communicantes posteriores, durch kurze Strecken der Aa. carotides internae, durch die Aa. corporis callosi und die A. communicans anterior, welches die letzteren vereinigt. (S. 666).

2. *A. mammaria interna* s. thoracica interna, innere Brustschl., $1\frac{1}{2}$‴ dick, läuft anfangs etwas nach aufsen gebogen, hinter der Vena subclavia, bis hinter die Articulatio sternoclavicularis, alsdann an der hinteren Fläche der nach vorn gewölbten Vorderwand des Thorax, unmittelbar hinter den Rippenknorpeln gerade herab, $\frac{1}{4}$″ bis $\frac{1}{2}$″ vom Rande des Brustbeins entfernt, indem sie hinten vom Brustfell und M. triangularis sterni überzogen wird: die rechte liegt nämlich in der gröfsten Strecke ihres Verlaufs vor dem vorderen Rande der rechten Lunge, die linke oberwärts vor dem vorderen Rande der linken Lunge, unterwärts vor dem Cavum mediastini anterioris und dem Herzbeutel. Zwischen dem sechsten Rippenknorpel und dem Proc. xiphoides sterni endigt ihr Stamm durch Spaltung in die Aa. musculophrenica und epigastrica superior.

a) *Aa. mediastinae anteriores*, vordere Mittelfellschl., von unbestimmter Anzahl, $\frac{1}{4}$‴ bis $\frac{1}{3}$‴ dick, zur Thymus, den Lymphdrüsen hinter dem Brustbein und im vorderen Mittelfellraume, zu den grofsen Gefäfsen und dem Herzbeutel.

b) *A. bronchialis anterior* s. superior, $\frac{1}{4}$‴ dick, zu dem unteren Ende der Luftröhre und den Bronchi, häufig fehlend.

c) *A. pericardiaco-phrenica* s. diaphragmatica superior, Herzbeutel-Zwerchfellschl., $\frac{1}{2}$‴ dick und ziemlich lang, steigt mit dem N. phrenicus an der Seitenwand des Herzbeutels, vor der Lungenwurzel, zum Zwerchfell herab

und vertheilt sich an den Herzbeutel und den mittleren vorderen Theil des Zwerchfells.

d) *Rami perforantes*, 6 bis 7 an der Zahl, $\frac{1}{2}$‴ dick; der oberste dringt noch oberhalb des Brustbein-Schlüsselgelenks zwischen beiden Köpfen des M. sternocleidomastoideus hervor, die anderen durch die 5 bis 6 ersten Interstitia intercostalia: vertheilen sich an das Brustbein und seine Beinhaut, an die Mm. intercostales, triangularis sterni, pectoralis major, rectus und obliquus externus abdominis, an die Haut der Brust: im weiblichen Geschlechte auch an die Milchdrüse unter dem Namen *Aa. mammariae externae*, von welchen die zwischen dem dritten und vierten Rippenknorpel hervordringende, meistens die ansehnlichste und zuweilen $\frac{3}{4}$‴ bis 1‴ dick ist. Die an das Brustbein gehenden Äste anastomosiren von der rechten und linken Seite her mit einander.

e) *Aa. intercostales anteriores*, vordere Zwischenrippenarterien, $\frac{1}{2}$‴ dick, gehen in den sechs ersten Interstitia intercostalia nach aufsen: es finden sich zwei in jedem Interstitium, welche aus einem gemeinschaftlichen Stämmchen oder jede für sich entspringen und an den unteren und oberen Rändern der Rippenknorpel laufen: sie anastomosiren mit den Aa. intercostales posteriores und vertheilen sich an die Intercostal- und Brustmuskeln, den queeren Bauchmuskel und an die Pleura.

f) *A. musculophrenica*, $\frac{3}{4}$‴ dick, läuft hinter den Knorpeln der siebenten bis zehnten oder eilften Rippe, im vorderen und äufseren Rande des Zwerchfells nach aufsen und unten, giebt die Aa. intercostales anteriores für das siebente bis zehnte Interstitium intercostale und viele Äste an das Zwerchfell und die seitlichen Bauchmuskeln.

g) *A. epigastrica superior* s. *Ramus epigastricus*, obere Bauchdeckenschl., $\frac{3}{4}$‴ dick, tritt zwischen dem siebenten Rippenknorpel und dem Proc. xiphoides, seltner durch ein Loch des letzteren, in die Fleischsubstanz des M. rectus abdominis und läuft, diese versorgend, bis in die Höhe des Nabels herab, woselbst sie mit den Endästen der A. epigastrica inferior anastomosirt. Zuweilen gelangt ein kleiner Ast im Lig. suspensorium hepatis bis zur Leber, mit der A. hepatica anastomosirend.

3. *Truncus thyreocervicalis*, ein nur 3‴ bis 6‴ langer, 2½‴ dicker Stamm für die Organe in der vorderen und seitlichen Halsgegend und der oberen Schulterblattgegend: spaltet sich in vier ziemlich ansehnliche, divergirend verlaufende Arterien, die von innen nach aufsen in folgender Ordnung liegen: A. thyreoidea inferior, A. cervicalis adscendens, A. cervicalis superficialis und A. transversa scapulae. Dieser Stamm wird von Vielen als die A. thyreoidea inferior selbst, und die übrigen drei als Äste der letzteren bezeichnet.

a) *A. thyreoidea inferior*, untere Schildschl., 1½‴ bis 1¾‴ dick, steigt zwischen der A. carotis communis und dem inneren Rande des M. scalenus anterior etwas nach aufsen gekrümmt aufwärts, geht alsdann bogenförmig hinter der A. carotis communis (zwischen dieser und der Speiseröhre) nach innen und vorn gegen die Luftröhre hin und mit mehreren kurzen Windungen bis zum Kehlkopf aufwärts. Giebt einen Ast zum M. longus colli, *Rami tracheales, oesophagei* und *pharyngei*, ¼‴ bis ½‴ dick; ferner *Rami thyreoidei*, von denen einer oft 1‴ dick ist, zu den Seitenlappen der Schilddrüse und die den Kehlkopf bedeckenden Muskeln, welche mit den Ästen der A. thyreoidea superior anastomosiren: endlich die ½‴ dicke *A. laryngea inferior*, untere Kehlkopfsschl., welche, die Seitenwand des Pharynx unter dem M. cricopharyngeus durchbohrend, zu der hinteren Wand des Kehlkopfs aufsteigt, an die unteren Muskeln desselben und an die Schleimhaut des Larynx und Pharynx sich vertheilt, auch mit der A. laryngea superior anastomosirt.

b) *A. cervicalis adscendens*, aufsteigende Halsschl., ¾‴ dick, steigt gerade aufwärts, hinter der Vena jugularis communis und dem M. sternocleidomastoideus, auf der vorderen Fläche der Mm. scalenus anterior und rectus capitis anterior major, bis zur Basis cranii herauf, giebt ansehnliche, meistens queer nach aufsen laufende Äste an die Mm. longus colli, recti capitis anteriores, scaleni, levator scapulae, trachelomastoideus, splenii und complexus: anastomosirt mit den Muskelästen der Aa. vertebralis, cervicalis profunda und occipitalis.

c) *A. cervicalis superficialis* s. transversalis

cervicis (nicht mit der A. transversa colli zu verwechseln) oberflächliche Halsschl., 1‴ dick, entsteht oft mit der vorigen aus einem gemeinschaftlichen, ½″ langen Stämmchen: läuft in beinahe queerer, etwas schräg aufsteigender Richtung nach aufsen und hinten, zuerst hinter dem M. sternocleidomastoideus, sodann durch die Fossa supraclavicularis, 1″ oberhalb des oberen Randes des Schlüsselbeins; hieselbst nur von dem Platysma myoides, dem oberflächlichen Blatte der Fascia cervicalis, dem hinteren Bauche des M. omohyoideus, von Lymphdrüsen und Fett bedeckt. Sie giebt diesen Theilen, so wie den Mm. scaleni und levator scapulae, vor welchen sie verläuft, Äste, verbirgt sich hinter dem vorderen Rande des M. cucullaris, und endigt in diesem Muskel und in den Mm. splenii und rhomboideus.

d) *A. transversa scapulae* s. suprascapularis, queere oder obere Schulterblattschl., 1¼‴ dick, läuft in queerer Richtung unmittelbar hinter dem Schlüsselbein nach aufsen, vor dem M. scalenus anterior, der Vena subclavia, der A. axillaris und dem Plexus brachialis, bedeckt vom Schlüsselbein, dem M. sternocleidomastoideus und dem oberflächlichen Blatte der Fascia cervicalis: giebt diesen Theilen und dem M. subclavius kleine Äste. Sodann wird sie, hinter dem Lig. coracoclaviculare hinlaufend, von dem M. cucullaris und dem hinteren Bauche des M. omohyoideus bedeckt; giebt hier den ½‴ dicken *Ramus acromialis* s. scapularis superficialis, welcher die Insertion des M. cucullaris durchbohrt und auf dem Acromion sich verästelt, mit dem Ramus acromialis der A. thoracico-acromialis anastomosirend. Hiernach dringt sie durch die Incisura scapulae, unter dem Lig. transversum, in die Fossa supraspinata, unter dem M. supraspinatus, welcher Äste erhält: geht sodann hinter das Collum scapulae, zwischen dem Schultergelenk und dem vorderen Rande der Spina scapulae, in die Fossa infraspinata herab zum M. infraspinatus, und anastomosirt durch Äste von ¼‴ bis ½‴ Dicke mit der A. circumflexa scapulae.

4. *Truncus costocervicalis*, ein kurzes 1½‴ dickes Stämmchen, steigt hinter dem M. scalenus anterior aufwärts und spaltet sich in die

a) *A. intercostalis suprema* s. prima, oberste Rippenschl., ⅝‴ dick, biegt sich an der inneren Fläche

des M. scalenus medius und unmittelbar vor dem Halse der ersten Rippe nach hinten und unten, und theilt sich in die *A. intercostalis prima et secunda*, jede beinahe 1‴ dick, von welchen die letztere vor dem Halse der zweiten Rippe in das zweite Interstitium intercostale gelangt. Ihre weitere Vertheilung ist der der Aa. intercostales posteriores gleich, (s. Äste der A. aorta desc. thoracica.)

b) *A. cervicalis profunda*, tiefe Nackenschl., ¾‴ dick, geht, von der Mm. scalenis verborgen, unterhalb des Proc. transversus des siebenten Halswirbels nach hinten und steigt alsdann in der Tiefe des Nackens, zwischen den Mm. transversalis cervicis und semispinalis colli, bis zur Höhe des Epistropheus aufwärts; vertheilt sich an die dritte und vierte Schicht der Nackenmuskeln und anastomosirt mit Ästen der Aa. vertebralis, cervicalis adscendens, occipitalis, und dem Ramus cervicalis posterior der A. transversa colli.

5. *A. transversa colli* s. dorsalis scapulae, queere Halsschl., 1⅓‴ dick, läuft queer nach aufsen und hinten durch die Fossa supraclavicularis, ungefähr ½″ oberhalb des oberen Randes des Schlüsselbeins und der A. transversa scapulae und ¼″ oberhalb der A. axillaris, ¼″ bis ½″ unterhalb der A. cervicalis superficialis, aber in gröfserer Tiefe als diese, genau an der äufseren Fläche des M. scalenus medius anliegend; bedeckt von dem Platysma myoides, der Fascia cervicalis, Lymphdrüsen, den vorderen Ästen des 5ten und 6ten Halsnerven (also durch den Plexus brachialis gehend) und vom hinteren Bauche des M. omohyoideus. Alsdann am oberen Rande des Schulterblatts laufend, von dem M. cucullaris verborgen, geht sie zwischen den Bündeln des M. levator scapulae hindurch, giebt diesen und den Mm. scalenus medius und posterior Äste, und theilt sich in den

a) *Ramus supraspinatus*, ⅔‴ dick, zu den Mm. supraspinatus, cucullaris und zum hinteren Theil des M. deltoides, die Insertion des M. cucullaris an der Spina scapulae durchbohrend und mit den Ästen der A. transversa scapulae anastomosirend.

b) *Ramus cervicalis posterior*, ⅔‴ dick, steigt im Nacken zwischen den Mm. levator scapulae und splenii

aufwärts und vertheilt sich an diese und die Nackenmuskeln der dritten Schicht.

c) *A. dorsalis scapulae*, Rückenschl. des Schulterblatts, ist die 1‴ dicke Fortsetzung des Stammes; geht oberhalb des Angulus superior scapulae und alsdann längs der Basis scapulae, zwischen M. rhomboideus und M. serratus posterior superior herab bis zum Angulus inferior scapulae, woselbst sie die Insertion des M. serratus anterior major durchbohrt und an die vordere Fläche des Schulterblatts gelangt. Giebt Äste an alle genannten Muskeln, auch an die Mm. infraspinatus und subscapularis; anastomosirt mit den Rami dorsales der Aa. intercostales posteriores, und auf der vorderen und hinteren Fläche des unteren Winkels des Schulterblatts mit dem Ramus thoracicodorsalis der A. subscapularis.

II. A. axillaris.

Die Achselschlagader, welche an ihrem oberen Ende beinahe 4‴, am unteren Ende fast 3‴ dick ist, läuft in schräger Richtung nach aufsen und unten, vom vorderen seitlichen Theile des Halses an, hinter und unter dem Schlüsselbein, über die erste Rippe hinweg, in der Achselhöhle herab bis zum unteren Ende derselben. Vom äufseren Rande des M. scalenus anterior an bis zum Schlüsselbein liegt sie in einer Strecke von ungefähr 1″ noch in der Fossa supraclavicularis, von vorn und oben nur von der Haut des Halses, dem Platysma myoides, dem oberflächlichen Blatte der Fascia cervicalis, Lymphdrüsen und Fett bedeckt: nach vorn und unten gränzt sie an die A. transversa scapulae und Vena subclavia, nach unten an die erste Rippe, nach hinten und oben an den M. scalenus medius und den Plexus brachialis, und wird durch einige grofse Nerven des letzteren von der hinter und über ihr liegenden A. transversa colli geschieden. In der Achselhöhle selbst wird sie vorn von der Mitte des Schlüsselbeins, vom M. subclavius, von der Portio clavicularis des M. pectoralis major, von der Fascia coracoclavicularis, vom M. pectoralis minor und endlich von der Cauda des M. pectoralis major bedeckt: mit ihrem inneren (bei aufgehobenem Arme — unteren) Umfange gränzt sie zuerst an den Ursprung des M. scalenus medius und die erste Rippe, an den M. inter-

costalis externus primus, alsdann an den M. serratus anterior major: nach aufsen und oben von der Arterie befinden sich der Proc. coracoideus, das Schultergelenk, der M. coracobrachialis und das Caput breve m. bicipitis: nach hinten der M. subscapularis und die Caudae der Mm. teres major und latissimus dorsi: von unten her wird sie nur durch den Theil der Fascia brachii, welcher zwischen den Enden der Mm. pectoralis major und latissimus dorsi ausgespannt ist, geschützt. An ihrer vorderen und inneren (unteren) Seite wird die Arterie von der Vena axillaris, an der äufseren (oberen), hinteren und unteren, zum Theil auch vorderen Seite von dem Plexus brachialis genauer umgeben, aufserdem aber von vielem lockeren fettreichen Zellstoff und den Gland. lymph. axillares umhüllt. Zwischen der Insertion des M. pectoralis major und denen der Mm. latissimus dorsi und teres major tritt sie, nahe an der Insertion des M. coracobrachialis an das Os brachii, aus der unteren Öffnung der Achselhöhle hervor, um als A. brachialis sich fortzusetzen.

Die A. axillaris giebt, — aufser kleinen unbeständigen Ästen an die Mm. serratus anterior major, subscapularis und coracobrachialis und an die Glandulae lymph. axillares, — die Hauptäste für die Brust- und Schultergegend ab: nämlich die drei Aa. thoracicae, von der vorderen und inneren Wand des Stammes entspringend; die A. subscapularis von der inneren unteren Wand, und die beiden Aa. circumflexae humeri, von der äufseren und inneren Wand entstehend.

1. *A. thoracica suprema* s. prima, obere äufsere Brustschl., 1‴ dick, entspringt hinter dem M. subclavius, läuft zwischen den M. pectoralis major und minor nach unten und vorn, und vertheilt sich in diesen Muskeln und dem M. serratus anterior major, vorzüglich im M. pectoralis major, schickt auch kleinere Rami mammarii externi zur Milchdrüse.

2. *A. thoracico-acromialis* s. thoracica humeraria s. acromialis, Brustschulterschl., $^5/_4$‴ dick, entspringt nahe unterhalb der vorigen und geht eine kurze Strecke weit nach vorn, so dafs sie in der Fossa infraclavicularis ziemlich oberflächlich, nur vom oberen Rande des M. pectoralis

major und der Fascia coracoclavicularis bedeckt, oberhalb der Cauda des M. pectoralis minor, zu finden ist.

a) *Rami pectorales*, $^1/_2$‴ dick, zu den Brustmuskeln, mit der A. thoracica suprema anastomosirend.

b) *Ramus acromialis*, $^3/_4$‴ dick, läuft, von dem Ursprunge der Portio clavicularis des M. deltoides bedeckt, nach aufsen und oben gegen das Acromion hin, giebt Äste an das Schultergelenk und an jenen Muskel und schickt mehrere, den Muskel durchbohrende Zweige auf die obere Fläche des Acromion, welche mit dem Ramus acromialis der A. transversa scapulae ein Netz von Anastomosen, *Rete acromiale*, bilden.

c) *Ramus deltoideus*, $^3/_4$‴ dick, in der Spalte zwischen Mm. pectoralis major und deltoides nach aufsen herabsteigend, geht an die Portio clavicularis der letzteren, anastomosirt mit den Ästen der Aa. circumflexae humeri.

3. *A. thoracica longa*, lange äufsere Brustschl., $1^1/_3$‴ dick, entspringt hinter dem M. pectoralis minor und läuft an der Seitenwand des Thorax, der inneren Wand der Achselhöhle herab, mündet mit Ästen der A. thoracica suprema und dem Ramus thoracicodorsalis der A. subscapularis zusammen, vertheilt sich vorzüglich an den M. serratus anterior major und giebt eine oder mehrere *A. mammariae externae*, die in den äufseren Rand der Mamma sich einsenken.

4. *A. subscapularis* s. infrascapsularis, Unterschulterblattschl., $1^3/_4$‴ dick; entspringt vor dem unteren Rande der Cauda des M. subscapularis, geht hinter der A. axillaris und vor dem M. subscapularis eine kurze Strecke nach hinten und aufsen herab und giebt

a) *Rami subscapulares*, drei bis vier, $^1/_2$‴ dick, zu dem M. subscapularis und den Gland. lymph. axillares.

b) *Ramus thoracico-dorsalis*, 1‴ dick, steigt schräg nach hinten und aufsen herab, in der Richtung des vorderen Randes des Schulterblatts, an der Seitenwand des Thorax, zwischen Mm. serratus anterior major und latissimus dorsi; anastomosirt mit der A. thoracica longa, hinter welcher er verläuft, und in der Gegend des Angulus inferior scapulae mit der A. dorsalis scapulae.

c) *A. circumflexa scapulae*, umgebogene Schulterblattschl., $1\frac{1}{3}$‴ dick, der stärkste Ast oder die Fortsetzung des Stamms, giebt Äste an die Mm. subscapularis und teretes, dringt zwischen M. subscapularis und teres major ein und schlägt sich um den vorderen Rand der Scapula auf die hintere Fläche derselben. Ihr stärkerer oberer Ast gelangt zwischen Mm. infraspinatus und teres minor, der schwächere untere zwischen Mm. teres minor und teres major in die Fossa infraspinata: beide vertheilen sich an die Mm. infraspinatus, teretes, Caput longum m. tricipitis und den hinteren Theil des M. deltoides, und anastomosiren mit der A. dorsalis scapulae; der obere Ast auch durch starke Äste mit der A. transversa scapulae und mit der A. circumflexa humeri posterior.

5. *A. circumflexa humeri anterior*, vordere Kranzschl. des Arms, $\frac{2}{3}$‴ dick, läuft an der vorderen Fläche des Collum ossis brachii nach aufsen und hinten, von den Mm. deltoides, coracobrachialis und den Köpfen des M. biceps bedeckt, giebt diesen und dem Schultergelenk Äste.

6. *A. circumflexa humeri posterior*, hintere Kranzschl. des Arms, $1\frac{1}{2}$‴ dick, entspringt, der vorigen gegenüber, in gleicher Höhe mit dem oberen Rande der Cauda des M. latissimus dorsi, geht durch den Raum zwischen den Mm. teretes, Caput longum tricipitis und Oberarmbein nach hinten, dann nach aufsen und vorn, und umkreiset in dieser Richtung das Collum oss. brachii, vom M. deltoides bedeckt. Vertheilt sich an die genannten Muskeln, vorzüglich an den M. deltoides und das Schultergelenk; anastomosirt mit den Aa. circumflexa humeri anterior, subscapularis und den Muskelästen der A. profunda brachii.

III. A. brachialis.

Indem die Armschlagader, welche an ihrem oberen Ende beinahe 3‴, am unteren $2\frac{1}{2}$‴ dick ist, zwischen den Sehnen der Mm. pectoralis major und latissimus dorsi aus der Achselhöhle hervortritt, liegt sie nahe am Os brachii, vorn an die Cauda des M. coracobrachialis gränzend, hinten durch vielen Zellstoff und Nerven von dem Caput longum tricipitis getrennt. Sodann läuft sie gestreckt in der Mitte der inneren Fläche des Oberarms herab, am inneren Rande des M. biceps, in der Furche zwischen diesem

und dem M. brachialis internus, von dem ersteren beträchtlich überragt, übrigens nur von der Haut und der Fascia brachii bedeckt; von den Venae brachiales und an ihrer äufseren Seite vom N. medianus begleitet, welcher oberhalb der Plica cubiti über sie hinweg an ihre innere Seite sich begiebt. In der Mitte der Plica cubiti wird sie von der Haut, der Vena mediana und der Aponeurosis m. bicipitis bedeckt, liegt auf der Cauda des M. brachialis internus, zwischen Mm. supinator longus u. flexor carpi radialis longus, und Mm. pronator rotundus u. flexor carpi ulnaris. Sie giebt, aufser zahlreichen Rami musculares, von ihrer inneren Wand die A. profunda brachii und die beiden Aa. collaterales ulnares ab und endigt in der Höhe des Proc. coronoideus ulnae durch Spaltung in die beiden Hauptstämme des Vorderarms, Aa. radialis und ulnaris.

1. *Rami musculares*, 10 bis 12 an der Zahl, $^1/_4$‴ bis $^3/_4$‴ dick, entspringen längs des ganzen Verlaufes der Armschl. an unbestimmten Stellen, gehen zu den Mm. coracobrachialis, biceps, brachialis internus, Caput internum m. tricipitis und M. supinator longus, anastomosiren mit Ästen der Aa. circumflexae humeri und profunda brachii.

2. *A. profunda brachii* s. collateralis magna, tiefe Armschl., ein kurzer $1^1/_2$‴ dicker Stamm, entspringt in gleicher Höhe mit dem Caput internum m. tricipitis, wendet sich zwischen diesem und dem Caput longum nach hinten und sodann zwischen Caput longum und der hinteren Fläche des Os brachii nach aufsen und unten, und spaltet sich in

a) *Rami musculares* für den M. triceps, die zum Theil unter dem M. deltoides neben und in dem Caput longum aufwärts laufen und mit den Ästen der A. circumflexa humeri posterior anastomosiren.

b) *A. nutritia magna oss. brachii*, welche durch ein Loch am unteren Ende der Spina tuberculi minoris in die Markhöhle einzudringen pflegt.

c) *A. collateralis radialis*, äufsere Nebenschl. des Arms, $^3/_4$‴ dick, gelangt in schräg absteigender Richtung von der hinteren zur äufseren Seite des Oberarms und läuft hinter dem Lig. intermusculare externum, nur von der Fascia brachii bedeckt, herab (den N. radialis

begleitend); giebt Äste an das Caput externum tricipitis, Mm. brachialis internus, supinator longus, extensores carpi radiales und anconaeus, und gelangt zwischen Condylus externus oss. brachii und Olecranon ulnae in das Rete articulare cubiti (S. 686).

d) *A. collateralis media* s. magna, mittlere Nebenschl., $^4/_5$‴ dick, Fortsetzung des Stammes der A. profunda, läuft mitten in der Substanz des M. triceps etwas geschlängelt herab, versorgt diese und endigt über dem Olecranon ulnae in dem Rete articulare cubiti.

3. *A. collateralis ulnaris superior* s. prima, obere innere Nebenschl. des Arms, $^3/_4$‴ dick, entspringt nahe unter der A. profunda brachii, läuft schräg nach hinten an der inneren Fläche des Oberarms, und weiter unten hinter dem Lig. intermusculare internum herab, (mit dem N. ulnaris); giebt Äste dem M. brachialis internus und Caput internum tricipitis, und fliefst zwischen Condylus internus oss. brachii und Olecranon ulnae in das Rete articulare cubiti.

4. *A. collateralis ulnaris inferior* s. secunda, untere innere Nebenschl. des Arms, $^3/_4$‴ dick, entspringt 1″ bis 3″ oberhalb des Condylus internus oss. brachii, geht in etwas absteigender Richtung nach innen und hinten, durchbohrt das Lig. intermusculare internum und windet sich in queerer Richtung um die hintere Fläche des unteren Endes des Oberarmbeins, zwischen dem Knochen und der Cauda des M. triceps, nahe oberhalb des Olecranon; giebt Äste für das Gelenk, anastomosirt mit allen anderen Aa. collaterales und recurrentes, und nimmt wesentlichen Antheil an der Bildung des Rete articulare cubiti.

IV. Aa. antibrachii et manus.

Die Schlagadern des Vorderarms, Aa. radialis, ulnaris und interossea, welche der ansehnlichste Ast der A. ulnaris ist, versorgen, indem sie zur die Hand hinablaufen, zunächst alle Theile des Vorderarms, und schicken nahe unterhalb des Ellenbogengelenkes die Aa. recurrentes ab, welche bogenförmig aufwärts steigend (zurücklaufend) den Aa. collaterales entgegen gehen und durch Anastomosen mit diesen das Rete articulare cubiti bilden helfen. Sie endigen an der Handwurzel, indem sie theils geradezu Arterien für

die Handwurzel, Mittelhand und Finger abgeben, theils noch vorher zu Netzen und Bögen, — Rete carpeum volare und dorsale, Arcus volaris superficialis und profundus — zusammenfliefsen, aus welchen die meisten und wichtigsten Schlagadern für die genannten Theile entstehen. In der Vola manus liegen überhaupt die zahlreicheren und stärkeren Pulsadern: jeder Finger erhält vier Arterien, die nach ihrer Lage an der Hohlhand- oder Rückenfläche und der Radial- oder Ulnarseite der Finger, als Aa. digitales volares und dorsales, und diese wiederum als radiales und ulnares bezeichnet werden.

1. *A. radialis*, Speichenschl., $1\frac{3}{4}$‴ dick, behält die gestreckte Richtung der A. brachialis bei; läuft, nachdem sie zwischen Aponeurosis und Tendo m. bicipitis hindurchgedrungen, an der inneren Fläche des Radius gegen das Handgelenk herab; anfänglich zwischen Mm. supinator longus und pronator rotundus, sodann zwischen Mm. supinator longus und flexor carpi radialis; an der oberen Hälfte des Vorderarms von diesen Muskeln überragt und mehr verborgen, an der unteren Hälfte desselben dagegen oberflächlich, nur von der Haut und Fascia antibrachii bedeckt. Von dem Radius wird sie durch die Insertionen der Mm. supinator longus und pronator rotundus, durch den Ursprung des M. flexor pollicis longus und die Insertion des M. pronator quadratus entfernt gehalten; an ihrer Radialseite wird sie vom N. radialis superficialis begleitet. Alsdann geht sie um den Radialrand der Handwurzel auf den Rücken derselben, zwischen Proc. styloideus radii und Os multangulum majus, von den Tendines der Mm. abductor longus und flexor brevis pollicis bedeckt; ist hier noch $1\frac{1}{4}$‴ dick; und dringt endlich zwischen den Bases der Ossa metacarpi pollicis und indicis wieder in die Vola manus, woselbst sie, zwischen M. abductor indicis und dem inneren Kopfe des M. flexor pollicis brevis, durch Spaltung in zwei Äste endigt.

Sogleich nach ihrem Ursprunge giebt sie ab:

a) *A. recurrens radialis*, zurücklaufende Speichenschl., $\frac{2}{3}$‴ dick, krümmt sich nach aufsen, oben und hinten, auf dem M. supinator brevis verlaufend, von den Mm. supinator longus und flexor carpi radialis longus und brevis

bedeckt; giebt diesen Muskeln Äste und gelangt vor dem Condylus externus oss. brachii in das Rete articulare cubiti.

An der inneren Fläche des Vorderarms:

b) *Rami musculares*, zahlreich, $^1/_4$‴ bis $^1/_2$‴ dick, an die Muskeln, welche sie in ihrem Laufe berührt; auch kleine Zweige an die Volarfläche des Handgelenks.

c) *Ramus volaris superficialis a. radialis* s. A. superficialis volae, oberflächl. Hohlhandzweig der Radialis, $^1/_2$‴ bis $^2/_3$‴ dick, entspringt neben der Insertion des M. supinator longus, läuft unmittelbar unter der Haut und der den Daumenballen überziehenden Fascia palmaris zur Hohlhand, giebt Äste an die Mm. abductor brevis, flexor brevis und opponens pollicis und geht in den Arcus volaris superficialis über.

Auf dem Rücken der Handwurzel:

d) *Ramus dorsalis*, ein Ast von $^1/_2$‴ Dm. oder mehrere kleinere, zum Rete carpeum dorsale.

e) *A. dorsalis pollicis radialis*, $^1/_2$‴ dick.

f) *A. dorsalis pollicis ulnaris*, $^1/_3$‴ dick.

g) *A. dorsalis indicis radialis*, $^1/_2$‴ dick. Letztere beide entstehen oft gemeinschaftlich aus einem kurzen Stämmchen, A. interossea dorsalis prima.

In der Vola manus:

h) *A. princeps pollicis et indicis* s. *digitalis communis prima*, Hauptschl. des Daumens und Zeigefingers, 1‴ dick, läuft an der Volarfläche des Os metacarpi pollicis in der Tiefe des Daumenballens, zwischen M. opponens und Caput internum des M. flexor pollicis brevis, von der Sehne des M. flexor pollicis longus bedeckt, bis in die Nähe des Capitulum des ersteren, giebt vorher die *A. volaris indicis radialis* ab, welche zwischen den Mm. abductor indicis und adductor pollicis zum Zeigefinger geht: und spaltet sich in die *Aa. volares pollicis, radialis* und *ulnaris*, von denen die erstere meistens dünner ist und sehr oft einen Verstärkungszweig aus dem Arcus volaris superficialis empfängt.

i) *Ramus volaris profundus*, tiefer Hohlhandast der Radialis, 1‴ dick, ist die letzte Endigung der A. radialis und geht in queerer Richtung in den Arcus volaris profundus über, welchen sie vorzüglich bildet.

Von Einigen wird die Strecke der A. radialis, welche

nach Abgabe des Ramus volaris superficialis an der Radialseite und auf dem Rücken des Carpus verläuft, Ramus dorsalis a. radialis genannt, und diejenige Strecke des Stammes, welche zwischen der Basis der Ossa metacarpi pollicis und indicis liegt, nebst dem Ursprunge der A. princeps pollicis et indicis, schon zum Arcus volaris profundus gerechnet.

2. *A. ulnaris* s. cubitalis, Ellenbogenschl., $2\frac{1}{4}'''$ dick, wendet sich nach ihrem Ursprunge leicht gebogen nach innen und hinten, gegen die Ulnarseite des Vorderarms hin, indem sie auf dem Ursprunge des M. flexor digitorum profundus liegt und von den Mm. pronator rotundus, flexor carpi radialis, palmaris longus und flexor digitorum sublimis verdeckt wird: läuft sodann gestreckt an der inneren Seite des Vorderarms herab, in dem Raume zwischen den Mm. flexores digitorum sublimis u. profundus und dem M. flexor carpi ulnaris: von dem vorderen sehnigen Rande des letzteren Muskels und dem angränzenden Rande des M. flexor digitorum sublimis verborgen: also überhaupt in grösserer Tiefe als die A. radialis. Zwischen ihr und dem Knochen liegt der M. flexor digitorum profundus, an ihrer Ulnarseite der N. ulnaris. Am unteren Ende des Vorderarms liegt sie am vorderen Rande der Sehne des M. flexor carpi ulnaris mehr oberflächlich, von der Fascia antibrachii bedeckt: läuft in die Vola manus, über das Lig. carpi volare proprium hinweg, an der Radialseite des Os pisiforme, vom M. palmaris brevis bedeckt, und endigt bei einer Dicke von $1\frac{1}{2}'''$ gleich unterhalb des vorderen Randes jenes Ligaments durch Spaltung in den Ramus volaris superficialis und profundus.

Von ihr entspringen unter dem inneren Rande des M. pronator rotundus:

a) *Rami musculares,* $\frac{1}{3}'''$ dick, zu den Mm. brachialis internus und pronator rotundus.

b) *A. recurrens ulnaris,* zurücklaufende Ellenbogenschl., $\frac{2}{3}'''$ dick, steigt, von den Köpfen des M. flexor digitorum sublimis und flexor carpi ulnaris bedeckt, nach oben und hinten, giebt diesen Muskeln Äste und endigt hinter dem Condylus internus oss. brachii in dem Rete articulare cubiti.

c) *A. interossea antibrachii communis*, gemeinschaftl. Zwischenknochenschl. des Vorderarms, der stärkste Ast der A. ulnaris, 1 ½‴ dick, entspringt vom hinteren Umfange der A. ulnaris und spaltet sich sogleich in die A. interossea externa und interna.

aa) *A. interossea externa* s. *interossea perforans superior*, 1‴ dick, geht zwischen dem oberen Ende des Radius und der Ulna, über dem oberen Rande des Lig. interosseum hindurch nach der äufseren Fläche des Vorderarms, und giebt sogleich die ½‴ dicke *A. interossea recurrens* ab, welche zwischen dem Capitulum radii und Olecranon ulnae, vom M. anconaeus bedeckt, emporsteigt und zum Rete articulare geht. Alsdann läuft die A. interossea externa an der äufseren Fläche des Vorderarms herab, etwas der Ulnarseite und der Oberfläche sich nähernd, so dafs sie von den Mm. extensores dig. minimi proprius und carpi ulnaris bedeckt, durch die Mm. abductor pollicis longus und extensor poll. longus von den Knochen und dem Lig. interosseum getrennt wird. Sie vertheilt sich an alle Mm. extensores des Carpus und der Finger, giebt auch kleine Äste zum Rete carpeum dorsale.

bb) *A. interossea interna*, 1‴ dick, geht dicht an der inneren Fläche des Lig. interosseum antibrachii herab, versorgt die Mm. flexor digitorum communis profundus und flexor pollicis longus, von welchen sie bedeckt wird: giebt 5 bis 6 kleine Rami interossei perforantes ab, welche das Lig. interosseum durchbohrend zu den Mm. extensores gehen: tritt unter den oberen Rand des M. pronator quadratus und giebt Zweige zu diesem M. und zum Rete carpeum volare. Endlich durchbohrt sie unter dem Namen *A. interossea perforans inferior*, ⅔‴ dick, das Lig. interosseum, gelangt an die äufsere Fläche des Vorderarms, giebt Äste an die Mm. abductor pollicis longus und extensores pollicis und indicis, und endigt im Rete carpeum dorsale. —

In ihrem Laufe am Vorderarm entspringen von der A. ulnaris:

d) *Rami musculares*, zahlreich und ¼‴ bis ½‴ dick, an die Mm. flexores digitorum communes, flexor carpi ulnaris und pronator rotundus.

e) *Ramus dorsalis a. ulnaris* ½‴ dick, entsteht unge-

fähr 1½″ oberhalb des Handgelenks, windet sich um die Ulna, oberhalb ihres Capitulum, nach dem Rücken der Handwurzel, giebt die ⅓‴ dicke *A. dorsalis dig. minimi ulnaris* ab und geht in das Rete carpeum dorsale.

Am Handgelenke:

f) Kleine Äste an die Haut, Mm. palmaris brevis und abductor dig. minimi.

g) *Ramus volaris superficialis a. ulnaris*, oberflächlicher Hohlhandast der Ulnaris, ¾‴ dick, der ansehnlichste Endast der A. ulnaris, welcher nach der Radialseite sich biegend in den Arcus volaris sublimis übergeht und diesen vorzüglich bildet.

h) *Ramus volaris profundus a. ulnaris*, tiefer Hohlhandast der Ulnaris, 1‴ dick, giebt die ⅔‴ dicke *A. volaris digiti minimi ulnaris* ab, welche in ihrem Laufe zum kleinen Finger auch die Mm. abductor und flexor brevis versorgt. Sodann dringt dieser Ast bei einem Dm. von ½‴ in die Tiefe der Hohlhand, indem er zwischen M. flexor brevis dig. minimi und den Sehnen der Mm. flexores digitorum communes, oder seltner zwischen M. flexor brevis und abductor dig. minimi hindurch geht; und fliefst mit dem Ramus volaris profundus der A. radialis zur Bildung des Arcus volaris profundus zusammen.

3. *Rete articulare cubiti*, das Ellenbogennetz, ein ansehnliches, das Ellenbogengelenk umgebendes Netz anastomosirender Arterien von ¼‴ bis ⅔‴ Dm., liegt theils oberflächlicher an den Condyli oss. brachii, theils tiefer zwischen dem hinteren Umfange des Gelenks und der Cauda des M. triceps brachii. In dasselbe senken sich ein von oben: 1. A. collateralis radialis hinter dem Condylus externus oss. brachii, 2. A. collateralis media über dem Olecranon ulnae, 3. 4. Aa. collaterales ulnares, superior und inferior hinter dem Condylus internus — von unten: 5. A. recurrens radialis vor dem Condylus externus oss. brachii, 6. A. recurrens interossea zwischen Olecranon ulnae und Capitulum radii, 7. A. recurrens ulnaris hinter dem Condylus internus oss. brachii. Nicht allein vereinigen sich die Endäste der einander begegnenden Arterien in bogenförmigen Anastomosen, sondern die A. collateralis ulnaris inferior läuft auch in queerer Richtung, nahe über dem Olecranon,

um die ganze hintere Wand des Kapselbandes und verbindet sich mit den Enden der übrigen sechs Arterien und diese unter einander. Aus diesem Netze, durch welches die Schlagadern des Oberams und Vorderarms mit einander communiciren, gelangen zahlreiche kleine Äste an die nahegelegenen Muskelinsertionen und Ursprünge, an die Gelenkbänder und Knochen.

4. *Rete carpeum dorsale* s. Arcus carpi dorsalis, Rückennetz der Handwurzel, besteht aus mehreren kleinen, durch Zwischenäste verbundenen Gefäfsbögen von $^1/_4$‴ bis $^1/_2$‴ Dm., und entsteht aus den zusammenfliefsenden Enden der Rami dorsales der Aa. radialis und ulnaris und den Enden der Aa. interossea perforans inferior (interossea interna) und interossea externa. Ein oberflächlicher, aus sehr kleinen Arterien zusammengesetzter Theil dieses Netzes, *Rete carpeum dorsale superficiale*, liegt unter der Haut auf dem Lig. carpi dorsale; das eigentliche stärkere tiefere Netz, *Rete carpeum dorsale profundum*, liegt dagegen, bedeckt vom Lig. carpi dorsale und den Sehnen der Extensoren, unmittelbar auf den Gelenkbändern der Handwurzel, versorgt diese mit kleinen Zweigen, und giebt drei $^1/_2$‴ dicke *Aa. interosseae metacarpi dorsales*, *secunda*, *tertia* und *quarta*, ab, (von der Radialseite der Mittelhand gezählt: als A. interossea dorsalis prima ist die A. dorsalis pollicis ulnaris und A. dorsalis indicis radialis zu betrachten, welche auch oft vermittelst eines gemeinschaftlichen Stämmchens entspringen). Diese Aa. interosseae dorsales verlaufen im Interstitium interosseum II, III und IV, gegen die Finger hin, werden durch die Rami interossei perforantes der Aa. interosseae volares verstärkt, versorgen die Mm. interossei dorsales, die Sehnen der Extensoren und die Haut, und spalten sich zwischen den Capituli ossium metacarpi, jede in zwei Aa. digitales dorsales für zwei verschiedene Finger. (S. Aa. digitales.)

5. *Rete carpeum volare*, Hohlhandnetz der Handwurzel, besteht aus wenigen kleinen, $^1/_4$‴ dicken Zweigen der Aa. radialis, ulnaris, interossea interna und des Arcus volaris profundus, welche sich in den Bändern und Knochen an der Volarfläche des Handgelenks und des Carpus verbreiten.

6. *Arcus volaris sublimis s. superficialis volae*, oberflächlicher Hohlhandbogen, liegt unmittelbar unter der Fascia palmaris auf den Sehnen des M. flexor dig. communis sublimis, ist mit seiner Convexität gegen die Finger, mit der Concavität gegen den unteren Rand des Lig. carpi volare proprium gerichtet und von diesem $\frac{1}{2}''$ bis $\frac{3}{4}''$ entfernt. Entsteht durch den Zusammenfluſs des Ramus volaris superficialis a. ulnaris und des Ramus volaris superficialis a. radialis, wird aber vorzüglich (und öfters allein) vom ersteren gebildet und ist daher an seinem Ulnarende $\frac{5}{4}'''$, an seinem Radialende nur $\frac{1}{2}'''$ dick. Er giebt kleine Äste an die Mm. lumbricales, die Ligg. carpi volaria, die Haut der Hohlhand und die Muskeln des Daumenballen, auch sehr häufig einen Verstärkungsast zur A. volaris pollicis radialis: vorzüglich aber die von seiner convexen Seite entspringenden, $\frac{3}{4}'''$ bis $\frac{4}{5}'''$ dicken, gemeinschaftlichen Fingerschl., *Aa. digitales communes*, *secunda*, *tertia* und *quarta* (von der Radialseite an gezählt; die A. dig. communis prima ist die A. princeps pollicis et indicis aus der A. radialis, die zuweilen auch aus diesem Arcus entsteht.) Die Aa. digitales communes laufen zwischen den vier Sehnenscheiden des M. flexor dig. sublimis divergirend bis zum Anfang der Finger, von der Fascia palmaris geschützt, geben Zweige an die Mm. lumbricales, die benachbarten Sehnen und Haut. Eine jede spaltet sich gabelförmig, nachdem sie eine A. interossea volaris aufgenommen hat, in zwei Aa. digitales volares für zwei verschiedene Finger: die quarta für den kleinen und Ringfinger, die tertia für den Ring- und Mittelfinger: die secunda, welche meistens die schwächste ist und vorzüglich durch die A. interossea volaris II verstärkt wird, für den Mittel- und Zeigefinger.

Da der Arcus volaris sublimis vorzüglich von der A. ulnaris entsteht, so zählen Einige (gegen die gewöhnliche Ordnung der Abzählung der Theile an der Hand) die Aa. digitales communes von der Ulnarseite an, und nennen die vierte die zweite, die zweite die vierte, dagegen die A. volaris digiti minimi ulnaris die erste.

7. *Arcus volaris profundus*, tiefer Hohlhandbogen, ist dünner aber länger und weniger convex als der vorige; entsteht vorzüglich aus dem Ramus volaris profundus a.

radialis, indem dieser mit dem Ramus volaris profundus a. ulnaris zusammenfliefst, ist daher an seinem Radialrande 1‴, an seinem Ulnarende ½‴ dick. Er liegt auf den Bases der Ossa metacarpi und den oberen Enden der Mm. interossei volares, bedeckt von dem M. abductor pollicis, den Sehnen der Flexores communes digitorum und dem M. adductor digiti minimi. Er giebt Zweige an die Gelenkbänder des Carpus und Metacarpus und vier, ½‴ bis ¾ dicke *Aa. interosseae volares, I—IV,* von denen die prima oder die secunda die stärksten zu seyn pflegen. Die prima läuft an der Volarfläche des M. interosseus dorsalis primus, gegen die Radialseite des Zeigefingers hin, die anderen im zweiten bis vierten Interstitium interosseum, die Mm. interossei volares und adductor dig. minimi versorgend: gleich unterhalb der Bases ossium metacarpi geben sie die ½‴ dicken *Rami interossei perforantes* ab, welche mit den Aa. dorsalis indicis radialis und interosseae dorsales anastomosiren und diese verstärken. Die Enden der Aa. interosseae volares fliefsen zwischen den Capitula der Mittelhandknochen in die Aa. digitales communes oder die von ihnen entstehenden Aa. volares der Finger über, an deren Bildung sie daher wesentlichen Antheil nehmen; und vorzüglich findet dieses am Zeigefinger und Mittelfinger Statt. Die A. interossea volaris prima ist oft so stark, dafs sie die A. volaris indicis radialis allein bildet und alsdann A. princeps indicis genannt wird, wobei die A. digitalis communis I nur zum Daumen als A. princeps pollicis geht.

8. *Aa. digitales* s. digitorum, Fingerschl., entstehen theils unmittelbar aus den Enden der A. radialis und ulnaris, die meisten aber auf solche Art aus den von beiden gemeinschaftlich gebildeten Bögen und Netzen, dafs die Aa. dorsales vermittelst der Aa. interosseae dorsales und Rami interossei perforantes von dem Rete carpeum dorsale und Arcus volaris profundus herstammen, die Aa. volares aber durch die Aa. digitales communes und interosseae volares den Arcus volares sublimis und profundus, vorzüglich dem ersteren, angehören. Es entstehen nämlich

die Aa. digitales dorsales

pollicis	radialis	aus der A. radialis selbst	
	ulnaris	desgl., oft gemeinschaftlich als A. interossea dorsalis I.	
indicis	radialis	aus der A. interossea dorsalis II	vom Rete carpeum dorsale und Arcus volaris profundus.
	ulnaris		
dig. medii ..	radialis	aus der A. interossea dorsalis III	
	ulnaris		
dig. annularis	radialis	aus der A. interossea dorsalis IV	
	ulnaris		
dig. minimi .	radialis	aus dem Ramus dorsalis a. ulnaris.	
	ulnaris		

die Aa. digitales volares

pollicis	radialis	aus der A. princeps pollicis et indicis s. dig. communis I, von der A. radialis	
	ulnaris		
indicis	radialis	aus der A. dig. communis II.	vom Arcus volaris sublimis und profundus
	ulnaris		
dig. medii ..	radialis	aus der A. dig. communis III	
	ulnaris		
d. annularis	radialis	aus der A. dig. communis IV	
	ulnaris		
dig. minimi.	radialis	aus dem Ram. volar. profundus a. ulnaris.	
	ulnaris		

Die Stämmchen aller Aa. digitales laufen an den Seiten der Finger gegen die Fingerspitze hin, schicken zahlreiche kleine queerlaufende Zweige ab, welche gröfstentheils an die Haut und das Fett der Finger, in geringerer Anzahl an die Sehnenscheiden und Sehnen, Gelenkbänder und Knochen dringen, und häufige Anastomosen bilden, so dafs alle vier Arterien eines Fingers unter einander in Verbindung stehen. Die Aa. digitales dorsales sind aber nur $^1/_3$''' dick und beträchtlich enger und kürzer als die Aa. dig. volares, sie reichen nur bis zum Anfange des zweiten Fingergliedes; die $^2/_3$''' dicken Aa. dig. volares, welche dicht neben den Sehnenscheiden der Mm. flexores digitorum laufen, versorgen das erste Glied in Gemeinschaft mit den Aa. dig. dorsales, das zweite und dritte Glied aber für sich allein, indem sie zur Rückenfläche derselben zahlreiche Rami dorsales schicken, auch das unter dem Nagel liegende Rete

unguiculare bilden: an der Volarfläche des Nagelgliedes fliefsen sie von der Radial- und Ulnarseite her in einen verhältnifsmäfsig ansehnlichen Bogen zusammen, dessen Zweige ein dichtes Netz bilden.

Arteria aorta descendens thoracica.

Die Brustaorta giebt in ihrem S. 649 beschriebenen Verlaufe bei Weitem kleinere Äste ab, als der Arcus und die Bauchaorta: von ihrem vorderen und seitlichen Umfange entspringen die Aa. bronchiales, oesophageae und mediastinae posteriores; von ihrer hinteren Wand paarweise die Aa. intercostales posteriores.

1. *Aa. bronchiales* s. *bronchiales posteriores* s. inferiores, dextra et sinistra, Luftröhren- oder Bronchialschl., oft auf einer oder beiden Seiten doppelt vorhanden, $\frac{1}{2}'''$ bis $1'''$ dick, entspringen vom oberen Ende der Brustaorta, sehr häufig aber, vorzüglich die rechte, aus der ersten A. intercostalis posterior. Sie laufen nach vorn zu der hinteren Wand der Bronchi und begleiten diese, nach Abgabe kleiner Äste an die Speiseröhre und Pleura, zur Lungenwurzel, woselbst sie in das Lungengewebe eintreten, den Ramificationen der Bronchia folgend; (S. 475.)

2. *Aa. oesophageae*, Schlundschl., drei bis sechs, $\frac{1}{4}'''$ bis $\frac{1}{2}'''$ dick, zur Speiseröhre: die unterste, nahe oberhalb des Zwerchfells entspringende, geht durch den Hiatus oesophageus bis zur Cardia und anastomosirt mit der A. coronaria ventriculi sinistra.

3. *Aa. mediastinae posteriores*, hintere Mittelfellschl., zahlreich, aber nur $\frac{1}{4}'''$ dick, gehen zur Pleura, hinteren Wand des Herzbeutels, zu den Gefäfsen, Nerven und Lymphdrüsen im hinteren Mittelfellraume, auch zur Pars lumbaris diaphragmatis.

4. *Aa. intercostales posteriores* s. aorticae, s. inferiores, *dextrae et sinistrae*, hintere Rippenschl., gehören nach ihrem Verlaufe den 9 unteren Interstitia intercostalia an (s. S. 674, A. intercostalis suprema), sind aber überhaupt für die Rückengegend und die Seitenwände des Thorax und des Bauchs bestimmt. Sie entspringen in einer rechten und linken, $3'''$ von einander entfernten Reihe von der hinteren Wand der Aorta, gewöhnlich als

8 Paare, indem die eine oder andere, meistens die erste, ein kurzes gemeinschaftliches Stämmchen für zwei dieser Arterien bildet. Sie nehmen von oben nach unten an Stärke zu, von $^5/_4$ bis $1^1/_2$‴ im Dm. haltend, Die Aa. intercostales sinistrae laufen horizontal an der linken Seite der Brustwirbelkörper nach hinten; die längeren Aa. interc. dextrae gehen mehr gebogen, hinter dem Oesophagus, dem Ductus thoracicus und der Vena azygos, über die vordere und rechte Fläche der Brustwirbelkörper. Zwischem dem Capitulum zweier Rippen spaltet sich jede A. intercostalis in den Ramus dorsalis und intercostalis, von welchen der letztere stärker ist und öfters schlechthin als A. intercostalis bezeichnet wird.

a) *Ramus dorsalis*, $^1/_2$‴ dick, geht am inneren Rande des Lig. colli costae internum nach hinten, schickt einen *Ramus spinalis* durch das Foramen intervertebrale in den Canalis spinalis zum Rückenmark, der mit den Aa. spinales anteriores und posteriores anastomosirt (S. 669): und tritt sodann zwischen den Proc. transversi hindurch zu den Muskeln und der Haut der Rückens.

b) *Ramus intercostalis*, 1‴ bis $^5/_4$‴ dick, geht anfänglich mitten im Interstitium intercostale an der vorderen Fläche des M. intercostalis externus nach hinten und aufsen und tritt sodann zwischen Mm. intercostalis externus und internus; spaltet sich aber schon vorher in den $^1/_2$‴ dicken *Ramus supracostalis*, welcher längs des oberen Randes der unter ihm liegenden Rippe nach vorn läuft: und in den $^3/_4$‴ bis 1‴ dicken *Ramus infracostalis*, welcher im Sulcus costalis der inneren Rippenfläche, und weiter nach vorn am unteren Rande, der höher liegenden Rippe verläuft. Beide Äste anastomosiren unter einander und mit den benachbarten Aa. intercostales, und mit den Aa. intercostales anteriores von den Aa. mammaria interna und musculophrenica: beide, vorzüglich der Ramus infracostalis, verbreiten sich nicht allein an die Intercostalmuskeln und das Zwerchfell, sondern geben auch ansehnliche Äste an die Mm. pectorales, serrati, latissimus dorsi, obliqui und transversus abdominis; auch an die Milchdrüse, *Rami mammarii externi*, die besonders zwischen der dritten bis sechsten Rippe hervordringen und an den äufseren und unteren Rand und die hintere

Fläche der Drüse gehen. Die unteren Aa. intercostales anastomosiren mit den Ästen der Aa. musculophrenica und lumbares.

Arteria aorta descendens abdominalis.

Von der Bauchaorta (Verlauf s. S. 649) entspringen folgende Äste:

Von der vorderen Wand die Aa. phrenica inferior dextra und sinistra für das Zwerchfell: und die unpaaren Aa. coeliaca, mesenterica superior u. mesenterica inferior, für die Organa chylopoëtica bestimmt, deren Äste in den Duplicaturen des Bauchfells verlaufen und meistens grofse anastomosirende Bögen bilden, so dafs diese drei Arterien mit einander communiciren.

Von der vorderen Gränze der Seitenwände der Aorta entstehen die paarweise vorhandenen Aa. suprarenalis media, renalis und spermatica interna, für die Nebenniere, Niere und Hoden oder Eierstock und Gebärmutter.

Von der hinteren Wand die paarweise vorhandenen Aa. lumbaris prima, secunda, tertia und quarta für das Rückgrat und die hinteren und seitlichen Bauchwände; auch die unpaare A. sacralis media für die Bauchwände und hintere Wand des Beckens.

Endlich spaltet sich die Aorta gabelförmig in die rechte und linke A. iliaca communis, den Hauptstamm für das Becken und die untere Extremität.

Von oben nach unten entstehen diese Äste in folgender Ordnung: Aa. phrenicae inferiores, A. coeliaca, beide nahe unter dem oberen Winkel des Hiatus aorticus diaphragmatis, noch vor dem 12ten Brustwirbel: Aa. lumbares primae, A. mesenterica superior $\frac{1}{4}$'' bis $\frac{1}{2}$'' unter der A. coeliaca; Aa. suprarenales mediae, renales, lumbares secundae und spermaticae internae, sämmtlich in der Höhe des zweiten Lendenwirbels: Aa. lumbares tertiae in der Höhe des dritten Lendenwirbels: A. mesenterica inferior vor dem Fibrocartilago zwischen dem 3ten und 4ten Lendenwirbel: Aa. lumbares quartae, sacralis media und iliacae communes in der Höhe des vierten Lendenwirbels.

1. *Aa. phrenicae inferiores* s. magnae, untere Zwerchfellschl., 1''' dick, entspringen sehr nahe neben einander oder vermittelst eines kurzen gemeinschaftlichen

Stammes, sehr häufig auch von der A. coeliaca: geben die ¼‴ dicken *Aa. suprarenales superiores* an die Nebennieren ab; laufen sodann divergirend nach aufsen, vorn und oben (die rechte hinter der Vena cava inferior) an der unteren Fläche des Zwerchfells; geben hintere Äste an die Pars lumbaris und costalis, vordere Äste an den mittleren und vorderen Theil desselben, welche Kränze um den Hiatus oesophageus und das For. quadrilaterum bilden, dem unteren Ende der Speiseröhre Zweige geben, und mit einander, mit den Aa. intercostales, lumbares, oesophageae und pericardiaco-phrenicae anastomosiren.

2. *A. coeliaca*, Eingeweideschl., ein nur ½″ langer, 4‴ dicker Stamm, geht unter einem rechten Winkel von der vorderen Wand der Aorta nach vorn, an der rechten Seite der Cardia zwischen die Blätter des kleinen Netzes eindringend, und spaltet sich in drei divergirende Äste, Aa. coronaria ventriculi sinistra, hepatica und lienalis, welche sämmtliche, oberhalb des Mesocolon transversum liegende Organe, namentlich Magen, Leber, Milz, Pancreas, Duodenum und die Netze versorgen. Jene Spaltungsstelle wird Tripus Halleri genannt.

a) *A. coronaria ventriculi sinistra* s. gastrica superior sinistra, linke Kranzschl. des Magens, 2‴ dick, krümmt sich nach links, oben und vorn an die rechte Seite der Cardia, giebt hier kleine Aa. oesophageae inferiores und cardiacae posteriores, welche mit den Aa. oesophageae aus der A. phrenica inferior anastomosiren, einen Kranz um die Cardia bilden und bis zum Fundus ventriculi sich verbreiten. Sodann läuft sie geschlängelt längs der Curvatura minor des Magens nach der rechten Seite bis in die Nähe des Pylorus, giebt zahlreiche Äste an die vordere und hintere Magenwand und das kleine Netz, und anastomosirt mit den Aa. coronaria ventriculi dextra, gastroepiploicae und gastricae breves.

b) *A. hepatica*, Leberarterie, 2½‴ dick, geht hinter der oberen Magenkrümmung queer nach der rechten Seite, gelangt hinter dem Pylorus zwischen die Blätter des Lig. hepatoduodenale und läuft in dieser Duplicatur, vor der Vena portarum und an der linken Seite des Ductus hepaticus, zur Fossa transversa der Leber. Äste:

aa) *A. coronaria ventriculi dextra* s. gastrica superior dextra, rechte Kranzschl. des Magens, $^2/_3$''' dick, wendet sich links zur Curvatura minor des Magens, giebt zwei bis drei *Aa. pyloricae* von $^1/_2$''' Dm. ab, die zuweilen auch abgesondert aus der A. hepatica entspringen, und fliefst mit der A. coronaria ventriculi sinistra zusammen, wodurch der obere Schlagaderkranz des Magens entsteht.

bb) *A. gastroduodenalis*, Magen-Zwölffingerdarmschl., $1^1/_2$''' dick, steigt bogenförmig hinter dem Pylorus, welcher nebst dem Anfange des Duodenum Äste erhält, herab und spaltet sich in die

α. A. pancreaticoduodenalis, obere Zwölffingerdarmschl., $^4/_5$''' dick, welche bogenförmig an der inneren concaven Seite des Duodenum um das Caput pancreatis läuft, und letzteres nebst der Pars transversa superior und descendens duodeni mit zahlreichen Ästen versorgt.

β. A. gastro-epiploica dextra s. gastrica inferior dextra, rechte Magen-Netzschl., $1^1/_3$''' dick, tritt oberhalb und vor dem Caput pancreatis, welches Äste erhält, an die Curvatura major des Magens, läuft an dieser geschlängelt nach der linken Seite, zwischen den Blättern des Omentum gastrocolicum, giebt Rami gastrici an die vordere und hintere Magenwand, und 6 bis 8 Rami epiploici von $^1/_2$''' Dicke an das grofse Netz, und fliefst mit der A. gastroepiploica sinistra zur Bildung des unteren Schlagaderkranzes des Magens zusammen.

cc) *Ramus hepaticus dexter*, $1^1/_2$''' dick, giebt die zuweilen doppelte, $^1/_2$''' dicke Gallenblasenschl., *A. cystica*, ab, zu den Wänden der Gallenblase und zur Leber selbst; dringt alsdann in der Fossa transversa unter dem Tuberculum papillare und hinter dem rechten Aste der Vena portarum mit mehreren Ästen in den rechten und die beiden kleinen Leberlappen.

dd) *Ramus hepaticus sinister*, $1^1/_4$''' dick, dringt mit mehreren Ästen in den Lobus sinister und Lobus Spigelii. Entspringt oft aus der A. coronaria ventriculi sinistra.

c) *A. lienalis s. splenica*, Milzschl., $2^3/_4$ bis 3''' dick, wendet sich nach der linken Seite, läuft etwas geschlängelt in queerer Richtung hinter dem Magen und dem oberen Rande des Pancreas; giebt hier ab

aa) *Rami pancreatici*, zahlreich, $^1/_2$‴ bis $^3/_4$‴ dick, zum mittleren Theil und der Cauda des Pancreas:

und spaltet sich zwischen den Blättern des Lig. gastrolienale in zahlreiche Äste:

bb) *A. gastro-epiploica sinistra* s. gastrica inferior sinistra, linke Magen-Netzschl., 1‴ dick, geht vor der Cauda pancreatis zur Curvatura major des Magens, vertheilt sich an den Wänden desselben und an das grofse Netz, und bildet durch Zusammenflufs mit der A. gastroepiploica dextra den unteren Pulsaderkranz des Magens.

cc) *Aa. gastricae breves*, kurze Magenschl., 4 bis 6 an der Zahl, $^1/_2$‴ bis $^3/_4$‴ dick, laufen nach vorn und rechts zum Fundus des Magens, anastomosiren mit den Ästen der Aa. coronaria ventriculi sinistra und gastroepiploica sinistra.

dd) *Rami lienales*, drei bis sechs, 1‴ dick, dringen durch den Hilus der Milz in das Innere derselben.

3. *A. mesenterica s. mesaraica superior*, obere Gekrösschl., $4^1/_4$‴ bis $4^1/_2$‴ dick, geht hinter dem mittleren Theile des Pancreas herab, tritt zwischen dem unteren Rande desselben und der Pars transversa inferior duodeni zwischen die Blätter des Mesenterium und läuft in diesem bis in die Regio iliaca dextra herab, indem sie einen schwach gekrümmten, mit seiner Convexität nach links und vorn gerichteten Bogen beschreibt. Sie versorgt den unteren Theil des Duodenum und Kopf des Pancreas, das Jejunum, Ileum, Coecum, Colon adscendens und transversum: von ihrer rechten hinteren concaven Seite entstehen die Aa. duodenalis inferior, colica media, colica dextra und ileocolica; von ihrer linken vorderen convexen Seite die Aa. intestinales.

a) *A. duodenalis inferior*, untere Zwölffingerdarmschl., $^1/_2$‴ dick, entspringt am unteren Rande des Pancreas, krümmt sich an der concaven Wand der Pars transversa inferior und adscendens des Duodenum nach rechts und oben, giebt Äste an dieses und an das Caput pancreatis, und fliefst bogenförmig mit der A. pancreatico-duodenalis zusammen.

b) *Aa. intestinales, jejunales et ileae*, Dünndarmschl., ungefähr 16 an der Zahl, meistens 1‴ dick, entspringen in

einer Reihe nahe untereinander und laufen zwischen den Blättern des Gekröses zum Jejunum und Ileum. Die Aa. int. jejunales, mit Ausnahme der ersten, sind länger als die Aa. int. ileae. Eine jede theilt sich in zwei Hauptäste, die mit den Ästen der nächsten oberen und unteren zu einem Bogen zusammenfliefsen: aus diesen Bögen entstehen kleinere Äste, die abermals zu kleineren Bögen zusammenmünden: und bei den längeren Aa. intestinales wiederholt sich diese Spaltung und bogenförmige Vereinigung noch zwei- bis dreimal: so dafs sich durch das ganze Mesenterium ein sehr grofses weitmaschiges Netz bildet, aus welchem kleine Zweige an die Drüsen und sehr zahlreiche, kurze, $^1/_4$ ''' dicke, fast parallellaufende Äste an den Dünndarm selbst gelangen, welche in den Häuten desselben fein und netzförmig anastomosirend sich verzweigen. Die hintere, an das Gekröse befestigte Darmwand enthält daher dickere Schlagäderchen, als die vordere freie Wand. Die letzte A. intestinalis, welche das $^5/_4$ ''' dicke Ende der A. mesenterica superior ist und das Ende des Ileum versorgt, krümmt sich aufwärts nach der rechten Seite hin, um einen Bogen mit der A. ileocolica zu bilden.

c) *A. ileocolica* s. colica dextra inferior, Blind-Grimmdarmschl., $^5/_4$ ''' dick, entspringt von der rechten concaven Seite der A. mesenterica superior, ungefähr in der Mitte ihres Verlaufs, der achten A. intestinalis gegenüber; wendet sich zwischen den Blättern des Mesocolon adscendens nach rechts und unten, fliefst durch ihren oberen Hauptast mit der A. colica dextra, durch den unteren mit dem gekrümmten Ende der A. mesenterica superior zusammen, und versorgt das Ende des Ileum, das Coecum und den Anfang des Colon adscendens, auch den Proc. vermiformis durch einen kleinen Ast, A. appendicularis.

d) *A. colica dextra*, rechte Grimmdarmschl., 1 ''' dick, entspringt etwas höher, der sechsten A. intestinalis gegenüber, oft aber gemeinschaftlich mit der vorigen: spaltet sich in einen unteren und oberen Ast, die mit denen der A. ileocolica und A. colica media zusammenfliefsen, und geht zum Colon adscendens.

e) *A. colica media*, mittlere Grimmdarmschl., $1^1/_3$ ''' dick, entsteht schon vom oberen Ende der A. mesenterica

superior, der zweiten A. intestinalis gegenüber: geht zwischen den Blättern des Mesocolon transversum etwas nach rechts und nach vorn: ihr rechter Ast fliefst mit dem oberen Aste der A. colica dextra, ihr linker Ast mit dem oberen Aste der A. colica sinistra zusammen.

Die ersten, von den Hauptästen der A. ileocolica und Aa. colicae gebildeten Bögen sind gröfser als die der Aa. intestinales: sie spalten sich aber nicht so oft und bilden, bevor sie zu den Darmwänden selbst gelangen, nur weniger zahlreiche untergeordnete Bogenreihen, als die Arterien des Dünndarms.

4. *A. mesenterica* s. *mesaraica inferior*, untere Gekrösschl., $1^2/_3$‴ dick, entspringt 2″ bis 3″ unter der A. mesenterica superior und $1^1/_2$″ bis 2″ oberhalb der Endigung der Aorta: wendet sich zwischen den Blättern des Mesocolon descendens nach vorn, unten und links und spaltet sich in zwei ansehnliche Äste:

a) *A. colica sinistra*, linke Grimmdarmschl., $^5/_4$‴ dick, geht, nachdem sie in zwei bis drei (obere, mittlere und untere) Äste sich getheilt hat, die mit denen der A. colica media und mit einander Bögen bilden, an das Colon descendens.

b) *A. haemorrhoidalis interna* s. *superior*, innere oder obere Mastdarmschl., $^5/_4$‴ dick, läuft abwärts, giebt einen Ast für die Flexura sigmoidea coli, die mit dem unteren Aste der A. colica sinistra einen Bogen bildet: steigt sodann an der linken Seite des Promontorium und vor dem Os sacrum, zwischen den Blättern des Mesorectum, an der hinteren Wand des Mastdarms herab, dessen oberen und mittleren, noch vom Bauchfell bekleideten Theil sie versorgt: ihre zahlreichen, verhältnifsmäfsig kurzen Äste anastomosiren bogenförmig unter einander und mit der A. haemorrhoidalis media.

5. *Aa. suprarenales mediae* s. aorticae s. Aa. renocapsulares, mittlere Nebennierenschl., gewöhnlich zwei Paare von $^1/_2$‴ Dicke, entspringen fast in gleicher Höhe mit der A. mesenterica superior und laufen vor den Schenkeln des Zwerchfells queer nach aufsen zu den Nebennieren.

6. *A. renalis*, dextra et sinistra, s. emulgentes, Nierenschl., $2^1/_2$‴ bis 3‴ dick, gehen 1″ unterhalb der A.

mesenterica superior unter rechten Winkeln von der Aorta ab, laufen queer, hinter dem Bauchfell und den Nierenvenen, vor den inneren Schenkeln des Zwerchfells zu den Nieren, geben die $^1/_4$‴ dicken *Aa. suprarenales inferiores* zur Nebenniere und kleine Äste zum Harnleiter und die Gland. lymph. lumbares ab, und dringen mit drei bis vier, $^5/_4$‴ bis $1^3/_4$‴ dicken Zweigen in den Hilus renalis ein (S. 524). Die rechte entspringt gewöhnlich etwas tiefer und ist um $^1/_2$″ länger, als die linke, läuft hinter der Vena cava adscendens hinweg.

7. *A. spermatica interna*, dextra et sinistra, innere Samenschl., 1‴ dick, entspringen nahe unter den Aa. renales, aber oberhalb der A. mesenterica inferior, von der Gränze der vorderen und seitlichen Wände der Aorta, unter sehr spitzigen Winkeln: laufen hinter dem Saccus peritonaei, vor den Harnleitern, mit welchen sie unter spitzen Winkeln sich kreuzen, und vor den Mm. psoae — nach unten, aufsen und vorn gegen den Eingang des kleinen Beckens geschlängelt herab, indem sie kleine Äste an die Harnleiter, das Bauchfell und die Gland. lymph. lumbares abgeben. Von hier an gehen sie im männlichen Geschlechte vor den Mm. psoae und den Vasa iliaca externa zum Canalis inguinalis, durch diesen und im Samenstrange herab. Hier geben sie Äste zu den Scheidenhäuten, zum Nebenhoden und spalten sich am hinteren Rande des Hoden in einen oberen und unteren Ast oder ein oberes und unteres Bündel von Zweigen, die in das Corpus Highmori eintreten, theils auch geradezu die Tun. albuginea durchbohren. (S. 537.)

Im weiblichen Geschlecht sind die Aa. spermaticae internae kürzer, aber mehr geschlängelt und nehmen während der Schwangerschaft allmählig um mehr als das Doppelte an Dicke zu. Sie treten von der inneren Fläche der Mm. psoae aus in die Ligg. uteri lata, zwischen die Blätter derselben und vertheilen sich vorzüglich an die Eierstöcke, auch an die Tubae und den Fundus uteri, indem sie mit den Aa. uterinae anastomosiren.

8. *Aa. lumbares* I — IV, Lendenschl., vier Paare von der Aorta, 1‴ bis $^3/_4$ dick, entspringen meistens unter rechten Winkeln von der hinteren Wand der Aorta, und krüm-

men sich queer nach hinten, unmittelbar vor der Mitte der Körper des ersten bis vierten Lendenwirbels, von den Schenkeln des Zwerchfells und den Ursprüngen der Mm. psoae verborgen, welche nebst den Wirbeln Äste erhalten. Vor den For. intervertebralia spalten sie sich in einen vorderen und hinteren Ast.

a) *Rami posteriores* s. *dorsales*, $^{3}/_{4}$‴ dick: jeder giebt einen *Ramus spinalis*, der durch das For. intervertebrale in den Canalis spinalis dringt, an die Dura mater und die Nervenwurzeln sich verbreitet und mit den Aa. spinales anteriores anastomosirt: — sodann gehen sie zwischen den Proc. transversi hindurch an die Muskeln und Haut der Lendengegend, woselbst der M. sacrospinalis die ansehnlichsten Zweige von ihnen erhält.

b) *Rami anteriores* s. *abdominales*, 1‴ dick, laufen zwischen den Bündeln des M. quadratus lumborum hindurch zu den seitlichen Bauchmuskeln, anastomosiren unter einander und mit Ästen der Aa. intercostales, epigastrica inferior und circumflexa ilium. Die vorderen Äste der dritten und vierten A. lumbaris sind die ansehnlichsten, schicken auch Zweige über die Crista oss. ilium hinweg zu den Mm. glutei, die mit den Ästen der A. glutea superior zusammenfliefsen, und Äste zum M. iliacus internus, welche mit den Zweigen der Aa. ileolumbalis und circumflexa ilium anastomosiren.

9. *A. sacralis media*, mittlere Kreuzschl., $^{5}/_{4}$‴ dick, unpaar, entspringt von der hinteren Wand der Aorta unmittelbar oberhalb ihrer Theilung in die beiden Aa. iliacae communes oder aus dem Theilungswinkel selbst, und läuft, in fortgesetzter Richtung der Aorta, auf der Vorderfläche des fünften Lendenwirbels und des Kreuz- und Steifsbeins, leicht geschlängelt herab. Vor dem fünften Lendenwirbel giebt sie die $^{3}/_{4}$‴ dicke *A. lumbaris quinta*, dextra et sinistra ab, welche denselben Verlauf, wie die übrigen Aa. lumbares hält, mit ihrem Ramus anterior vorzüglich an die Mm. psoas major und iliacus internus sich vertheilt und mit der A. ileolumbalis anastomosirt. Auf dem Os sacrum giebt sie zahlreiche kleine Queeräste ab und endigt auf der vorderen Fläche des Os coccygis mit kleinen Zweigen: alle diese Äste fliefsen theils mit Ästen der Aa. sacrales laterales

zusammen und vertheilen sich an die Knochen, Bänder, Muskeln und Nerven an der hinteren Beckenwand: theils anastomosiren sie mit den Aa. haemorrhoidalis media und inferiores, indem sie sich an die Häute des Mastdarms, Mm. coccygeus, levator ani und sphincter ani verbreiten.

Arteriae iliacae communes.

Die Aa. iliacae communes s. primitivae, gemeinschaftliche oder ursprüngliche Hüftschl., 2″ bis 2½″ lang, die rechte meistens um ¼″ länger als die linke, 5‴ bis 5½‴ dick: gehen unter einem spitzen Winkel (von ungefähr 65° im männlichen, 75° im weiblichen Geschlechte) von der Aorta ab, laufen divergirend und etwas nach hinten gekrümmt, hinter dem Saccus peritonaei, den Harnleitern und der A. haemorrhoidalis interna, vor den Körpern des vierten und fünften Lendenwirbels und an der inneren Seite der Mm. psoae herab, so dafs das Promontorium zwischen ihnen frei liegt: die rechte gränzt aufserdem nach aufsen an den Anfang der Vena cava inferior, nach hinten an die rechte Vena iliaca communis; die linke nach innen an die linke Vena iliaca communis. Nachdem sie an alle diese Theile nur sehr kleine Zweige gegeben haben, theilt sich jede oberhalb und vor der Symphysis sacroiliaca in die A. hypogastrica für das Becken und Gesäfs, und in die A. cruralis für die Bauchdecken, Schenkel und Fufs.

A. hypogastrica s. iliaca interna.

Die 3¼‴ dicke Becken- oder innere Hüftschl. steigt, etwas nach innen und hinten sich biegend, vor der Symphysis sacroiliaca in das kleine Becken herab und spaltet sich gewöhnlich, nach einem Verlaufe von kaum 1″, in einen vorderen und hinteren Hauptast, welche alsbald in kleinere Arterien zerfallen. Der sehr kurze, 2¼‴ dicke *Ramus posterior* krümmt sich stark nach hinten, gegen die Incisura ischiadica superior hin, giebt die Aa. ileolumbalis, sacrales laterales und obturatoria ab und endigt als A. glutea: der längere 2½‴ dicke *Ramus anterior* steigt leicht nach hinten gebogen vor den Ursprüngen des M. pyriformis an der hinteren Beckenwand abwärts, giebt die A. umbi-

licalis mit der A. vesicalis superior, die Aa. vesicalis inferior und haemorrhoidalis media ab, und theilt sich in die Aa. ischiadica und pudenda communis. Von diesen Arterien sind einige für die Muskeln in der inneren und äufseren Hüftgegend und am Gesäfse, an den Seitenwänden des kleinen Beckens und an dem oberen inneren Theile des Oberschenkels bestimmt, nämlich die Aa. ileolumbalis, glutea, ischiadica, sacrales laterales und obturatoria: andere gehen zu den in der Beckenhöhle, im Beckenausgange und vor demselben liegenden Harn- und Geschlechtsorganen, nämlich die Aa. vesicales, haemorrhoidalis media, uterina und pudenda communis.

1. *A. ileolumbalis*, Hüftlendenschl., 1‴ dick, geht in gebogener Richtung nach hinten und aufsen, hinter dem M. psoas major, in die Fossa iliaca, giebt zahlreiche Äste an das Os ilium, an die Mm. psoas major, iliacus internus, quadratus lumborum und transversus abdominis, welche mit den Ästen der Aa. lumbares IV. und V. und der A. obturatoria, vorzüglich aber mit der A. circumflexa ilium zahlreiche Anastomosen eingehen.

2. *Aa. sacrales laterales* s. sacrae laterales, seitliche Kreuzschl., gewöhnlich zwei, *superior et inferior*, jede 1‴ dick. Sie laufen nach innen und unten zur vorderen Fläche des Kreuzbeins, vereinigen sich mit Ästen der A. sacralis media, geben Rami anteriores zum Kreuz- und Steifsbein und zu den Bändern an der hinteren Beckenwand, an die Mm. pyriformis, coccygeus und levator ani: und Rami posteriores, die durch die For. sacralia anteriora zu der Dura mater und den Nervenwurzeln im Canalis sacralis gehen, sodann aber durch die For. sacralia posteriora an die hintere Fläche des Kreuzbeins, zu den Bändern, den Ursprüngen der Mm. multifidus spinae, sacrospinalis und gluteus maximus und zu der Haut gelangen.

3. *A. obturatoria*, Hüftbeinlochschl., $^5/_4$‴ dick, läuft nach aufsen gekrümmt an dem oberen Theile der Seitenwand des Beckens nach vorn, nahe unterhalb des M. psoas major und der Linea innominata, dicht an der Fascia pelvis, und gibt noch innerhalb des Beckens kleine Äste an die Mm. iliacus internus, obturator internus und levator ani, welche mit Ästen der Aa. ileolumbalis und sacrales

laterales anastomosiren: ferner den $^1/_3$''' dicken *Ramulus pubicus*, welcher an der inneren Fläche des Ramus horizontalis oss. pubis sich verbreitet, mit dem auf der oberen Fläche des Lig. Gimbernati laufenden Ramulus obturatorius der A. pubica (aus der A. epigastrica inferior oder A. cruralis) zusammenfliefst, auch hinter der Symphysis pubis mit dem Ramulus pubicus der anderen Seite anastomosirt. — Sodann geht die A. obturatoria durch den Canalis obturatorius (S. 574.) und die äufsere obere Ecke des For. obturatum zum oberen inneren Theile des Oberschenkels: giebt den Mm. obturatores Äste und theilt sich, indem sie über oder durch den M. obturator externus hervordringt, in einen vorderen inneren und hinteren äufseren, 1''' dicken Ast. Der *Ramus anterior* tritt zwischen den M. adductor brevis und adductor longus femoris, vertheilt sich an diese, an die Mm. pectineus und gracilis und anastomosirt mit der A. circumflexa femoris interna: der *Ramus posterior* giebt die $^1/_2$''' dicke *A. acetabuli* ab, welche unter dem Lig. transversum acetabuli durch die Incisura acetabuli in die Pfanne dringt, diese und das Lig. teres versorgt und vermittelst dieses Bandes auch Zweige an das Caput oss. femoris schickt: — alsdann geht er zwischen Mm. obturator externus und quadratus femoris nach aufsen und hinten, vertheilt sich an diese und die Mm. gemelli, und anastomosirt mit den Aa. circumflexa femoris interna und ischiadica.

4. *A. glutea* s. glutea superior s. iliaca posterior, obere Gesäfs- oder hintere Hüftschl., $2^1/_4$''' dick, das Ende des hinteren Hauptastes der A. hypogastrica, geht nach hinten und aufsen aus dem Becken hervor, durch den oberen Umfang der Incisura ischiadica superior, oberhalb des M. pyriformis, zwischen den Nerven des Plexus ischiadicus hindurch. In der äufseren Hüftgegend ist sie von hinten und aufsen durch die Mm. gluteus maximus und medius bedeckt. Sie theilt sich sogleich in drei bis vier, 1''' bis $1^1/_2$''' dicke Äste, welche nach oben und unten, und die Mm. glutei durchdringend nach aufsen und hinten laufen: die ansehnlichsten finden sich zwischen Mm. gluteus medius und minimus. Sie versorgen die Mm. pyriformis, gluteus medius und minimus, den oberen Theil des M. gluteus

maximus, das Darmbein und die Haut: anastomosiren mit den Ästen der unteren Aa. lumbares und circumflexa ilium, den hinteren Ästen der Aa. sacrales laterales, und mit Zweigen der Aa. ischiadica und circumflexae femoris.

5. *A. ischiadica* s. glutea inferior, untere Gesäfsschl., $1^3/_4$‴ dick, dringt vor und unter dem M. pyriformis, über dem Lig. sacrospinosum, durch den unteren Theil der Incisura ischiadica superior aus dem Becken hervor, in die untere Gesäfsgegend herabsteigend, vom M. gluteus maximus bedeckt, dessen unteren Theil nebst der Haut des Gesäfses sie mit zahlreichen Ästen versorgt. Queerlaufende Äste gehen von ihr zu den Mm. gemelli, obturatores und quadratus femoris und zum Hüftgelenk, anastomosiren mit dem Ramus posterior a. obturatoriae, mit der A. glutea und hinter dem Collum oss. femoris mit den Aa. circumflexae femoris: andere absteigende Äste vertheilen sich an die Köpfe der Mm. semitendinosus, semimembranosus, Caput longum m. bicipitis femoris und an den M. adductor magnus, und anastomosiren mit den Aa. circumflexa femoris interna und perforans prima.

6. *A. umbilicalis*, Nabelschl. Bei dem Erwachsenen findet sich keine offene Nabelarterie, sondern nur der von der A. hypogastrica ausgehende Strang, Chorda arteriae umbilicalis (S. 527). Dieser entsteht durch die in den ersten Wochen nach der Geburt erfolgende Obliteration der Nabelarterie, welche während des Foetuslebens von beträchtlicher Weite und die ansehnlichste Fortsetzung der A. iliaca communis ist (s. Bd. II.). Nur in dem Anfange der Chorda a. umbilicalis befindet sich, als noch offener Rest der Nabelschlagader, die 1‴ dicke obere Harnblasenschl., *A. vesicalis superior*, welche, sobald die Chorda a. umbilicalis die Seitenwand der Harnblase erreicht hat, aus dem Strange hervortritt und mit mehreren, $^1/_2$‴ dicken Ästen, an die Häute der Harnblase geht. Die oberen, zum Blasenscheitel aufsteigenden Äste pflegt man als *Aa. vesicales supremae* von den an dem mittleren Theile der Blase sich verzweigenden Ästen, *Aa. vesicales mediae*, zu unterscheiden. Von den letzteren oder von der A. vesicalis inferior geht die $^1/_4$‴ dicke *A. deferentialis* zum Samenleiter, theils abwärts zu den Samenbläschen, theils aufwärts gegen den

hinteren Leistenring: wenn sie stark entwickelt, $^1/_2$ ‴ dick ist, so gelangt sie längs des Vas deferens, durch den Canalis inguinalis und im Samenstrange, bis in die Nähe der Epididymis.

7. *A. vesicalis inferior* s. infima, untere Harnblasenschl., $^3/_4$ ‴ dick, geht nach vorn zum Fundus vesicae, und im männlichen Geschlecht auch zu den Samenbläschen und der Prostata: im weiblichen Geschlecht dagegen zu der Mutterscheide, als die 1‴ dicke Blasen-Scheideschl., *A. vesicovaginalis*, welche sehr häufig aus der A. uterina entspringt.

8. *A. uterina*, Gebärmutterschl., $^5/_4$ ‴ dick, läuft unmittelbar über der Fascia pelvis, am unteren Rande des Lig. uteri latum nach innen bis zum Collum uteri, giebt hier einige Rami vaginales oder die stärkere A. vesicovaginalis und steigt alsdann, zwischen den Blättern des breiten Mutterbandes, in kurzen Windungen stark sich schlängelnd, an dem Seitenrande der Gebärmutter bis zum Fundus aufwärts, indem sie mit zahlreichen Ästen in die vordere und hintere Wand derselben eindringt und am Fundus mit der A. spermatica interna anastomosirt. In der Schwangerschaft erreicht sie einen Dm. von 3‴.

9. *A. haemorrhoidalis media*, mittlere Mastdarmschl., $^3/_4$ ‴ dick, entsteht eben so häufig aus der A. pudenda communis als aus der A. hypogastrica selbst; geht an den unmittelbar oberhalb der Fascia pelvis befindlichen Theil des Mastdarms und an den M. levator ani, giebt auch Zweige an die Samenbläschen und Prostata oder an die Scheide: anastomosirt mit den Aa. vesicalis inferior, uterina, haemorrhoidales interna und externae.

10. *A. pudenda communis s. interna*, gemeinschaftliche oder innere Schamschl., $1^1/_2$ ‴ dick, ist das Ende des vorderen Hauptastes der A. hypogastrica und für den After, Damm und die äufseren Geschlechtstheile bestimmt. Sie geht nahe von der A. ischiadica, durch den unteren Umfang der Incisura ischiadica superior, in der Richtung nach unten und hinten aus dem Becken, (nachdem sie oft vorher die A. haemorrhoidalis media abgegeben hat): wendet sich alsdann an der hinteren Fläche des Lig. sacrospinosum wiederum nach vorn, indem sie durch die Incisura ischiadica

inferior in den Beckenausgang eintritt. In diesem läuft sie nach vorn und etwas nach innen, genau an der inneren Fläche des Tuber und Ramus adscendens oss. ischii anliegend, also an dem äufseren Rande der Fossa perinaei (S. 575), von dem Lig. falciforme und dem Theile der Fascia perinaei, welcher die untere Hälfte des M. obturator internus bekleidet, überzogen und geschützt. Hier giebt sie die Aa. haemorrhoidales externae ab: oberhalb des Ursprungs des M. transversus perinaei und in gleicher Linie mit dem vorderen Ende des M. sphincter ani externus spaltet sie sich in die A. perinaei und A. penis oder A. clitoridea.

a) Kleine Äste an das Lig. sacrotuberosum, die Mm. gluteus maximus, gemellus inferior, obturator internus und die Ursprünge der Mm. adductor magnus und quadratus femoris, welche mit Ästen der Aa. ischiadica und circumflexa femoris interna anastomosiren.

b) *Aa. haemorrhoidales externae s. inferiores*, Afterschl., zwei bis drei, $\frac{1}{2}$‴ dick, durchbohren die Fascia perinaei, laufen durch das Fettpolster der Mittelfleischgrube queer nach innen und unten, vertheilen sich an die Mm. levator und sphincter externus und die Haut des Afters.

c) *A. perinaei s. transversa perinaei*, Dammschl., geht oberhalb des M. transversus perinaei in einer Strecke von $\frac{1}{2}$″ queer nach innen, ohne jedoch die Mittellinie des Damms zu erreichen, und wendet sich alsdann nach vorn, unterwärts nur von der Fascia superficialis des Damms bedeckt. — Im männlichen Geschlecht ist sie nur $\frac{3}{4}$‴ dick, giebt Äste an die Mm. sphincter ani externus, transversus perinaei und bulbocavernosus und endigt in mehrere, $\frac{1}{2}$‴ dicke *Aa. scrotales posteriores* gespalten, die zur hinteren Wand und zum Boden des Hodensackes gehen. — Im weiblichen Geschlechte ist sie 1‴ bis $\frac{5}{4}$‴ dick, schickt Äste an die Muskeln des Afters und Dammes, auch zum M. constrictor cunni, den kleinen Schamlefzen und den unteren Theil der Scheide und endigt in den grofsen Schamlefzen, indem sie in mehrere *Aa. labiales posteriores* sich theilt.

d) *A. penis*, Ruthenschl., $\frac{5}{4}$‴ dick, im männlichen Geschlecht: *A. clitoridea* s. A. clitoridis, Kitzlerschl., $\frac{2}{3}$‴ dick, im weiblichen Geschlecht: laufen in fortgesetzter Richtung der A. pudenda communis, nahe am Ramus descendens

oss. pubis und zwischen dem oberflächlichen und tiefen Blatte der Fascia perinaei nach vorn, bis unter das Lig. arcuatum inferius der Symphysis pubis.

Die *A. penis* geht zwischen den Mm. bulbacavernosus und ischiocavernosus, schickt ihnen und dem vorderen Theile des M. levator ani, der Prostata und der Pars membranacea mehrere Zweige, und giebt die $^1/_2$‴ dicke *A. bulbo-urethralis* s. A. corporis cavernosi urethrae ab, welche in den Bulbus urethrae eindringt und in ihm und überhaupt im Corpus cavernosum urethrae sich vertheilt. Unter der Symphysis pubis geht sie an der inneren Seite des Crus penis nach dem Rücken der Wurzel der Penis und spaltet sich in die Aa. profunda und dorsalis der Ruthe. Die $^4/_5$‴ dicke tiefe Ruthenschl., *A. profunda penis*, durchbohrt die Tunica albuginea an der inneren Seite des Crus penis und läuft in dem Inneren des Corpus cavernosum penis, nahe am Septum, geschlängelt nach vorn bis in die Nähe der Eichel (S. 549). Die $^3/_4$‴ dicke Rückenschl. der Ruthe, *A. dorsalis penis*, geht auf dem Rücken der Ruthe, von der der anderen Seite nur durch die Vena dorsalis penis getrennt und von der Fascia penis bedeckt, geschlängelt nach vorn, giebt Äste an die Haut und auch einzelne in das Corpus cavernosum eindringende tiefe Äste, wenn die A. profunda penis wenig entwickelt ist. Hinter der Corona glandis spaltet sie sich in viele Äste, welche mit denen der anderen Seite anastomosiren, die Basis der Eichel mit einem unvollkommenen Kranze umgeben, und die Eichel, den vorderen Theil des Harnröhrenzellkörpers und die Vorhaut versorgen.

Die *A. clitoridea* verläuft zwischen den Mm. constrictor cunni und ischiocavernosus, giebt diesen, der vorderen Scheidenwand, Harnröhre, dem Vestibulum und den Labia minora Zweige; spaltet sich unter der Symphysis pubis in die $^1/_3$‴ dicke *A. profunda clitoridis*, die in das Crus clitoridis eindringt: und in die $^1/_2$‴ dicke *A. dorsalis clitoridis*, welche auf dem Rücken der Clitoris verlaufend an die oberen Enden der Labia minora, an die Glans und das Praeputium clitoridis sich vertheilt.

Arteria cruralis.

Der Name A. cruralis, Schenkelschl., wird gemeiniglich dem ganzen langen und starken Arterienstamme beigelegt, welcher, von der A. iliaca communis entsprossen, unter dem Arcus cruralis durch die Lacuna vasorum cruralium (S. 283.) zum Oberschenkel gelangt, an dessen vorderer und innerer Seite herabsteigt, durch die Spalte des M. adductor magnus (S. 297.) zur hinteren Fläche des Oberschenkels sich wendet und bis zur unteren Gränze der Kniekehle hinabgeht, woselbst er durch Spaltung in die Aa. tibiales, die weiterhin am Unterschenkel zum Fufse herabsteigen, endigt. Die einzelnen Strecken dieses Stammes erhalten indessen besondere Namen: die Strecke vom Ursprunge bis zum Arcus cruralis nennt man A. iliaca externa; die Strecke vom Arcus cruralis bis zum Spalt des M. adductor magnus heifst A. femoralis; (beide Namen werden zuweilen der ganzen A. cruralis beigelegt): die Strecke von der Spalte im M. adductor magnus bis zum unteren Ende der Kniekehle ist die A. poplitea.

I. *A. iliaca externa.*

Die $3\frac{1}{2}'''$ lange, $4\frac{1}{4}'''$ dicke äufsere Hüftschl. läuft von oben und hinten nach unten vorn und aufsen herab, indem sie eine leichte Biegung nach aufsen und hinten macht; an der inneren vorderen Seite des M. psoas major und vor der Fascia iliaca, hinter dem Saccus peritonaei. Indem sie dem Arcus cruralis sich nähert und hinter demselben herabsteigt, wird sie von der Vagina vasorum cruralium (S. 283.) umgeben, und durch die Scheidewand derselben von der an ihrer inneren Seite liegenden Vena cruralis getrennt: dagegen sie von dem nach aufsen liegenden N. cruralis durch die Fascia iliaca und dem mit dieser zusammenhangenden tiefen Blatte der Fascia lata geschieden wird. Das Ende der A. iliaca externa oder ihr Übergang in die A. femoralis, befindet sich hinter dem Arcus cruralis, an der inneren Seite des Tuberculum iliopectineum, mitten in der Lacuna vasorum cruralium, beinahe in der Mitte zwischen der Spina anterior superior oss. ilium und der Symphysis pubis, jedoch der letzteren um $4'''$ bis $6'''$ näher: ihre Scheide ist hier mit dem hinteren Rande des

Arcus cruralis, mit der Fascia transversalis, iliaca und den Anfängen des oberflächlichen und tiefen Blattes der Fascia lata verwachsen und dadurch verstärkt, aufserdem aber durch das Lig. iliopectineum an das Tuberculum iliopectineum geheftet: wodurch die Arterie in ihrer Lage genauer befestigt wird. — Die A. iliaca externa giebt aufser kleinen Ästen an den M. psoas major, an die Fascia iliaca und das Bauchfell, nur zwei gröfsere Arterien ab, die A. epigastrica inferior und A. circumflexa ilium, welche beide in der Höhe des Arcus cruralis, beinahe einander gegenüber, erstere von der inneren, letztere von der äufseren Wand des Stammes entspringen; letztere jedoch meistens um 2‴ bis 3‴ tiefer, als erstere.

1. *A. epigastrica inferior* s. interna, auch schlechthin A. epigastrica genannt, untere Bauchdeckenschl., Oberbauchschl., $^5/_4$‴ dick, läuft in einer Strecke von $^1/_2$″ horizontal nach innen, unmittelbar vor und oberhalb des vorderen Umfanges des Annulus cruralis, unterhalb des Annulus inguinalis posterior; unterwärts liegt sie auf dem hinteren Rande des Arcus cruralis, da wo derselbe mit dem äufseren Ende des vorderen Randes des Lig. Gimbernati sich verbindet: nach hinten gränzt sie an die Vena cruralis und an das in das Becken hinabsteigende Vas deferens, mit diesen sich kreuzend: übrigens ist sie von einer, vorzüglich von der Fascia transversalis gebildeten Fortsetzung der Vagina vasorum cruralium bekleidet. Alsdann steigt sie schräg nach oben und innen herauf an der hinteren Wand des Canalis inguinalis und der hinteren Fläche der Fascia transversalis, ungefähr in der Mitte zwischen dem hinteren und vorderen Leistenringe und hinter den durch den Leistenkanal laufenfenden Vasa spermatica interna und Samenleiter (oder rundem Mutterbande): nach hinten wird sie nur durch ein dünnes Blatt der Fascia transversalis und etwas Zellstoff vom Bauchfell getrennt und bewirkt an diesem die Plica epigastrica peritonaei, welche die Fovea inguinalis externa und interna von einander scheidet (S. 581). Ungefähr $2^1/_2$″ bis 3″ oberhalb der Symphysis pubis erreicht sie den äusseren Rand des M. rectus abdominis, läuft an dessen hinterer Fläche nach oben, hinterwärts von dem vorderen unteren Theil der Fascia transversalis, der Linea semicircularis

Douglasii und der hinteren Platte der Fascia recta abdominis überzogen, und gelangt, zwischen die Muskelbündel eindringend, bis zur Höhe des Nabels, woselbst ihre Endigung mit der A. epigastrica superior von der A. mammaria interna (S. 672) zusammenfliefst. — Äste:

a) *A. pubica* s. *A. cristae pubis*, Schambeinschl., $\frac{1}{2}$‴ dick, entsteht von dem horizontalen Anfangstheile der A. epigastrica, läuft in derselben horizontalen Richtung vor dem Annulus cruralis, längs des vorderen Randes des Lig. Gimbernati und der dritten Insertion des Arcus cruralis an die Crista pubis, bis zum oberen Rande der Symphysis pubis, woselbst sie hinter dem Lig. triangulare lineae albae mit der der anderen Seite zusammenfliefst. Sie giebt ab den $\frac{1}{3}$‴ dicken *Ramulus obturatorius*, welcher bogenförmig auf der oberen Fläche des Lig. Gimbernati, am inneren Umfange des Schenkelringes, nach hinten läuft, an der hinteren Fläche des Ramus horizontalis oss. pubis herabsteigt und mit dem Ramulus pubicus der A. obturatoria anastomosirt (S. 703): — aufserdem entstehen von ihr kleine Zweige an den Arcus cruralis, die Mm. pyramidalis und rectus abdominis.

b) *A. spermatica externa*, äufsere Samenschl., $\frac{1}{2}$‴ dick, entsteht vom horizontalen oder vom Anfange des aufsteigenden Theils der A. epigastrica, dringt in den Canalis inguinalis durch dessen hintere Wand, selten durch den hinteren Leistenring; läuft im männlichen Geschlecht aus dem vorderen Leistenringe hervor an der vorderen Fläche des Samenstranges bis in den Grund des Hodensackes, versorgt den M. cremaster und die Tunica vaginalis communis, anastomosirt mit den Aa. spermatica interna und scrotales anteriores. Im weiblichen Geschlecht geht sie theils zu den grofsen Schamlefzen, theils schickt sie einen Ast zum Lig. uteri rotundum, welcher bis zum Gebärmuttergrunde geht und mit den Aa. spermatica interna und uterina anastomosirt.

c) *Rami musculares* von der aufsteigenden Strecke der A. epigastrica, zahlreich, $\frac{1}{2}$‴ bis $\frac{3}{4}$‴ dick, meistens für die Mm. rectus abdominis und pyramidalis: einer der stärksten oder mehrere kleinere verästeln sich auch in den seitlichen Bauchmuskeln und anastomosiren mit Ästen der Aa.

lumbares und intercostales. Auch das Bauchfell erhält kleine Zweige.

2. *A. circumflexa ilium* s. abdominalis externa, Kranzschl. der Hüfte, 1‴ dick, entsteht meistens 1‴ bis 2‴ unter dem Arcus cruralis, steigt hinter demselben nach aufsen und oben gegen die Spina anterior superior oss. ilium hin, indem sie oberwärts von der Vereinigungsstelle der Fascia iliaca und Fascia transversalis, unterwärts von der Vereinigung des Arcus cruralis mit der Fascia iliaca und dem tiefen Blatte der Fascia lata umgeben und geschützt wird: (seltner verläuft sie höher, oberhalb dieser Vereinigungsstellen und nur vom Bauchfell bedeckt). Sie giebt Äste an die Mm. sartorius, tensor fasciae latae und gluteus medius, an den M. iliacus internus und an die seitlichen Bauchmuskeln in der Regio hypogastrica und iliaca, und läuft längs des Labium internum cristae oss. ilium bogenförmig nach hinten, der A. ileolumbalis entgegen, mit welcher, so wie mit Ästen der Aa. lumbares und epigastrica inferior sie anastomosirt.

II. *A. femoralis.*

Die 4‴ dicke Oberschenkelschlagader läuft, nachdem sie hinter dem Arcus cruralis an die vordere Fläche des Oberschenkels gelangt ist, von der Vagina vasorum cruralium umhüllt, mitten durch die Fossa iliopectinea (S. 282.) herab, nach aufsen an die vereinigten Mm. psoas major und iliacus internus, nach innen an den M. pectineus gränzend, zwischen den Blättern der Fascia lata und zwar hinter dem Proc. falciformis des oberflächlichen Blattes des Fascia lata, (S. 286.) neben welchem ihr innerer Umfang zuweilen in die Fovea ovalis hineinragt: wird übrigens an ihrer inneren Seite von der Vena femoralis, an ihrer äufseren Seite von den Ästen des N. cruralis, vorn von Gland. lymph. inguinales umgeben. Am unteren Ende der Fossa iliopectinea, 3″ bis 3½″ unterhalb des Arcus cruralis, verbirgt sie sich hinter dem inneren Rande des M. sartorius und läuft nun an der inneren Seite des Oberschenkels herab, in der Furche zwischen dem Ursprunge des M. vastus internus und den Insertionen der Mm. adductores, überall vom M. sartorius bedeckt und vor der Vena femoralis: die Vagina wird allmählig dünner, dafür ist sie aber zwischen den

Blättern der Fascia lata, welche hinter ihr die Mm. vastus internus und adductores genau überzieht und über die Furche zwischen diesen Muskeln vor der Arterie brückenförmig hingespannt ist, eingeschlossen. In diesem Verlaufe gelangt sie immer mehr nach hinten und in die Tiefe des Oberschenkels, dicht an die innere Fläche des Os femoris und tritt, 4″ bis 5″ oberhalb des Condylus internus des Oberschenkelbeins, durch den Spalt in der Insertion des M. adductor magnus, woselbst sie noch $3\frac{1}{3}$‴ dick ist. Der Lauf der A. femoralis ist überall sehr gestreckt.

Nahe unter dem Arcus cruralis giebt sie die Rami inguinales, die Aa. epigastrica superficialis und pudendae externae ab; sodann ungefähr $1\frac{1}{2}$″ unterhalb des Arcus cruralis die A. profunda femoris, (öfters auch eine oder beide Aa. circumflexae femoris): in ihrem ferneren Verlaufe entstehen zahlreiche Muskeläste und zuletzt von ihrem unteren Ende die A. articularis genu superficialis.

Von Einigen wird die A. femoralis an ihrem Anfange als A. femoralis communis bezeichnet und nach Abgabe der A. profunda femoris als A. femoralis superficialis, obgleich die letztere, vom M. sartorius bedekt, tiefer liegt als die A. femoralis communis.

1. *Rami inguinales*, vier bis sechs, $\frac{1}{4}$‴ bis $\frac{1}{2}$‴ dick, vertheilen sich im unteren Theile der Inguinalgegend nahe unter dem Arcus cruralis an die, die Fossa iliopectinea begränzenden Muskeln, an die Lymphdrüsen und die Haut.

2. *A. epigastrica superficialis* s. abdominalis subcutanea, oberflächliche Bauchdeckenschl., $\frac{3}{4}$‴ dick, giebt kleine Äste zu den Lymphdrüsen in der Fovea ovalis, durchbohrt den Proc. falciformis fasciae latae, steigt vor dem Arcus cruralis gerade aufwärts durch den äufseren Theil der Regio inguinalis und hypogastrica, zuweilen bis zur Höhe des Nabels; indem sie unter der Haut in der Fascia superficialis verläuft, vertheilt sie sich nur an den M. obliquus externus abdominis und die Haut.

3. *Aa. pudendae externae*, äufsere Schamschl., $\frac{3}{4}$‴ bis 1‴ dick, gemeiniglich zwei, seltner nur eine. Sie entstehen nahe unter einander, von der vorderen und inneren Wand der A. femoralis, und laufen in queerer Richtung nach innen; die eine mehr oberflächlich durch die Fovea

ovalis vor der Schenkelvene, Äste an die Drüsen und die Haut abgebend, die andere dagegen hinter der Vene und hinter der Portio pectinea fasciae latae, dem M. pectineus Zweige gebend, bevor sie die Fascia durchbohrt. Alsdann vertheilen sie sich an die vordere Wand des Hodensackes und an die Haut der Wurzel des Penis, oder an die Commissura anterior und den vorderen Theil der Labia pudendi majora, als *Aa. scrotales* oder *labiales anteriores*, die mit den gleichnamigen posteriores aus der A. perinaei und mit der A. spermatica externa anastomosiren.

4. *A. profunda femoris* s. femoralis profunda, tiefe Oberschenkelschl., 3‴ dick, der stärkste Ast der A. cruralis überhaupt: entsteht von der hinteren Wand der A. femoralis und steigt hinter derselben und etwas mehr nach aufsen, ½″ bis 1″ von ihr entfernt, mit einigen schwachen Biegungen herab. Anfänglich liegt sie vor dem unteren Ende der Mm. psoas major und iliacus internus, woselbst sie die, einen Kranz um das Collum oss. femoris bildenden Aa. circumflexae femoris und Muskeläste abgiebt; alsdann vor der Insertion des M. pectineus, woselbst die A. perforans prima von ihr entsteht; hiernach senkt sie sich nach unten und hinten zwischen die Insertionen der Mm. adductor brevis und longus, und theilt sich in die Aa. perforans secunda und tertia, welche, nebst der A. perforans I, den M. adductor magnus durchbohren und an die hintere Seite des Oberschenkels gelangen.

a) *A. circumflexa femoris interna*, innere Kranzschl. des Oberschenkels, 1½‴ dick, entspringt von der inneren Wand der A. profunda femoris, geht hinter der A. femoralis queer nach innen: giebt zuerst den 1‴ dicken *Ramus superficialis* ab, welcher vor dem M. pectineus und zwischen Mm. adductor longus und brevis queer nach innen geht, diesen Muskeln und dem M. gracilis Äste giebt und mit dem Ramus anterior a. obturatoriae anastomosirt. Alsdann dringt sie nach hinten in die Tiefe, indem sie zwischen Mm. psoas und pectineus und zwischen Mm. adductor brevis und obturator externus an die innere Seite des Collum oss. femoris gelangt, giebt Äste an diese Muskeln und an das Hüftgelenk und anastomosirt mit dem Ramus posterior a. obturatoriae und mit Zweigen der A. pudenda com-

munis. Am Trochanter minor spaltet sie sich in einen oberen und unteren Ast: der 1‴ dicke *Ramus superior* steigt hinter dem Collum oss. femoris, zwischen Mm. obturator externus und quadratus femoris, aufwärts zur Fossa trochanterica, giebt Äste an die Mm. obturatores, gemelli, pyriformis und gluteus minimus, auch zum Trochanter major und der Cauda des M. gluteus maximus, anastomosirt mit den Aa. circumflexa femoris externa, glutea und ischiadica. Der $^4/_5$‴ dicke *Ramus inferior* tritt zwischen den Mm. quadratus femoris und adductor magnus nach hinten, vertheilt sich an der vorderen und hinteren Fläche dieser Muskeln, auch an die Mm. semitendinosus, semimembranosus und Caput longum bicipitis, und anastomosirt mit den Aa. ischiadica und perforans prima.

b) *A. circumflexa femoris externa*, äufsere Kranzschl. des Oberschenkels, $1^3/_4$‴ dick, entsteht von der äufseren Wand der A. profunda femoris, meistens etwas unterhalb der vorigen. Sie geht vor der Cauda des M. iliacus internus und hinter dem M. rectus femoris queer nach aufsen, giebt Äste an diese und die Mm. sartorius, tensor fasciae latae und an die Cauda des M. gluteus maximus: auch einen $^5/_4$‴ dicken *Ramus descendens*, welcher hinter dem M. rectus femoris, zwischen Mm. cruralis und vastus externus herabsteigt, diese versorgt und mit Muskelästen der A. poplitea, und häufig mit der A. articularis genu superior externa anastomosirt. Sodann gelangt sie, nur noch $^2/_3$‴ dick, um die vordere und äufsere Fläche des Collum ossis femoris sich windend, von dem vorderen Rande des M. gluteus medius bedeckt und ihm Äste gebend, in die Fossa trochanterica, woselbst sie mit dem Ramus superior a. circumflexae internae zusammenfliefst und aufserdem mit den Aa. circumflexa ilium, glutea und perforans I. anastomosirt.

c) *Rami musculares* von veränderlicher Anzahl und Stärke an die Muskeln der vorderen Seite des Oberschenkels.

d) *A. perforans prima*, erste durchbohrende Schl. des Oberschenkels, $1^1/_2$‴ dick, dringt zwischen den Insertionen der Mm. pectineus und adductor brevis nach hinten, durchbohrt den M. adductor magnus 2″ unterhalb des

Trochanter minor; schickt einen $^3/_4$ ''' dicken Ast aufwärts zu den Mm. gluteus maximus und quadratus femoris, welcher mit den Aa. circumflexae femoris und ischiadica anastomosirt; und verbreitet sich abwärts an den M. adductor magnus, an die Flexoren des Unterschenkels und den M. vastus externus, schickt auch die $^1/_2$ ''' dicke *A. nutritia femoris superior* zur Markhöhle; anastomosirt mit den Aa. perforantes II und III und den Muskelästen der A. femoralis.

e) *A. perforans secunda*, $^4/_5$ ''' dick, wendet sich unter dem M. adductor brevis nach hinten und innen und durchbohrt den M. adductor magnus, vertheilt sich an die Mm. adductores, vastus internus, semitendinosus und semimembranosus, anastomosirt mit den Aa. perforantes I und III, mit den Muskelästen der A. poplitea und der A. articularis genu superficialis.

f) *A. perforans tertia*, das Ende der A. profunda femoris, $^4/_5$ ''' dick, durchbohrt den M. adductor magnus dicht am Knochen und nahe oberhalb der Spalte für die A. femoralis; giebt die $^3/_4$ ''' dicke *A. nutritia magna oss. femoris*, welche durch ein Loch in der Linea aspera in die Markhöhle dringt: vertheilt sich an den M. adductor magnus, die Ursprünge der Mm. vasti und an den M. biceps femoris: anastomosirt mit den Aa. perforantes I und II, und den Muskelästen der A. poplitea.

5. *Rami musculares* der A. femoralis von der vorderen und inneren Seite des Oberschenkels, 6 bis 8 an der Zahl, $^1/_2$ ''' bis 1 ''' dick, gehen zu den Mm. adductor longus, sartorius, gracilis, rectus femoris, cruralis und vastus internus, anastomosiren mit Ästen der Aa. circumflexae femoris, perforantes und articularis genu superficialis. Unter diesen zeichnet sich der 1 ''' dicke *Ramus musculo-articularis* aus, welcher vom unteren Ende des A. femoralis entspringend, im M. vastus internus zur Kniescheibe herabläuft und Antheil an der Bildung des Rete articulare genu nimmt.

6. *A. articularis genu superficialis* s. suprema, oberflächliche oberste Kniegelenkschl., 1 ''' dick, entspringt vom unteren Ende der A. femoralis, unmittelbar bevor diese durch die Spalte des M. adductor magnus dringt, und oft gemeinschaftlich mit dem Ramus musculo-articularis. Sie

steigt, anfänglich vom M. sartorius bedeckt, vor dem unteren schmalen Ende des M. adductor magnus bis zum Condylus internus oss. femoris herab, giebt den genannten Muskeln, auch den Mm. gracilis und vastus internus Äste, und gelangt an der inneren und vorderen Seite des Kniegelenks zum Rete articulare genu.

III. *A. poplitea.*

Die Kniekehlenschlagader, die dritte unterste Strecke der A. cruralis und unmittelbare Fortsetzung der A. femoralis, liegt, nachdem sie den M. adductor magnus durchbohrt hat, nahe an dem inneren und hinteren Umfange des Os femoris, zwischen diesem und dem hinter ihr herabsteigenden M. semimembranosus. Von hier an läuft sie, etwas schräg nach aufsen herabsteigend, in die Kniekehle und senkrecht und gestreckt durch die Mitte derselben, vorne an das Lig. popliteum und den M. popliteus gränzend, hinterwärts und etwas nach aufsen von der Vena poplitea und dem hinter dieser herabsteigenden N. tibialis verborgen, so dafs nur ihr innerer Umfang von der Vene unbedeckt in der Tiefe der Kniekehle sichtbar ist: übrigens wird sie von vielem lockeren fettreichen Zellstoff umhüllt. Sie giebt in diesem Laufe Muskeläste, Aa. articulares genu und Aa. surales ab und endigt, bei einer Stärke von $2^{3}/_{4}$ ‴, nachdem sie zwischen den Köpfen der Mm. gastrocnemii, vor dem M. plantaris, herabgestiegen und in den Spalt zwischen dem äufseren und inneren Ursprunge des M. soleus (S. 302.) gedrungen ist, durch Theilung in die Aa. tibiales, antica und postica.

1. *Rami musculares* in dem oberen Theile der Kniekehle, 4 bis 6 an der Zahl, $^{1}/_{2}$ ‴ bis 1 ‴ dick, vertheilen sich an die Mm. vasti, adductor magnus und die Flexoren des Unterschenkels, anastomosiren mit den Ästen der Aa. perforantes und articulares genu superiores.

2. *A. articularis genu superior externa*, obere äufsere Kniegelenkschl., 1 ‴ dick, läuft queer nach aufsen und vorn, oberhalb des Condylus externus oss. femoris und des Ursprungs des M. gastrocnemius externus, hinten vom M. biceps femoris bedeckt: gelangt zwischen den Mm. biceps und vastus externus hindurchgehend an die äufsere Seite des Condylus externus oss. femoris, giebt zahlreiche

Zweige an diese Muskeln und die Gelenkbänder des Knies, anastomosirt mit den, am unteren äufseren Theile des Oberschenkels verbreiteten Muskelästen der A. femoralis und poplitea und des Ramus descendens a. circumflexae femoris externae. Zwischen dem Capitulum fibulae und dem Lig. patellae fliefst sie mit den Ästen der A. articularis genu inferior externa und der A. recurrens tibialis, oberhalb der Kniescheibe und an der vorderen und hinteren Fläche derselben mit den Endigungen der Aa. artic. genu superficialis und superior interna, auch des Ramus musculo-articularis, bogenförmig zusammen.

3. *A. articularis genu superior interna*, obere innere Kniegelenkschl., $^4/_5$‴ dick, entspringt der vorigen gegenüber, läuft queer nach innen und vorn, oberhalb des Condylus internus oss. femoris und des Kopfes des M. gastrocnemius internus, von hinten und innen durch die Mm. semimembranosus, semitendinosus, gracilis und sartorius und das untere Ende des M. adductor magnus bedeckt: — gelangt zwischen den letzteren und dem M. vastus internus an die vordere Fläche des Condylus internus oss. femoris; vertheilt sich an die genannten Muskeln und die Gelenkbänder, und bildet zahlreiche Anastomosen; nach oben mit der A. artic. genu superficialis, den Muskelästen der A. poplitea und den Enden der Aa. perforantes II und III; nach unten am Condylus internus tibiae mit der A. artic. genu inferior interna: oberhalb und vor der Kniescheibe mit dem Ramus musculo-articularis und der A. artic. genu superior externa.

4. *A. articularis genu media*, mittlere Kniegelenkschl., $^3/_4$‴ dick, ist vorzüglich für das Innere des Kniegelenks bestimmt: entspringt von der vorderen Wand der A. poplitea, geht nach vorn und dringt über dem Lig. popliteum durch das Kapselband in die Fossa intercondyloidea posterior ein, vertheilt sich vorzüglich an die Ligg. cruciata, mucosum und alaria und anastomosirt mit den, die Kapsel durchbohrenden Zweigen der anderen Aa. articulares.

5. *Aa. surales*, Wadenschl., 4 bis 6, öfters aus einem oder zwei gemeinschaftlichen Stämmchen von $1^1/_2$‴ Dm. entspringend, theils an der Oberfläche, theils in den Muskeln der Wade verlaufend:

a) *Aa. surales superficiales*, zwei bis drei, $^1/_2$‴ $^3/_4$‴ dick, laufen in der Haut der Wade herab, geben auch den Mm. gastrocnemii Äste: die äufsere geht oft bis in die Nähe des Malleolus externus herab und anastomosirt mit der A. peronaea.

b) *Aa. surales profundae* s. *gastrocnemicae*, s. gemellae surae, zwei bis drei, $^3/_4$‴ bis 1‴ dick, laufen zwischen den Mm. gastrocnemii und soleus herab, vertheilen sich an diese Muskeln, vorzüglich an die ersteren.

6. *A. articularis genu inferior externa*, untere äufsere Kniegelenkschl., $^4/_5$‴ dick, windet sich um den Condylus externus tibiae nach aufsen und nach vorn, oberhalb des Capitulum fibulae, an dem Kopfe des M. popliteus und an der Kapsel, längs des äufseren Randes des Fibrocart. falciformis externus, genau anliegend; von den Mm. gastrocnemius externus, plantaris, biceps femoris und dem Lig. laterale genu externum bedeckt: giebt allen diesen Theilen Äste, anastomosirt mit der A. artic. genu superior externa und der A. recurrens tibialis, und fliefst vor und hinter dem Lig. patellae mit der folgenden zusammen.

7. *A. articularis genu inferior interna*, untere innere Kniegelenkschl., 1‴ dick, geht nach innen und unter dem gröfsten Umfange des Condylus internus tibiae sich herumwindend nach vorn, von dem Kopfe des M. gastrocnemius internus und den Insertionen der Mm. semimembranosus, semitendinosus, gracilis und sartorius und dem unteren Ende des Lig. laterale genu internum bedeckt: giebt oberflächliche und tiefe Zweige an diese Theile und an das Kapselband und bildet, vor und hinter dem Lig. patellae, mit der vorigen horizontale Anastomosen, aus welchen Äste aufwärts steigen, die mit den Anastomosen der Aa. art. genu superiores und superficialis zusammenfliefsen.

8. *Aa. articulares genu accessoriae* von unbestimmter Anzahl, $^1/_4$‴ bis $^1/_2$‴ dick, unter welchen oft eine media inferior, welche die hintere Wand der Kapsel durchbohrt: — dringen in der Kniekehle an das Gelenk und die Muskeln, anastomosiren mit den gröfseren Aa. articulares genu und surales, gelangen aber nicht an die vordere Seite des Knies.

Rete articulare genu, Kniegelenknetz, an der vor-

deren und Seitenfläche des Kniegelenks, entsteht aus dem Zusammenfluſs der ¼‴ bis ½‴ dicken Äste und Endigungen aller Aa. articulares genu, des Ramus musculo-articularis, der A. recurrens tibialis, aus der A. tibialis anterior und kleinen Muskelästen der A. tibialis postica. Die kleineren Bögen und Ramificationen dieses Netzes liegen zwischen der Haut und der Fascia, diese versorgend: die stärkeren aber von der Fascia, den Sehnen der Flexoren und Adductoren des Unterschenkels, von den Ligg. lateralia genu, den Endigungen der Extensoren des Unterschenkels, von der Kniescheibe und dem Lig. patellae bedeckt: aus diesen dringen zahlreiche mit einander anastomosirende Zweige in die Gelenkhöhle, an die inneren Bänder, Zwischenknorpel und die Synovialkapsel (welche indessen hauptsächlich von der A. artic. genu media versorgt werden.) Dieses Netz verbindet die Aa. perforantes, den Ramus descendens der A. circumflexa femoris externa und die Muskeläste der A. femoralis und des oberen Theiles der A. poplitea, mit dem unteren Ende der A. poplitea und mit der A. tibialis antica und postica.

IV. *Aa. cruris et pedis.*

Die Arterien des Unterschenkels und Fuſses entstehen sämmtlich aus zwei Stämmen, den Aa. tibiales, anterior et postica.

1. *A. tibialis anterior s. antica*, vordere Schienbeinschl., 1½‴ dick, für die vordere Seite des Unterschenkels, den Fuſsrücken und zum Theil auch für die Fuſssohle bestimmt, dringt sogleich nach ihrem Ursprunge, zwischen den oberen Extremitäten der Tibia und Fibula hindurch und über dem oberen Rande des Lig. interosseum cruris, nach vorn und läuft auf der vorderen Fläche dieses Ligaments herab; nach innen an den M. tibialis anterior, nach auſsen an die Mm. extensor digitorum communis longus und extensor longus hallucis gränzend, von dem letzteren zunächst bedeckt. In der Mitte der Vorderfläche des Fuſsgelenks liegt sie fast unmittelbar auf dem Kapselbande und geht durch die mittlere Scheide des Lig. cruciatum, auch hier von der Sehne des M. extensor longus hallucis bedeckt: und gelangt auf den Rücken des Tarsus, woselbst sie ¾‴ dick ist und den Namen *A. dorsalis pedis*, s. pediaea s. tarsea interna,

Rückenschl. des Fufses, erhält: diese läuft zwischen der Sehne des M. extensor longus hallucis und dem M. extensor hallucis brevis, nur von der Fascia dorsalis pedis bedeckt, gegen das erste Interstitium interosseum metatarsi hin, woselbst sie durch Spaltung in die A. interossea dorsalis prima und den Ramus plantaris profundus endigt. Äste:

a) *A. recurrens tibialis*, zurücklaufende Schienbeinschl., $^2/_3$‴ dick, entspringt schon in der Höhe des oberen Randes des Lig. interosseum, steigt zwischen dem Condylus internus tibiae und Capitulum fibulae aufwärts, durchbohrt die vereinigten Köpfe der Mm. tibialis anterior und extensor digitorum communis longus und giebt ihnen Äste: gelangt am äufseren Rande des Lig. patellae in das Rete articulare genu und fliefst vorzüglich mit der A. artic. genu inferior externa zusammen.

b) *Rami musculares*, sehr zahlreich, $^1/_4$‴ bis $^1/_2$‴ dick, an die Mm. tibialis anterior, extensores longi digitorum und hallucis.

c) *A. malleolaris anterior externa*, vordere äufsere Knöchelschl., $^2/_3$‴ dick, läuft queer an dem Malleolus externus und fliefst mit den Aa. peronaea anterior und posterior und dem hinteren Aste der A. tarsea externa zum äufseren Knöchelnetz zusammen, *Rete malleolare externum*, aus welchem zahlreiche kleine Zweige an die Mm. peronaei, das Fufsgelenk und die Mm. extensor brevis digitorum und abductor dig. minimi gehen.

d) *A. malleolaris anterior interna*, vordere innere Knöchelschl., $^1/_2$‴ dick, umkreiset den inneren Knöchel, und fliefst mit den Aa. malleolaris posterior interna und tarseae internae zum inneren Knöchelnetze, *Rete malleolare internum*, zusammen, welches sich an der inneren Seite des Fufsgelenks verbreitet.

e) *A. tarsea externa*, äufsere Fufswurzelschl., $^3/_4$‴ dick, entspringt auf dem Collum tali, läuft, vom M. extensor digitorum brevis bedeckt, auf dem Calcaneus und Os cuboideum gegen den äufseren Fufsrand hin und theilt sich in einen hinteren und vorderen Ast: ersterer nimmt Antheil an der Bildung des Rete malleolare externum und anastomosirt auch mit Ästen der A. plantaris externa: letzterer

fliefst neben der Tuberositas oss. metatarsi quinti mit der A. metatarsea bogenförmig zusammen, vertheilt sich an die Mm. extensor digitorum brevis und abductor digiti minimi und an die Knochen und Bänder des Fufsgelenks und der Fufswurzel.

f) *Aa. tarseae internae*, innere Fufswurzelschl. zwei bis drei, $^1/_4$‴ bis $^1/_2$‴ dick; laufen über den inneren Rand der Fufswurzel hinab, verbreiten sich an den M. abductor hallucis, Fufsgelenk und Fufswurzel, nehmen Antheil an der Bildung der Rete malleolare internum.

g) *A. metatarsea*, Mittelfufsschl., $^3/_4$‴ dick, entspringt auf dem Os naviculare, läuft vom M. extensor digitorum brevis bedeckt nach aufsen und fliefst bogenförmig mit dem vorderen Aste der A. tarsea externa zusammen. Aus diesem nach vorn convexen Fufsrückenbogen, *Arcus dorsalis pedis*, entspringen:

aa) Äste an den kurzen Zehenstrecker, an die Fufswurzel und die Mittelfufsgelenke.

bb) *Aa. interosseae metatarsi dorsales, secunda, tertia* et *quarta*, $^1/_3$‴ bis $^1/_2$‴ dick, laufen im zweiten, dritten und vierten Interstitium interosseum nach vorn, stehen durch die Rami perforantes metatarsi posteriores, welche zwischen den Bases der Ossa metatarsi hindurchdringen, mit den Aa. interosseae plantares in Verbindung (öfters auch durch schwächere Rami perforantes anteriores zwischen den Capitula oss. metatarsi). Sie versorgen die Mm. interossei dorsales pedis; alsdann theilt sich eine jede, zwischen den Köpfen der Mittelfufsknochen, gabelförmig in zwei, $^1/_4$‴ dicke Zehenrückenschl., *Aa. digitales pedis dorsales*, eine *externa* und eine *interna* für zwei verschiedene Zehen, welche sich überhaupt wie die der Finger verhalten.

cc) *A. digitalis dorsalis dig. minimi externa*, $^1/_3$ dick, anastomosirt mit Ästen der A. plantaris externa und geht zum Rücken der kleinen Zehe.

h. *A. interossea dorsalis prima* s. *dorsalis hallucis*, Rückenschl. der grofsen Zehe, 1‴ dick, läuft im Interstitium interosseum primum, vom M. extensor hallucis brevis bedeckt, nach vorn, vereinigt sich durch einen $^1/_2$‴ dicken Ramus perforans anterior, zwischen den Köpfen des

ersten und zweiten Mittelfufsknochen, mit der A. interossea plantaris I, und spaltet sich in drei $^1/_3$''' dicke *Aa. digitales dorsales;* in die *interna* und *externa hallucis* und die *interna digiti secundi.*

i) *Ramus plantaris profundus* arteriae dorsalis pedis s. anastomoticus profundus s. perforans posterior primus, $^2/_3$''' dick, dringt zwischen den Bases des ersten und zweiten Mittelfufsknochens und den beiden Köpfen des M. interosseus dorsalis I hindurch in die Fufssohle; und fliefst mit dem inneren Ende der A. plantaris externa zur Bildung des Arcus plantaris profundus zusammen.

2. *A. tibialis postica*, hintere Schienbeinschl., $2^1/_4$''' dick, ist für die hintere Seite des Unterschenkels und die Fufssohle bestimmt. Sie steigt zuerst fast senkrecht zwischen den Köpfen des M. soleus und tibialis posticus 1'' weit herab und giebt ihren ansehnlichsten Ast, die *A. peronaea communis* ab: läuft alsdann, bei einer Stärke von 2''', leicht geschlängelt und etwas nach innen, an der hinteren Fläche der Mm. tibialis posticus und flexor communis digitorum longus herab, anfänglich hinterwärts noch vom inneren Rande des M. soleus bedeckt. Am unteren Drittheil des Unterschenkels liegt sie oberflächlicher, nur von der Fascia cruralis bedeckt, in dem Raume zwischen dem inneren Rande des Tendo Achillis und dem Malleolus internus, unmittelbar hinter diesem Knöchel und den Sehnen der Mm. tibialis posticus und flexor digitorum longus. Unterhalb des Malleolus internus, woselbst sie noch $1^1/_2$''' dick ist, wird sie von dem Lig. laciniatum bedeckt und biegt sich, zwischen den Sehnen der Mm. flexor digitorum longus und flexor hallucis longus, um die innere Fläche des Calcaneus nach unten und vorn, gelangt oberhalb des M. abductor hallucis in die Fufssohle und endigt nahe vor der Tuberositas calcanei, am inneren Rande des M. quadratus, durch Spaltung in die Aa. plantares, interna und externa. Äste:

a) *A. nutritia tibiae superior*, $^1/_3$''' dick, geht zu den Condyli tibiae und anastomosirt mit Ästen der A. artic. genu inferior interna.

b) Äste zum M. soleus, die mit der A. artic. genu inferior externa und den Aa. surales profundae anastomosiren.

c) *A. peronaea communis* s. fibularis, Wadenbeinschl., $^5/_4$‴ dick, geht unter einem spitzen Winkel von der A. tibialis postica ab, und läuft etwas geschlängelt an der hinteren Fläche der Fibula und des Lig. interosseum herab, beinahe parallel mit der A. tibialis postica und nur $^1/_2$″ bis $^3/_4$″ von ihr entfernt: hinterwärts anfänglich vom M. soleus, sodann vom M. flexor longus hallucis unmittelbar bedeckt. Sie giebt zahlreiche, $^1/_4$‴ bis $^1/_2$‴ dicke Äste nach aufsen an die Mm. soleus und peronaei, eine A. nutritia fibulae, und kleinere Äste nach innen an die Mm. tibialis posticus, flexor longus hallucis und flexor longus digitorum, welche oberhalb der Knöchel mit Zweigen der A. tib. postica anastomosiren. Oberhalb des Malleolus externus spaltet sie sich in zwei Endäste:

aa) *A. peronaea anterior*, $^3/_4$‴ dick, durchbohrt das Lig. interosseum, versorgt vorzüglich den M. peronaeus tertius und fliefst mit Zweigen der Aa. malleolaris anterior externa, peronaea posterior und des hinteren Astes der A. tarsea externa zum Rete malleolare externum (S. 720) zusammen.

bb) *A. peronaea posterior*, 1‴ dick, steigt hinter dem äufseren Knöchel herab, gelangt zwischen dem Tendo Achillis und dem M. peronaeus brevis an die äufsere Seite des Calcaneus, giebt Zweige an den Tendo Achillis, die Mm. flexor longus hallucis, peronaeus longus und brevis; und endlich zahlreiche Äste an die äufsere Seite der Ferse, *Rami calcanei externi*, von $^1/_4$‴‴ bis $^1/_2$‴ Dm., welche an das Fufsgelenk, die Fufswurzelknochen und Bänder, die Mm. abductor dig. minimi und flexor communis digitorum brevis gehen, und das Rete malleolare externum und Rete calcaneum bilden helfen.

d) *A. nutritia tibiae magna*, 1‴ dick, die stärkste Knochenschl. des m. K., dringt durch das grofse Ernährungsloch an der hinteren Fläche des Corpus tibiae in die Markhöhle.

e) *Rami musculares*, zahlreich, $^1/_4$‴ bis $^1/_2$‴ dick, an die Mm. soleus, tibialis posticus und flexores longi digitorum und hallucis.

f) *A. malleolaris posterior interna*, hintere innere Knöchelschl., $^1/_2$‴ dick, windet sich um den Malleolus

internus nach vorn, zwischen diesem Knöchel und den Sehnen der Mm. flexor digitorum longus und tibialis posticus, und bildet mit den Aa. malleolaris anterior interna und tarseae internae das Rete malleolare internum. (S. 720).

g) *A. malleolaris posterior externa* ist ein $^1/_3$‴ bis $^1/_2$‴ dicker Verbindungszweig zur A. peronaea posterior, da wo diese hinter dem äufseren Knöchel herabsteigt.

h) *Rami calcanei interni*, innere Fersenzweige, drei bis fünf, $^1/_3$‴ bis $^1/_2$‴ dick, laufen nach hinten und innen, hinter die Insertion des Tendo Achillis und an die innere Seite des Calcaneus, schicken Äste an die Mm. abductor hallucis, flexor digitorum brevis, an das Fufsgelenk, den Calcaneus und die Haut der Ferse, indem sie mit den Rami calcanei externi der A. peronaea posterior das Fersennetz, *Rete calcaneum*, bilden, welches mit den Retia malleolaria zusammenhängt.

i) *A. plantaris interna*, innere Fufssohlenschl., $^4/_5$‴ dick, giebt zuerst die $^1/_2$‴ dicke *A. superficialis pedis interna* ab, welche oberhalb des M. abductor hallucis an dem inneren Fufsrande nach vorn läuft, an diesen Muskel und die Haut sich vertheilt, mit den Aa. tarseae internae anastomosirt und in die A. digit. dorsalis interna hallucis übergeht. — Hiernach läuft die A. plantaris interna ziemlich oberflächlich an der inneren Seite der Fufssohle nach vorn, zwischen Mm. flexor digitorum brevis und abductor hallucis, unterwärts nur von den Rändern dieser Muskeln und der Fascia plantaris bedeckt: giebt diesen Muskeln, auch dem M. flexor brevis hallucis, den Fufswurzelknochen und Bändern und der Haut zahlreiche Äste: und ergiefst sich, zwischen den beiden Portionen des M. flexor brevis hallucis, nur noch $^1/_4$‴ dick, in die A. digit. plantaris hallucis interna.

k) *A. plantaris externa*, äufsere Fufssohlenschl., $^3/_4$‴ dick, läuft gegen den äufseren Fufsrand hin gebogen nach vorn, überhaupt tiefer als die A. plantaris interna; sie wird im hinteren Theile der Fufssohle unterwärts von der Fascia plantaris und dem M. flexor dig. brevis verborgen; in der Mitte der Fufssohle liegt sie zwischen dem M. flexor brevis digiti minimi und dem M. quadratus plantae, zum Theil nur von der Fascia plantaris bedeckt. Auf

diesem Wege giebt sie Äste an die Fufswurzel, den M. quadratus, die Muskeln der kleine Zehe und an die Haut des äufseren Fufsrandes, welche mit Ästen der Aa. tarsea externa und metatarsea anastomosiren: ferner die *A. digitalis plantaris dig. minimi externa*, welche am äufseren Fufsrande unter der Haut verläuft und mit der A. digit. dorsalis externa derselben Zehe (S. 721) anastomosirt. — Nach Abgabe dieser Äste krümmt sich die A. plantaris externa bogenförmig in die Tiefe der Fufssohle und gegen den inneren Fufsrand hin und endigt durch Zusammenfluſs mit dem Ramus plantaris profundus der A. dorsalis pedis (S. 722). Der auf solche Weise gebildete, nach vorn convexe, 1‴ dicke Fufssohlenbogen, *Arcus plantaris profundus*, liegt am hinteren Ende des Metatarsus, unmittelbar an den Plantarflächen der Mm. interossei plantares, unterwärts von der Fascia plantaris, den Sehnen der Mm. flexores digitorum brevis und longus, den Mm. lumbricales und dem M. adductor hallucis bedeckt. Aus ihm entspringen vier *Aa. interosseae plantares* s. digitales communes: die *secunda, tertia* und *quarta*, vom inneren Fufsrande an gezählt, sind ¾‴ dick, laufen im zweiten, dritten und vierten Interstitium interosseum nach vorn, stehen durch die ⅓‴ dicken *Rami perforantes metatarsi posteriores* zwischen den Bases oss. metatarsi (öfters auch noch durch Rami perforantes metatarsi anteriores zwischen den Capitula) mit den Aa. interosseae dorsales in Verbindung (S. 721): sie geben allen tieferen Muskeln in der Mitte der Fufssohle Äste, gelangen zwischen dem M. transversalis plantae und den Ligg. capitulorum oss. metatarsi zu den hinteren Enden der Zehen, und spalten sich gabelförmig in zwei, ¼‴ bis ½‴ dicke *Aa. digitales plantares*, eine *externa* und eine *interna*, für zwei verschiedene Zehen: die II für die zweite und dritte, die III für die dritte und vierte, die IV für die vierte und fünfte Zehe. — Die 1‴ dicke *A. interossea plantaris prima*, welche aus dem inneren Ende des Arcus plantaris entsteht, im ersten Interstitium interosseum verläuft und den Mm. flexor brevis und adductor hallucis Äste giebt, schickt zuerst die ½‴ dicke *A. dig. plantaris hallucis interna* ab, welche das Ende der A. plantaris interna aufnimmt: verstärkt sich alsdann durch Aufnahme des

Ramus perforans anterior der A. interossea dorsalis I (S. 721) und spaltet sich in die $^2/_3$''' dicke *A. dig. plantaris hallucis externa* und in die $^1/_2$''' dicke *A. dig. plantaris digiti secundi interna.* (Von Einigen werden die Aa. interosseae plantares in umgekehrter Ordnung, nämlich vom äufseren nach dem inneren Fufsrande hin und dem Laufe der A. plantaris externa entsprechend, abgezählt).

Die Zehenarterien, *Aa. digitales pedis*, entstehen also in folgender Ordnung:

die Aa. digitales dorsales

hallucis	interna	von der A. inteross. dorsalis I und A. superfic. pedis int.
	externa	von der A. interossea dorsalis I
digiti II	interna	» » » » » II
	externa	
dig. III	interna	» » » » » III
	externa	
dig. IV	interna	» » » » » IV
	externa	
dig. V	interna	» » » metatarsea und A. plantaris externa.
	externa	

die Aa. digitales plantares

hallucis	interna	von der A. interossea plantaris I u. der A. plantaris interna
	externa	von der A. interossea plantaris I
digiti II	interna	» » » » » II
	externa	
dig. III	interna	» » » » » III
	externa	
dig. IV	interna	» » » » » IV
	externa	
dig. V	interna	» » » plantaris externa.
	externa	

In ihrem weiteren Verlaufe, Vertheilung und Anastomosen verhalten sich die Zehenarterien ganz wie die Fingerarterien, sind aber kürzer und dünner als die letzteren.

Übersicht der Anastomosen im Aortensystem.

Sämmtliche Arterien des Körpers stehen zwar durch die Netze der Capillargefäfse, in welche ihre feineren Endzweige sich auflösen, unter einander in Verbindung: aufserdem anastomosiren aber die Schlagadern, welche mit ihren Endästen von verschiedenen Richtungen und von zuweilen sehr entfernten Ursprungsstellen her sich einander nähern, durch Äste von verschiedener Stärke, meistens von $^1/_5$‴ bis $^1/_4$‴ Dm., selten von $^1/_2$‴ bis 1‴ Dm. Diese zusammenfliefsenden Äste können, nach Verschliefsung der einen Arterie, welcher sie angehören, sich beträchtlich erweitern und die verschlossene Arterie dergestalt ersetzen, dafs die Ernährung eines Organs, welches im Normalzustande von zwei verschiedenen Schlagadern versorgt wurde, nur vermittelst einer derselben ungestört fortdauert: ja dafs sogar nach Verschliefsung des Hauptstammes für eine gröfsere Abtheilung des Körpers, z. B. für eine ganze Gliedmafse, das Blut zu den unterhalb der verschlossenen Stelle liegenden Organen, durch eine Reihe von anastomosirenden Ästen mehrerer Arterien (sogenannter Collateralgefäfse oder Nebengefäfse des Hauptstamms) geführt wird.

Anastomosen in der Mittellinie.

Die Verbindung der Arterien der beiden Seitenhälften des Körpers wird zwar hauptsächlich durch die Aorta, durch den Stamm, welcher nach der rechten und linken Seite hin die gröfstentheils paarweisen Schlagadern abgiebt, vermittelt. Aufserdem communiciren, in einiger Entfernung von der Aorta, die der Mittellinie des Körpers am meisten sich nähernden Arterien, welche hierunter aufgezählt werden, mit einander; meistens durch sehr kleine Zweige, einige aber durch sehr starke Äste. Die meisten dieser Anastomosen finden sich an den unpaaren, übrigens symmetrisch gebildeten Organen, einige nicht unansehnliche auch an asymmetrischen Theilen.

Gegenden der Mitte des Körpers.	Anastomosirende Arterien:		abstammend von den	
Schädelgewölbe.	Aa.	frontales	Aa.	ophthalmicae
	»	temporales superfic.	»	carotides externae
	»	occipitales	»	» »
Schädel- und Rückgratshöhle.	»	meningeae mediae .	»	maxill. internae
	»	corporis callosi.... durch die A. communicans anterior	»	carotides internae
	»	cerebelli superiores et inf.	A.	basilaris
	»	vertebrales..... durch die A. basilar.	Aa.	subclaviae
	»	spinales anteriores	»	vertebrales
	»	» posteriores	»	vertebrales
	Rami	spinales	»	»
	»	»	»	intercostales
	»	»	»	lumbares
	»	»	»	sacrales
Gesicht.	Aa.	dorsales nasi	»	ophthalmicae
	»	nasales laterales...	»	maxillares externae
	»	septi mobilis	»	» »
	»	coronariae labior.	»	» »
	»	submentales	»	» »
Höhlen des Gesichts.	»	septi narium poster.	»	sphenopalatinae
	»	ethmoidales	»	ophthalmicae
	»	raninae	»	linguales
	»	pterygopalatinae...	»	maxillares internae
	»	pharyngopalatinae .	»	pharyngeae adscendentes
Hals.	»	cricothyreoideae...	»	thyreoideae super.
	»	laryngeae superior.	»	» »
	»	» inferiores	»	thyreoideae infer.
	Rami	thyreoidei.....	»	» »
	»	tracheales.....	»	» »
	»	pharyngei.....	»	» »
	»	oesophagei	»	» »
	»	musculares.....	»	cervicales adscendentes

Gegenden.	Anastomosirende Arterien:		abstammend von der
Hals.	Rami cervicales.....	Aa.	occipitales
	» musculares.....	»	cervicales profund.
	» »	»	vertebrales
	» cervicales posterior.	»	transversae colli
Thorax.	» perforantes.....	»	mammariae intern.
	» dorsales.....	»	intercostales
	Aa. mediastinae anter..	»	mammariae intern.
	» pericardiaco phrenicae.....	»	» »
	» coronariae cordis..	A.	aorta adscendens
	» bronchiales.....	»	aorta desc. thoracic.
	» oesophageae.....	»	» » »
Bauch	» epigastricae super..	Aa.	mammariae intern.
	» pubicae und Rami musculares.....	»	epigastricae infer.
	Rami dorsales.....	»	lumbares
	Aa. sacralis media und laterales.....	»	aorta u. hypogastr.
	» phrenicae inferiores	A.	aorta desc. abdomin.
Magen.	A. coronaria ventriculi sinistra.....	»	coeliaca
	» coronaria ventriculi dextra.....	»	hepatica
	» gastroepiploica dext.	»	gastroduodenalis (hepatica)
	» » sinist.	»	lienalis
Pancreas.	» pancreatico duoden.	»	gastroduod. (hepat.)
	Rami pancreatici.....	»	lienalis
Darmkanal	Aa. intestinales.....	»	mesenterica super.
	» colica dextra.....	»	» »
	» » sinistra.....	»	» infer.
	durch die A. colica media		
	» haemorrhoidales mediae.....	Aa.	hypogastricae
Harnblase.	» vesicales.....	»	umbilicales u. hypog.
Geschlechtstheile.	» spermaticae intern.	A.	aorta desc. abdomin.
	» uterinae.....	Aa.	hypogastricae
	Aa. vaginales.....	Aa.	hypog. (vesic. infer.)

Gegenden.	Anastomosirende Arterien:	abstammend von den
	» scrotales (labiales) posteriores	Aa. perinaei (pudendae communes)
	» scrotales (labiales) anteriores	» femorales
	» profundae penis (clitorideae)	» penis s.clit.(pud.com.)
	» dorsales	» penis s. clitorideae (pud. com.)

Anastomosen nach der Longitudinalrichtung.

Diese finden gleichförmig in beiden Seitenhälften des Körpers Statt, mit Ausnahme derer in den asymmetrisch gelagerten unpaaren Verdauungswerkzeugen. Die zahlreicheren und stärkeren finden sich in gröfserer Entfernung vom Herzen, daher vorzüglich in den unteren Enden der Extremitäten; jedoch auch im Hirn und den Verdauungsorganen. In der folgenden Zusammenstellung sind die mit ihren Zweigen zunächst zusammenfliefsenden zwei oder mehreren Arterien durch eine Klammer vereinigt.

Gegenden.	Anastomosirende Arterien:	abstammend von der
Schädelgewölbe.	A. frontalis	A. ophthalmica
	» supraorbitalis	» »
	» temporalis superfic.	» carotis externa
	» auricularis poster.	» » »
	» occipitalis	» » »
Schädelhöhle.	» meningea anterior v. d. A. ethmoidalis	» ophthalmica
	» meningea media	» maxillaris interna
	Ramus meningeus v. d. A. pharyngobasilaris	» pharyngea adscend.
	A. meningea poster. ext.	» occipitalis
	» » » int.	» vertebralis
	» corporis callosi	» carotis interna
	» fossae Sylvii	» » »
	» profunda cerebri	» basilaris

Gegenden.	Anastomosirende Arterien:	abstammend von der
Schädelhöhle	A. choroidea	A. carotis interna
	Rami choroidei	» profunda cerebri
	A. communicans poster.	» carotis interna
	» profunda cerebri	» basilaris (vertebral.)
	» cerebelli superior	» basilaris
	Aa. » inferiores	» vertebralis
Rückgratshöhle.	» spinales anteriores u. posteriores	» »
	Rami spinales	» »
	» » v. d. A. intercostal. suprem.	» subclavia
	Rami spinales v. d. Aa. intercostal. poster.	» aorta desc. thorac.
	Rami spinales v. d. Aa. lumbares	» » » abdomin.
	Rami spinales v. d. A. sacralis media	» » » »
	Rami spinales v. d. Aa. sacrales laterales	» hypogastrica
Ohr.	A. tympanica	» maxillaris interna
	» stylomastoidea	» auricularis posterior
	Ram. petrosus superfic.	» meningea media
	A. auditiva interna	» basilaris
Schläfe.	» temporalis media	» temporalis superfic.
	Aa. temporales profund.	» maxillaris interna
	Ram. temporalis a. lacrymalis	» ophthalmica
Augengegend.	Aa. palpebrales	» »
	Rami palpebr. u. infraorbitalis	» maxillaris interna
	Ramus supraorbitalis	» temporalis superfic.
Nase.	A. dorsalis nasi	» ophthalmica
	» nasalis lateralis (angularis)	» maxillaris externa
	» infraorbitalis	» » »

Gegenden.	Anastomosirende Arterien:	abstammend von der
Wange u. Backe.	A. infraorbitalis	A. maxillaris interna
	» transversa faciei	» temporalis superfic.
	Ram. zygomaticus a. lacrymalis	» ophthalmica
	A. buccinatoria	» maxillaris interna
	Rami buccales superior.	» » externa
	» » inferior.	» » »
	» masseterica	» » interna
Unterkiefer- und Unterkinngegend.	A. coronaria labii infer.	» » externa
	» mentalis v. d. A. alveolaris infer.	» » interna
	» submentalis	» » externa
	» sublingualis	» lingualis
Nasenhöhle.	A. septi mobilis v. d. A. coron. lab. sup.	» maxillaris externa
	» septi narium poster.	» sphenopalatina
	» nasalis anterior v. d. A. ethmoidalis	» ophthalmica
	Aa. nasales posteriores	» sphenopalatina
Mundhöhle	A. sublingualis	» lingualis
	» submentalis	» maxillaris externa
	» pharyngopalatina	» pharyngea adscend.
	» pterygopalatina	» maxillaris interna
Pharynx.	» A. Vidiana	» pterygopalatina
	» pharyngobasilaris	» pharyngea adscend.
	» pharyngopalatina	» » »
	Rami pharyngei	» thyreoidea inferior
Kehlkopf.	A. laryngea superior	» » superior
	» » inferior	» » inferior
Vordere Halsgegend u. Nacken.	Rami musc. u. thyreoid.	» » superior
	» » » »	» » inferior
	A. pharyngobasilaris	» pharyngea adscend.
	» cervicalis adscendens	» subclavia

Gegenden.	Anastomosirende Arterien:	abstammend von der
Vordere Hals-gegend u. Nacken.	Rami cervicales.....	A. occipitalis
	» musculares.....	» vertebralis
	A. cervicalis profunda	» subclavia
	» » superficial.	» »
	Ramus cervicalis poster.	» transversa colli
Schulter.	» acromialis	» thoracico-acromial.
	» »	» transversa scapulae
	» supraspinatus...	» » colli
	A. transversa scapulae .	» subclavia
	» circumflexa scapulae	» subscapularis
	» dorsalis scapulae....	» transversa colli
	Ramus thoracico dorsal.	» subscapularis
	A. thoracica longa.....	» axillaris
Oberarm.	Ramus deltoideus.....	» thoracico-acromial.
	A. circumflexa humeri anterior.....	» axillaris
	A. circumflexa humeri posterior.....	» »
	» subscapularis.....	» »
	Rami musculares	» profunda brachii
	» »	» brachialis
Ellen-bogen.	A. collateralis radialis .	» profunda brachii
	» » media.....	» » »
	» » ulnaris sup.	» brachialis
	» » » inf.	» »
	» recurrens radialis...	» radialis
	» » ulnaris....	» ulnaris
	» » interossea.	» interossea externa
Hand-gelenk.	Ramus dorsalis.....	» radialis
	» »	» ulnaris
	A. interossea externa...	» inteross. antibr. com.
	» » perforans inferior.....	» » » intern.

Rete articulare cubiti.

Rete carpeum dorsal.

Gegenden.		Anastomosirende Arterien:	abstammend von der
Handgelenk.	Rete carpeum volare.	Zweige von der	A. radialis
		» » »	» ulnaris
		» » »	» interossea interna
		» » »	Arcus volaris profundus
Mittelhand.	Arc. vol. sublimis	Ram. volaris superfic.	A. ulnaris
		» »	» radialis
	Arc. vol. prof.	» profundus.	» radialis
		» »	» ulnaris.
		Rami inteross. perfor.	Aa. inteross. metac. volares
		» »	» inteross. metac. dorsales
Brustkasten.		Rami perforantes u. Aa. mammar. ext.	A. mammaria interna
		» musculares u. Aa. mammar. ext.	» intercostalis suprema
		» musculares und Aa. mammar. ext.	Aa. intercostales post.
Rücken.		» dorsales	A. intercost. suprema
		» »	Aa. » posteriores
Brusthöhle.		» tracheales	A. thyreoidea inferior
		Aa. mediastinae u. bronchiales anteriores	» mammaria interna
		» bronchialis poster.	» aorta desc. thoracica
		Zweige zur Pleura	Aa. mediastinae
		» » »	» intercostales
		» » »	» bronchiales
		A. coronaria cordis dext.	A. aorta adscendens
		» » sinist.	» » »
		Rami oesophagei	A. thyreoidea inferior
		Aa. oesophageae	» aorta desc. thoracica
Zwerchfell.		A. pericardiaco-phrenica	» mammaria interna
		» musculo-phrenica	» » »
		» phrenica inferior	» aorta desc. abdomin.

Gegenden.	Anastomosirende Arterien:	abstammend von der
Bauch und Beckenwände, vordere	A. epigastrica superior	A. mammaria interna
	» » inferior	» iliaca externa
	Ramulus obturatorius ..	» epigastrica inferior v. d. A. iliaca ext.
	» pubicus	» obturatoria v. d. A. hypogastrica
seitliche	A. musculo phrenica ...	» mammaria interna
	Rami musculares.....	» intercostales poster.
	» »	» lumbares
	A. epigastrica inferior .	» iliaca externa
	» » superfic.	» femoralis
	» circumflexa ilium...	» iliaca externa
	» ileolumbalis.....	» hypogastrica
hintere	Rami dorsales.....	Aa. intercostales
	» »	» lumbares
	» »	A. sacralis media
	» »	Aa. sacrales laterales
Bauchhöhle.	A. oesophagea inferior	A. aorta desc. thoracica
	» coron. ventr. sinist.	» coeliaca
	Aa. gastricae breves ...	» lienalis
	A. coronar. ventr. sinist.	» coeliaca
	» » » dextra	» hepatica
	» gastroepipl. sinistra.	» lienalis
	» » dextra .	» gastroduodenalis v. d. A. hepatica
	» pancreatico duoden.	» gastroduodenalis v. d. A. hepatica
	» duodenalis inferior..	» mesenterica superior
	Aa. intestinales jejunales	» » »
	» » ileae ...	» » »
	A. ileocolica	» » »
	» colica dextra.....	» » »
	» » media	» » »
	» » sinistra.....	» » inferior

Gegenden.	Anastomosirende Arterien:	abstammend von der
Bauchhöhle.	A. haemorrhoidalis int.	A. mesenterica inferior
	» » med.	» hypogastrica
	» » ext.	» pudenda communis
	A. suprarenalis super. .	» phrenica inferior
	» renalis	» aorta desc. abdomin.
	Aa. lumbares.....	» » » »
Beckenhöhle.	A. spermatica interna..	» » » »
	» » externa..	» epigastrica inferior
	» uterina.....	» hypogastrica
	» haemorrhoid. media	» »
Damm.	Aa. vesicales u. vesicovaginalis.....	» »
	» haemorrhoidal. ext.	» pudenda communis
Geschlechtstheile.	A. scrotalis (labialis) posterior.....	» » »
	» scrot. (labial.) anter.	» femoralis
	» spermatica externa..	» epigastrica inferior
	» » int. (männl.)	» aorta descend. abdominalis
	» deferentialis.....	» vesicalis (hypogastr.)
Äufsere Hüft- und Gefäfsgegend.	Rami posterior. der A. lumbaris IV u. V.	» aorta desc. abdom. u. sacralis media
	Rami posterior. der Aa. sacral. lateral.	» hypogastrica
	A. circumflexa ilium...	» iliaca externa
Oberschenkel.	» glutea	» hypogastrica
	» ischiadica	» »
	» pudenda communis..	» »
	» obturatoria.....	» »
	Aa. circumflexae femoris	» profunda femoris
	A. perforans I.....	» » »
	» » II u. III..	» » »

Gegenden.		Anastomosirende Arterien:	abstammend von der	
Ober-schenkel.	Rete articulare genu	A. artic. genu superfic.	A. femoralis	
		Ramus musculo-articul.	»	»
		Rami musculares	»	poplitea
		Aa. artic. genu superior.	»	»
		» surales	»	»
		» artic. genu inferior.	»	»
		A. recurrens tibialis..	»	tibialis anterior
		Rami musculares	»	» postica
Äufsere Knöchel-gegend.	Rete malleolare externum	A. malleolaris anter. ext.	»	tibialis anterior
		» peronaea anterior...	»	peronaea communis
		» tarsea externa.....	»	dorsalis pedis
		malleolaris poster. ext.	»	tibialis postica
		peronaea posterior....	»	peronaea communis
Innere Knöchel-gegend.	Rete mall. internum	A. malleolaris ant. int.	»	tibialis ant.
		» » post.	»	» post.
		» tarseae internae.....	»	dorsal. pedis
Ferse.	Rete calcan.	Rami calcanei externi..	»	peronaea poster.
		» » interni ..	»	tibialis »
Fufs-rücken.	Arc. dors. pedis	A. tarsea externa	»	dorsalis pedis
		» metatarsea	»	» »
Innerer Fufsrand.		Aa. tarseae internae....	»	dorsalis pedis
		» superfic. pedis int.	»	plantaris interna
Äufserer Fufsrand.		» dorsalis dig. minimi externa	»	dorsalis pedis
		» plantaris dig.min.ext.	»	plantaris externa
Fufs-sohle	Arc. plant. profundus	A. plantaris externa....	»	tibialis postica
		Ram. plant. profund. ...	»	dorsalis pedis
		Rami perforantes poster.	Aa. inteross. dors. II-IV	
		» » » »	plant. II-IV	
		Ramus perforans anter.	»	dorsalis hallucis
		A. interossea plantaris I.	Arcus plantar. profund.	

Varietäten der Schlagadern des Aortensystems.

Bei der Betrachtung der Varietäten der Schlagadern sind vorzüglich folgende allgemeine Verhältnisse zu berücksichtigen.

Benachbarte Arterien, gröfsere und kleinere, können hinsichtlich der Abgabe von Ästen einander vertreten, indem die eine derselben, bei gröfserer Dicke und Länge, in mehrere untergeordnete Arterien, als gewöhnlich, sich spaltet: dagegen der anderen diejenigen Äste fehlen, welche sie normaler Weise abgeben müfste, die aber nun von der ersteren entspringen. Hiernach wird der Ursprung irgend einer untergeordneten Arterie öfters nicht an der gewöhnlichen Stelle, sondern an einem anderen Arterienstamme in der Nachbarschaft gefunden. Öfters ist eine gewisse Schlagader doppelt oder überzählig vorhanden: man findet nämlich eine von ihrem normalen Mutterstamme entspringende, und eine zweite, von demselben oder von einem benachbarten Stamme entsprossene. Dagegen fehlt auch oft eine im Normalzustande selbstständig vorhandene Arterie, indem sie von mehreren kleineren unbenannten Zweigen benachbarter Schlagadern ersetzt wird. Häufig ereignet es sich, dafs von den zwei oder mehreren Arterien, die für ein gewisses Organ bestimmt sind, die eine ungewöhnlich stark entwickelt, die andere dagegen kurz und dünn, verkümmert ist. Diese Verhältnisse finden sowohl bei den Arterien statt, welche paarweise vorhanden, in beiden Körperhälften einander entsprechen: als noch häufiger bei den in einer Körperhälfte nahe neben einander entspringenden und verlaufenden Arterien.

Auch bei normaler Spaltung der Stämme variiren die Ursprünge der untergeordneten Arterien öfters hinsichtlich der Ordnung ihrer Aufeinanderfolge und der Entfernung vom Herzen, in welcher sie vom Stamme abgehen.

Diese Varietäten des Ursprungs ziehen Varietäten der Lage und des Verlaufs nach sich, die oft ganz unbedeutend, öfters aber in Beziehung auf die Chirurgie von gröfster Wichtigkeit sind. Seltner ist der Verlauf einer normal entspringenden Arterie in der Art abweichend, dafs sie auf Umwegen Gegenden oder Organe berührt, in deren Nachbarschaft sie in der Regel nicht angetroffen wird, oder durch

eine Öffnung geht, die normaler Weise nicht für sie bestimmt ist.

Varietäten der A. aorta.

A. An dem Ursprunge der Aorta kommen zuweilen Varietäten vor, durch welche sie mit dem rechten Ventrikel oder der Lungenarterie communicirt, deren Betrachtung aber, da sie eine Vermischung des rothen und schwarzen Blutes veranlassen, durchaus der pathologischen Anatomie anheim fällt.

In seltenen Fällen existirt nur eine A. coronaria cordis, häufiger drei oder mehrere. Die eine der beiden normalen ist zuweilen ungewöhnlich klein. Ursprung aus dem Arcus aortae oder der A. subclavia.

B. Die Aorta adscendens und der Arcus sind in ihrer Bildung und Verlaufe abweichend:

I. Es bildet sich überhaupt kein Arcus, sondern die Aorta theilt sich in einen senkrecht aufsteigenden Stamm, welcher sich kreuzförmig in die Aa. anonyma, carotis sinistra und subclavia sinistra spaltet: und in einen absteigenden Stamm, welcher unter der Spaltungsstelle der Luftröhre in die Brusthöhle herabgeht (sehr selten).

II. Die Aorta spaltet sich sogleich nach dem Ursprunge in zwei nach aufsen gebogene Aa. aortae adscendentes, welche auf jeder Seite die Aa. subclavia, carotis externa und interna abgeben und sich alsdann zur Aorta descendens vereinigen.

III. Der Arcus ist doppelt, zerfällt in einen vorderen und hinteren Bogen, welche die Luft- und Speiseröhre zwischen sich einschliefsen und sich wiederum vereinigen.

IV. Der Arcus läuft nicht vor der Luftröhre und über den Bronchus sinister, sondern schlägt sich sogleich über den Bronchus dexter nach hinten und geht in die, alsdann an der rechten Seite der Wirbelsäule herabsteigende Aorta descendens über, oder er krümmt sich hinter der Luft- und Speiseröhre nach der linken Seite. In diesen Fällen steigen die Aa. carotis sinistra und subclavia sinistra hinter der Speiseröhre aufwärts; zuweilen geht zugleich die A. subclavia dextra, vom Ende des Arcus entstehend, von der Luftröhre nach der rechten Seite hinüber.

C. Der Arcus ist regelmäfsig gebildet und gerichtet,

aber die aus ihm hervorgehenden Äste variiren: es entspringen aus ihm:

I. Zwei Äste, nämlich: 1) eine rechte und eine linke A. anonyma; 2) die A. anonyma giebt auch die linke A. carotis ab, welche hinter dem Manubrium sterni und am Halse bis unterhalb der Schilddrüse, vor der Luftröhre, nach der linken Seite aufsteigt (häufig). 3) A. subclavia dextra und eine linke A. anonyma für beide Carotiden und die linke A. subclavia (selten). 4) A. carotis dextra und eine linke A. anonyma, wobei die A. subclavia dextra aus der A. aorta descendens entspringt und hinter der Luftröhre nach der rechten Seite läuft.

II. Drei Äste, aber in veränderter Ordnung und Bestimmung: 1) A. subclavia dextra, carotis dextra, anonyma sinistra. 2) A. carotis sinistra, subclavia sinistra, anonyma dextra. 3) A. subclavia dextra, kurzer Stamm für beide Carotiden, subclavia sinistra (selten). 4) Stamm für beide Carotiden, A. subclavia sinistra, subclavia dextra, welche hinter der linken A. subclavia und den Carotiden, gewöhnlich auch hinter der Speiseröhre nach der rechten Seite läuft (öfterer; vergl. B. IV. — C. I, 4. — III, 3). 5) Stamm für die A. subclavia dextra und beide Carotiden, A. vertebralis sinistra, subclavia sinistra.

III. Vier Äste:

a) entweder fehlt die A. anonyma und die beiden Aa. subclaviae und carotides entspringen jede für sich in der normalen Aufeinanderfolge, häufiger aber in abnormer Ordnung, nämlich: 1) Aa. carotis dextra, subclavia dextra, die hinter der carotis dextra nach der rechten Seite sich biegt, carotis sinistra, subclavia sinistra. 2) A. carotis sinistra, carotis dextra, subclavia dextra, die mit beiden Carotiden sich kreuzt, indem sie hinter oder zwischen ihnen sich nach rechts wendet, — subclavia sinistra. 3) A. carotis dextra, carotis sinistra, subclavia sinistra, subclavia dextra vom Ende des Arcus entspringend und hinter der Speiseröhre, oder zwischen dieser und der Luftröhre, fast horizontal nach der rechten Seite laufend.

b) oder, aufser den drei normalen Ästen entspringen vom Bogen selbst noch untergeordnete Äste, nämlich: 4) eine A. vertebralis, sehr häufig und zwar fast immer die linke,

gewöhnlich zwischen der linken A. carotis und linken A. subclavia, seltner als letzter Ast des Bogens. 5) eine A. thyreoidea inferior, gewöhnlich die dextra, zwischen A. anonyma und carotis dextra, — seltner die sinistra, zwischen A. carotis sinistra und subclavia sinistra entstehend: sie wird alsdann *A. thyreoidea ima* genannt und steigt senkrecht vor der Luftröhre zur Schilddrüse herauf, während zugleich die aus dem Truncus thyreocervicalis entspringende A. thyreoidea inferior der entsprechenden Seite meistens fehlt oder sehr klein ist. 6) eine A. mammaria interna (sehr selten).

IV. Fünf Äste: 1) die drei normalen und beide Aa. vertebrales, oder die drei normalen Äste, die linke A. vertebralis und die rechte A. thyreoidea inferior oder mammaria interna. 2) die A. anonyma fehlt und aufser den Aa. carotides und subclaviae kommt die linke A. vertebralis oder eine A. thyreoidea ima hinzu.

V. Sechs Äste, nämlich: Aa. subclavia dextra, vertebralis dextra, carotis dextra, carotis sinistra, vertebralis sinistra, subclavia sinistra (selten).

VI. Nicht selten entspringen, bei normaler oder ungewöhnlicher Anordnung der grofsen Äste, aus der vorderen oder der concaven Wand des Bogens kleinere Zweige, Aa. mediastinae, pericardiacae, thymicae, bronchiales anteriores.

D. Die A. aorta descendens thoracica ist in seltenen Fällen an ihrem Anfange oder weiter abwärts beträchtlich verengert oder sogar verschlossen, wobei die Aa. mammariae internae, thoracicae, intercostales, lumbares und epigastricae aufserordentlich erweitert sind und das Blut zur unteren Körperhälfte leiten.

Varietäten der A. anonyma.

Sie ist zuweilen ungewöhnlich kurz: — zuweilen giebt sie bei normaler Länge schon einen der Äste der A. subclavia ab, nämlich die A. vertebralis aus der Theilungsstelle der A. anonyma aufsteigend, oder die A. mammariae interna oder den Truncus thyreocervicalis. Seltner entsteht aus ihr eine überzählige, senkrecht vor der Luftröhre aufsteigende *A. thyreoidea ima*; in welchem Falle die A. thyreoidea inferior aus dem Truncus thyreocervicalis zwar vorhanden, aber

ungewöhnlich klein ist. — Öfters giebt die A. anonyma kleine Aa. mediastinae, tracheales und bronchiales anteriores und Muskelzweige zu den Mm. sternohyoideus und sternothyreoideus.

Varietäten der A. carotis und ihrer Äste.

A. carotis communis. Sowohl der Stamm als die beiden Hauptäste sind zuweilen von sehr ungleicher Dicke. — Der Lauf ungewöhnlich geschlängelt. — Sie spaltet sich schon am unteren Theile des Halses. — Sie spaltet sich erst nahe unter der Basis cranii neben dem Proc. styloideus, so dafs die unteren Äste der A. carotis externa noch von der A. carotis communis entspringen. — Sie spaltet sich nicht in Aa. carotis externa und interna, sondern die Äste der ersteren entspringen büschelförmig nahe beisammen von der A. carotis communis, welche hiernach als A. carotis cerebralis weiter geht.

A. carotis externa. Die Äste von der A. thyreoidea superior bis zur A. occipitalis entspringen in gleicher Höhe unmittelbar über der Theilungsstelle der A. carotis communis. — Die A. thyreoidea superior entspringt von der A. carotis communis, — oder gemeinschaftlich mit der A. lingualis, — ist öfters ungewöhnlich dick und stark oder doppelt, oder sehr klein oder fehlt auf der einen Seite, ersetzt durch die der anderen Seite oder durch die A. thyreoidea inferior. Die A. laryngea superior entsteht aus der A. carotis externa, oder aus der A. lingualis oder einem anderen Aste der ersteren: geht selten durch ein Loch des Schildknorpels. Die A. cricothyreoidea oft aus der A. thyreoidea inferior. — A. pharyngea adscendens zuweilen sehr klein, zuweilen doppelt, — entspringt aus der A. carotis communis, oder aus der Spaltungsstelle derselben, oder aus der A. carotis cerebralis, oder aus der A. thyreoidea superior, occipitalis oder maxillaris externa: — sie fehlt oft als besonderer Stamm und die A. pharyngopalatina kommt aus der A. maxillaris externa, die A. pharyngobasilaris aus der A. carotis externa oder occipitalis. — Die Aa. lingualis und maxillaris externa entspringen häufig vermittelst eines kurzen gemeinschaftlichen Stammes. — Die A. sublingualis kommt

oft von der A. maxillaris externa, neben der A. submentalis oder von dieser selbst. — A. maxillaris externa ist sehr veränderlich, oft sehr klein, nur bis zum Mundwinkel reichend: seltener sehr lang und in beträchtlicher Stärke als A. angularis zum inneren Augenwinkel sich erstreckend. — A. coronaria labii inferioris fehlt auf der einen Seite und wird durch die längere und stärkere der anderen Seite ersetzt. — Aa. coronaria labii superioris und nasalis lateralis entstehen aus der A. transversa faciei oder infraorbitalis. — Der Ramus sternocleidomastoideus entspringt von der A. maxillaris externa. — Die A. occipitalis entspringt oft früher als die A. maxillaris externa, oder aus der A. carotis interna. — A. auricularis posterior, oder nur die A. stylomastoidea, entsteht von der A. occipitalis. — A. transversa faciei ist überhaupt sehr veränderlich, kommt oft von der A. carotis externa selbst; ist oft sehr klein, so dafs sie schon im M. orbicularis palpebrarum endigt: zuweilen sehr stark, wenn die A. maxillaris externa klein ist und giebt alsdann die Aa. coronaria labii superioris und nasalis lateralis. — A. temporalis superficialis oft doppelt. — A. maxillaris interna entspringt sehr selten oberhalb des Arcus zygomaticus. — Aa. auricularis profunda und tympanica von der A. carotis externa oder interna. — A. meningea media entspringt früher als die A. alveolaris inferior — giebt die Aa. temporalis profunda posterior und pterygoideae ab. — A. buccinatoria entsteht gemeinschaftlich mit der A. masseterica oder der A. temporalis profunda anterior oder A. alveolaris superior. — A. Vidiana von der A. sphenopalatina.

A. carotis interna ist seltneren Varietäten unterworfen: fehlt höchst selten auf einer Seite gänzlich: liegt zuweilen sehr nahe an der inneren Seite der A. carotis externa: — giebt Äste der A. carotis externa ab, — am öftersten die A. pharyngea adscendens, occipitalis, lingualis. — Der Stamm der A. ophthalmica variirt selten: — A. lacrymalis ist zuweilen ein Ast der A. meningea media, seltner der A. temporalis profunda anterior, und geht im ersteren Falle durch die Fissura orbitalis superior, im letzteren durch die Fissura orbitalis inferior oder das For. zygomaticum temporale. A. supraorbitalis fehlt, oder ist Ast der A. frontalis, seltner der A. lacrymalis. — A. dorsalis nasi fehlt und wird durch stärkere Entwickelung der A. nasalis lateralis

oder angularis derselben Seite oder der anderen Seite, indem die A. nasalis lateralis über die Nasenwurzel sich krümmt, ersetzt. — Die Vertheilung der A. carotis interna innerhalb der Schädelhöhle ist zuweilen asymmetrisch, so dafs die Aa. fossae Sylvii dextra und sinistra aus der einen, und die Aa. corporis callosi dextra und sinistra aus der anderen A. carotis cerebralis entspringen. Die A. communicans posterior ist oft auf der einen Seite stärker als auf der anderen: fehlt sehr selten. Die A. communicans anterior ist oft doppelt.

Varietäten der A. subclavia und ihrer Äste.

Die rechte A. subclavia entspringt vom Ende des Arcus und geht hinter der Speiseröhre, oder zwischen dieser und der Luftröhre, nach der rechten Seite (s. Var. des Arcus aortae). Die Äste der A. subclavia sind überhaupt hinsichtlich ihres Ursprungs und Vertheilung sehr veränderlich. Die A. vertebralis kommt vom Arcus aortae selbst, oder von der A. anonyma oder der A. carotis communis: selten entsteht sie mit zwei Wurzeln aus der A. subclavia oder aus dieser und dem Arcus aortae, die sich zu einem Stamme vereinigen: sehr selten kommt sogar noch eine dritte Wurzel aus der A. thyreoidea inferior hinzu. Öfters ist sie an der einen Seite dicker als an der anderen. Zuweilen tritt sie erst durch das Foramen transversarium des fünften, vierten, dritten oder zweiten Halswirbels in den Canalis vertebralis ein, höchst selten durch das des siebenten Halswirbels. Die A. spinalis posterior entsteht sehr oft aus der A. cerebelli inferior posterior, die A. auditiva interna aus der A. cerebelli inferior anterior. Auf der einen oder anderen Seite fehlt oft eine A. cerebelli inferior, dagegen die A. cerebelli superior doppelt vorhanden. — Die A. mammaria interna entspringt aus dem Truncus thyreocervicalis, aus dem Arcus aortae, aus der A. anonyma, seltener aus der A. axillaris: — ist doppelt vorhanden: — giebt einen abnormen starken Ast, der an der inneren Fläche der vier obersten Rippen schräg nach aufsen herabsteigt und mit der vierten A. intercostalis anastomosirt. — Einzelne Äste des Truncus thyreocervicalis entspringen oft von der A. subclavia selbst, vorzüglich oft die A. thyreoidea inferior und transversa

scapulae: die Aa. cervicalis superficialis und cervicalis adscendens entstehen sehr häufig vermittelst eines gemeinschaftlichen Stämmchens. Die A. thyreoidea inferior entspringt aufserdem zuweilen vom Arcus aortae, von der A. anonyma oder der A. carotis communis: ist zuweilen doppelt, in welchem Falle die eine als *A. thyreoidea ima* vor oder sehr nahe neben der Luftröhre aufsteigt. Fehlt zuweilen auf einer Seite gänzlich: oder die linke kommt von der rechten A. subclavia und geht vor der Luftröhre nach der linken Seite hinüber. — Die A. transversa scapulae entspringt selten gemeinschaftlich mit der A. mammaria interna: ist oft sehr klein, verliert sich schon hinter dem Schlüsselbein und wird sodann durch den Ramus supraspinatus der A. transversa colli ersetzt. — Die A. transversa colli entspringt selten aus dem Truncus thyreocervicalis, öfterer aus der A. axillaris in der Fossa supraclavicularis: fehlt zuweilen oder ist so kurz, dafs die A. dorsalis scapulae aus der stärker entwickelten A. cervicalis superficialis oder transversa scapulae entsteht. — Die A. cervicalis profunda entspringt zuweilen abgesondert aus der A. subclavia, seltner aus der A. transversa scapulae, A. vertebralis oder dem Truncus thyreocervicalis: giebt zuweilen eine A. vertebralis accessoria ab, welche im Canalis vertebralis oder durch accessorische Foramina transversaria aufsteigt und in den tieferen Halsmuskeln endigt. Ist sie sehr klein, so wird sie durch den Ramus cervicalis posterior der A. transversa colli oder die Rami cervicales der A. occipitalis ersetzt. — Die A. intercostalis suprema kommt zuweilen abgesondert von der A. subclavia: variirt oft hinsichtlich ihrer Stärke, indem sie nur das erste Interstitium intercostale versorgt, oder bis in den dritten und vierten Zwischenrippenraum hinabreicht.

Die *A. axillaris* ist in ihrem Laufe sehr beständig, der Ursprung ihrer Äste aber häufig variirend. Häufig fehlt entweder die A. thoracica suprema oder die A. thoracica longa: erstere wird alsdann durch einen Ast der A. thoracico-acromialis, letztere durch den Ramus thoracicodorsalis der A. subscapularis ersetzt: — zuweilen sind vier bis fünf Aa. thoracicae vorhanden. Die A. thoracico-acromialis und subscapularis variiren selten, letztere insofern, als ihre Hauptäste abgesondert aus der A. axillaris entspringen. —

Die Aa. circumflexae humeri entspringen zuweilen aus einem kurzen dicken Stamme gemeinschaftlich mit der A. circumflexa scapulae: die A. circumflexa humeri anterior zerfällt oft in mehrere kleinere Arterien: die posterior entsteht (selten) aus der A. profunda brachii und läuft alsdann hinter dem Tendo des M. latissimus dorsi aufwärts unter den M. deltoides.

A. brachialis. Die A. profunda brachii entspringt öfters schon hoch in der Achselhöhle aus der A. axillaris, für sich allein oder gemeinschaftlich mit den Aa. subscapularis und circumflexa humeri posterior vermittelst eines dicken Stammes: öfters ist sie von Anfang an in ihre Äste zerfallen, so dafs die Muskeläste, die A. collateralis radialis und A. collateralis media jede für sich aus der A. brachialis entspringen. — Die A. brachialis giebt eine überzählige A. collateralis radialis ab. — Die A. collateralis ulnaris superior kommt von der A. profunda brachii: seltner fehlt sie und wird durch stärkere Entwickelung der, alsdann höher entspringenden A. collateralis ulnaris inferior ersetzt: letztere ist sehr beständig, nur selten klein bei ungewöhnlicher Dicke der A. collateralis ulnaris superior.

Häufig findet eine hohe Spaltung der A. brachialis oder (etwas seltner) der A. axillaris statt, so dafs die A. radialis, seltner die A. ulnaris, am seltensten die A. interossea antibrachii, hoch oben am Oberarm von der A. brachialis, oder schon in der Achselhöhle von der A. axillaris entspringen. Sie kommt meistens an einem Arme, seltner an beiden zugleich vor, und häufiger bei kleinen als bei grofsen Menschen. Bei dieser hohen Spaltung finden sich meistens Vasa aberrantia, nämlich kleinere überzählige Arterien, welche vom Hauptstamm entspringend zu den Muskeln und zu dem abnorm entsprossenen Stamme gehen und oft wieder in den Hauptstamm fliefsen.

Aa. antibrachii et manus. Bei dem regelmäfsigen Ursprunge der Schlagadern des Vorderarms ist die A. radialis zuweilen dicker als die A. ulnaris und giebt alsdann mehrere Muskelzweige als gewöhnlich und die A. recurrens interossea ab. Nicht selten entsteht der Ramus volaris superficialis a. radialis schon in der Mitte des Vorderarms, und läuft alsdann entweder neben dem Stamme zum Handgelenke

herab: oder der Stamm der A. radialis wendet sich sogleich oberflächlich über die Mm. supinator longus und extensores carpi radiales und das Lig. carpi dorsale hinweg zum Handrücken. Im ersteren Falle findet man über dem Handgelenke, da, wo man den Pulsschlag zu untersuchen pflegt, zwei Arterien: im letzteren Falle nur den dünnen, schwach pulsirenden Ramus volaris superficialis der A. radialis. — Die A. ulnaris verläuft zuweilen oberflächlich unmittelbar unter der Fascia oder sogar im Unterhautzellgewebe neben der Vena basilica. — Die A. interossea ist in seltnen Fällen sehr stark und giebt eine überzählige *A. interossea superficialis* ab: diese läuft anfänglich zwischen Mm. flexor digitorum sublimis und profundus, sodann aber, in Begleitung der Sehne des M. palmaris longus über das Lig. carpi volare proprium hinweg und senkt sich entweder in den Arcus volaris sublimis, oder schickt, wenn dieser Bogen sich nicht gebildet hat, geradezu die A. princeps pollicis und die Aa. digitales volares des Zeige- und Mittelfingers ab.

Bei dem hohen Ursprunge der A. radialis läuft sie mit der A. brachialis herab, zuweilen an der inneren Seite der letzteren und am Ellenbogen kreuzend über jene hinweglaufend: wird entweder von der Fascia brachii und antibrachii bedeckt, oder durchbohrt die Fascia schon am Oberarm und läuft über die Aponeurosis m. bicipitis hinweg, unter der Haut mit der Vena cephalica herab. — Ist die A. ulnaris hoch entsprossen, so läuft sie meistens sehr oberflächlich mit der Vena basilica: die A. brachialis spaltet sich alsdann in der Plica cubiti in die A. radialis und interossea communis und steht zuweilen hier mit der A. ulnaris noch durch einen Queerast in Verbindung.

Varietäten der Arterien der Hand sind bei dem normalen und abweichenden Ursprunge und Verlaufe der Arterien des Vorderarms aufserordentlich häufig; bei letzterem finden sie sich jedesmal. Sie beziehen sich vorzüglich auf eine stärkere oder schwächere Entwickelung des Arcus volares, indem zwischen den Arcus volares sublimis und profundus, (so wie zwischen den Endästen der Aa. radialis und ulnaris überhaupt), hinsichtlich ihrer Gröfse und der Anzahl und Stärke der aus ihnen entspringenden Arterien ein umgekehrtes

Verhältnifs Statt findet. Die häufigsten abweichenden Anordnungen sind folgende:

1) Der Arcus volaris sublimis ist sehr stark, dagegen das Ende der A. radialis und der Arcus volaris profundus ungewöhnlich schwach: ersterer giebt fast alle Aa. digitales volares ab: nämlich, aufser der zweiten bis vierten A. digitalis communis, auch die A. volaris digiti minimi ulnaris und die A. princeps pollicis et indicis, wenigstens die Volararterien des Daumens oder einen mit den letzteren sich vereinigenden starken Zweig: dagegen die A. volaris indicis radialis häufiger von der A. interossea volaris prima herstammt. Die starke Ausbildung des Arcus volaris sublimis rührt her: a) von ungewöhnlicher Dicke des Ramus volaris superficialis a. ulnaris, welcher den Arcus zuweilen ganz allein bildet: b) von ungewöhnlicher Stärke des Ramus volaris superficialis a. radialis (beides sehr häufig vorkommende Verhältnisse); c) eine ungewöhnlich lange A. interossea antibrachii interna, oder eine überzählige A. interossea superficialis, senken sich in diesen Arcus ein.

2) Der Arcus volaris sublimis ist ungewöhnlich schwach, der Arcus volaris profundus aber sehr stark: ersterer giebt nur die Aa. digitales communes III und IV ab und alle übrigen kommen aus dem Arcus volaris profundus: — oder er giebt die drei normalen Aa. digitales communes ab, die aber sehr dünn sind und erst durch ungewöhnlich ansehnliche Aa. interosseae volares verstärkt werden. — Gewöhnlich geht in diesem Falle der sehr schwache Ramus volaris superficialis a. radialis nicht in den Arcus volaris sublimis über, sondern verliert sich in den Muskeln des Daumenballens.

3) Es bildet sich kein Arcus volaris sublimis, die Rami volares superficiales der A. ulnaris und radialis (letzterer meistens ungewöhnlich stark) laufen gestreckt oder geschlängelt in die Hand, vereinigen sich entweder gar nicht oder nur durch einen sehr dünnen einfachen oder doppelten Queerzweig, — und spalten sich jeder besonders in Fingerarterien. Der Ramus volaris superficialis a. radialis giebt in diesem Falle gewöhnlich die Aa. digitales volares für den Daumen und Zeigefinger, zuweilen auch für den Mittelfinger ab und wird in seltnen Fällen noch durch das Ende der

A. interossea interna verstärkt: der Ramus volaris superficialis a. ulnaris die der übrigen Finger. Der Arcus volaris profundus ist in diesem Falle meistens vorhanden, aber sehr schwach und nimmt an der Bildung der Fingerarterien wenig Antheil.

Die Aa. digitales volaris und dorsalis für die Radialseite des Zeigefingers entspringen zuweilen mit einem gemeinschaftlichen Stämmchen aus der A. radialis, welches *A. princeps indicis* genannt wird.

Varietäten der Arterien in der Brusthöhle.

Varietäten der Aorta s. S. 739.

Die Aa. bronchiales sind höchst veränderlich in Zahl und Ursprung: einzelne von ihnen oder alle, und zwar an der rechten Seite häufiger als an der linken, kommen von der ersten A. intercostalis posterior oder von der A. mammaria interna, anonyma, subclavia. Selten ist die eine auffserordentlich stark und in diesem Falle als eine abnorme aus der Aorta entspringende A. pulmonalis angesehen worden. — Auch die Aa. oesophageae und mediastinae variiren oft an Anzahl und Stärke. — Die Aa. intercostales posteriores entstehen zuweilen auf jeder Seite mit sechs, sieben, oder neun Stämmen: im ersteren Falle versorgt ein Stamm drei Interstitia intercostalia. Das letzte Paar dieser Arterien entsteht öfters aus einem gemeinschaftlichen unpaaren Stamme.

Varietäten der Arterien in der Bauchhöhle.

Eine oder beide Aa. phrenicae inferiores kommen sehr häufig von der A. coeliaca, seltner von der A. coronaria ventriculi sinistra oder von der A. renalis: selten sind zwei auf jeder Seite vorhanden. — Die A. coeliaca spaltet sich nur in zwei Äste oder fehlt gänzlich, indem ihre drei Äste abgesondert aus der Aorta entspringen. — Die A. coronaria ventriculi sinistra ist oft eben so dick als die A. hepatica und giebt, (aufser einer oder beiden Aa. phrenicae inferiores), den Ramus hepaticus sinister für den linken Leberlappen ab. Seltner entspringt sie, mit einer A. phrenica inferior vereinigt, unmittelbar aus der Aorta. — Die A. hepatica oder nur ihr Ramus hepaticus dexter entsteht von der Aorta selbst oder von der A. mesenterica superior: etwas häufiger kommt von der letzteren die A. gastroduodenalis oder einer

der Äste derselben. Die A. coronaria ventriculi dextra entspringt von der A. gastroduodenalis, oder später als die letztere, oder aus dem Ramus hepaticus sinister. — Die A. lienalis ist zuweilen doppelt: giebt öfters einen Ast an das Colon. — Die A. mesenterica superior bildet einen gemeinschaftlichen Stamm mit der A. coeliaca (selten): die Zahl der Aa. intestinales ist sehr veränderlich: die A. ileocolica und colica dextra bilden sehr häufig einen gemeinschaftlichen Stamm, seltner die A. colica dextra und media. Zuweilen entsteht von der A. mesenterica superior eine überzählige *A. colica sinistra superior.* — Die A. mesenterica inferior fehlt (sehr selten), wobei die Aa. colica sinistra und haemorrhoidalis interna von der A. mesenterica superior stammen: sehr selten fehlt die bogenförmige Anastomose zwischen den Aa. colicae media und sinistra. — Die Aa. renales sind sehr häufigen Varietäten unterworfen, entspringen häufig tiefer als gewöhnlich von der Aorta: sind oft auf einer oder beiden Seiten doppelt, selten drei- bis fünffach vorhanden und alsdann von sehr verschiedener Stärke: die überzähligen entspringen oft vom unteren Ende der Aorta, von der A. mesenterica inferior, iliaca communis, hypogastrica. Sehr selten entspringen die rechte und linke Nierenarterie mit einem gemeinschaftlichen Stamme: oft geben sie die Aa. suprarenales mediae und spermaticae internae, seltner Aa. intestinales, colicae oder lumbares ab. — Die Aa. spermaticae internae entspringen mit einem gemeinschaftlichen kurzen Stamme; sind zuweilen auf einer oder beiden Seiten doppelt vorhanden: nicht selten entsteht die eine beträchtlich höher als die andere: oft kommen sie aus der A. renalis oder aus einer A. suprarenalis, seltner aus der A. hypogastrica (als stärkere Entwickelung der A. deferentialis). — Von den Aa. lumbares kommen drei oder fünf Paare aus der Aorta, die fünfte auch wohl aus der A. iliaca communis: die unteren Paare oft vermittelst eines gemeinschaftlichen Stammes. — Die A. sacralis media ist zuweilen doppelt: häufig sehr klein: entsteht nicht selten aus der A. iliaca communis, vorzüglich aus der linken. — Die Spaltung der Aorta in die Aa. iliacae communes erfolgt zuweilen ungewöhnlich hoch, so dafs die beiden Aa. iliacae communes anfangs neben einander herablaufen, bis sie vor dem vierten

Lendenwirbel divergiren, durch einen Queerast in Verbindung stehen, und mehrere Aa. lumbares und die A. sacralis media, die linke auch die A. mesenterica inferior abgeben. Sehr selten ist die rechte A. iliaca communis kürzer als die linke, indem sie bald nach ihrem Ursprunge, schon in der Höhe des fünften Lendenwirbels, in die Aa. hypogastrica und cruralis sich spaltet.

Varietäten der A. hypogastrica und ihrer Äste.

Sie spaltet sich nicht in einen vorderen und hinteren Hauptast, sondern giebt die einzelnen untergeordneten Arterien von ihrer vorderen und hinteren Wand ab und endigt mit einem gemeinschaftlichen Stamme für die A. ischiadica und pudenda communis. — Die A. ileolumbalis ist zuweilen doppelt, entspringt oft aus der A. iliaca communis, glutea, iliaca externa, lumbaris quarta oder sacralis media. — Die Aa. sacrales laterales sind zu drei oder vier vorhanden: entstehen sämmtlich oder nur die eine und andere von der A. iliaca communis, ileolumbalis, glutea, ischiadica.

Die A. obturatoria ist sehr häufigen Varietäten unterworfen, so dafs wenigstens bei dem dritten Menschen eine unbedeutende oder eine höchst wichtige Verschiedenheit auf der einen oder auf beiden Seiten sich vorfindet:

1) Sie entspringt an der hinteren Beckenwand von der A. iliaca communis, oder vom vorderen Aste der A. hypogastrica, oder gemeinschaftlich mit einem der anderen Äste der A. hypogastrica: hält aber den gewöhnlichen Verlauf.

2) Sie entspringt von der A. iliaca externa oberhalb der A. epigastrica und geht etwas gebogen an der inneren Seite der Vena iliaca externa, nach aufsen und hinten vom Annulus cruralis, zum Foramen obturatum herab.

3) Sie entsteht aus der A. iliaca externa, gemeinschaftlich mit der A. epigastrica vermittelst eines Stämmchens von 2‴ bis 1½″ Länge, oder sehr nahe neben der A. epigastrica. Diese Abweichung kommt wenigstens bei zwei Menschen unter sieben vor, häufiger an beiden Seiten als an einer, im letzteren Falle wahrscheinlich häufiger an der linken als an der rechten, und häufiger bei Weibern als bei Männern. Bei diesem Ursprunge geht die A. obturatoria jedesmal in der Gegend des Annulus cruralis, um die obere und hintere Fläche des Ramus horizontalis oss. pubis

sich biegend, zum Foramen obturatum herab: und zwar gewöhnlich am äufseren Umfange des Annulus cruralis, unmittelbar an der Vena iliaca externa und am Knochen: seltner hält sie den Verlauf der A. pubica und des Ramulus obturatorius derselben (S. 710) und läuft bogenförmig um den vorderen und inneren Umfang des Annulus cruralis auf der oberen Fläche des Lig. Gimbernati (dieser Verlauf ist von Einigen »der Todtenkranz« genannt). Sehr selten ist zugleich eine, regelmäfsig aus der A. hypogastrica entspringende und verlaufende, dünnere A. obturatoria vorhanden, die mit der abnorm entsprungenen am Eingange des Canalis obturatorius anastomosirt.

4) Selten entspringt die A. obturatoria, für sich allein oder gemeinschaftlich mit der A. epigastrica, aus der A. femoralis weit unterhalb des Arcus cruralis und läuft vor dem M. pectineus, an der inneren Seite der Schenkelvene, aufwärts durch den Annulus cruralis und über den Ramus horizontalis oss. pubis zum Foramen obturatum herab. —

Die Aa. glutea und ischiadica, häufiger aber die Aa. ischiadiaca und pudenda communis, bilden einen gemeinschaftlichen Stamm: zuweilen findet sich auch ein solcher für die Aa. umbilicalis, vesicalis inferior, uterina und haemorrhoidalis media: die Aa. vesicalis inferior und haemorrhoidalis media, welche letztere nicht selten fehlt, kommen oft aus der A. pudenda communis, oder auch aus der A. ischiadica oder sacralis lateralis inferior. — Die A. pudenda communis entspringt selten sehr hoch aus einem gemeinschaftlichen Stamme mit den Aa. obturatoria, umbilicalis, vesicales u. a. und theilt sich sogleich in zwei Äste, von welchen der untere den gewöhnlichen Verlauf durch die Incisurae ischiadicae nimmt und die Aa. haemorrhoidales externae und A. perinaei abgiebt: der andere obere aber die A. penis oder clitoridea ist und an der Seite des Mastdarms und der Harnblase, durch die Beckenhöhle von hinten nach vorn läuft, indem er einen stärkeren oder schwächeren, sogar bis zur Seitenfläche der Prostata herabsteigenden Bogen nach unten bildet, und unter der Symphysis pubis auf dem Rücken des Penis hervortritt. Selten entspringt die A. dorsalis penis unterhalb des Arcus cruralis, von der A. femoralis, oder aus einer A. pudenda externa,

oder sogar von der A. profunda femoris; sie läuft alsdann queer über die vordere Fläche des Oberschenkels und durch den Hodensack zum Penis.

Varietäten der A. cruralis und ihrer Äste.

A. iliaca externa. Die A. epigastrica entspringt zuweilen ungewöhnlich hoch, 1″ bis 2″ oberhalb des Arcus cruralis, steigt aber vor der A. iliaca externa bis zum hinteren Rande des Arcus cruralis herab, um sich von hier an nach innen und oben zu wenden. Eben so oft entspringt sie ¼″ bis 1½″ unterhalb des Arcus cruralis, in der Fossa iliopectinea, von der A. femoralis oder seltner von der ungewöhnlich hoch entsprossenen A. profunda femoris, und steigt mehr oder weniger schräg an der inneren Seite der A. femoralis aufwärts, um durch den Annulus cruralis hinter den Arcus cruralis zu treten: giebt alsdann auch gewöhnlich Äste an den M. pectineus, die Inguinaldrüsen und Haut, oder auch eine A. pudenda externa. — Nicht selten bildet sie, bei ihrem Ursprunge sowohl an der normalen als an einer ungewöhnlichen Stelle, ein meistens nur kurzes gemeinschaftliches Stämmchen mit der A. obturatoria, von welcher sie sich an dem äufseren Umfange des Annulus cruralis dergestalt trennt, dafs sie selbst nach innen und oben, die A. obturatoria aber nach hinten und unten sich wendet (S. 751). — Höchst selten entspringt sie in der Beckenhöhle von der normal entsprossenen A. obturatoria und steigt an der inneren Seite der Vasa iliaca externa zur vorderen Bauchwand herauf. — Unter ihren Ästen wird die A. pubica in seltnen Fällen ersetzt durch die mit der A. epigastrica abnorm entspringende und über das Lig. Gimbernati bogenförmig verlaufende A. obturatoria (S. 752): die A. spermatica externa aber durch eine, von den Aa. vesicales stammende stärkere A. deferentialis ersetzt. — Die A. circumflexa ilium entsteht nur selten ungewöhnlich hoch, öfters aber von der A. femoralis, ¼″ bis ¾″ unterhalb des Arcus cruralis in der Fossa iliopectinea, und giebt alsdann, bevor sie den Schenkelbogen erreicht, Zweige an die Mm. psoas major, iliacus internus und sartorius, oft auch die A. epigastrica superficialis ab. Zuweilen ist sie doppelt vorhanden: alsdann verläuft meistens die eine derselben oberflächlicher vor dem Arcus cruralis zum Hüftbeinkamm und wird *A. abdominalis Halleri* genannt.

A. femoralis. In sehr seltnen Fällen endigt die A. femoralis mit Abgabe der Aa. circumflexae und profunda femoris, wobei die A. poplitea eine Fortsetzung der stärkeren A. ischiadica ist und mit dem Nervus ischiadicus an der hinteren Seite des Oberschenkels zur Kniekehle herabläuft. — Die A. epigastrica superficialis doppelt. — Zuweilen finden sich drei bis vier Aa. pudendae externae, die nicht allein zum Hodensacke, sondern auch an der vorderen Bauchwand vor dem vorderen Leistenringe verlaufen. — Die A. profunda femoris entspringt häufig ungewöhnlich hoch und zwar öfterer bei Weibern als bei Männern, auch öfterer bei kleinen als bei grofsen Menschen: selten entsteht sie schon von der A. iliaca externa oberhalb des Arcus cruralis und steigt durch den Annulus cruralis vor der Schenkelvene herab: öfters aber unmittelbar unter dem Schenkelbogen und läuft alsdann gewöhnlich auf dem Boden der Fovea ovalis, an der inneren Seite der A. femoralis und hinter der Vena cruralis, bis sie 2″ unterhalb des Arcus cruralis sich hinter der A. femoralis nach aufsen wendet: bei diesem hohen Ursprunge giebt sie gewöhnlich einige der Rami inguinales oder die Aa. pudendae externae, oder selbst die Aa. epigastrica und obturatoria ab. Selten entspringt sie tiefer als 2″ unterhalb des Schenkelbogens. — Die A. circumflexa femoris interna und externa entspringen häufig aus der A. femoralis selbst und zwar alsdann die erstere gewöhnlich höher, die letztere tiefer als die A. profunda femoris: zuweilen entstehen auch diese drei grofsen Schlagadern, jede abgesondert, in gleicher Höhe aus der A. femoralis. Die Zahl und Stärke der Aa. perforantes ist sehr veränderlich, variirt von einer zu fünf: niemals fehlt die prima.

In seltnen Fällen spaltet sich die A. femoralis nach Abgabe der A. profunda femoris, schon in der Fossa iliopectinea, in zwei Stämme, welche nahe neben einander oder jede in einer besonderen Scheide herablaufen und entweder an der unteren Hälfte des Oberschenkels sich wieder vereinigen (A. femoralis bifida): oder getrennt in die Kniekehle dringen und als A. tibialis anterior und posterior sich fortsetzen.

Die Aa. articulares genu sind ziemlich beständig: selten fehlt die eine oder andere: öfterer finden sich einzelne der-

selben doppelt und alsdann kleiner als gewöhnlich, oder es sind überzählige vorhanden.

Aa. tibiales. Die Spaltung der A. poplitea in die Aa. tibiales findet selten ungewöhnlich hoch in der Kniekehle Statt: in diesem Falle läuft die A. tibialis anterior zuweilen zwischen dem M. popliteus und dem Lig. popliteum herab. — Die Aa. tibiales variiren selten in ihrem Verlaufe, oft aber in ihrer relativen Stärke, so dafs die A. tibialis anterior zuweilen stärker als die A. tibialis postica, oder ungewöhnlich dünn bei sehr ansehnlicher Dicke der letzteren ist. Ist die A. tibialis anterior sehr klein, so endigt sie oberhalb des Malleolus externus durch Zusammenflufs mit einer sehr starken A. peronaea anterior, welche alsdann die Aa. malleolares anteriores abgiebt und zur regelmäfsig verzweigten A. dorsalis pedis wird. Ist dagegen der ganze Stamm der A. tibialis anterior, oder nur die mit einer dicken A. peronaea anterior vereinigte A. dorsalis pedis sehr stark: so versorgt sie nicht allein den Fufsrücken, sondern bildet auch vorzugsweise den Arcus plantaris profundus vermittelst ihres ungewöhnlich dicken Ramus plantaris profundus, oder wenigstens die Aa. interosseae und digitales plantares der ersten und zweiten Zehe; indem zugleich die A. plantaris externa schwächer als gewöhnlich ist. Sehr häufig sind zwei oder drei Aa. metatarseae vorhanden, die zwar mit den Aa. tarsea und plantaris externa anastomosiren, aber keinen regelmäfsigen Arcus dorsalis pedis bilden, sondern einzeln die Aa. interosseae dorsales abgeben. Bei ungewöhnlicher Kleinheit der A. metatarsea entstehen die Aa. interosseae dorsales hauptsächlich aus den Rami perforantes posteriores der Aa. interosseae plantares. — Die A. peronaea communis ist oft so schwach, dafs sie oberhalb des Malleolus externus endigt und dagegen die A. peronaea posterior ein besonderer Ast der A. tibialis postica ist. Seltner fehlt die A. peronaea communis gänzlich, in welchem Falle die A. tibialis postica selbst die aus jener entstehenden Muskeläste, und erst nahe oberhalb des äufseren Knöchels die Aa. peronaea anterior und posterior, jede besonders oder vermittelst eines kurzen gemeinschaftlichen Stammes abgiebt. — Die Aa. plantares externa und interna spalten sich zuweilen um sich wieder zu vereinigen: hinsichtlich ihrer Stärke

stehen sie mit dem Ramus plantaris profundus der A. dorsalis pedis und unter einander im umgekehrten Verhältnisse: ist die A. plantaris interna dicker als gewöhnlich (immer aber schwächer als die A. plantaris externa), so nimmt sie mehr Antheil an der Bildung des Arcus plantaris profundus: oder sie bildet mit Zweigen der A. plantaris externa und des Ramus plantaris profundus der A. dorsalis pedis einen, nur von der Fascia plantaris bedeckten Arcus plantaris superficialis, aus welchem die Arterien der ersten und zweiten Zehe entstehen: oder sie läuft geradezu zwischen die erste und zweite Zehe und spaltet sich in die A. digitalis plantaris externa hallucis und die A. digitalis plantaris interna der zweiten Zehe.

Blutadern des grofsen Kreislaufs, Hohlvenensystem.

Das durch die Schlagadern des Aortensystems zu allen Organen des Körpers geleitete Blut gelangt aus den Capillargefäfsnetzen in die Anfänge der Venen: zarte Äderchen, die durch den Zusammenflufs mehrerer venöser Capillargefäfse entstehen, schon mit unbewaffnetem Auge sichtbar sind und Venenwurzeln genannt werden. Diese fliefsen zu Venen von geringer Stärke zusammen, welche sehr häufig, in oder neben den Organen, aus welchen sie das Blut zurückführen, durch zahlreiche Windungen, Anastomosen, neue Spaltungen und neue Vereinigungen, ein Netz oder Geflecht, *Plexus venosus*, bilden. Aus einfachen Vereinigungen oder aus jenen Plexus gehen alsdann die gröfseren Venen hervor, welche mehr oder weniger genau dem Laufe der, jenen Organen angehörenden Arterien folgen, meistens aber in gröfserer Anzahl als letztere vorhanden sind. Sehr häufig liegen sie genau an den Wänden der Arterien und folgen dem Laufe derselben: alsdann sind in der Regel für jeden Ast einer Arterie und selbst für einen kleineren Arterienstamm, zwei Venen vorhanden, welche durch kurze Queeräste von unbe-

stimmter Anzahl mit einander sich verbinden und endlich zu einem gröfseren Venenstamm, dem Begleiter eines gröfseren Arterienstammes, zusammenfliefsen. In seltneren Fällen nehmen die Venen eines Organs einen von dem der Arterien desselben gänzlich verschiedenen Verlauf: letzteres findet auch namentlich bei den oberflächlichen Venae subcutaneae Statt, die nicht nach dem Verlaufe der Hautäste der Arterien sich richten. — Da wo im Folgenden nur der Name und die Einsenkungsstelle einer Vene angegeben, ihr Ursprung und Verlauf aber nicht näher beschrieben wird: da ist entweder der Name von dem Organe, aus welchem die Vene entspringt, abgeleitet und ihr Lauf zu dem nächsten Hauptstamm, in welchen sie sich einsenkt, bietet nichts Ausgezeichnetes dar: oder die Vene entspricht in ihrem Ursprunge, Vereinigung ihrer Wurzeln, Anastomosen und Verlaufe durchaus der gleichnamigen Arterie.

Das an allen Stellen des Körpers in die Venen aufgenommene Blut gelangt zur Höhle des rechten Vorhofes in drei Abtheilungen:

1) aus der Substanz des Herzens selbst durch die Blutadern des Herzens:

2) aus der oberen Körperhälfte, oberhalb des Zwerchfells, durch die obere Hohlvene, Vena cava superior, und die in diese mittelbar und unmittelbar sich ergiefsenden untergeordneten Blutadern, die indessen auch einiges Blut aus der unteren Körperhälfte empfangen:

3) aus der unteren Körperhälfte, unterhalb des Zwerchfells, durch die untere Hohlvene, Vena cava inferior und die ihr untergeordneten Blutadern.

Blutadern des Herzens, Venae cardiacae s. cordis.

1) *Vena coronaria cordis magna s. sinistra*, grofse linke Kranzbl. des Herzens, ist die ansehnlichste Herzvene, welche die meisten kleineren aufnimmt. Ihr Stamm läuft gekrümmt in der linken oder hinteren Hälfte des Sulcus circularis, zwischen der linken Herzkammer und Vorhof von links nach rechts, erreicht einen Dm. von $4\frac{1}{2}$ bis $5'''$ und mündet in das Atrium dextrum, am hinteren unteren

Umfange desselben, durch die von der Valvula Thebesii halb verschlossene Öffnung (S. 643). Sie entsteht mit vier bis fünf Ästen in den Wänden des linken Ventrikels: unter diesen ist der ansehnlichste der Ramus longitudinalis anterior, welcher an der convexen Fläche des Herzens, von der Spitze an, im Sulcus longitudinalis aufsteigt: kleinere Äste erhält sie aus den Wänden des linken Vorhofs. Unmittelbar vor ihrer Einmündung nimmt sie die Vv. coronaria cordis minor und dextra auf.

2) *V. coronaria cordis minor* s. media s. posterior, kleine Kranzvene des Herzens, $2\frac{1}{3}$‴ dick, beginnt an der Spitze des Herzens, woselbst sie mit dem Ramus longitudinalis anterior der vorigen anastamosirt; läuft an der platten Fläche des Herzens im Sulcus longitudinalis zwischen beiden Ventrikeln aufwärts, nimmt Venen von den hinteren Wänden beider Herzkammern und aus dem Septum ventriculorum auf, und ergiefst sich im Sulcus circularis in die V. coronaria magna, nahe vor der Einmündung der letzteren.

3) *V. coronaria cordis dextra*, rechte Kranzbl. des Herzens, $1\frac{1}{3}$‴ dick, entsteht am unteren rechten Rande des Ventriculus dexter durch Zusammenflufs mehrerer Äste aus den Wänden dieses Ventrikels, krümmt sich in dem rechten Theile des Sulcus circularis, zwischen rechter Herzkammer und Vorhof, nach hinten und links und ergiefst sich in das Ende der V. coronaria magna. Fehlt öfters und wird durch die vorige und die folgende ersetzt.

4) *V. cordis anterior*, vordere Herzbl., eine kleine, aus der vorderen Wand des rechten Ventrikels entstehende Vene, welche aufwärts läuft und den unteren vorderen Rand des Atrium dextrum durchbohrt.

5) *Venae cordis minimi*, kleine Herzvenen aus den Wänden der Vorhöfe, besonders des rechten, und aus dem Septum atriorum, die sich durch die For. Thebesii an vielen Stellen in den rechten Vorhof ergiefsen.

Die Venen des Herzens variiren häufig an Zahl und Stärke. Selten ergiefst sich die V. coronaria magna in die V. anonyma sinistra; zuweilen die V. coronaria minor abgesondert in den rechten Vorhof.

Obere oder absteigende Hohlvene, Vena cava superior s. descendens.

Ein $2\frac{1}{2}$" langer, 10‴ dicker, klappenloser Stamm, welcher von oben nach unten und leicht gekrümmt von vorn und links nach hinten und rechts, in der Brusthöhle herabsteigt. Die untere Strecke der Vena cava superior, welche in der Höhe des 6—7ten Brustwirbels in das Atrium dextrum einmündet, ist in einer Länge von $1\frac{1}{2}$" in der Höhle des Herzbeutels eingeschlossen, dessen seröses Blatt ihre vordere und Seitenwände genau bekleidet; und gränzt hieselbst nach vorn an die Auricula dextra und die Wurzel der A. aorta, links an die A. aorta adscendens, rechts an die rechte Lunge, aber durch die rechte Wand des Herzbeutels von ihr geschieden: hinten an die A. und Venae pulmonales dextrae und den Bronchus dexter, mit welchen sie durch Zellstoff verbunden ist. Ihre obere kürzere Strecke aufserhalb des Herzbeutels liegt in der Höhe des 3—4ten Brustwirbels und des ersten und zweiten Rippenknorpels der rechten Seite, vorn von der Glandula thymus bedeckt, gränzt rechts und hinten an das rechte Blatt des vorderen Mittelfelles und die rechte Lunge, links und hinten an die A. aorta adscendens und A. anonyma. Die hintere Wand dieser oberen Strecke nimmt die Vena azygos auf: das obere Ende oder der Anfang der oberen Hohlvene wird hinter dem ersten Rippenknorpel rechterseits durch den Zusammenflufs der rechten und linken Vena anonyma gebildet.

Varietäten. Sie steigt hinter dem Atrium dextrum herab und fliefst mit der V. cava inferior zusammen. — Sie ist doppelt vorhanden, indem sie die V. anonyma sinistra nicht aufnimmt, sondern diese in gekrümmter Richtung bis zum unteren hinteren Rande des rechten Vorhofs herabsteigt und abgesondert, oder mit der V. coronaria magna cordis vereinigt, einmündet.

Die Vena cava superior nimmt das Blut aus den Venen des Kopfes, Halses, der oberen Extremitäten und der Wände des Brustkastens auf: die erstgenannten haben gröfstentheils die Richtung von oben nach unten; die ansehnlicheren derselben sind klappenlos oder nur an den queer und schräg

laufenden Stellen mit Klappen versehen. Die Venen der oberen Extremitäten und des Brustkastens laufen dagegen theils in der Queerrichtung des Körpers, gröfstentheils aber aufsteigend und besitzen zahlreiche Klappen.

Venae anonymae.

Die 7‴ dicke Vena anonyma s. brachio-cephalica, (auch V. jugularis communis oder V. subclavia genannt), entsteht auf jeder Seite durch den Zusammenflufs der V. jugularis communis, V. subclavia und V. jugularis externa, in der oberen Öffnung des Brustkastens, unmittelbar hinter der Articulatio sternoclavicularis, so dafs ihr Anfang auf dem Lig. rhomboides und dem ersten Rippenknorpel ruhet, vorn von den Ursprüngen der Mm. sternocleidomastoideus, sternohyoideus und sternothyreoideus und von der Fascia cervicalis bedeckt wird, hinten an die A. subclavia gränzt. Von hier an steigt die ½″ bis 1″ lange V. anonyma dextra senkrecht hinter dem ersten Rippenknorpel herab, gränzt rechts an die rechte Lunge, links und hinten an die Theilungsstelle der A. anonyma. Die 2″ bis 2½″ lange V. anonyma sinistra geht fast horizontal, nur wenig schräg nach unten gerichtet oder leicht nach unten gekrümmt, nach der rechten Seite, hinter dem Manubrium sterni und der Glandula thymus, vor den Aa. subclavia sinistra, carotis communis sinistra und anonyma, unmittelbar oberhalb des Arcus aortae. — Die Venae anonymae nehmen aufser den oben genannten Hauptstämmen des Kopfes, Halses und der oberen Extremitäten auch die tieferen Venen des Halses — Vv. vertebrales und thyreoideae inferiores, — die von den Wänden des Brustkastens — Vv. mammariae internae und intercostales supremae, — und die aus dem vorderen Mittelfellraume stammenden Vv. mediastinae anteriores, thymicae, pericardiacae und phrenicae superiores auf.

Blutadern des Kopfes und Halses.

Diese zerfallen hinsichtlich ihrer Lage und Ordnung, nach welcher Venen von verschiedenen Gegenden her zu abgesonderten Stämmen sich vereinigen, in drei Abtheilungen, nämlich: I. Vena jugularis communis und die dieser untergeordneten Venen: ein System von Blutadern, welches

die gröfste Menge des Bluts vom Kopfe zurückführt: II. die oberflächlichen Halsvenen: III. die tiefen Halsvenen, die nicht in die V. jugularis communis sich ergiefsen. Diese drei Abtheilungen stehen durch viele Anastomosen unter einander in Verbindung.

I. Vena jugularis communis.

Die V. jugularis communis s. interna s. cephalica, gemeinschaftliche oder innere Drosselbl., Kopfbl., ein 5‴ dicker, klappenloser, an der Seite des Halses gestreckt herablaufender Venenstamm, entspricht der A. carotis communis und führt den gröfsten Theil des Blutes vom Kopfe, dagegen nur weniges vom Halse zurück. Sie entsteht im Trigonum cervicale, an der hinteren und äufseren Seite der Spaltungsstelle der A. carotis communis, durch den Zusammenflufs der V. jugularis interna und der V. facialis communis: läuft von hier an genau an der äufseren Seite der A. carotis communis herab, indem sie mit dieser gemeinschaftlich in die, von den Blättern der Fascia cervicalis gebildete Scheide eingeschlossen, aber durch eine dünne Scheidewand von der Arterie getrennt ist, und im angefüllten Zustande die letztere nach vorn etwas überragt: — bis sie hinter dem Schlüssel-Brustbeingelenke mit der V. subclavia und jugularis externa zur Bildung der V. anonyma sich vereinigt. Aufser den beiden Stämmen, durch deren Zusammenflufs sie entsteht, nimmt sie gewöhnlich auf: 1) die *V. thyreoidea superior* nebst der V. laryngea superior (die aber oft in die V. facialis communis sich ergiefst); 2) *V. thyreoidea media s. lateralis*, eine oder zwei Venen, die aus dem Seitenlappen der Schilddrüse und aus den Muskeln der Vorderfläche des Halses kommen.

A. *Vena jugularis interna s. cerebralis*, innere Drosselbl., 4‴ dick, ohne Klappen, entspricht der A. carotis interna, welche sie begleitet, und führt fast alles Blut aus der Schädel- und Augenhöhle, auch von der Zunge und dem Schlundkopfe zurück. Sie beginnt in der hinteren Abtheilung des For. jugulare, als unmittelbare Fortsetzung des Sinus transversus der harten Hirnhaut, bildet in der Fossa jugularis eine rundliche Erweiterung, Bulbus venae jugularis; steigt alsdann unmittelbar hinter der A. carotis interna und an der Seitenwand des Pharynx, bis in das Trigonum

cervicale, etwas schräg nach vorn und aufsen herab, indem sie sich allmählig an die äufsere Seite der A. carotis interna wendet und in die V. jugularis communis übergeht: welche letztere daher oft als ihre unmittelbare Fortsetzung angesehen und benannt wird. Sie nimmt folgende Venen auf:

1) *Sinus venosi durae matris*, Blutleiter der harten Hirnhaut, sind grofse Venen in der Schädelhöhle, welche nur von der Tunica intima vasorum gebildet werden, keine Klappen besitzen, und zwischen den Blättern der harten Hirnhaut und zwar gröfstentheils genau an den Schädelwänden liegen: durch welche Anordnung einer stärkeren Ausdehnung derselben begegnet wird. Sie sind theils paarweise zu beiden Seiten vorhanden, theils unpaar in der Mittellinie laufend und von sehr verschiedener Dicke. Die ansehnlichsten derselben fliefsen in einer unregelmäfsig rundlichen Höhle, *Confluens sinuum* s. Torcular Herophili, zusammen, welche vor der Protuberantia occipitalis interna von den Blättern des Tentorium cerebelli und der Processus falciformes durae matris gebildet wird. — 1) *Sinus transversi*, Queerblutleiter, sind die ansehnlichsten, nehmen das Blut aus fast allen übrigen Sinus auf, beginnen im Confluens sinuum, laufen bogenförmig im hinteren Rande des Tentorium cerebelli und in den Sulci transversi der Lineae transversae oss. occipitis nach aufsen und vorn und sind hier von abgerundet dreiseitig prismatischer Gestalt; gehen alsdann in halbcylindrischer Gestalt durch die Fossae sigmoideae der Partes mastoideae der Schläfebeine nach unten und vorn; und winden sich durch die Sulci jugulares der Partes condyloideae des Hinterhauptbeins nach innen in die For. jugularia, woselbst sie ununterbrochen in die Vv. jugulares internae übergehen. Der rechte Sinus transversus ist in der Regel stärker. — 2) *Sinus longitudinalis superior*, oberer Sichelblutleiter, läuft im oberen Rande der Falx cerebri, neben der Crista frontalis interna und im Sulcus longitudinalis des Schädelgewölbes, unter der Sutura sagittalis und der oberen Kreuzlinie des Hinterhauptbeins: sein vorderes, sehr dünnes Ende anastomosirt durch das For. coecum mit den Venen der Nasenhöhle: nach hinten laufend nimmt er beträchtlich an Stärke zu und senkt sich in den Confluens sinuum, indem er sich meistens gegen den Anfang des rechten

Sinus transversus hin wendet. Durch seinen dreiseitigen inneren Raum laufen zahlreiche schräge Fäden der Dura mater, Trabeculae, zwischen denen die Vene sich hindurch windet. — 3) *Sinus longitudinalis inferior*, unterer Sichelblutleiter, enger und kürzer als der vorige, plattrundlich, läuft im unteren Rande der hinteren Hälfte der Falx cerebri und senkt sich in den Sinus rectus. — 4) *Sinus rectus* s. perpendicularis s. quartus s. tentorii, gerader oder Zeltblutleiter, ist kurz und weit: liegt in der Mittellinie des Tentorium cerebelli, zwischen den Blättern desselben und des hinteren Endrandes der Falx cerebri; läuft schräg von oben und vorn nach unten und hinten und ergiefst sich in den Confluens sinuum, meistens gegen den Anfang des linken Sinus transversus hin gerichtet. — 5) *Sinus cavernosi*, Zellblutleiter, liegen zu beiden Seiten der Sella turcica und des Corpus oss. sphenoidei; ihre obere und äufsere Wand wird von dem Theile der Dura mater gebildet, welcher zwischen den Proc. ensiformes und clinoidei anteriores und den Spitzen der Pyramiden der Schläfebeine ausgespannt ist und hinten mit dem Tentorium cerebelli zusammenhängt. Die von den genannten Theilen eingeschlossene Höhle ist von sehr unregelmäfsig eckiger Gestalt, ziemlich weit, und enthält nicht allein die dünnhäutige Vene, sondern auch die A. carotis interna, den Plexus caroticus internus des Gangliensystems, den N. abducens und zahlreiche, theils fibröse, theils zellstoffige, durchkreuzte Fäden, in deren Zwischenräumen die Vene viele zellenartige Erweiterungen bildet. Das nach vorn und aufsen gerichtete verlängerte Ende des Sinus cavernosus unter dem Proc. ensiformis wird *Sinus sphenoparietalis* s. Sinus alae parvae genannt. — 6) *Sinus circularis Ridleyi* besteht aus einer vorderen weiteren und einer hinteren engeren, kurzen, oft doppelten Vene, welche queer durch die Sella turcica, erstere unter und vor, letztere hinter der Glandula pituitaria verlaufen, in die Sinus cavernosi münden, diese mit einander vereinigen und dadurch einen Venenkranz um die Glandula pituitaria bilden. — 7) *Sinus petrosi superiores*, obere Felsenblutleiter, sind eng, laufen auf jeder Seite im äufseren Rande des Tentorium cerebelli und im Sulcus petrosus superior längs des oberen Winkels der Pyramiden der Schläfebeine, von vorn nach hinten und

aufsen; führen aus dem hinteren oberen Theile der Sinus cavernosi in die Sinus transversi, da, wo diese in die Fossae sigmoideae sich herabsenken. — 8) *Sinus petrosi inferiores*, untere Felsenblutleiter, sind weiter und kürzer und laufen unter den vorigen, in der Furche zwischen dem Clivus und den Pyramiden der Schläfebeine: gehen von dem hinteren unteren Theile der Sinus cavernosi zu den unteren Enden der Sinus transversi, in welche sie sich, unmittelbar oberhalb der For. jugularia einsenken. Die Sinus petrosi leiten das Blut aus den Sinus cavernosi in die Sinus transversi. — 9) *Sinus basilares* s. occipitales anteriores, Grundblutleiter, sind sehr kleine Sinus, die auf dem Clivus herablaufen, durch Queerzweige mit einander und mit den Sinus petrosi inferiores und transversi in Verbindung stehen, und am vorderen Umfange des For. magnum occipitale in die Venae spinales longitudinales anteriores (s. Venen der Rückgrathöhle) übergehen. — 10) *Sinus occipitales posteriores*, Hinterhauptblutleiter, (zuweilen nur auf einer Seite vorhanden) steigen vom Confluens sinuum an längs der Crista occipitalis interna und der Falx cerebelli herab und senken sich theils in die Enden der Sinus transversi, nahe an den For. jugularia, theils treten sie in ein ungefähr halbkreisförmiges, aus zahlreichen kleineren Venen bestehendes Geflecht, *Plexus s. sinus circularis foraminis magni*, welches den hinteren Umfang des grofsen Hinterhauptloches und des oberen Endes des Canalis spinalis umgiebt und mit den Venae spinales longitudinales posteriores zusammenhängt.

Einzelne Sinus durae matris sind zuweilen doppelt vorhanden: selten fehlt einer der gröfseren, öfters einer der kleineren. Zuweilen findet sich ein überzähliger *Sinus squamoso-petrosus*, der an der Gränze zwischen der Pars squamosa und der oberen Fläche der Pyramide des Schläfebeins nach hinten verläuft und in den Sinus transversus einmündet.

In die Sinus durae matris ergiefsen sich die Hirnvenen, die Venen der harten Hirnhaut und der Diploë der Schädelknochen, die Venen des inneren Gehörorgans und des Auges.

a) *Venae cerebrales*, Hirnvenen. Ihre Wurzeln entstehen aus den (nicht mit einander zusammenhangenden) Capillargefäfsen der grauen und der Marksubstanz und

vereinigen sich schnell zu gröfseren zahlreichen Venen, welche theils an der Oberfläche, theils in den Höhlen des Hirns verlaufen und daher die Hirnarterien gar nicht, oder nur in kurzen Strecken begleiten. Sie senken sich, indem sie die Dura mater schräg durchbohren, in die Sinus und besitzen gröfstentheils keine Klappen. Man unterscheidet: *Venae cerebrales superiores* von dem gröfsten Theile der Oberfläche des grofsen Gehirns, vereinigen sich auf jeder Seite zu 12 bis 15 Stämmchen, die zwischen den Windungen der oberen, seitlichen und inneren platten Fläche der Hemisphaerae cerebri verlaufen und in die Sinus longitudinales superior und inferior sich ergiefsen: die hinteren oberen Hirnvenen sind ansehnlicher als die vorderen: sie dringen unter sehr spitzigen Winkeln theils in den Sinus longitudinalis superior, theils in die Sinus transversi. — *Venae corporis callosi* gehen theils in den Sinus longitudinalis inferior, theils, die A. corporis callosi begleitend, in die Sinus cavernosi. — *Venae cerebrales laterales et inferiores*, vom unteren Theil der Seitenflächen und von den unteren Flächen der Hemisphaerae cerebri, auch von der Mittelgegend der unteren Fläche des grofsen Gehirns: senken sich in die Sinus cavernosi, circularis Ridleyi und petrosi superiores: viele kleinere dringen aus den Löchern der Laminae cribrosae cerebri und der Substantia perforata media hervor: die ansehnlichste ist die *V. fossae Sylvii*, die in das vordere Ende des Sinus cavernosus oder den Sinus sphenoparietalis sich ergiefst. — *Venae cerebelli superiores* von der oberen Fläche des kleinen Gehirns, laufen theils in 2 bis 3 Stämmchen vereinigt auf dem Vermis nach vorn und dringen in den Sinus rectus, theils senken sie sich in die Sinus transversi. — *Venae cerebelli inferiores* von der unteren Fläche des kleinen Gehirns, auch von dem Pons Varolii und der Medulla oblongata, gehen zu den Sinus petrosi inferiores, transversi und occipitales posteriores. — *Vena cerebralis magna s. Galeni*, eine kurze, dicke, unpaare Vene, die aus der Fissura transversa cerebri (zwischen Splenium corporis callosi und Eminentia quadrigemina) hervortritt und in das vordere Ende des Sinus rectus sich ergiefst: führt das Blut aus dem Inneren des grofsen Gehirns und entsteht durch den Zusammenflufs der rechten und linken *Vena cerebralis*

interna. Diese wird im Foramen Monroi durch die Vereinigung der Vena corporis striati und der Vena choroidea lateralis gebildet: erstere nimmt das Blut aus dem Corpus striatum auf und läuft längs der Stria terminalis (oberen Randes der Taenia semicircularis): letztere steigt aus dem Cornu descendens ventriculi lateralis im Plexus choroideus lateralis herauf, nimmt alle kleineren, sehr gewundenen Venen dieses Plexus, auch Venen des Thalamus opticus auf. Beide anastomosiren mit den Vv. cerebrales inferiores. Alsdann läuft die V. cerebralis interna in der Tela choroidea unter dem Fornix rückwärts und nimmt die Venen des Plexus choroideus medius und kleine Blutadern von der Eminentia quadrigemina auf.

b) *Venae meningeae* s. durae matris, Venen der harten Hirnhaut: die meisten sind eng und kurz und münden in den nächstbenachbarten Sinus: die auf jeder Seite meistens doppelte Vena meningea media ist ansehnlicher, begleitet die gleichnamige Arterie und senkt sich theils in den Sinus cavernosus vermittelst des sog. Sinus sphenoparietalis, oder in den Sinus squamosopetrosus, theils durch das For. spinosum oder ovale in den Plexus maxillaris internus.

c) *Venae diploicae,* sind mäfsig weite, plattgedrückte, nur von sehr zarter innerster Gefäfshaut gebildete Venen, welche in der Diploë der platten Schädelknochen in der Richtung von oben nach unten laufen: mit ihren Enden durchbohren sie gewöhnlich beide, zuweilen nur die eine, Tafel der Schädelknochen und ergiefsen sich nach innen in die Sinus durae matris, oder nach aufsen in äufsere Venen des Kopfes, meistens in beide zugleich. Auf jeder Seite mündet die *V. diploica frontalis* in den Sinus longitudinalis superior und in die V. frontalis: die *V. diploica temporalis anterior* in den Sinus sphenoparietalis und durch ein Loch in der Ala magna oss. sphenoidei in eine V. temporalis profunda: *V. diploica temporalis posterior* durch das For. parietale und For. mastoideum in den Sinus longitudinalis superior, den Sinus transversus und in die Vv. auriculares posteriores: *V. diploica occipitalis* in den Confluens sinuum durch ein Loch in der Protuberantia occipitalis interna, oder in den Sinus transversus oder in eine V. occipitalis. Häufig fehlt eine oder mehrere dieser Venen.

d) *Emissaria Santorini* sind Anastomosen zwischen den Sinus oder Vv. meningeae und den Venen an der äufseren Schädelfläche: meistens werden sie durch die nach innen und aufsen sich öffnenden Mündungen der Vv. diploicae gebildet. Sie sind von verschiedener Weite und Anzahl: die beständigsten und geräumigsten sind das Emissarium parietale, mastoideum und occipitale, von denen erstere durch die gleichnamigen Löcher, letzteres durch das For. condyloideum posterius dringt.

Sowohl einzelne Vv. diploicae als einzelne Emissaria, vorzüglich das Emiss. mastoideum, sind zuweilen von ungewöhnlich beträchtlicher Weite.

e) *Venae auditivae internae*, Venen des inneren Gehörorgans, zwei bis drei kleine Venen, welche aus dem Labyrinthe und vom Boden der Paukenhöhle durch den Meatus auditorius internus und den Aquaeductus vestibuli hervordringen und in den Sinus petrosus inferior oder transversus, nahe über dem Bulbus v. jugularis internae einmünden.

f) *Venae ophthalmicae*, Augenbl. Die ansehnliche *Vena ophthalmica superior s. cerebralis s. interna* entspricht in ihrem Verlaufe im Allgemeinen der A. ophthalmica: communicirt durch ihr vorderes Ende oberhalb des inneren Augenwinkels mit der V. angularis, dem Anfange der V. facialis anterior; läuft von hier an rückwärts durch den M. orbicularis palpebrarum, über dem Lig. palpebrale internum, unter der Trochlea — und an der inneren und oberen Wand der Augenhöhle oberhalb und nach aufsen von der A. ophthalmica; nimmt hier ihren stärksten Ast, Ramus inferior, auf, welcher vom vorderen Theile des Bodens der Augenhöhle unter dem Augapfel emporsteigt: wendet sich sodann über den N. opticus hinweg an dessen äufsere Seite, dringt oberhalb des Kopfes des M. rectus oculi superior durch die Fissura orbitalis superior und senkt sich in den Sinus cavernosus ein, welchen sie daher mit der vorderen Gesichtsvene verbindet. Sie nimmt Venen von den Augenliedern, Thränensack, der Bindehaut, die Vv. ethmoidales, musculares, lacrymalis, ciliares posticae breves (die innere und die obere) et longae und die V. centralis retinae auf. — Die engere und kürzere *V. ophthalmica inferior s. facialis* s. externa hat ungefähr die Gestalt eines Y, läuft in ziemlich queerer

Richtung in der Tiefe der Augenhöhle, hinter dem Augapfel und unter dem N. opticus: senkt sich mit ihrem hinteren Ende durch die Fissura orbitalis superior oder inferior in den Sinus cavernosus; durch ihr inneres oberes Ende, welches unter dem Sehnerven zur inneren Wand der Augenhöhle emporsteigt, communicirt sie mit der V. ophthalmica superior: mit ihrem äufseren unteren Ende (welches häufig besonders stark ist und den Stamm dieser Vene darstellt, nicht selten aber sehr dünn ist) geht sie durch die Fissura orbitalis inferior nach aufsen herab und senkt sich in den Ramus profundus der V. facialis anterior. Nimmt die V. muscularis inferior, die untere und die äufsere V. ciliaris postica brevis, die V. infraorbitalis und Vv. zygomaticae auf, fliefst auch mit dem Ramus inferior der V. ophthalmica cerebralis zusammen: und bildet daher eine ansehnliche Anastomose zwischen der V. ophthalmica superior, dem Sinus cavernosus und der V. facialis anterior. —

Unterhalb des For. jugul. senken sich in die V. jug. int.:

2) *Venae pharyngeae*, Schlundkopfbl., welche ein Geflecht, *Plexus pharyngeus*, an den Wänden des Pharynx bilden, auch Venen von der Tuba Eustachii, von den Muskeln an der Basis cranii und Vv. palatinae aufnehmen und alsdann an der Seitenwand des Schlundkopfs herabsteigen. Nicht selten gehen sie, nebst der V. lingualis, in die V. facialis communis oder V. facialis posterior.

3) *Vena lingualis*, Zungenbl., verläuft von vorn nach hinten und unten: entsteht als Vena ranina an der Spitze der Zunge, und liegt zuerst an der unteren Fläche derselben, sodann oberhalb des M. mylohyoideus, den Ductus Whartonianus eine Strecke begleitend, und an der äufseren Fläche des M. hyoglossus, oberhalb des Cornu majus oss. hyoidei, also überhaupt oberflächlicher als die A. lingualis; nimmt die Vv. sublingualis und dorsales linguae auf; führt das Blut von allen Theilen der Zunge, den Gland. sublingualis und submaxillaris, auch von den Mm. mylo- und geniohyoideus: anastomosirt mit den Vv. pharyngeae und mit Ästen der V. facialis antérior; senkt sich zuweilen in die V. facialis communis oder V. fac. posterior.

B. *Vena facialis communis*, gemeinschaftliche Gesichtsbl., ein kurzer, nur ½ ″ bis 1 ″ langer, 2½ ‴ dicker

Stamm, läuft in schräg nach hinten herabsteigender Richtung im Trigonum cervicale, an der äufseren Seite der A. carotis externa, von dem Platysma myoides und dem oberflächlichen Blatte der Fascia cervicalis bedeckt. Sie entsteht nahe unter dem Angulus maxillae inferioris und dem unteren Rande der Gland. parotis durch den bogenförmigen Zusammenfluſs der ansehnlichen Vv. faciales anterior und posterior, aus welchen sie vorzüglich das, durch die Aa. maxillares externa und interna und die A. temporalis, der vorderen und den Seitenflächen des Gesichts, der Stirn und Schläfe zugeführte Blut empfängt: aufser diesen nimmt sie zuweilen auch noch die *Vv. thyreoidea superior* und *laryngea superior*, oder die Vv. pharyngeae und lingualis auf. Ihr unteres Ende flieſst mit der V. jugularis interna zur Bildung der V. jugularis communis zusammen.

1) *Vena facialis anterior*, vordere Gesichtsbl., läuft in schräger Richtung von der Nasenwurzel an zum Angulus maxillae inferioris, ziemlich oberflächlich durch das Gesicht, hinter der A. maxillaris externa und weniger geschlängelt als diese: wird nur von der Haut und dem Fett, von den Mm. zygomatici, der Fascia parotideo-masseterica und dem M. risorius Santorini bedeckt. Ihr Anfang an der Seite der Nasenwurzel und am inneren Augenwinkel, *V. angularis* genannt, entsteht durch den Zusammenfluſs der doppelten V. frontalis, der V. supraorbitalis, dorsalis nasi und des vorderen Endes der V. ophthalmica cerebralis (S. 767): in ihrem Verlaufe nimmt sie auf die Vv. nasales laterales, superior et inferior, von der äufseren Nase; die Vv. palpebrales inferiores, interna et externa, aus dem Venennetze unter der Haut der Augenlieder; die V. labialis superior von der Oberlippe: — alsdann den *Ramus profundus* v. fac. anterioris s. V. maxillaris interna anterior, welche in der Fossa pterygopalatina durch den Zusammenfluſs der V. ophthalmica facialis und der V. sphenopalatina s. nasalis posterior, auch der V. alveolaris superior und einiger kleinen Vv. temporales profundae zusammengesetzt wird: mit dem Plexus maxillaris internus communicirt und unterhalb des Proc. zygomaticus oss. maxillaris superioris, vom Ursprunge des M. masseter und von den Mm. zygomatici bedeckt, nach vorn und unten sich wendet. — Hiernach erhält die V.

facialis anterior die V. labialis media vom Mundwinkel, einige Vv. buccales, welche mit dem Plexus maxillaris internus zusammenhangen und öfters sehr ansehnlich sind; die V. labialis inferior von der Unterlippe und einige Vv. massetericae und parotideae: endlich unterhalb des Unterkieferwinkels die V. submentalis, welche auch Äste aus der Gland. submaxillaris aufnimmt und mit der V. sublingualis anastomosirt.

2) *Vena facialis posterior* s. temporalis communis, hintere Gesichtsbl., entsteht durch den Zusammenfluſs der Schläfenvenen. Die *V. temporalis superficialis* kommt mit einem vorderen und hinteren Aste vom Scheitel und der Gegend über dem Ohre herab, indem sie durch Anastomosen mit den Vv. frontales und occipitales ein weitmaschiges Netz auf dem Schädelgewölbe bildet, und läuft in der Schläfegegend unmittelbar hinter der A. temporalis superficialis, die Vv. auriculares superiores aufnehmend. Die *V. temporalis media* s. profunda beginnt in der Augenbrauengegend, indem sie mit den Vv. supraorbitalis und frontalis zusammenflieſst, nimmt die Vv. palpebrales superiores auf und anastomosirt am äuſseren Augenwinkel mit der V. palpebralis inferior externa: alsdann läuft sie, von der Fascia temporalis bedeckt, oberhalb des Arcus zygomaticus, in fast horizontaler Richtung nach hinten; nimmt Venen aus dem M. temporalis auf, durchbohrt die Fascia und flieſst mit der schwächeren V. temporalis superficialis, nahe oberhalb der Wurzel des Proc. zygomaticus des Schläfebeins zusammen. — Der hiedurch gebildete Stamm der V. facialis posterior geht hinter dem Ramus maxillae inferioris, an der äuſseren Seite der A. carotis externa, durch die Parotis und vom hinteren Bauche des M. digastricus maxillae inferioris und dem M. stylohyoideus bedeckt herab, um mit der V. facialis anterior sich zu vereinigen; und nimmt auf diesem Wege auf die Vv. articulares und tympanicae vom Kiefergelenk, der Paukenhöhle und dem Paukenfell; Vv. auriculares anteriores und inferiores, stylomastoidea, parotideae; die meistens doppelte V. transversa faciei, von denen die untere den Ductus Stenonianus zu begleiten pflegt; ferner einen über den Proc. mastoideus laufenden Verbindungsast mit der V. jugularis externa: und die meistens doppelte kurze

V. maxillaris interna: diese kommt aus dem zwischen den Mm. temporalis und pterygoidei liegenden *Plexus maxillaris internus* s. pterygoideus, welcher Vv. temporales profundae, pterygoideae, massetericae, meningea media und alveolaris inferior aufnimmt, und mit dem Ramus profundus v. facialis anterioris, mit den tieferen Vv. buccales, den Vv. pharyngeae und mit der V. temporalis media anastomosirt.

Die V. facialis posterior senkt sich zuweilen in die V. jugularis externa, seltner auch die V. facialis anterior: meistens findet jedoch bei dieser Varietät dennoch eine Verbindung zwischen den Vv. faciales und der V. jugularis interna Statt.

II. Oberflächliche Halsvenen.

Sie sind in dem gröfseren Theile ihres Verlaufes an der vorderen und seitlichen Fläche des Halses nur von dem Platysma myoides und dem oberflächlichen Blatte der Fascia cervicalis bedeckt und nehmen das Blut von der Haut und der oberflächlichen Muskellage auf.

1) *Vena jugularis externa* s. jugularis externa posterior, äufsere Drosselbl., entsteht in der Gegend über und hinter dem Ohre durch den Zusammenflufs der Vv. occipitales anteriores und auriculares posteriores und steht unter dem Ohre durch eine einen kurzen starken Ast mit der V. facialis posterior in Verbindung: läuft alsdann, bei einer Stärke von 2‴ bis 2½‴, senkrecht über die äufsere Fläche des M. sternocleidomastoideus herab und nimmt Vv. occipitales posteriores und cervicales superficiales auf. Am unteren Theile des Halses wendet sie sich plötzlich in die Tiefe, unter dem hinteren Rande des Caput claviculare des M. sternocleidomastoideus sich verbergend; nimmt hier die V. superficialis colli inferior, öfters auch die V. transversa colli et scapulae auf: endlich fliefst sie in die V. anonyma, in den Winkel zwischen der Vereinigung der V. jugularis communis und V. subclavia, öfters auch in die eine oder andere dieser beiden Venen.

Zuweilen steigt die V. jugularis externa über das Schlüsselbein hinweg in die Fossa infraclavicularis herab und senkt sich in das obere Ende der V. cephalica.

2) *Vena superficialis colli anterior* s. mediana colli, vordere oberflächliche Halsbl., 1½‴ dick, entsteht am Kinn

als V. mentalis, welche mit den Vv. submentalis und labialis inferior anastomosirt: steigt an der vorderen Fläche des Halses, nahe an der Mittellinie, auf dem vorderen Bauche des M. digastricus maxillae inferioris und auf dem M. sternohyoideus herab: steht mit der V. jugularis externa durch einen Ast in Verbindung, welcher oberflächlich und queer über das Trigonum cervicale hinweg läuft: senkt sich am unteren Theile des Halses in die folgende.

3) *Vena superficialis colli inferior* s. jugularis externa anterior, untere oberflächliche Halsbl., 2‴ dick, verläuft in queerer Richtung nahe oberhalb des oberen Randes des Manubrium sterni vor den Mm. sternohyoidei und sternothyreoidei, nimmt die vorige auf und senkt sich hinter den Köpfen der Mm. sternocleidomastoidei in die rechte und linke V. jugularis externa, oder auch auf der einen Seite in die V. jugularis communis; verbindet dadurch die Vv. jugulares communes und externae beider Seiten mit einander. Hat zuweilen die Form eines Plexus; fehlt zuweilen oder ist sehr klein.

III. Tiefe Halsvenen.

1) *Venae thyreoideae inferiores*, untere Schilddrüsenbl., 2‴ bis 2½‴ dick, liegen am unteren Theile der Vorderfläche des Halses, von den Mm. sternothyreoidei bedeckt, führen Blut von der Schilddrüse, den unteren Hälften des Kehl- und Schlundkopfs, von der Luft- und Speiseröhre zurück. Gewöhnlich findet sich eine rechte und linke, die aus den Seitenlappen der Schilddrüse hervortreten und in die rechte und linke V. anonyma sich einsenken, und eine mittlere unpaare, *V. thyreoidea ima*, welche im Isthmus gland. thyreoideae beginnt, auf der Vorderfläche der Luftröhre herabsteigt und hinter dem Manubrium sterni in die V. anonyma sinistra einmündet, zuweilen auch mit einer der seitlichen sich vereinigt. Eine oder die andere dieser Venen senkt sich öfters in die V. superficialis colli inferior.

2) *Venae vertebrales*, Halswirbelbl. Gewöhnlich finden sich zwei derselben, die *V. vertebralis interna s. profunda*, welche im Canalis vertebralis die A. vertebralis begleitet; und die dickere *V. vertebralis externa s. superficialis* s. cervicalis profunda, welche hinter den Pr. transversi der Halswirbel herabsteigt, der A. cervicalis profunda entsprechend,

von dieser jedoch durch den M. semispinalis colli getrennt. Sie entstehen aus einem Geflecht, *Plexus vertebralis cervicalis*, welches mit zahlreichen Venen die vordere und hintere Fläche der Halswirbelsäule und die Proc. transversi umgiebt: sie nehmen das Blut aus den tieferen Schichten der Hals- und Nackenmuskeln und von der Wirbelsäule auf: die V. vert. externa erhält auch einige tiefere Vv. occipitales, die V. vert. interna dagegen die Ausmündungsäste der Vv. spinales longitudinales anteriores. Die V. vert. interna tritt an der vorderen und äufseren Seite der A. vertebralis aus dem For. transversarium des sechsten Halswirbels hervor; die V. vert. externa wendet sich vor der A. cervicalis profunda unter dem Proc. transversus des siebenten Halswirbels nach vorn: alsdann senken sie sich in die V. anonyma, meistens zu einem einfachen, kurzen, $2\frac{1}{2}$‴ dicken Stamm, *V. vertebralis communis*, vereinigt, der vor der A. subclavia herabsteigt: seltner einzeln, diese Arterie zwischen sich einschliefsend. — Zuweilen bildet sich aus dem vorderen Theile des Plexus vertebralis cervicalis ein besonderes, der A. cervicalis adscendens entsprechendes Stämmchen, V. vertebralis externa anterior.

Blutadern der oberen Extremität.

Vena subclavia, Schlüsselbeinbl., ist der $5\frac{1}{2}$‴ dicke Hauptstamm, welcher alle tiefen und oberflächlichen Venen des Arms und die Venen der Schulter aufnimmt. Sie reicht, als unmittelbare Fortsetzung der V. axillaris, vom oberen Ende der Achselhöhle, vom oberen Rande des M. serratus anterior major an, bis hinter das Schlüssel-Brustbeingelenk, woselbst sie, mit den Vv. jugulares communis und externa zusammenfliefsend, in die V. anonyma übergeht: läuft in beinahe horizontaler Richtung, von aufsen und unten nach innen und vorn etwas aufsteigend, über die erste Rippe, vor und unter der A. subclavia und vor dem Ursprunge des M. scalenus anterior, welcher sie von der Arterie trennt; unter der A. transversa scapulae: bedeckt von der Fascia coracoclavicularis, dem M. subclavius, dem Schlüsselbein, dem oberflächlichen Blatt der Fascia cervicalis und dem Caput claviculare des M. sternocleidomastoideus. Sie nimmt theils mittelbar, theils unmittelbar, folgende Venen auf, die alle reichlich mit Klappen versehen sind.

1) *Venae profundae brachii*, tiefe Armbl., folgen sehr regelmäfsig dem Laufe der Arterien, so dafs für jede der letzteren zwei Venen vorhanden sind, welche genau an den Arterien liegen und nach diesen benannt werden. Sie beginnen in der Hand als sehr kleine *Venae digitales volares* an der Volarfläche der ersten Fingerglieder, bilden in der Mittelhand einen doppelten *Arcus venosus volaris sublimis* und *profundus*, welche die tieferen Venen der Mittelhand aufnehmen und in die *Venae radiales* und *ulnares* übergehen. Diese nehmen *Vv. musculares*, *interosseae* und *recurrentes* auf, anastomosiren an mehreren Stellen mit den oberflächlichen Armvenen, und vereinigen sich in der Plica cubiti zu zwei *Venae brachiales*, *interna* und *externa*, welche genau an der inneren und äufseren Seite der A. brachialis laufen, durch mehrere kurze starke Queeräste mit einander communiciren und die Venen des Oberarms aufnehmen. Die V. brachialis interna ist stärker, $3\frac{1}{2}$''' dick, entsteht vorzüglich aus den Vv. ulnares, interosseae und collaterales ulnares, nimmt oberhalb der Mitte des Oberarms die V. basilica, und bei ihrem Eintritt in die Achselhöhle die *Venae profundae brachii* auf, und erhält hiernach den Namen *Vena axillaris*, Achselbl. Diese einfache, im Mittel $4\frac{1}{2}$''' dicke Vene läuft am inneren und vorderen Umfange der A. axillaris, nimmt in der Mitte der Achselhöhle die V. brachialis externa auf, welche die Muskeläste von der vorderen und äufseren Seite des Oberarms, meistens auch die Vv. collaterales radiales und circumflexae brachii anteriores an sich gezogen hat: sodann nimmt sie die *Vv. circumflexae brachii posteriores*, *subscapulares* und *thoracicae externae*, von welchen die V. thor. longa vorzüglich ansehnlich ist und auch Äste von den Bauchdecken an sich zieht — und an ihrem oberen Ende, nahe unter dem Schlüsselbeine, noch die V. cephalica auf; worauf sie dann als V. subclavia sich fortsetzt.

Zuweilen bleibt die V. axillaris und subclavia, bis zur Einsenkung in die V. anonyma, in zwei Stämme gespalten, durch stärkere Entwickelung der V. brachialis externa, welche dann auch die Vv. circumflexae brachii und transversa scapulae et colli aufnimmt.

2) *Venae superficiales s. subcutaneae brachii*, oberfläch-

liche oder Hautbl. des Arms, liegen in dem gröfseren Theile ihres Verlaufs zwischen der Haut und der Fascia des Arms, nehmen die ansehnlicheren Venen der Hand, die Hautvenen und einige oberflächliche Muskelvenen des Arms auf, anastomosiren auch durch Spalten der Fascia mit den tiefen Venen. Sie beginnen an den Fingerspitzen und dem zweiten Fingergliede aus dem engmaschigen Geflechte der zahlreichen kleinen Fingervenen, Plexus venosi digitales dorsales und volares, welche in mehrere dickere Venen übergehen, die über die Rückenfläche des ersten Fingergliedes zum Rücken der Mittelhand laufen und hier ein grofses weites Netz bilden, *Rete venosum dorsale manus:* in diesem Netze zeichnen sich aus die *V. salvatella* zwischen dem vierten und fünften Mittelhandknochen, und die *V. cephalica pollicis* zwischen dem Mittelhandknochen des Daumens und Zeigefingers. Aus diesem Netze entstehen in der Gegend des Handgelenks die beiden Hauptstämme der oberflächlichen Armvenen:

a) *Vena basilica* s. cutanea ulnaris, 2‴ dick, nimmt, als Fortsetzung der V. salvatella, die Venen von der Ulnarseite des Handrückens und der Hohlhand auf, läuft an der Ulnarseite und der inneren Fläche des Vorderarms herauf, erhält aber auch Venen von der äufseren Fläche desselben: liegt in der Ellenbogengrube unter der Haut und ½‴ vom Condylus internus oss. brachii entfernt: steigt alsdann an der inneren Seite des Oberarms bis unterhalb der Mitte desselben herauf und durchbohrt am inneren Rande des M. biceps die Fascia brachii (S. 249): läuft hiernach noch eine Strecke unter der Fascia (zuweilen bis in die Achselhöhle) aufwärts und senkt sich in die V. brachialis interna.

b) *Vena cephalica* (antibrachii et brachii) s. cutanea radialis, 2‴ dick, Fortsetzung der V. cephalica pollicis, erhält die meisten Hautvenen vom Handrücken und Daumenballen, auch von der Volarseite des Handgelenks; steigt an der Radialseite des Vorderarms hinauf und durch den äufseren Theil der Ellenbogengrube, woselbst sie zwischen dem M. supinator longus und der Aponeurosis m. bicipitis, aber unmittelbar unter der Haut liegt: läuft unter der Haut des Oberarms längs des äufseren Randes des M. biceps aufwärts und durch die Furche zwischen den Mm. deltoides

und pectoralis major bis in die Fossa infraclavicularis: nimmt hier die *V. thoracico-acromialis* auf, durchbohrt die Fascia coraco-clavicularis und senkt sich nahe unter dem Schlüsselbein in das obere Ende der V. axillaris: aufserdem zuweilen noch mit einem Nebenzweige, der hinter der Portio clavicularis des M. pectoralis major queer verläuft, in die V. subclavia.

c) *Vena mediana antibrachii* ist eine kurze, 2½‴ dicke Verbindungsvene zwischen den Vv. cephalica, basilica und den tiefen Venen des Vorderarms. Sie läuft entweder einfach von der V. cephalica zur V. basilica, in schräger Richtung von unten nach oben, unter der Haut der Ellenbogengrube und über die Aponeurosis m. bicipitis hinweg: oder sie bildet aus den Venen in der Mitte der inneren Fläche des Vorderarms einen kleinen Stamm, der unter der Ellenbogengrube gabelförmig in zwei Äste (V. mediana basilica, V. mediana cephalica) sich spaltet, welche in die V. basilica und cephalica sich einsenken. Jedesmal steht sie mit einer V. radialis oder der V. brachialis externa durch einen kurzen weiten Zweig in Verbindung, welcher zwischen M. supinator longus und Aponeurosis m. bicipitis in die Tiefe der Ellenbogengrube dringt: öfters anastomosirt sie auch mit einer V. ulnaris oder interossea. — Ist sie ein einfacher Verbindungszweig und sehr stark, so leitet sie das meiste Blut der V. cephalica in die V. basilica über: in diesem Falle ist die Fortsetzung der V. cephalica am Oberarme ungewöhnlich schwach und geht zuweilen schon am unteren Ende der Achselhöhle in die V. axillaris.

Zuweilen findet sich eine V. subcutanea mediana brachii, welche von der V. mediana in der Ellenbogengrube ausgehend, am Oberarm zwischen V. cephalica und basilica hinaufläuft und in eine derselben sich einsenkt.

3) *Vena transversa colli et scapulae* s. supra-scapularis, 2‴ dick, führt das Blut aus der hinteren und oberen Schulterblattsgegend und von der zweiten und dritten Schicht der Nackenmuskeln zurück; entspricht den Ästen der A. transversa scapulae und A. transversa colli: tritt unter dem M. cucullaris hervor in die Fossa supraclavicularis; liegt hier in queerer Richtung vor der A. transversa colli und über der A. transversa scapulae; und senkt sich in die V.

subclavia, zuweilen in die V. jugularis externa. Zerfällt zuweilen in mehrere kleinere Venen.

Blutadern des Brustkastens und der Mittelfellräume.

1) *Venae mammariae internae*, dextra et sinistra, nehmen auf jeder Seite die Vv. epigastricae superiores und musculophrenicae, phrenicae superiores, intercostales anteriores, Venen von den Brustmuskeln und der Milchdrüse, auch einige Vv. pericardiacae und bronchiales anteriores auf; begleiten als anfangs doppelter, dann einfacher Stamm die A. mammaria interna und senken sich in die rechte und linke V. anonyma.

2) Mehrere Vv. pericardiacae, mediastinae anteriores und bronchiales anteriores gehen in die Vv. anonymae oder in die V. cava superior.

3) *Venae thymicae*, von der Thymus, gehen in die Vv. anonymae, die meisten in die V. anonyma sinistra.

4) *Venae intercostales supremae, dextra* et *sinistra.* Die rechte ist kürzer und enger, nimmt das Blut aus dem ersten bis dritten Interstitium intercostale, selten aus mehreren auf, verläuft vor der gleichnamigen Arterie aufwärts und senkt sich in die rechte V. anonyma, seltner herabsteigend in die V. azygos. Die ansehnlichere linke läuft hinter der A. aorta desc. thoracica an der linken Seite der Körper der Brustwirbel, gewöhnlich vom sechsten bis zum dritten herauf, anastomosirt mit den Vv. azygos und hemiazygos, nimmt die Vv. intercostales posteriores aus den vier bis acht obersten Interstitia intercostalia, einige Venen der Wirbelsäule und Speiseröhre und die V. bronchialis posterior sinistra auf; biegt sich über den Bronchus sinister und ergiefst sich in die V. anonyma sinistra. Öfters (nach Breschet regelmäfsig) nimmt sie den entgegengesetzten Verlauf, entspringt in den obersten Zwischenrippenräumen, läuft an der linken Seite der Wirbelsäule abwärts, krümmt sich vor dem 7ten Brustwirbel nach der rechten Seite und mündet in die V. azygos.

5) *V. azygos* s. azyga s. V. sine pari s. sine comite, unpaarige Blutader, an ihrem oberen Ende $3\frac{1}{2}$‴ dick, beginnt in der Spalte zwischen dem inneren und mittleren Schenkel des Zwerchfells rechterseits, als Fortsetzung der

V. lumbaris adscendens dextra und steht durch diese und durch besondere ansehnliche Communicationszweige zwischen ihr und den Vv. iliaca communis, renalis und cava inferior, mit dem System der unteren Hohlvene in Verbindung, wodurch ein Theil des Bluts der unteren Körperhälfte in die obere Hohlvene gelangen kann. Sie besitzt wenige und nur unvollständige Klappen, dagegen die in sie einmündenden Venen mit solchen versehen sind. Sie steigt an der rechten Seite der Brustwirbelkörper bis zum dritten Brustwirbel herauf, im Cavum mediastini posterioris, vor den Aa. intercostales posteriores dextrae. Sie nimmt von der rechten Seite die Vv. intercostales posteriores des 11ten bis 4ten Interstitium intercostale auf: von der linken Seite anastomosirende Äste der V. intercostalis suprema sinistra, ferner eine bis drei oder mehrere Vv. intercostales posteriores sinistrae, je nachdem die V. intercostalis suprema tiefer hinabreicht oder die V. hemiazygos höher hinaufsteigt: — und weiter abwärts die V. hemiazygos. Die *V. hemiazygos* s. V. azygos sinistra s. minor, entsteht im Zwerchfell als Fortsetzung der V. lumbaris adscendens sinistra, überhaupt ganz wie die V. azygos: steigt aber an der linken Seite der Körper der 4 bis 5 unteren Brustwirbel, im Cavum mediastini posterioris, hinter der A. aorta, vor den Ursprüngen der Aa. intercostales posteriores sinistrae herauf: erhält die 4 bis 5 untersten Vv. intercostales posteriores und einige Vv. oesophageae, anastomosirt oft mit der V. interc. suprema sinistra: krümmt sich alsdann hinter der Aorta, über den 9ten oder 8ten Brustwirbel hinweg, nach der rechten Seite und fliefst mit einem einfachen oder gespaltenen Ende in die V. azygos.

Aufser den Vv. intercostales posteriores empfängt die V. azygos mehrere Vv. oesophageae, mediastinae und pericardiacae posteriores und die V. bronchialis posterior dextra: in der Höhe des dritten Brustwirbels krümmt sie sich über den Bronchus dexter und die A. pulmonalis dextra bogenförmig nach vorn und etwas nach unten; und senkt sich in die hintere Wand der V. cava superior, nahe oberhalb des Eintritts derselben in den Herzbeutel.

Die Stämme der V. azygos und hemiazygos bieten häufige Varietäten dar, indem sie bald höher, bald tiefer ent-

springen und endigen, mehr oder weniger Vv. intercostales aufnehmen und daher länger und dicker, oder kürzer und dünner sind. Wenn die V. hemiazygos schwach entwickelt ist, so steht die V. azygos mit beiden Vv. lumbares adscendentes und renales in Verbindung und pflegt durch den Hiatus aorticus des Zwerchfells, hinter der Aorta, in die Brusthöhle einzudringen. Die V. hemiazygos steigt zuweilen eben so hoch herauf als die V. azygos und ergiefst sich abgesondert in die V. cava superior: diesen Fall bezeichnet man als Doppeltsein der V. azygos. Nicht ganz selten geht die V. azygos oder hemiazygos, oder auch beide, in die V. intercostalis suprema über und ergiefst sich in die V. anonyma ihrer Seite. — Die eine oder andere V. bronchialis hat man ungewöhnlich dick gefunden und irrig für eine abnorme V. pulmonalis angesehen.

Die *Venae intercostales posteriores* entstehen aus Rami intercostales und dorsales. Erstere begleiten die Rami supra- und infracostales der Aa. intercostales posteriores, und führen einen ansehnlichen Theil des Blutes aus den Wänden des Brustkastens und der Bauchhöhle zurück. Letztere sind stärker als die Rami intercostales, entstehen aus dem *Plexus vertebralis dorsalis* s. Vv. dorsi spinales, einem Venengeflecht an der hintern und den Seitenflächen der Brustwirbelsäule, welches die Blutadern der Muskeln und Haut des Rückens, und durch die For. intervertebralia die Seitenäste der Vv. spinales longitudinales aufnimmt; oberwärts mit dem Plexus vertebralis cervicalis zusammenhängt. Die durch Vereinigung der Rami intercostales und dorsales gebildeten einfachen Stämme der Vv. intercostales posteriores laufen, in dem hinteren Theile der Interstitia intercostalia und an der Vorderfläche der Wirbelsäule, oberhalb und vor den Aa. intercostales.

Blutadern der Rückgratshöhle.

Die *Venae spinales*, Rückenmarksbl., bilden ein durch die ganze Länge des Canalis spinalis fortgesetztes Geflecht, welches aufserhalb des von der Dura mater gebildeten Sackes liegt, durch alle For. intervertebralia und sacralia in die Venen an der seitlichen und vorderen Fläche der Wirbelsäule ausmündet, überhaupt mit den Plexus vertebrales und den Venen der Schädelhöhle zusammenhängt,

und daher sowohl dem System der V. cava inferior als dem der V. cava superior, vorzüglich aber dem letzteren angehört.

1) *Venae spinales longitudinales anteriores* s. Sinus columnae vertebralis s. Plexus spinalis anterior, sind die ansehnlichsten Stämme dieses Geflechts: zwei ansehnliche, gewundene, sehr häufig sich spaltende und wieder vereinigende Venen, welche zu beiden Seiten der vorderen Wand des Canalis spinalis, neben den Wurzeln der Arcus vertebrarum verlaufen. Sie liegen genau an den Körpern der Wirbel und werden hinterwärts von den dünneren Rändern des Lig. longitudinale posterius bekleidet, durch dieses Band etwas plattgedrückt und unverschiebbar in ihrer Lage erhalten. Ihre Wände selbst sind sehr dünn; in ihrem Inneren enthalten sie zahlreiche niedrige Falten, aber keine vollständige Klappen. Hinter jedem Fibrocartilago intervertebralis verengern sie sich, bilden dagegen hinter jedem Wirbelkörper eine beträchtliche Erweiterung und stehen an diesen Stellen durch vordere Queeräste mit einander in Verbindung, welche vom Lig. longitudinale anterius völlig verdeckt werden. Nach aufsen gehen ansehnliche Seitenäste durch alle For. intervertebralia und sacralia anteriora, vermittelst welcher sie in die Vv. vertebrales, Rami dorsales der Vv. intercostales und lumbares, und in die Vv. sacrales laterales einmünden. Im For. magnum occipitale anastomosiren sie mit dem Plexus circularis foraminis magni und mit den Sinus basilares, auch mit den Vv. jugulares internae vermittelst eines kleinen, durch das For. condyloideum anterius dringenden Zweiges. Sie nehmen die kleinen Venen des Rückenmarks, *Venulae spinales propriae*, welche durch die für die Nervenwurzeln bestimmten Öffnungen des Sackes der Dura mater hervortreten, — und die Blutadern der Dura mater und der Wände des Canalis spinalis, theils unmittelbar, theils vermittelst der Vv. spinales longitudinales posteriores und basivertebrales auf.

2) *Venae spinales longitudinales posteriores* s. Plexus spinalis posterior, liegen locker zwischen dem Kanale der Dura mater und der hinteren Wand der Rückgratshöhle, erstrecken sich durch den ganzen Canalis spinalis; anastomosiren im For. magnum occipitale mit dem Plexus circularis

foraminis magni und vermittelst zahlreicher, die Ligg. intercruralia durchbohrender Äste mit den Plexus vertebrales cervicalis, dorsalis, lumbaris und sacralis. Im Innern der Rückgratshöhle stehen sie durch hintere Queeräste in netzförmiger Verbindung unter einander und münden durch doppelte vordere Queeräste, welche die Wurzeln der Rükkenmarksnerven zwischen sich fassen, in die Vv. spinales longitudinales anteriores oder deren ausmündende Seitenäste ein.

Durch die Queeräste der vorderen und hinteren Vv. spinales wird in jedem Wirbel ein Blutaderkranz gebildet, die sog. Circelli venosi spinales.

Die *Vv. basivertebrales* sind die, nur aus der innersten Gefäfshaut gebildeten Venen in der Substantia spongiosa der Wirbelkörper. Diese Knochenvenen, welche auch mit den Blutadern auf der vorderen Fläche der Wirbelsäule anastomosiren, bilden im hinteren Theil der Wirbelkörper einen Bogen, welcher auch kleine Venen aus dem Arcus aufnimmt und mit einem oder zwei Stämmchen in die vorderen Queeräste der Vv. spinales longit. anteriores einmündet.

Untere oder aufsteigende Hohlvene, Vena cava inferior s. adscendens.

Die untere Hohlvene entsteht durch den Zusammenfluſs der beiden Vv. iliacae communes, vor dem Fibrocartilago des 4—5ten Bauchwirbels, hinter dem Ursprunge der A. iliaca communis dextra; steigt zuerst vor der rechten Seite der Körper der Lendenwirbel und den Ursprüngen des M. psoas dexter, hinter dem Saccus peritonaei — alsdann vor der Pars lumbaris dextra des Zwerchfells und hinter dem Pancreas, an der hinteren Wand der Bauchhöhle herauf: und liegt in dieser Strecke ihres Verlaufs stets an der rechten Seite der A. aorta descendens abdominalis, anfangs unmittelbar neben dieser, späterhin etwas mehr nach vorn. Hinter dem Pancreas bildet sie eine schwache Krümmung nach der rechten Seite und nach vorn; läuft unmittelbar vor den rechten Schenkeln des Zwerchfells durch die Fossa venae cavae der Leber, an ihrem linken, vorderen und rechten Umfange von dem Lobus Spigelii, dessen Tuberculum

caudatum, und vom rechten Leberlappen genau umschlossen und fest mit ihnen verwachsen: bis sie in das Foramen quadrilaterum diaphragmatis eintritt. Aus diesem gelangt sie in die Brusthöhle und sogleich in das Innere des Herzbeutels, läuft in diesem ½″ lang und leicht gebogen nach oben, vorn und links, wird vorn und auf beiden Seiten von dem serösen Blatte des Herzbeutels bekleidet und tritt in der Höhe des 8—9ten Brustwirbels in den unteren, rechten und hinteren Umfang des Atrium dextrum.

Ihre Länge beträgt im Mittel 9″, ihre Dicke am unteren Ende 10‴, unterhalb der Leber 13‴, im Foramen quadrilaterum und Herzbeutel 15‴. Sie besitzt keine Klappen.

Vermittelst der Vv. iliacae communes empfängt sie das Blut von den unteren Extremitäten und aus der Beckenhöhle: nimmt sodann in der Bauchhöhle die Vv. lumbares transversae, spermaticae internae, renales und suprarenales und phrenicae inferiores auf. Endlich gelangt noch durch die Venae hepaticae das Blut der Chylificationsorgane zur V. cava inferior, nachdem sich dieses zuvor in der Vena portarum angesammelt hatte und von Neuem durch die Leber vertheilt worden.

Varietäten der V. cava inferior. Sie entsteht erst in der Höhe des zweiten Lendenwirbels, indem die rechte V. iliaca communis an der rechten Seite, die linke an der linken und vorderen Seite der Aorta aufsteigen und auch noch die Nierenvenen aufnehmen. Indessen verbinden sich bei dieser Anordnung die Vv. iliacae com. meistens durch einen schwächeren Zweig vor dem 4ten oder 5ten Lendenwirbel. — In seltenen Fällen stieg sie hoch in die Brusthöhle herauf, entweder durch das For. quadrilaterum oder auch durch den Hiatus aorticus; und senkte sich in die V. cava superior, indem sie den Lauf der fehlenden V. azygos nahm und über den Bronchus dexter sich bog, dabei aber meistens vorher nach der linken Seite sich wendete und den Lauf der V. hemiazygos nachahmte: oder in einem Falle sogar bogenförmig über den Bronchus sinister sich krümmte. Bei diesem abweichenden Verlaufe nahm sie nicht die Venae hepaticae, aber die meisten Vv. intercostales auf, obgleich die V. hemiazygos nicht immer fehlte. — Beim Situs

inversus der Baucheingeweide liegt sie an der linken Seite der Aorta.

Venae iliacae communes

s. primitivae, gemeinschaftliche Hüftbl., 7‴ dick, klappenlos, entstehen auf jeder Seite vor dem oberen Ende der Symphysis sacroiliaca und hinter der Stelle der Spaltung der Aa. iliacae communes, durch Vereinigung der V. cruralis (iliaca externa) und V. hypogastrica. Die längere V. iliaca communis sinistra läuft schräg nach innen und oben, an der inneren Seite der gleichnamigen Arterie, vor der A. sacralis media und hinter dem Ursprunge der A. iliaca communis dextra hinweg, und nimmt auch die doppelte V. sacralis media auf, welche aus dem Plexus sacralis anterior entsteht. Die kürzere V. iliaca communis dextra steigt weniger schräg nach oben und innen, änfänglich hinter, sodann an der rechten Seite der A. iliaca communis dextra.

I. Blutadern der unteren Extremität.

Vena cruralis, Schenkelbl., ist der Hauptstamm, begleitet überall genau die A. cruralis und erhält gleich dieser in den verschiedenen Strecken ihres Verlaufs die Namen V. poplitea, femoralis, iliaca externa. — Die 4‴ dicke *Vena poplitea* entsteht am unteren Ende der Kniekehle durch den Zusammenfluſs der Vv. tibiales, läuft durch die Mitte der Kniekehle aufwärts, hinter der A. poplitea und etwas mehr nach aufsen. Als *Vena femoralis*, oberhalb der Spalte im M. adductor magnus und an der inneren Seite des Oberschenkels, liegt sie an der hinteren und äuſseren Seite der A. femoralis; tritt aber in der Fossa iliopectinea hinter dieser hervor an ihre innere Seite, ist in der Vagina vasorum cruralium eingeschlossen, aber durch eine Scheidewand von der Arterie getrennt; und wird in der Fovea ovalis fasciae latae nur theilweise vom Proc. falciformis fasciae latae, übrigens von der Fascia superficialis, Fett und den Gland. lymph. inguinales bedeckt. Ihre Fortsetzung, die 5½‴ dicke *Vena iliaca externa*, welche hinter dem Arcus cruralis zwischen der Arterie und dem Schenkelringe liegt, steigt vom Arcus cruralis an, linkerseits an der inneren und hinteren Wand der A. iliaca externa sinistra herauf; rechterseits geht sie gleichfalls anfangs an der inneren Seite, dann aber hinter der A. iliaca externa dextra hinweg: wonach

beide sich mit den Vv. hypogastricae zur Bildung der Vv. iliacae communes vereinigen. Die V. iliaca externa entbehrt der Klappen; in der V. femoralis und poplitea und den in diese einmündenden Venen, vorzüglich in den oberflächlichen Schenkelvenen, sind die Klappen zahlreich und vollständig entwickelt.

1) *Venae profundae cruris et femoris*, die tiefen Schenkelbl., halten von den ersten Zehengliedern an genau den Verlauf der Arterien: die Vv. plantares, metatarseae und tarseae, einige Vv. calcaneae und malleolares, setzen die doppelten *Vv. tibiales anteriores* und *posticae* und *Vv. peronaeae* zusammen, welche endlich zu den kurzen einfachen Stämmen der Vv. tibiales antica und postica sich vereinigen; aus diesen entsteht die V. poplitea. Die Vv. *gastrocnemicae* und *Vv. articulares genu* fliefsen in die V. poplitea; die V. femoralis erhält zahlreiche Muskelvenen und am unteren Ende der Fossa iliopectinea die von hinten aufsteigende, einfache, ansehnliche *V. profunda femoris*, welche aus den doppelten *Vv. perforantes* und *circumflexae femoris* entsteht. Die V. iliaca externa nimmt die doppelten, zuletzt aber zu einem einfachen kurzen Stämmchen vereinigten *Vv. epigastricae inferiores* und die ebenso sich verhaltenden *Vv. circumflexae ilium* auf, auch eine durch den Canalis inguinalis laufende *V. spermatica externa:* und steht jedesmal (auch bei normalem Ursprunge und Verlaufe der A. obturatoria) durch einen ansehnlichen Ast mit der V. obturatoria in Verbindung, welcher nach aufsen vom Annulus cruralis, über den Ramus horizontalis oss. pubis hinweg, in den Beckeneingang hinabsteigt.

2) *Venae superficiales* s. *subcutaneae*, oberflächliche oder Hautbl. des Schenkels, führen das Blut von den Zehenspitzen, von der Haut, der Fascia und einigen oberflächlichen Muskeln zurück; haben sehr zahlreiche Klappen und verhältnifsmäfsig dicke Wände; anastomosiren mit den tiefen Venen. Sie beginnen an der Rückenfläche der Zehen mit einem Geflecht kleiner Zehenblutadern, welche zu gröfseren zusammenfliefsen und auf dem Rücken des Mittelfufses ein weites Netz von mehr oder weniger bogenförmiger Gestalt bilden, *Rete venosum dorsale pedis:* aus diesem entstehen die beiden Hauptstämme:

a) *Vena saphena parva* s. minor, kleine Rosenader, ″′ dick, läuft auf dem Fufsrücken über dem äufseren Fufsrande bis unter und hinter dem äufseren Knöchel; steigt alsdann an der äufseren Seite des Tendo Achillis und in der Mitte der Wade durch die Furche zwischen beiden Mm. gastrocnemii herauf, von der Fascia superficialis bedeckt: dringt von hinten in die Kniekehle ein und mündet in die V. poplitea. Sie nimmt in diesem Verlaufe oberflächliche Venen vom Fufsrücken, äufseren Fufsrande, von der Fufssohle und Wade auf, anastomosirt mit den Vv. peronaeae, erhält auch in der Kniekehle noch einige von der hinteren Fläche des Oberschenkels herabsteigende Blutadern, die mit den Vv. perforantes und der V. saphena magna anastomosiren.

b) *Vena saphena magna*, grofse Rosenader, an ihrem unteren Ende 2‴, am oberen 3½ ‴ dick, geht von dem inneren Theile des Rete venosum dorsale pedis aus; nimmt auch vorzüglich Venen von der grofsen Zehe, vom inneren Fufsrande und Hautvenen der Fufssohle auf: steigt aufwärts vor dem inneren Knöchel, an der inneren Seite des Unterschenkels, hinter dem Condylus internus oss. femoris, — alsdann an der inneren Fläche des Oberschenkels, in der Richtung des inneren Randes des M. sartorius, von der Fascia superficialis bedeckt — bis zum unteren Rande des Proc. falciformis fasciae latae, oberhalb dessen sie sich in die Fovea ovalis senkt und in die vordere innere Wand der V. femoralis einmündet. Sie erhält die einzelnen oberflächlichen Venen von der inneren Fläche des Unterschenkels, auch von der hinteren Fläche, durch welche sie mit der V. saphena parva anastomosirt: ferner die Hautvenen von der Vorderseite des Unterschenkels und Knies, nachdem diese sich zu einem, vor dem Condylus internus oss. femoris aufsteigenden Nebenstamm vereinigt haben: alsdann die oberflächlichen Blutadern von der inneren, vorderen und äufseren Fläche des Oberschenkels, zum Theil auch von der hinteren Fläche desselben: in der Fovea ovalis nimmt sie noch die *Vv. pudendae externae* (entstehend aus den Vv. scrotales oder labiales anteriores), Vv. epigastricae superficiales und Vv. inguinales auf.

II. Blutadern des Beckens.

Vena hypogastrica s. iliaca interna, Beckenbl., ist der kurze, 4‴ dicke Hauptstamm: sie steigt unmittelbar hinter der A. hypogastrica, vor der Symphysis sacroiliaca und dem M. pyriformis empor, und entsteht durch den Zusammenfluſs zahlreicher Venen, welche im Allgemeinen den Ästen der A. hypogastrica entsprechen, und, so weit sie in der Beckenhöhle verlaufen, keine Klappen besitzen. Die in dem gröſsten Theile ihres Verlaufs doppelten, zuletzt aber einfachen *Vv. gluteae*, *ischiadicae*, *ileolumbales* und *obturatoriae* halten ganz den Verlauf der gleichnamigen Arterien: die Vv. ischiadicae hangen mit den Hautvenen an der hinteren Fläche des Oberschenkels zusammen: der Stamm der V. obturatoria anastomosirt mit der V. iliaca externa (S. 784), senkt sich auch zuweilen ganz in diese oder in die V. epigastrica: jedoch ist diese Varietät selten und existirt nicht immer bei der so häufigen abnormen Anordnung der A. obturatoria. Die *Vv. sacrales laterales* bilden mit den Vv. sacrales mediae den *Plexus sacralis anterior*, welcher die unteren Ausmündungen der Vv. spinales longitudinales anteriores aufnimmt und sich auf jeder Seite theils in die V. hypogastrica, theils in die V. lumbaris adscendens ergieſst. Die Vv. scrotales (labiales) posteriores, transversae perinaei und haemorrhoidales externae, — zu welchen noch im männlichen Geschlecht die Ausmündungen der meisten Vv. cavernosae des Bulbus urethrae, nämlich die kurzen Vv. bulbo-urethrales kommen, — setzen die *V. pudenda communis* zusammen, welche die gleichnamige Arterie begleitet und mit der V. ischiadica zusammenflieſst.

Die sehr zahlreichen Blutadern des Mastdarms, der Blase und eines groſsen Theils der Geschlechtsorgane bilden, durch Verschlingung und netzförmige Vereinigung, ansehnliche, engmaschige, mit einander communicirende Geflechte:

1) *Plexus haemorrhoidalis*, an den Wänden des Mastdarms, hängt unterwärts mit den Vv. haemorrhoidales externae zusammen und mündet theils durch die kurzen *Vv. haemorrhoidales mediae* in die Vv. hypogastricae, theils durch die V. haemorrhoidalis interna in das Pfortadersystem.

2) *Plexus vesicalis* bildet ein mehr weitmaschiges Geflecht an den Wänden der Harnblase, hängt mit dem vorigen

zusammen, nimmt am Blasenhalse den Plexus pudendalis auf und ergiefst sich durch mehrere *Vv. vesicales* in die Vv. hypogastricae.

3) *Plexus pudendalis* befindet sich unter und hinter dem Lig. arcuatum inferius der Symphysis pubis. Im männlichen Geschlecht umgiebt er die Pars membranacea urethrae und die Prostata: empfängt kleinere Venen von diesen Theilen, von den Samenbläschen, Blasenhalse, auch einige von dem Bulbus urethrae: vorzüglich aber die ansehnlichen Vv. profundae und dorsales penis. Die sehr kurzen *Vv. profundae penis* nehmen die meisten Vv. cavernosae aus den Corpora cavernosa penis auf (S. 549), treten an der inneren und oberen Seite der Crura penis hervor und gehen um den unteren Rand des Ramus descendens oss. pubis in den Plexus pudendalis. Die *V. dorsalis mediana penis* s. dorsalis profunda, ein unpaarer, jedoch öfters gespaltener und wiederum vereinigter, $2\frac{1}{2}$‴ dicker, mit Klappen versehener Stamm, entsteht mit zwei Ästen, welche das Collum glandis umkreisen und die Venen der Eichel aufnehmen: läuft alsdann in der Furche mitten auf dem Rücken des Penis, zwischen den beiden Aa. dorsales penis, von der Fascia penis bedeckt, gegen die Wurzel der Ruthe hin; nimmt auf diesem Wege die Venen der mittleren Strecke des Corpus cavernosum urethrae auf, welche an den Seiten des Penis zum Rücken heraufsteigen; auch einen Theil der Vv. cavernosae penis, welche die Tunica albuginea der Corpora cavernosa penis durchbohren; tritt alsdann unter die Aponeurosen der Mm. ischiocavernosi (S. 579) und das Lig. suspensorium penis, durchbohrt das Lig. puboprostaticum medium und theilt sich in zwei Enden, welche oberhalb der Seitenlappen der Prostata in den Plexus pudendalis sich einsenken. — Kleinere Vv. dorsales penis subcutaneae vom Praeputium und der Haut der Ruthe, oberhalb der Fascia verlaufend, senken sich an der Wurzel des Penis theils in die V. dorsalis mediana, vorzüglich jedoch in die Vv. scrotales anteriores.

Im weiblichen Geschlecht empfängt der kleinere Plexus pudendalis die Venen der Clitoris (Vv. profundae und dorsalis mediana, welche das Lig. pubovesicale medium durchbohrt), der Labia minora, der Harnröhre und des Vestibulum, hängt mit dem Plexus vaginalis zusammen.

4) *Plexus vaginalis et uterinus* finden sich nur beim weiblichen Geschlecht. Ersterer besteht aus dem Blutadernetze an den Wänden der Scheide: letzterer liegt an beiden Seiten des Corpus und Collum uteri zwischen den Platten des Lig. uteri latum, nimmt die Venennetze aus der vorderen und hinteren Wand der Gebärmutter und die stärkeren an den Seitenrändern des Uterus herabsteigenden Stämme der Vv. uterinae auf; hängt nach oben mit dem Plexus pampiniformis, unten am Fundus vaginae mit dem Plexus vaginalis zusammen. Seine Venen erweitern sich während der Schwangerschaft sehr beträchtlich. Der Plexus vaginalis und uterinus hangen mit allen anderen Plexus in der Beckenhöhle zusammen, führen aber das in ihnen gesammelte Blut auf jeder Seite vorzüglich durch die kurzen weiten *Vv. uterinae*, welche die Aa. uterinae begleiten, in die Vv. hypogastricae.

Blutadern zum Stamm der V. cava inferior.

1) *Venae renales* s. emulgentes, Nierenbl. Auf jeder Seite treten aus dem Hilus renalis drei bis fünf Blutadern hervor, welche sich vor der Spaltungsstelle der A. renalis zu einem einfachen, $3\frac{1}{2}$‴ bis 4‴ dicken Stamm vereinigen: dieser ergiefst sich unter einem rechten Winkel in die untere Hohlvene. Die linke V. renalis ist länger und läuft in der Regel vor der A. aorta, selten hinter ihr. Gewöhnlich anastomosiren sie mit den Vv. lumbares, azygos und hemiazygos. Zuweilen sind überzählige Nierenvenen vorhanden.

2) *Venae suprarenales*, Nebennierenbl., zwei bis drei auf jeder Seite, ergiefsen sich rechterseits in die V. cava inferior, linkerseits meistens in die linke Nierenvene.

3) *Vena spermaticae internae*, innere Samenbl. Im männlichen Geschlechte, woselbst sie Klappen besitzen, treten ihre Wurzeln, aus dem Corpus Highmori und von der Epidydimis hervorgehend, in den Samenstrang, in welchem sie den Plexus pampiniformis bilden (S. 541), laufen hiernach mit zwei bis drei Stämmchen durch den Canalis inguinalis, alsdann an der hinteren Wand der Bauchhöhle und an der äufseren Seite der A. spermatica interna aufwärts (S. 699); und vereinigen sich meistens zuletzt zu einem einfachen dünnen Stamm, der gewöhnlich rechterseits in die V.

ava inferior, linkerseits in die V. renalis sinistra sich einenkt. — Im weiblichen Geschlecht entstehen sie aus den ierstöcken, von den Eileitern und dem Fundus uteri, bilen im oberen Theile des Lig. uteri latum ein sehr ansehnches Rankengeflecht, Plexus pampiniformis (S. 563), welcher it dem Plexus uterinus zusammenhängt: die aus diesem ervortretenden Stämmchen begleiten die Aa. spermaticae nternae und verhalten sich wie im männlichen Geschlecht, nd aber kürzer und klappenlos.

4) *Venae lumbares.* Die *Vv. lumbares transversae*, vier is fünf auf jeder Seite, verlaufen im Allgemeinen wie die a. lumbares, werden aber nicht allein durch die Vv. lumares adscendentes, sondern noch durch besondere Anastonosen mit einander vereinigt, wodurch um die Bauchwirelsäule der *Plexus vertebralis lumbaris* entsteht, der mit em *Plexus vertebralis dorsalis* und *sacralis* zusammenhängt. ie ergiefsen das von ihnen gesammelte Blut theils in die *V.* cava inferior, theils in die Vv. lumbares adscendentes. Die rechte und linke *V. lumbaris adscendens* entsteht neben em Promontorium aus dem Plexus sacralis und aus Zweien, die mit der V. ileolumbaris oder der V. iliaca communis anastomosiren: steigt sodann vor den Wurzeln der Proc. ransversi der Lendenwirbel, neben den For. intervertebraia, vom M. psoas major bedeckt, aufwärts, nimmt die ausmündenden Äste der Vv. spinales longitudinales anteriores uf, anastomosirt mit allen Vv. lumbares transversae und meistens auch mit der V. renalis, tritt zwischen den äufseen und mittleren Schenkel des Zwerchfells, und setzt sich echterseits als V. azygos, linkerseits als V. hemiazygos fort S. 777).

5) *Vv. phrenicae inferiores* folgen dem Verlaufe der leichnamigen Arterien; die rechte senkt sich zuweilen in ine V. hepatica.

Blutadern der Chylificationsorgane.

Sie haben überhaupt einen kurzen, zum Theil dem der Arterien nicht entsprechenden Verlauf, sind aber von berächtlicher Weite und besitzen keine Klappen.

I. Pfortadersystem, Systema venae portarum.

Die *Vena portarum* s. portae, Pfortader, entsteht

hinter der Pars transversa superior duodeni durch den Zusammenfluſs der Venen des Magens und Darmkanals, der Milz und Bauchspeicheldrüse, deren Wurzeln und untergeordnete Stämmchen im Allgemeinen mit den Verästelungen der Arterien dieser Theile gleichen Verlauf halten, zwischen den Blättern der Gekröse und Netze zahlreiche bogenförmige Anastomosen bilden und drei gröſsere Stämme zusammensetzen:

1) *Vena coronaria ventriculi superior* s. dextra, obere Magenbl., $2\frac{1}{2}$‴ dick, läuft von links nach rechts, an der Curvatura minor des Magens und hinter der Pars transversa superior duodeni, nimmt die Venen von der Cardia, von dem oberen Theile der Magenwände, vom Pylorus und vom oberen Queerstück des Zwölffingerdarms auf.

2) *V. mesenterica* s. mesaraica, Gekrösbl., 5‴ dick, läuft in der Radix mesenterii, die A. mesenterica superior an ihrer rechten und vorderen Seite begleitend; beginnt als V. ileocolica und nimmt die V. intestinales ileae und jejunales, die Vv. colica dextra und colica media auf. Indem sie hinter dem Caput pancreatis aufsteigt, erhält sie die V. mesenterica minor, einige Vv. pancreaticae und duodenales und die V. gastroepiploica dextra s. coronaria ventriculi inferior, die zuweilen mit der V. colica media zu einem gemeinschaftlichen Stamm, V. gastrocolica, zusammenfliefst.

Die *V. mesenterica minor* s. inferior, $2\frac{3}{4}$‴ dick, entsteht durch den Zusammenfluſs der V. haemorrhoidalis interna s. superior, welche das Blut von der oberen Hälfte des Mastdarms führt und mit dem Plexus haemorrhoidalis zusammenhängt (S. 786) und der V. colica sinistra: — begleitet aber nicht die A. mesenterica inferior, sondern läuft im Mesocolon descendens aufwärts, bis unter oder hinter das Pancreas, biegt sich dann nach der rechten Seite zur V. mesenterica, oder geht öfters geradezu in die V. lienalis.

3) *V. lienalis* s. *splenica*, Milzbl., $4\frac{1}{2}$‴ dick, entsteht durch die Vereinigung der vier bis sechs aus dem Hilus der Milz hervortretenden Venen, nimmt sogleich die ansehnlichen Vv. gastricae breves vom Fundus ventriculi und die V. gastroepiploica sinistra, häufig auch die V. mesenterica minor auf. Ihr Stamm verläuft in queerer Richtung von

links nach rechts, hinter dem oberen Rande des Pancreas, unter und vor der A. lienalis und nimmt noch einige Vv. pancreaticae, und zuweilen die V. coronaria superior ventriculi auf.

Die kleinen Venen des Saccus peritonaei, welche an der äufseren Fläche desselben ein weitmaschiges Netz bilden, münden zum Theil in die vorbenannten Venen, vorzüglich in die Vv. colicae ein: zum Theil aber in die Blutadern an den Wänden der Bauchhöhle und in die der Organe in der Beckenhöhle: nämlich in die Vv. lumbares, epigastricae, Plexus haemorrhoidalis, vesicalis und uterinus, welche dem System der unteren Hohlvene angehören.

Der Stamm der *Vena portarum*, $2\frac{1}{2}$ ″ lang und 7‴ dick, läuft zwischen den Platten des Lig. hepatoduodenale aufwärts und nach der rechten Seite hin (in fortgesetzter Richtung der Gekrösvene), vor der V. cava inferior, hinter der A. hepatica und den Gallenausführungsgängen und mit diesen in die sog. Capsula Glissonii eingehüllt: erhält noch einige kleine Venen von diesen Gängen und von der Gallenblase. Alsdann tritt er in die Fossa transversa hepatis und theilt sich in den Ramus dexter und sinister: ersterer ist kurz und dicker, dringt, in mehrere untergeordnete Äste gespalten, geradezu in den Lobus dexter und quadratus; letzterer läuft eine kurze Strecke horizontal nach der linken Seite und senkt sich mit einzelnen Zweigen in den Lobus sinister und Lobus Spigelii. Die schwach erweiterte Spaltungsstelle der unter einem rechten Winkel divergirenden Hauptäste bildet den sog. Sinus venae portarum, welcher die Fossa transversa gröfstentheils ausfüllt. Die einzelnen Zweige der Pfortader verästeln sich baumförmig in der Lebersubstanz als Venulae interlobulares (S. 512).

In höchst seltenen Fällen geht die V. portarum nicht in die Leber, sondern geradezu in die untere Hohlvene: dann ist die Leberarterie ungewöhnlich stark. — Sehr selten fand sich eine ansehnliche Communication des Hohlvenensystems mit der Pfortader durch eine abnorme dicke Vene, welche von der V. iliaca externa aus, hinter der Linea alba bis zum Nabel und von da im Lig. suspensorium hepatis zur Queergrube der Leber lief und in den Sinus venae portarum sich einsenkte.

II. Venae hepaticae, Leberbl. Sie entspringen hauptsächlich in den Läppchen der Leber als Venulae centrales lobulorum (S. 512). Zum geringeren Theile sind ihre Wurzeln unmittelbare, $^1/_8$‴ bis $^1/_2$‴ dicke Fortsetzungen der Verästelungen der V. portarum selbst: sie sammeln sich in acht bis zehn kleinere und endlich in zwei bis drei, sehr ansehnliche, kurze, 6‴ bis 8‴ dicke Stämme, welche in der Fossa venae cavae und am stumpfen Rande der Leber aus der Lebersubstanz hervortreten und in die untere Hohlvene, unmittelbar unter dem Foramen quadrilaterum, sich einsenken. Sie führen die ganze, durch die A. hepatica und V. portarum in die Leber geführte Blutmasse zurück, nachdem aus ihr die Galle bereitet worden.

Wenn die V. cava superior, den Lauf der V. azygos nachahmend und diese vertretend, hoch in die Brusthöhle aufsteigt (S. 782), so gehen die Lebervenen, zu einem kurzen Stamm vereinigt, abgesondert durch das For. quadrilaterum und in das rechte Atrium.

Gefäfse des Lungenkreislaufs, Vasa pulmonalia.

Sie haben einen bei Weitem kürzeren Verlauf als die Gefäfse des Körperkreislaufs; bilden keine langgestreckte und geschlängelte Stämme; die gröfseren Arterien spalten sich schnell in kleinere und gleichmäfsig fliefsen die kleineren Venen nach kurzem Laufe zu gröfseren zusammen, ohne nach Art der Plexus sich zu vereinigen: die Spaltung der Arterien und die Vereinigung der Venen geschieht sehr regelmäfsig dichotomisch. Die Wände der Arterien sind dünner und schlaffer, die der Venen etwas dicker als die Wände der Körperarterien und der meisten Körpervenen (z. B. die Wände der A. aorta adscendens $^7/_{10}$‴, die der A. pulmonalis $^1/_2$‴ dick). Die Lungenvenen besitzen keine gröfsere Capacität als die Lungenarterien: erstere sind auch nicht, wie die Körpervenen, mit Klappen versehen, sondern nur mit sehr schmalen, halbmondförmigen Falten der Tunica

intima an dem inneren Winkel der Vereinigung zweier Venen. Die Lungenarterien führen schwarzes (venöses) Blut aus dem rechten Herzen in die Lungen, welches, nachdem es in dem Capillargefäfsnetze an den Wänden der Lungenbläschen in rothes (arterielles) umgewandelt worden, von den Lungenvenen zum linken Herzen zurückgeleitet wird (S. 474).

Arteria pulmonalis communis

s. Vena arteriosa, gemeinschaftliche Lungenschl., ist der unpaare Hauptstamm, welcher sich in einen rechten und linken Hauptast für jede der beiden Lungen spaltet: 2″ lang, 12½‴ dick; hält jedoch zuweilen 13‴ bis 14‴ im Dm. und ist in diesem Falle dicker, hingegen selten dünner als die A. aorta adscendens. Aus dem Ostium arteriosum des Ventriculus dexter hervorgehend, liegt ihr Anfang von allen grofsen Gefäfsen an der Basis des Herzens am meisten nach vorn, vor dem Anfange der A. aorta adscendens, zwischen den Spitzen beider Auriculae: von hier an steigt sie nach hinten gekrümmt aufwärts an der linken Seite der Aorta adscendens, zwischen dieser und der linken Lunge, hinten an den Sinus des linken Vorhofs und an die Spaltungsstelle der Luftröhre gränzend: ist fast in ihrer ganzen Länge in den Sack des Herzbeutels eingeschlossen und von dem serösen Blatte desselben mit der Aorta adscendens gemeinschaftlich überzogen; hingegen da, wo sie die vordere und die linke Wand der Aorta berührt, durch kurzen Zellstoff fest mit ihr verwachsen. Ihr Ende liegt, in der Höhe des dritten Brustwirbels, weiter nach hinten als das Ende der aufsteigenden Aorta und unter dem Arcus aortae: hier spaltet sie sich in die, unter einem beinahe rechten Winkel divergirenden Hauptäste, die rechte und linke Lungenarterie: während von der Spaltungsstelle selbst ein plattrundlicher, 4‴ langer, elastisch-zellulöser Strang schräg nach links emporsteigt: er geht zur concaven Seite des Arcus aortae, zum Ende des Arcus und Anfang der Aorta descendens, dem Ursprunge der A. subclavia sinistra beinahe gegenüber, jedoch etwas mehr nach links, und verschmilzt mit den Häuten der Aorta: dieser Strang ist der Rest des, im

Foetus offenen, Ductus arteriosus Botalli und wird *Chorda ductus arteriosi* s. Lig. arteriosum genannt.

A. pulmonalis dextra s. Ramus dexter a. pulmonalis, die rechte Lungenschl., ist etwas länger und weiter als die linke, $9\frac{1}{2}$ ‴ dick; läuft horizontal unter dem Arcus aortae und hinter der A. aorta adscendens und V. cava superior, vor dem Bronchus dexter, zur Wurzel der rechten Lunge; und spaltet sich in einen unteren kleineren und oberen dickeren Ast, welcher letztere den Hauptast für den mittleren Lappen abgiebt: gewöhnlich spalten sich diese Äste noch einmal, bevor sie von der Lungensubstanz umgeben und verborgen werden. — Die kürzere *A. pulmonalis sinistra* s. Ramus sinister a. pulmonalis, linke Lungenschl., $8\frac{1}{2}$ ‴ dick, ist an ihrer unteren Wand noch von dem serösen Blatt des Herzbeutels bekleidet: sie geht vor der A. aorta descendens und dem Bronchus sinister zur Wurzel der linken Lunge und dringt in diese mit einem schwächeren oberen und stärkeren unteren Hauptaste ein. — Die gröfseren Äste der Aa. pulmonales verlaufen auch innerhalb der Lunge meistens an der oberen und vorderen Seite der gröfseren Luftgefäfse.

Venae pulmonales.

Die Lungenblutadern bilden vier Stämme, auf jeder Seite einen oberen und unteren, welche in den Wurzeln der Lungen durch den Zusammenfluſs ansehnlicher, im Allgemeinen unter den gröfseren Bronchia laufender Äste entstehen. Indem sie aus der Lunge hervortreten, gelangen sie sogleich in den Herzbeutel, laufen innerhalb desselben in queerer Richtung, weiter nach hinten als die anderen grofsen Gefäfsstämme an der Basis des Herzens, und senken sich in den Sinus des linken Vorhofs ein (S. 645): sie haben eine Länge von nur ungefähr $\frac{1}{2}$ ″ und werden im Herzbeutel von dem serösen Blatte desselben umhüllt. Die 7‴ dicke *V. pulmonalis dextra superior*, welche auch die $4\frac{1}{2}$ ‴ dicke *V. pulmonalis dextra media* aus dem mittleren Lappen der rechten Lunge aufnimmt, läuft vor und unter der A. pulmonalis dextra und dem Bronchus dexter: die $6\frac{1}{3}$ ‴ dicke *V. pulmonalis dextra inferior* hinter der Arterie und dem Bronchus; beide laufen im Herzbeutel hinter dem Ende

der V. cava superior und dem Sinus des Atrium dextrum und ergiefsen sich nahe neben einander in den rechten Theil des hinteren oberen Umfanges des Atrium sinistrum. Die $5^3/_4$ ‴ dicke *V. pulmonalis sinistra superior* läuft unter und hinter der A. pulmonalis sinistra und vor dem Bronchus sinister, die $6^1/_5$ ‴ dicke *V. pulmonalis sinistra inferior* hinter und etwas unterhalb der vorigen und des Bronchus: beide dringen durch den linken Theil der hinteren oberen Wand des linken Vorhofs, ungefähr 1 ″ von der Einsenkungsstelle der rechten Lungenvenen entfernt. —

Varietäten der Lungenarterien sind bei Erwachsenen sehr selten und meistens nur bei grofsen Bildungsfehlern des Herzens und der Hauptstämme vorhanden: bei ziemlich regelmäfsiger Anordnung fand man sie zuweilen doppelt — mit der Aorta oder einem ihrer Äste anastomosirend — einen oder anderen Ast der Aorta abgebend. Ziemlich häufig fliefsen die Lungenvenen der einen Seite zu einem sehr kurzen, 9 ‴ dicken, gemeinschaftlichen Stamme, einer V. pulmonalis communis, zusammen und zwar häufiger die linken als die rechten. Seltener sind auf einer Seite drei abgesonderte Lungenvenenstämme vorhanden, meistens auf der rechten Seite, indem die V. pulm. dextra media sich abgesondert in den linken Vorhof ergiefst.

Lymphgefäfssystem, Systema vasorum lymphaticorum.

Die *Lymphgefäfse* oder *Saugadern*, *Vasa lymphatica* s. *absorbentia* s. Venae absorbentes, laufen von allen Stellen ihrer blind geschlossenen oder netzförmigen Ursprünge in der Richtung gegen das Herz hin, an einigen Stellen mehr gestreckt, an anderen gewunden und leicht geschlängelt, überall vielfach anastomosirend und zu Stämmchen von sehr geringem Durchmesser sich vereinigend: und treten in diesem Laufe sämmtlich durch eine oder mehrere Lymphdrüsen. Endlich senken sie sich in der Nähe des Herzens in das Hohlvenensystem, indem sie einen linken längeren und

dickeren und einen rechten kürzeren, oft doppelten Hauptstamm zusammensetzen, welche in den Anfang der linken und rechten Vena anonyma einmünden.

Die *Lymphdrüsen* oder *Lymphknoten, Glandulae lymphaticae* s. *Ganglia lymphatica* s. Gland. conglobatae, finden sich nur an gewissen Stellen des Körpers in gröfseren oder kleineren Haufen zusammengedrängt, welche Sammlungspunkte der Saugadern oder Centralabtheilungen des Lymphgefäfssystems darstellen: indem sie die Saugadern aus den vom Herzen entfernteren gröfseren Abtheilungen des Körpers, z. B. von einer ganzen Gliedmafse, aufnehmen und ihre Vasa efferentia entweder anderen, in gröfserer Nähe des Herzens liegenden Drüsenhaufen, oder unmittelbar den Hauptstämmen selbst, zusenden. Diese Drüsenhaufen sind besonders zahlreich am Stamm vorhanden, und zwar regelmäfsig an bestimmten Stellen gelagert, wenn gleich die Anzahl und Gröfse der einzelnen Drüsen, aus welchen sie bestehen, veränderlich ist, und aufserdem auch an anderen Stellen kleinere, unbeständige und häufig fehlende Drüsen oder Drüsenhaufen vorkommen. Die einzelnen Drüsen eines Haufens liegen im Allgemeinen nahe beisammen, oft einander berührend, stehen immer durch zahlreiche, von einer Drüse zur anderen gehende, Lymphgefäfse in Verbindung, und bilden mit diesen und den in sie ein- und ausführenden Lymphgefäfsen die *Saugadergeflechte*, *Plexus lymphatici:* deren specielle Benennung von der Stelle, an welcher sie liegen, abgeleitet wird.

Die Lymphgefäfse sind hinsichtlich ihrer Lage und ihres Verlaufes an den meisten Stellen des Körpers als oberflächliche und tiefe zu unterscheiden. Die zahlreicheren Vasa lymphatica superficialia liegen theils an der Oberfläche des Körpers, woselbst sie in der Haut des Kopfes, Stammes und der Extremitäten entspringen und im Unterhautzellgewebe verlaufen (Vasa lymph. subcutanea), endlich aber die Fascia superficialis und selbst die stärkeren Fasciae musculares durchbohren, um mit den tieferen Saugadern sich zu vereinigen: — theils finden sie sich an der Oberfläche der Organe von zusammengesetzterem Bau, Muskeln, Drüsen, Eingeweiden u. a. m. Die Vasa lymphatica profunda liegen zwischen den tieferen Muskelschichten oder in der inneren Substanz

der Eingeweide, indem sie meistens die Hauptstämme der Blutgefäfse eines Körpertheils oder Gegend begleiten. Öfters gehen die tieferen und oberflächlichen Saugadern eines Organs oder Körperabtheilung zu verschiedenen Drüsenhaufen.

I. Hauptstämme des Lymphgefäfssystems.

1) *Truncus lymphaticus communis sinister s. Ductus thoracicus* s. lumbothoracicus s. chyliferus, Brustgang, Milchbrustgang, Speisesaftröhre, entsteht vor dem ersten oder zweiten Lendenwirbel, zuweilen aber höher oder tiefer, an dem hinteren und rechten Umfange der A. aorta desc. abdominalis, durch den Zusammenfluſs dreier ansehnlicher kurzer Stämmchen, der Wurzeln des Ductus thoracicus. Die rechte und linke dieser Wurzeln, *Trunci lymph. lumbares*, werden von den Vasa efferentia der Glandulae lumbares zusammengesetzt: sie enthalten die Lymphe von den unteren Extremitäten, aus dem Becken, von den Geschlechtsorganen und dem unteren Theile der Bauchwände: die mittlere Wurzel, *Truncus lymph. intestinalis*, welche an der rechten Seite des Ursprungs der A. mesenterica superior und der rechten Seite der Aorta liegt, entsteht durch den Zusammenfluſs der meisten Saugadern der Verdauungswerkzeuge, namentlich des Darmkanals, und führt daher aufser der Lymphe auch den Chylus. Sehr häufig sind diese Wurzeln nicht einfache Stämmchen, sondern bestehen aus mehreren anastomosirenden und sich oft um einander windenden ansehnlichen Lymphgefäfsen, so daſs alsdann der Milchbrustgang aus 9 bis 10 einzelnen Wurzeln entspringt. Der Anfang des Ductus thoracicus, zuweilen auch die mittlere Wurzel oder nur diese allein, bildet nicht selten eine spindelförmige, 1″ bis 2″ lange und 3‴ bis 4‴ dicke Anschwellung, *Receptaculum* s. *Cisterna chyli* s. Receptaculum Pecqueti s. Saccus lacteus, genannt.

Von seinem Ursprunge an läuft der Ductus thoracicus durch den Hiatus aorticus des Zwerchfells und im Cavum mediastini posterioris aufwärts; an der rechten und hinteren Seite der A. aorta desc. thoracica, zwischen ihr und der V. azygos und vor den Vereinigungen der Vv. hemiazygos, intercostales posteriores und intercostalis suprema sinistra mit der V. azygos. In der Höhe des 6ten bis 3ten Brustwirbels

liegt er aufserdem unmittelbar hinter der Speiseröhre, wendet sich alsdann hinter dieser und dem Ende des Arcus aortae nach der linken Seite; steigt zwischen der Speiseröhre und der A. subclavia sinistra bis vor den siebenten Halswirbel herauf, so dafs er durch die obere Öffnung der Brusthöhle an den unteren linken Theil des Halses gelangt: senkt sich alsdann, hinter der V. jugularis communis und vor der V. vertebralis communis, bogenförmig nach aufsen, unten und vorn herab, und mündet in den Anfang der V. anonyma sinistra, gewöhnlich in den Vereinigungswinkel der V. jugularis communis und V. subclavia, selten in eine dieser Venen allein. In diesem Laufe nimmt er die Saugadern von der linken Seite der Brustwände, von der linken Lunge, von einem Theile der Speiseröhre und des Herzens, von der linken Seite des Kopfes und Halses vermittelst des *Truncus lymph. jugularis sinister*, und von der linken oberen Extremität vermittelst des *Truncus lymph. subclavius sinister* auf.

Er hat an den meisten Strecken seines geschlängelten Verlaufs 1‴ Dm., ist jedoch stellenweise zu 2‴ bis 3‴ erweitert und an seinem Ende gewöhnlich 1½‴ bis 2‴ dick: spaltet sich an manchen Stellen in zwei bis drei, wiederum zusammenfliefsende Stämme, zerfällt auch wohl an seiner Einsenkungsstelle in mehrere Endigungen. Sehr selten ist er in seiner ganzen Länge doppelt, so dafs beide Stämme erst am Ende sich vereinigen, oder der eine auf der linken, der andere auf der rechten Seite in die Vv. anonymae sich ergiefst: höchst selten geht der einfache Stamm in die V. anonyma dextra: gleichfalls äufserst selten endigt er in der Brusthöhle, in der Höhe des 8—9ten Brustwirbels, durch Einmündungen in die V. azygos. — In seinem unteren Theile besitzt er nur in Entfernungen von etwa 1″ ein Klappenpaar; im oberen Theile werden die Klappen zahlreicher: an der Einmündungsstelle finden sich zwei genau anschliefsende, nach dem Innern der Vene hin sich öffnende Klappen.

2) *Truncus lymphaticus communis dexter s.* minor, rechter Saugaderstamm, führt die Lymphe von der rechten Seite des Brustkastens, des Herzens, der Speiseröhre und der rechten Lunge, eines Theiles der Leber, der rechten

Hälfte des Kopfes und der rechten oberen Extremität. Er ist meistens nur ½ ″ lang, oft kürzer, 1 ‴ dick, läuft von oben und aufsen nach unten und innen, in dem Winkel zwischen den rechten Vv. jugularis communis und subclavia, hinter dem Ende der V. jugularis externa; und senkt sich in die V. anonyma dextra, woselbst er mit einer gewöhnlich einfachen Klappe versehen ist. Er entsteht mit drei Wurzeln: einer äufseren, *Truncus lymph. subclavius dexter*, gebildet von den Vasa efferentia der Glandulae axillares; einer oberen, *Truncus lymph. jugularis dexter*, aus den Glandulae cervicales profundae s. jugulares hervorgehend; und einer inneren hinteren, *Truncus bronchiomediastinus dexter*, welcher hinter der A. subclavia dextra aus der oberen Öffnung der Brusthöhle emporsteigt, über diese nach vorn sich biegt und aus den Vasa efferentia der Glandulae bronchiales, mediastinae und dem Plexus mammarius internus rechterseits entsteht. Häufig senken sich diese drei Stämmchen, ohne einen einfachen Stamm zu bilden, abgesondert oder zu zweien vereinigt, in die V. anonyma oder in die V. jugularis communis oder subclavia: zerfallen auch wohl in noch mehrere einzelne Stämmchen.

II. Drüsen und Saugadern des Kopfes und Halses.

1) *Gl. faciales superficiales* s. zygomaticae, oberflächliche Antlitzdrüsen, drei bis vier kleine Drüsen, liegen vor dem Ohre oberflächlich auf der Gl. parotis und nehmen die oberflächlichen von dem Scheitel und der Schläfe herabsteigenden Lymphgefäfse auf: ihre Vasa efferentia gehen zu den Gl. submaxillares und cervicales superficiales.

2) *Gl. subauriculares*, untere Ohrdrüsen, 2 bis 3 kleine Drüsen unter und hinter dem Ohre auf der Insertion des M. sternocleidomastoideus liegend, und eine bis zwei kleine unbeständige *Gl. occipitales*, erhalten die oberflächlichen Saugadern von der Gegend hinter dem Ohre und vom Hinterhaupte, schicken ihre Vasa efferentia zu den Gl. cervicales superficiales.

3) *Gl. faciales profundae*, tiefe Antlitzdrüsen, 3 bis 6, liegen auf dem hinteren Theile des M. buccinator und an

der Seitenwand des Pharynx, zum Theil genau an der A. maxillaris interna: sie nehmen die Vasa lymph. profunda des Gesichts auf, aus der Fossa temporalis und Fossa pterygopalatina, aus der Augenhöhle, Nasenhöhle, vom Gaumen und Pharynx; auch die Vasa lymph. meningea, welche in Begleitung der A. u. V. meningea media von der Dura mater herabkommen: schicken ihre Vasa efferentia den Gl. cervicales profundae superiores zu.

4) *Gl. submaxillares*, Unterkieferdrüsen, 8 bis 10, zum Theil von ziemlicher Gröfse, liegen zwischen der Basis maxillae inferioris und dem M. digastricus max. inf., von dem oberflächlichen Blatte der Fascia cervicalis bedeckt, an die V. facialis communis und die A. maxillaris externa gränzend. Sie nehmen auf die oberflächlichen Lymphgefäfse vom vorderen Theile des Gesichts, welche zum Theil in Begleitung der V. facialis anterior, von der Stirn, den Augenliedern und der äufseren Nase, Wangen, Lippen und Kinn herabsteigen: ferner die Vasa efferentia der Gl. faciales superficiales, und die Saugadern von dem Boden der Mundhöhle, einige von der Zunge und von der Unterkinngegend. Ihre Vasa effer. gehen zu den Gl. cervicales, superficiales und profundae superiores.

5) *Gl. cervicales superficiales*, oberflächliche Halsdrüsen. Der gröfsere Theil derselben, 4 bis 6, liegt am oberen Theile der Seitenfläche des Halses, an den Rändern und der äufseren Fläche des M. sternocleidomastoideus, zum Theil vom Platysma myoides bedeckt; und nimmt die Vasa efferentia der Gl. subauriculares und occipitales, auch einige Lymphgefäfse aus den Gl. faciales superficiales und submaxillares, ferner Saugadern vom äufseren Ohre und der Haut des Halses und Nackens auf. — An der vorderen Fläche des Halses liegen nur eine bis zwei oberflächliche Drüsen vor den Mm. sternohyoidei: seltener finden sich auch solche im Nacken auf dem M. cucullaris. — Die Vasa efferentia gehen zu den Gl. cervicales profundae.

6) *Gl. cervicales profundae superiores* s. jugulares superiores, tiefe obere Halsdrüsen. Die ansehnlichsten derselben umgeben die V. jugularis interna und die Theilungsstelle der A. carotis communis, und sind im Trigonum cervicale, an der inneren Fläche des M. sternocleidomastoideus und

an der Seitenwand des Pharynx zerstreut: kleinere liegen auch zwischen der Schilddrüse und dem Kehlkopfe, und zwischen dem Pharynx und der Wirbelsäule. Ihre Zahl beträgt 10 bis 16, welche durch zahlreiche ausführende Lymphgefäfse zusammenhangen. Sie nehmen auf die Vasa efferentia der Gl. faciales profundae, submaxillares und cervicales superficiales; die Saugadern des Hirns, welche in der Tun. arachnoidea und Pia mater in Begleitung der Blutgefäfse verlaufen und mit der V. jugularis interna und A. carotis interna herabsteigen (zum Theil aber auch in die Sinus durae matris sich einsenken?); ferner die Lymphgefäfse der Zunge, welche die A. u. V. ranina begleiten und zuweilen durch eine oder zwei kleine, am M. hyoglossus liegende besondere Drüsen gehen; die Saugadern des Kehlkopfes, der Seitenlappen der Schilddrüse und des mittleren und unteren Theiles des Pharynx: und die tieferen Saugadern zwischen den Muskeln des oberen Theiles des Halses und Nackens. — Ihre Vasa efferentia steigen mit der V. jugularis communis abwärts, gehen oft in der Mitte des Halses durch einige unbeständige Gl. cervicales mediae und senken sich alsdann in die folgenden

7) *Gl. cervicales profundae inferiores* s. jugulares inferiores s. supraclaviculares, tiefere untere Halsdrüsen. Diese liegen in der Fossa supraclavicularis und in dem Winkel der V. jugularis communis und V. subclavia, von dem oberflächlichen Blatte der Fascia cervicalis und zum Theil von den Ursprüngen des M. sternocleidomastoideus bedeckt. In ihnen fliefsen alle Saugadern des Kopfes und Halses zusammen, indem sie die Vasa efferentia der Gl. cervicales profundae superiores, — aufserdem die Lymphgefäfse vom unteren Theile der Schilddrüse, des Kehl- und Schlundkopfes und vom Halstheile der Luft- und Speiseröhre, — ferner die oberflächlichen Saugadern von der Haut und den Muskeln des unteren Theiles des Halses, — und die mit den Vertebral-Blutgefäfsen herabsteigenden tiefen Saugadern des Halses, Nackens, aus dem hinteren Theile der Schädelhöhle und aus den Canalis spinalis aufnehmen. Mit den Gl. axillares und den Drüsenhaufen in der Brusthöhle stehen sie durch ein- und ausführende Gefäfse in Verbindung. Ihre kurzen Vasa efferentia fliefsen zu einem kurzen, meistens

einfachen Stämmchen, *Truncus lymph. jugularis* dexter et sinister, zusammen, von welchen der erstere in den Truncus lymph. communis dexter (S. 799), letzterer in das obere Ende des Ductus thoracicus übergeht, zuweilen jedoch abgesondert in die V. jugularis communis oder V. subclavia sich einsenkt.

Die Gl. cervicales superficiales, profundae superiores und profundae inferiores bilden mit den zahlreichen Saugadern, durch welche sie unter einander zusammenhangen, ein ansehnliches, an der Seitenfläche des Halses, in Begleitung der Vv. jugulares herabsteigendes Geflecht, *Plexus lymph. cervicalis* s. jugularis genannt, dessen meiste und ansehnlichsten Drüsen nahe an der hinteren und äufseren Seite der V. jugularis interna und communis liegen.

III. Drüsen und Saugadern der oberen Extremität, der Brust- und Oberbauchwände und des Rückens.

Plexus lymph. axillaris besteht aus den 10 bis 12 *Glandulae axillares* und den Lymphgefäfsen, welche diese mit einander verbinden. Vor den Gl. axillares, Achseldrüsen, liegen 3 bis 4 oberflächliche am unteren Rande des M. pectoralis major und eine oder zwei *Gl. infraclaviculares* auf der Fascia coracoclavicularis zwischen M. pectoralis major und M. deltoides: die meisten und ansehnlichsten finden sich aber hinter den Mm. pectorales major und minor, locker in das Fett der Achselhöhle eingesenkt, und umgeben die grofsen Blutgefäfse in der Achselhöhle, vorzüglich an ihrer vorderen und inneren Seite. Sie sind der Sammlungspunkt aller Lymphgefäfse von der Hand, dem Ober- und Vorderarme, von den Schultergegenden, und des bei Weitem gröfsten Theiles der Saugadern von den Bauchwänden oberhalb des Nabels; von den äufseren häutigen und muskulösen Bedeckungen des Brustkastens, von dem unteren Theile des Nackens, und vom Rücken bis zu den Lendengegenden herab. Ein grofser Theil dieser Lymphgefäfse senkt sich unmittelbar in die Achseldrüsen ein, andere laufen erst durch untergeordnete kleinere Drüsen.

1) Oberflächliche Lymphgefäfse der Hand und des Arms, sehr zahlreich; die von der Volarfläche der Finger und Mittelhand, in welcher sie bogenförmig anastomosiren, und die von der inneren Fläche des Vorderarms, steigen gerade aufwärts: die von der Rückenfläche der Finger und Mittelhand, woselbst sie den Plexus lymph. dorsalis manus bilden, und die von der äufseren Seite des Vorderarms, biegen sich um die Ulnarseite zur inneren Fläche des Vorderarms: so dafs sie fast sämmtlich über die Ellenbogengrube hinweg laufen. Hiernach gehen sie zum Theil durch eine (oder zwei) *Gl. cubitalis superficialis*, welche $1\frac{1}{2}$ '' über dem Condylus internus oss. brachii, neben der V. basilica liegt. Alsdann laufen sie, nebst den oberflächlichen Saugadern des Oberarms, an der inneren Fläche desselben aufwärts; vereinigen sich mit den wenigen oberflächlichen Saugadern von der äufseren Fläche des Oberarms, welche sich über den M. deltoides hinweg nach vorn wenden; und dringen endlich theils in die oberflächlichen, theils in die tiefen Achseldrüsen: einige begleiten die V. cephalica und senken sich in eine Gl. infraclavicularis.

2) Die tiefen Lymphgefäfse der Hand und des Arms sind weniger zahlreich, begleiten die Vv. radiales, ulnares und interosseae bis zur Ellenbogengrube, woselbst sie mit den oberflächlichen anastomosiren; gehen durch einige kleine *Gl. cubitales profundae;* laufen mit den tiefen Saugadern des Oberarms vereint längs den Vv. brachiales, woselbst sie zuweilen noch durch kleine, sehr unbeständige Gl. brachiales dringen, und senken sich in die tiefen Achseldrüsen.

3) Die oberflächlichen Saugadern der Brust und des Oberbauchs sind zahlreich, kommen aus den Regiones umbilicalis, hypochondriacae und gastrica, in deren Mitte sich selten eine Gl. epigastrica findet: ferner entstehen sie von der ganzen vorderen und den seitlichen Flächen des Brustkastens, woselbst zuweilen eine bis zwei Drüsen, Gl. pectorales, auf dem unteren Theile des M. pectoralis major liegen, und von der Milchdrüse: senken sich endlich in die oberflächlichen Achseldrüsen und die Gl. infraclaviculares.

4) Die tiefen Saugadern des Oberbauchs und der Brust laufen an den äufseren und inneren Oberflächen der Mm. pectorales, serratus anterior major und obliquus externus

abdominis, gehen durch einige, auf dem M. serratus ant. major liegende Gl. pectorales: sie anastomosiren mit den oberflächlichen Lymphgefäfsen dieser Gegenden, nehmen auch Saugadern von der Mamma auf, und gehen meistens in Begleitung der Aa. und Vv. thoracicae zu den tiefen Achseldrüsen. Die tiefen Saugadern vom M. rectus abdominis gehen zu den Gl. sternales.

5) Die oberflächlichen Saugadern vom unteren Theile des Nackens, vom Rücken und der Schulterblattgegend laufen auf dem M. cucullaris, dem hinteren Theile des M. deltoides und auf dem M. latissimus dorsi, und dringen unter der Sehne des letzteren in die Achselhöhle zu den tiefen Gl. axillares.

6) Die tiefen Saugadern der Schulter und des Rückens halten den Lauf der A. und V. subscapulares, dringen durch unbeständige Gl. subscapulares und dorsales, anastomosiren mit den Vasa lymph. intercostalia und gelangen endlich zu den tiefen Achseldrüsen. —

Die oberflächlichen und tiefen Achseldrüsen hängen untereinander, die letzteren und die Gl. infraclaviculares auch mit den Gl. cervicales profundae inferiores, durch zahlreiche ein- und ausführende Saugadern zusammen. Die eigentlichen Vasa efferentia der tiefen Achseldrüsen vereinigen sich zu einem einfachen Stamme, *Truncus lymph. subclavius* (oder auch zu mehreren Stämmchen), welcher in queerer etwas gebogener Richtung hinter der V. subclavia nach innen läuft und linkerseits in das Ende des Ductus thoracicus, rechterseits in den Truncus lymph. communis dexter einmündet, häufig aber sich schon in die untere vordere Wand der V. subclavia einsenkt.

IV. Drüsen und Saugadern in der Brusthöhle.

1) *Gl. sternales s. substernales*, Brustbeindrüsen, 6 bis 10, liegen an jeder Seite längs der inneren Fläche der sieben oberen Rippenknorpel und bilden mit ihren ein- und ausführenden Lymphgefäfsen den *Plexus lymph. mammarius internus*, welcher die A. und V. mammaria interna begleitet. Sie nehmen Saugadern von der oberen Fläche des Zwerchfells, aus dem vorderen Theile der Interstitia intercostalia, von den Muskeln des Thorax, M. rectus abdominis,

und von der Mamma auf; anastomosiren mit den Saugadern an der Aufsenfläche des Thorax und mit den Plexus intercostales; ihre Vasa efferentia vereinigen sich mit denen der Gl. mediastinae anteriores.

2) *Gl. intercostales*, Zwischenrippendrüsen, kleine, im hinteren Theile der Interstitia intercostalia, vor den Rippenköpfchen und an der Vorderfläche der Brustwirbelsäule zerstreute Drüsen, 16 bis 20 auf jeder Seite: nehmen die Lymphgefäfse aus den Zwischenrippenräumen, die von den tiefen Rückenmuskeln und aus dem Canalis spinalis, von den Rändern des Zwerchfells und von der Pleura auf, und bilden mit diesen Lymphgefäfsen die *Plexus lymph. intercostales:* anastomosiren mit den Plexus lymph. mammarii interni und den Gl. mediastinae posteriores: ihre Vasa efferentia vereinigen sich zu einzelnen Stämmchen, von denen die meisten in den Ductus thoracicus einmünden, rechterseits jedoch grofsentheils zum Truncus lymph. bronchio-mediastinus dexter gelangen.

3) *Gl. mediastinae anteriores*, vordere Mittelfelldrüsen, liegen im Cavum mediastini anterioris, unmittelbar hinter den Gl. sternales und mit diesen zusammenhangend; die unteren 3 bis 4 vor dem Herzbeutel nahe über dem Zwerchfell, die oberen 8 bis 10 vor dem Arcus aortae und neben den Vv. anonymae. Sie nehmen auf a) oberflächliche Saugadern von der Leber, von der convexen Fläche des rechten Lappens und des mittleren Theiles derselben; welche mit wenigen ansehnlichen Stämmchen zwischen die Blätter des Lig. suspensorium und des Lig. coronarium hepatis treten und durch den Rippenrand des Zwerchfells, theils hinter dem Proc. ensiformis und sechsten Rippenknorpel, theils vor der zwölften Rippe, in die Brusthöhle eindringen: — b) Saugadern von der oberen Fläche des Zwerchfells, dem Herzbeutel und der Thymus: — c) die meisten Saugadern des Herzens, welche die Aa. und Vv. coronariae begleiten, an den Wänden der Aorta adscendens und A. pulmonalis communis heraufsteigen und aus dem Herzbeutel hervortreten: — d) die Vasa efferentia der Gl. sternales.

4) *Gl. mediastinae posteriores*, hintere Mittelfelldrüsen, 8 bis 12, klein, liegen längs der Brustaorta und der Speise-

röhre, nehmen Lymphgefäfse vom Zwerchfell, der Speiseröhre und dem Herzbeutel auf.

5) *Gl. bronchiales*, Bronchialdrüsen. Die kleineren derselben, *Gl. pulmonicae*, liegen in grofser Anzahl im Gewebe der Lungen selbst an den gröfseren Bronchia; die gröfseren 20 bis 30, vorzugsweise Gl. bronchiales genannt, liegen an den Bronchi, und vorzüglich an der Theilungsstelle der Luftröhre: andere am unteren Ende der Luftröhre werden *Gl. tracheales* genannt. Bei Erwachsenen sind sie in der Regel tief schwarz, von schwarzem, sehr feinkörnigen Pigment, welches sich in ihren Zellstoff abgelagert hat, durchdrungen, und von einem mehr weichen und lockeren Gewebe, als alle anderen Lymphdrüsen des m. K.: in der Kindheit und Jugend sind sie röthlich und mehr compact. Sie nehmen auf a) die oberflächlichen Saugadern der Lungen, welche in dichten Netzen an den Oberflächen der Lungen liegen, in der Incisura interlobularis mit den tieferen Saugadern sich verbinden, gröfstentheils aber gegen die Lungenwurzel sich hinwenden: — b) die tiefen Saugadern der Lungen, welche die Bronchia und die Vasa pulmonalia begleiten und aus der Lungenwurzel hervortreten: — c) die Saugadern vom unteren Theile der Luftröhre: — d) einige Saugadern von der hinteren Fläche des Herzens. — Die Bronchialdrüsen stehen unter einander und mit den Gl. mediastinae in vielfachem Zusammenhange.

Die Vasa efferentia der Gl. bronchiales, die der Gl. mediastinae anteriores mit den Gl. sternales, und die der Gl. mediastinae posteriores, vereinigen sich auf der linken Seite zu mehreren kleineren Stämmchen, welche zur obersten Strecke des Ductus thoracicus gehen: auf der rechten Seite setzen sie hinter der V. anonyma dexter den einfachen (oder in mehrere Stämmchen zerfallenden) *Truncus lymph. bronchiomediastinus dexter* zusammen (S. 799), welcher zum Truncus lymph. communis dexter geht.

V. Drüsen und Lymphgefäfse der unteren Extremität.

Die *Glandulae inguinales*, Leistendrüsen, sind der Sammlungspunkt für die Saugadern der unteren Gliedmafse und

benachbarten Gegenden: sie sind zahlreich und zum Theil von ansehnlicher Gröfse: liegen in der Inguinalgegend und in der Fossa iliopectinea des Oberschenkels; die oberflächlichen, 7 bis 13 an der Zahl, finden sich vor dem Arcus cruralis, dem Processus falciformis fasciae latae und in der Fovea ovalis, neben der Einmündung der V. saphena magna in die V. femoralis, nur von der Haut und Fascia superficialis bedeckt: die 3 bis 7 tiefen Leistendrüsen liegen hinter dem oberflächlichen Blatte der Fascia lata, neben der A. und V. femoralis; die oberste von diesen steckt gewöhnlich im Annulus cruralis, in einem Loche des Septum crurale. Die oberflächlichen und tieferen Leistendrüsen stehen untereinander durch zahlreiche, zum Theil den Proc. falciformis durchbohrende Lymphgefäfse in Verbindung, wodurch der *Plexus lymph. inguinalis* gebildet wird: die ersteren nehmen vorzüglich die oberflächlichen Saugadern der ganzen unteren Extremität, der unteren Hälfte der Bauchwände und der vorderen Seite der äufseren Geschlechtstheile auf; letztere dagegen die tiefen Saugadern der unteren Extremität, welche dem Laufe der gröfseren Blutgefäfse entsprechen, und aufserdem die Vasa efferentia der oberflächlichen Leistendrüsen.

1) Oberflächliche Lymphgefäfse der unteren Extremität: die meisten laufen vom Fufsrücken und inneren Fufsrande an längs der inneren und vorderen Fläche des Unter- und Oberschenkels in der Richtung der V. saphena magna; mit diesen vereinigen sich die meisten Saugadern der Fufssohle und die der hinteren Fläche des Unter- und Oberschenkels, indem sie über die Kniekehle hinweg und an der äufseren und vorderen Seite des Oberschenkels schräg gegen die Inguinalgegend aufsteigen: andere wenden sich von der hinteren und inneren Fläche des Oberschenkels nach vorn zur Leistengegend.

2) Die tiefen Saugadern der unteren Extremität begleiten mit einfachen oder doppelten Stämmchen theils die tiefen Vv. plantares, tibiales posticae und peronaeae, theils die Vv. tibiales anteriores, indem sie durch eine, auf der vorderen Fläche des Lig. interosseum cruris liegende, aber häufig fehlende Drüse, Gl. tibialis anterior, dringen. In der Kniekehle gehen sie durch 2 bis 3 kleine unbeständige *Gl.*

popliteae, welche nahe an der V. poplitea liegen. Auch am Oberschenkel halten sie genau den Verlauf der tieferen Venen und gelangen mit wenigen an der inneren Seite der V. cruralis aufsteigenden Stämmchen zu den tiefen Inguinaldrüsen.

3) Die oberflächlichen Lymphgefäfse des Gesäfses gehen durch die äufsere Hüftgegend und um die innere Seite des Oberschenkels zu den oberflächlichen Leistendrüsen.

4) Die oberflächlichen Saugadern aus der Regio lumbaris, iliaca, hypogastrica und der unteren Hälfte der Regio umbilicalis steigen von oben zu den oberflächlichen Inguinaldrüsen herab.

5) Die oberflächlichen Saugadern von der Vorhaut, der Eichel und dem Rücken des Penis, die von der Clitoris und einige von der vorderen und Seitenfläche des Hodensackes oder der grofsen Schamlefzen, steigen bis zum Mons pubis in die Höhe und alsdann in dem Fettpolster desselben nach aufsen zu den oberflächlichen Leistendrüsen, indem sie bei Weibern mit den Lymphgefäfsen der Ligg. uteri rotunda zusammenhangen. Andere oberflächliche Lymphgefäfse von dem Scrotum und den Labia majora laufen mit den Aa. und Vv. pudendae externae, queer nach aufsen zu den genannten Drüsen.

Die Vasa efferentia der Glandulae inguinales dringen hinter dem Arcus cruralis in die Bauchhöhle, die meisten durch den Annulus cruralis, einige auch an der vorderen und äufseren Seite der A. cruralis, und senken sich in die Gl. iliacae externae.

VI. Drüsen und Saugadern in der Beckenhöhle.

1) *Gl. iliacae externae* s. anteriores, äufsere Hüftdrüsen, 6 bis 8, zum Theil ziemlich grofse Drüsen, liegen an beiden Seiten längs der A. und V. iliaca externa und communis, vom Annulus cruralis an bis zum fünften Lendenwirbel aufwärts, und bilden mit den, sie verbindenden Lymphgefäfsen den *Plexus lymph. iliacus externus* s. anterior. Sie nehmen auf die Vasa efferentia der Gl. inguinales, einige Saugadern von den Mm. psoas und iliacus internus und die Lymphgefäfse von den Bauchmuskeln und Bauchfell an der vorderen

und den Seitenwänden der Bauchhöhle unterhalb des Nabels, welche mit den Aa. und Vv. epigastricae und circumflexae ilium herabsteigen: die letzteren gehen öfters durch eine bis drei an der Crista oss. ilium liegenden Drüsen, Gl. iliacae superiores. Sie stehen durch zahlreiche Lymphgefäfse mit den Gl. hypogastricae und sacrales in Verbindung: ihre Vasa efferentia gehen aber gröfstentheils zu den Gl. lumbares inferiores.

2) *Gl. hypogastricae* s. iliacae internae, Beckendrüsen, 9 bis 12, liegen rechts und links an den Seitenwänden des Beckens, an der A. und V. hypogastrica und den Ästen derselben, und bilden den *Plexus lymph. hypogastricus.* Sie nehmen auf: a) einige Lymphgefäfse aus den Gl. inguinales und iliacae externae. — b) Einige tiefe Saugadern des Oberschenkels, welche mit der A. und V. obturatoria durch den Canalis obturatorius dringen. — c) Die tiefen Lymphgefäfse der Gesäfsgegend, welche die Aa. und Vv. ischiadica und glutea begleiten, und zuweilen durch unbeständige, zwischen den Mm. glutei und in der Incisura ischiadica superior liegende Drüsen gehen. — d) Die Saugadern vom hinteren Theile des Hodensackes oder der Labia majora, aus den Corpora cavernosa penis und Bulbus urethrae, oder aus den Labia minora und vom Scheideneingange; ferner die aus dem Perinaeum und vom After: welche sämmtlich dem Laufe der A. und V. pudenda communis folgen. — e) Die zahlreichen Saugadern der Blase, vordere und hintere: mit letzteren vereinigen sich die Saugadern der Samenbläschen, der Gl. prostata und des unteren Theiles der Scheide. — f) Die Saugadern vom Scheidengewölbe, dem Collum und unteren Theile des Corpus uteri. — Die Vasa efferentia der Gl. hypogastricae gehen zu den Gl. lumbares inferiores.

3) *Gl. sacrales*, Kreuzbeindrüsen. Die kleineren unteren von sehr unbeständiger Anzahl liegen hinter dem Mastdarm an der vorderen Fläche des Kreuzbeins, die 4 bis 5 gröfseren oberen auf dem Promontorium zwischen den Platten des Mesorectum. Sie nehmen auf Saugadern vom Mastdarm, von der hinteren Beckenwand und von dem unteren Theile des Canalis spinalis, verbinden sich durch Lymphgefäfse mit einander zum *Plexus lymph. sacralis*, aufserdem

mit den Gl. hypogastricae und mesocolicae. Ihre Vasa efferentia gehen zu den Gl. lumbares inferiores.

VII. Drüsen und Saugadern in der Bauchhöhle.

1) *Gl. lumbares*, Lendendrüsen, nennt man alle die 20 bis 25, zum Theil sehr ansehnlichen Drüsen an der hinteren Bauchwand, welche hinter dem Saccus peritonaei, vor den Mm. psoae majores und quadrati lumborum und der Pars lumbaris des Zwerchfells liegen und die A. aorta descendens abdominalis und die V. cava inferior, besonders an ihrer hinteren Seite umgeben. Man unterscheidet Gl. lumbares inferiores und superiores, welche aber durch zahlreiche ein- und ausführende Lymphgefäfse vielfach mit einander zusammenhangen und den sehr ansehnlichen *Plexus lymph. lumbaris* bilden. Sie nehmen auf:

a) Die Vasa efferentia der Gl. iliacae externae und durch Vermittelung derselben die des Plexus inguinalis.

b) Die Vasa efferentia der Gl. hypogastricae und sacrales.

c) Die Saugadern von der Flexura iliaca coli, welche zwischen den Platten des Mesocolon descendens verlaufen und durch Gl. mesocolicae gehen.

d) Die Saugadern der Hoden, der Nebenhoden und der Scheidenhäute; erstere bilden ein Netz zwischen der Tun. albuginea und sérosa des Hoden, treten mit 3 bis 4 Stämmchen zwischen den Blättern der Einstülpung der Tun. vaginalis propria, am Nebenhoden vorbei, in den Samenstrang, und laufen nebst den zahlreichen Lymphgefäfsen der Epididymis und der eigenen Scheidenhaut im Samenstrange aufwärts: alsdann mit der A. und V. spermatica interna bis zur Nierengegend herauf.

e) Im weiblichen Geschlechte die sehr zahlreichen Saugadern vom Fundus und oberen Theile des Corpus uteri, von den Tubae und Ovarien; welche zwischen den Blättern des Lig. uteri latum ein Geflecht bilden und alsdann mit mehreren Stämmchen, die während der Schwangerschaft eine beträchtliche Dicke erreichen, die A. und V. spermatica interna begleiten.

f) Die Saugadern der Nieren: die oberflächlichen laufen theils über die Oberfläche der Niere zum Hilus renalis,

theils dringen sie in die Substanz derselben, um mit den tieferen sich zu vereinigen, welche aus dem Hilus renalis hervortreten.

g) Die verhältnifsmäfsig zahlreichen Saugadern der Nebennieren.

h) Die tiefen Saugadern von den tiefen Rückenmuskeln in der Lendengegend, von der Pars lumbaris und der unteren Fläche des Zwerchfells, aus dem Canalis spinalis der Bauchwirbelsäule, und von der hinteren Wand des Bauchfellsackes.

Die sehr ansehnlichen Vasa efferentia der Gl. lumbares liefsen auf jeder Seite zu einer der seitlichen Wurzeln des Ductus thoracicus, zu dem einfachen (oder doppelt und dreifach verhandenen) *Truncus lymph. lumbaris*, dexter et sinister, (S. 797.) zusammen, welche gewöhnlich, zwischen den oberen Enden der A. aorta desc. abdominalis und der V. cava inferior, einander durchkreuzen und umwinden, bevor sie sich mit einander und mit dem Truncus lymph. intestinalis verbinden.

2) *Gl. mesentericae s. mesaraicae*, Gekrösdrüsen, der ansehnlichste Drüsenhaufen im m. K.; liegen zwischen den Platten des Mesenterium in mehreren Reihen: in der äufsersten finden sich die kleineren und sparsamer zerstreuten Drüsen 1″ bis 2″ weit von der hinteren Wand des Dünnarms entfernt: in der folgenden mittleren Reihe liegen die Drüsen einander näher und sind gröfser: vorzüglich besteht aber die innerste Reihe, in der Radix mesenterii an den Stämmen der A. mesenterica superior und V. mesenterica liegend, aus sehr ansehnlichen, dicht an einander gedrängten Drüsen (die aber nicht, wie in einigen Säugethieren, zu einer zusammenhangenden Masse, einem sog. Pancreas Aselii, verschmelzen). Ihre Zahl überhaupt beträgt zwischen 100 und 200; im Gekröse des Jejunum sind sie am zahlreichsten und vollkommensten entwickelt. Sie nehmen die oberflächlichen und tiefen, mit sehr zahlreichen Klappen versehenen Saugadern des gröfsten Theiles des Dünn- und Dickdarmes, *Vasa lymphatica intestinalia s. lactea s. chylifera*, Milch- oder Chylusgefäfse, auf, welche zur Zeit der Verdauung den Chylus von der inneren Darmfläche zum Ductus thoracicus leiten, aufser dieser Zeit aber Lymphe und

wässrige, aus den im Dickdarme verweilenden Faeces aufgenommene Flüssigkeiten führen.

a) Die Saugadern der unteren Hälfte des Duodenum, die des Jejunum und des Ileum sind aufserordentlich zahlreich: die oberflächlichen entstehen zwischen der serösen und Muskelhaut und verlaufen leicht geschlängelt eine Strecke weit nach der Longitudinalrichtung des Darms, bevor sie nach dessen hinterer Wand sich wenden: sie anastomosiren zwischen den Bündeln der Tun. muscularis mit den tiefen Saugadern des Darms. Letztere entspringen in der Tun. mucosa selbst, in den Villi und zwischen denselben in den Lieberkühnschen Grübchen, und verlaufen in queerer Richtung um die Tun. mucosa in der Lamina cellulosa, die Blutgefäfse derselben begleitend. An der hinteren Wand des Darms treten die oberflächlichen und tiefen Saugadern zwischen die Platten des Mesenterium, vereinigen sich zu mehreren Stämmchen und gehen zu der ersten Drüsenreihe, alsdann mit wenigeren anastomosirenden Stämmchen zu der mittleren und innersten Drüsenreihe.

b) Die Saugadern des Coecum, Colon adscendens und transversum und der oberen Hälfte des Colon descendens sind weniger zahlreich und auch dünner: sie entspringen wie die des Dünndarms, die tieferen nämlich in der Schleimhaut selbst; und treten durch die 20 bis 50 *Gl. mesocolicae* Gekrösdrüsen des Grimmdarms, welche in einer einfachen höchstens doppelten Reihe, meistens nahe an der hinteren Darmwand, zwischen den Platten des Mesocolon liegen. Alsdann laufen sie längs den Bögen der Aa. und Vv. colicae von Drüse zu Drüse bis zur Vereinigungsstelle des Mesocolon transversum mit dem oberen Ende des Mesenterium und senken sich hieselbst in die obersten Gl. mesentericae der innersten Reihe.

Die Vasa efferentia der innersten Reihe der Gl. mesentericae, welche nach und nach alle Saugadern aus den übrigen Gekrösdrüsen aufgenommen haben, vereinigen sich neben dem Ursprunge der A. mesenterica superior mit den Vasa efferentia der Gl. coeliacae, zur mittleren Wurzel des Ductus thoracicus, *Truncus lymph. intestinalis*, welcher im unteren Theile des Hiatus aorticus des Zwerchfells, an der

rechten und hinteren Seite der Aorta, mit den beiden Trunci lymph. lumbares zusammenfliefst.

3) *Gl. coeliacae*, obere Eingeweidedrüsen, 16 bis 20 ansehnliche Drüsen, liegen hinter dem Pancreas, Duodenum und Pylorus, vor der Aorta, zwischen und hinter den Platten des Mesocolon transversum und dem kleinen Netze, die A. coeliaca, die V. portarum und den Ursprung der A. mesenterica sup. umgebend. Meistens werden sie zu den Gl. lumbares superiores gezählt, mit welchen sie in gleicher Höhe, aber weiter nach vorn liegen und mit ihnen und den obersten Gl. mesentericae durch zahlreiche, kurze, ein- und ausführende Lymphgefäfse zusammenhangen. Sie nehmen alle die zahlreichen Saugadern von allen den, oberhalb des Mesocolon transversum liegenden Verdauungsorganen auf, welche gröfstentheils vorher durch untergeordnete Drüsenhaufen gehen: nämlich

a) Die meisten oberflächlichen Saugadern der Leber, welche mit sehr engen Netzen unmittelbar unter dem Peritonealüberzuge entspringen und zahlreiche zarte Stämmchen mit wenigen Klappen zusammensetzen. Die von der convexen Fläche des linken Lappens laufen durch das Lig. triangulare sinistrum und vereinigen sich mit den Saugadern des Magens; die von der ganzen concaven Fläche der Leber und von der Gallenblase laufen convergirend gegen die Fossa transversa und fliefsen hier mit den tiefen Lymphgefäfsen der Leber zusammen: einige dringen auch in die Lebersubstanz selbst ein, um mit den tiefen zu anastomosiren.

(Die oberflächlichen Saugadern von der convexen Fläche des mittleren Theils und des rechten Lappens der Leber gehen zu den Gl. mediastinae anteriores. (S. 805.)

b) Sämmtliche sehr zahlreiche tiefe Lebersaugadern, welche die Verästelungen der Blutgefäfse im Innern dieses Organs begleiten, und aus der Fossa transversa hervordringend, mit den oberflächlichen der concaven Fläche sich vereinigen: hiernach steigen sie im Lig. hepato-duodenale vor der V. portarum herab und dringen hier durch einige kleine *Gl. hepaticae*, zum Theil auch durch die Gl. gastro-epiploicae superiores, bevor sie zu den Gl. coeliacae gelangen.

c) Saugadern des Magens und der oberen Hälfte des Duodenum, welche gleich den übrigen des Darmkanals in

oberflächliche und tiefe zerfallen und wie jene entspringen. Die von dem oberen Theile des Magens laufen gegen die Cardia und die Curvatura minor hin und dringen durch 4 bis 6 kleine *Gl. gastro-epiploicae superiores*, welche längs des oberen Magenrandes zwischen don Platten der Ligg. gastrophrenica und des Omentum minus liegen. Die Saugadern vom unteren Theile des Magens dringen durch 6 bis 8 kleine *Gl. gastro-epiploicae inferiores*, welche längs der Curvatura major bis zum Pylorus hin, zwischen den Blättern des Omentum gastrocolicum liegen: in diese Drüsen treten auch die Saugadern von der oberen Hälfte des Duodenum. Die vom Fundus ventriculi treten in das Lig. gastrolienale und vereinigen sich mit denen der Milz.

d) Saugadern der Netze vereinigen sich mit denen des Magens: die des kleinen Netzes in den Gl. gastro-epiploicae superiores, die des grofsen Netzes in den Gl. gastro-epiploicae inferiores.

e) Saugadern der Milz und des Pancreas. Die ansehnlichen oberflächlichen Saugadern der Milz laufen sämmtlich gegen den Hilus lienis, aus welchem die tiefen hervortreten und mit ersteren sich vereinigen. Die Lymphe, welche sie enthalten, ist von röthlicher Farbe. Sie dringen durch 8 bis 10 *Gl. splenico-pancreaticae*, welche im Hilus lienis, zwischen den Platten des Lig. gastrolienale, und längs der A. und V. lienalis hinter dem Pancreas liegen, und aufser den Lymphgefäfsen der Milz auch die vom Fundus ventriculi und die oberflächlichen und tiefen Saugadern vom Corpus und der Cauda pancreatis aufnehmen. Die Saugadern vom Caput pancreatis vereinigen sich dagegen mit denen des Duodenum und der Leber. —

Die Vasa efferentia der Gl. coeliacae fliefsen zu ansehnlichen kurzen Stämmchen zusammen, welche, theils abgesondert, theils mit denen der Gl. mesentericae zusammenfliefsend, in den Truncus lymph. intestinalis übergehen: zum Theil aber auch mit den Vasa efferentia der Gl. lumbares in die Trunci lymph. lumbares sich einsenken.

Literatur der Gefäfslehre.

Blutgefäfssystem.

1454. *J. C. A. Mayer* anat. Beschreibung der Blutgef. d. m. K. Berlin u. Leipzig. 1777. 8. — 1788. 8. m. K.

1455. *F. A. Walther* angiologisches Handbuch. Berlin 1789. 8.

Die gröfseren Handbücher der Anatomie, vorzüglich Sömmering (Nr. 39.) 4r Bd. Meckel (Nr. 56.) 3r Bd. Münz (Nr. 58.) 2r Th. H. Cloquet (Nr. 59.) 2r. Bd. Hildebrandt her. v. E. H. Weber (Nr. 38.) 3r Bd.

1456. *C. J. M. Langenbeck* Gefäfslehre mit Hinweisung auf die Icones anat. Gött. 1836. 8.

Abbildungen.

Loder (Nr. 94.) Hft. V. Münz. (Nr. 58.)
Mascagni (Nr. 98.) J. Cloquet (Nr. 99.)
Langenbeck (Nr. 101.) M. J. Weber (Nr. 104.)

1457. *L. J. v. Bierkowsky* Abb. der Puls-, Blut- und Saugadern mit Erläut. Berlin 1825. Fol.

Die topographischen und chirurgischen Darstellungen der Anatomie von Rosenmüller, Velpeau, Blandin, Bierkowsky, Bock, (S. Bd. II.) enthalten viele, der Gefäfslehre vorzugsweise angehörige Beschreibungen und Abbildungen.

Herz.

1458. *R. Lower* Tractatus de corde etc. Lond. 1669. 8. — Edit. 7ma Lgd. Bat. 1740. 8.

1459. *M. de Senac* Traité de la structure du coeur, de son action et de des maladies. à Par. 1749. 2 Vol. 4. — ib. 1774.

Lage des Herzens.

F. Tiedemann (Nr. 1496.) Tab. I.

1460. *A. W. Otto* von der Lage der Organe in der Brusthöhle m. Abb. Berl. 1829. 4.

1461. *J. Hope* (on the diseases of the heart) von den Krankheiten des Herzens und der gr. Blutgef. A. d. Engl. m. Zus. v. F. W. Becker. Berlin 1833. 8.

Herzbeutel.

1462. *M. A. Severinus* de aqua pericardii etc. Hanau 1654. 4.

1463. *J. M. Hoffmann* resp. *Frankenau* Diss. de pericardio. Altd. 1690. 4.

1464. *G. C. Schelhammer* resp. *Wentzel* Diss. de aqua pericardii. Jen. 1694. 4.

1465. *A. Littre* in Mém. de l'ac. de Paris 1711.

1466. *C. de Jonge* Diss. de pericardio et liquore in eo contento. Traj. ad Rhen. 1754. 4.

Dimensionen und Capacität.

1467. *J. D. Santorini* Obs. an. (Nr. 134.) c. VIII.

1468. *S. Aurivillius* de inaequali vasorum pulmonalium et cordis cavitatum amplitudine. Gött. 1750. 4. in Haller Disp. (Nr. 138.) Vol. VII.

1469. *J. N. Weifs* de dextro cordis ventriculo post mortem ampliori. Alt. 1767. 4.

1470. *A. C. Sabatier* in vivis animalibus ventriculorum cordis eadem capacitas. Paris 1772. 4. (Nr. 32.)

1471. *A. Portal* in Nr. 47. Bd. III. und in Nr. 29. Bd. I.

1472. *J. F. Meckel* in Nr. 56. Bd. III.

1473. *M. J. Weber* in Nasse's Zeitschr. f. Anthropol. 1825. Hft. 3.

1474. *J. Müller* in Medic. Vereins-Zeit. 1834. Nr. 29.

1475. *J. Bouillaud* Traité clinique des maladies du coeur etc. Par. 1835. Tome I.

Bau des Herzens.

1476. *B. Eustachius* Libell. de vena sine pari, in Opusc. (Nr. 108.)

1477. *J. N. Pechlin* Diss. de fabrica et usu cordis. Kil. 1676. in Haller Disp. Vol. II.

1478. *J. B. Morgagni* (Nr. 129.) Advers. I. 2. V. — Epist. XV.

1479. *A. C. Thebesius* Diss. de circulo sanguinis in corde. Lgd. B. 1708. 4.

1480. *J. B. Winslow* Obs. sur les fibres du coeur et sur les valvules, in Mém. de l'ac. de Paris 1711. 1717. 1725.

1481. *R. Vieussens* Traité de la structure et des causes du mouvement du coeur. Toulous. 1715. 4.

1482. *A. F. Walther* de structura cordis auricularum. Lips. 1734. in Haller Disp. Vol. II.

1483. *J. M. Lancisi* de corde et aneurysmatibus. Romae 1728. fol. — Lips. 1740. 4.

1484. *J. Lieutaud* Obs. anat. sur le coeur, in Mém. de l'ac. de Paris. 1758.

1485. *C. F. Wolff* de ordine fibrarum musc. cordis etc. in Act. ac. Petropol. 1780—81. und Nova act. ac. Petr. Vol. I.—VI. Vol. VIII—X.

1486. *P. N. Gerdy* Recherches etc. (Nr. 1017.)

1487. *E. H. Weber* in Hildebrandts Anat. (Nr. 38.) Bd. III.

1488. *Filhos* in Archives gén. de Méd. 1833. Juillet.

1489. *Th. King* (üb. die Valv. tricusp.) in l'Institut 1835. Nr. 126.

1490. *A. Retzius* über die Scheidewand des Herzens beim Menschen mit Rücksicht auf das Tuberc. Loweri, in Müllers Archiv 1835.

Körperarterien.

1491. *A. de Haller* Icones anat. (Nr. 82.) Fasc. II.—VII.

1492. *A. Murray* Descriptio arteriarum c. h. (Diss. IV. 1780—83.) Lips. 1794. 8.

1493. *A. Scarpa* Sull' aneurisma riflessioni ed osservaz. anat. chirurgiche. Pavia 1804. Fol. c. tab. aen. Deutsch (üb. d. Pulsadergeschwülste) v. C. F. Harless. Zürich 1808. 4.

1494. *J. Barclay* a description of the arteries of the human body. Edinb. 1812. 8.

1495. *Ch. Bell* Engravings of the arteries of the hu-

man body. Edinb. 1711. 8. — 4th ed. 1824. 8. — Deutsch u. Lat. v. Robbi. m. 14 Kpft. (Nr. 60. Bd. IV.)

1496. *F. Tiedemann* Tabulae arteriarum c. h. Carlsr. 1822. Fol. Text in 4.

1497. *R. Harrison* surg. anatomy of the arteries of the hum. body. Dublin 1824. 2 Voll. 8.

1498. *G. D. Dermott* Illustrations of the arteries, connected with aneurism and surg. operations. Lond. 1825. Fol. mit Kpft. — A concise description of the locality and distribution of the arteries in the h. body. Lond. 1812. 12.

1499. *R. Froriep* Chirurgische Anatomie der Ligaturstellen am m. K. Weimar 1830. Fol. m. Kpft.

1500. *A. M. Valsalva* (Sinus der Aorta) in Diss. posth. II. in Opp. Nr. 137.

1501. *A. de Haller* de vasis cordis propriis in Opp. min. (Nr. 138.) Vol. I.

1502. *J. N. Bayer* praes. *F. Tiedemann* Diss. de ramis ex arcu aortae prodeuntibus. Salzb. 1817. 4. c. tab.

1503. *A. Burns* Remarks on the surgical anatomy of the head and neck. Edinb. 1811. 8. Deutsch v. Dohlhoff (Nr. 688.) m. Abb.

1504. *F. Schlemm* Diss. de arteriarum praesertim faciei anastomosibus. Berol. 1821. 4. c. tab. aen. — Arteriarum capitis superficialium icon nova, acc. tabb. II. Berol. 1830. Fol.

1505. *J. G. Günz* Com. de art. maxillari interna. Lips. 1743. 4.

1506. *A. F. Walther* Pr. de vasis vertebralibus. Lips. 1730. in Haller Disp. Vol. II.

1507. *A. de Haller* resp. *Winkler* Diss. de arteria brachii. Gött. 1745. 4. — De arteriis venisque bronchialibus et oesophageis. Gött. 1743. in Disp. Vol. III.

1508. *A. F. Walther* Pr. quod art. coeliacae tabulam sistit. Lips. 1729. in Haller Disp. Vol. III.

1509. *J. N. Weifs* resp. *Leincker* Diss. de arteriis viscerum propriis. Alt. 1744. 4.

1510. *G. Martin* on the seminal bloodvessels, in Edinb. med. essays and observ. Vol. III. — A. Monro I. in dess. Works (Nr. 144.) art. 32.

1511[a]. *A. Cooper* Observations on the testis (Nr. 1310.)

1511.b. *A. K. Hesselbach* üb. den Ursprung u. Verlauf der unteren Bauchdeckenschl. und der Hüftbeinlochschl. Würzb. 1829. 4. m. Abb. u. in Nr. 722.

Über die Arterien in der Leistengegend s. auch J. Cloquet (Nr. 717.) Scarpa u. Seiler (Nr. 720. 721.)

Über die A. pudenda communis s. Langenbeck (Nr. 1412.) Sanson (Nr. 1416.) Scarpa (Nr. 1419.) *Dupuytren*, Mém. sur une manière nouvelle de pratiquer l'operation de la pierre, publ. p. L. J. Sanson et L. J. Begin. Paris. 1836. Fol. m. Abb.

Varietäten der Arterien.

Haller (Nr. 82.) Sömmering (Nr. 39.) Portal (Nr. 47.) J. F. Meckel (Nr. 56.) Münz (Nr. 58.) Tiedemann (Nr. 1496.) Langenbeck (Nr. 1456.)

1512. *J. F. Meckel* Handbuch der pathol. Anatomie 2r Bd. Leipz. 1818. 8. — Tabulae anat. pathologicae, Fasc. II. Lips. 1820.

1513. *A. W. Otto* Lehrb. der pathol. Anatomie. Berlin 1830. Bd. I. — Seltene Beobachtungen zur Anat. Physiol. u. Pathol. Bd. I. Breslau 1816. Bd. II. Berlin 1824. 4. m. Abb.

1514. *Nicolai* Diss. de directione vasorum, in Haller Disp. Vol. II.

1515. *Petsche* Sylloge observ. anatomicarum, in Haller Disp. Vol. VI.

1516. *J. C. Pohl* Observationes angiologicae. Lips. 1773. 4.

1517. *E. Sandifort* de notabil. vasorum aberrationibus, in Observ. anat. path. (Nr. 149.) Lib. IV.

1518. *J. C. Loder* Pr. de varietatibus arteriarum. Jen. 1781. 4.

1519. *A. Burns* Obs. on some of the most frequent and most important diseases of the heart etc. Edinb. 1809. 8. — Von einigen der häufigsten und wichtigsten Herzkrankheiten (her. v. F. Nasse) Lemgo 1817. 8.

1520. *Zagorsky* in Mém. de l'ac. de St. Petersbourg. T. I. II.

1521. *Ryan* de Diss. quarundam arteriarum in c. h. distributione. Edinb. 1812. 8.

1522. *W. G. Kelch* Beiträge (Nr. 677.)

1523. *G. Fleischmann* Leichenöffnungen. Erlang. 1815. 8.

1524. *M. J. Schön* Diss. de nonnullarum arter. ortu et decursu abnom. Hal. 1823. 8.

1525. *G. Breschet* in Répertoire gén. (Nr. 174.) Vol. II.

1526. *R. Wagner* Beob. ursprünglicher Bildungsabweichungen, in Heusingers Zeitschr. (Nr. 175.) Bd. III. Hft. 3.

1527. *E. A. Lauth* in Mém. de la soc. d'histoire natur. de Strasbourg. Livr. II 1833.

1528. *J. J. Huber* de arcus aortae ramis, in Act. Helvet. T. VIII.

1529. *P. A. Böhmer* de quatuor et quinque ramis ex aorta adscendentibus. Hal. 1741.

1530. *Koberwein* Diss. de vasorum decursu abnormi. Viteb. 1810. 4.

1531. *M. J. Weber* (über Varietäten der Venen) in Meckels Arch. f. A. u. Phys. 1829.

1532. *J. C. Neubauer* resp. Erdmann Descriptio arteriae innominatae et thyreoideae imae, in Opp. (Nr. 154.)

1533. *A. Meckel* Dreifache Wirbelarterie, in Meckels Arch. f. A. u. Ph. 1828.

1534. *C. G. Ludwig* Pr. de variantibus art. brachialis ramis etc. Lips. 1767. 4.

1535. *F. Tiedemann* Beob. üb. die hohe Theilung der Armschlagader, in Denkschriften der Ak. d. W. zu München. Bd. VI.

1536. *J. F. Meckel* üb. d. regelwidrigen Verlauf der Armpulsadern, im Deutsch. Arch. Bd. II.

1537. *A. Monro II.* On the morbid anatomy of the human gullet, stomach and intestines. Edinb. 1811. 4. (üb. die Var. der Aa. epigastrica u. obturatoria) s. auch Hesselbach (Nr. 1511[b]) J. Cloquet (Nr. 717.) Seiler (Nr. 721.) Langenbeck (Nr. 716.)

1538. *Ch. Bell* in London med. a. phys. Journal 1826. Aug. — *Hawkins* in London med. a. surg. Journal 1833. Sept. — *J. Houston* in Dublin Hosp. Reports and Commun. Vol. IV. 1830. — (über A. femoralis bifida.)

Körpervenen.

1539. *A. C. Bock* Darstellung der Venen d. m. K. Leipz. 1823. 8. m. Abb. (Encykl. d. A. Nr. 60. Bd. V.)

1540. *G. Breschet* Recherches anat. phys. et pathol. sur le système veineux. à Paris (1829.) Fol. m. Abb.

Bei Loder (Nr. 94.) Caldani (Nr. 95) Mascagni (Nr. 98.) Langenbeck (Nr. 101.) finden sich originale Abb.

1541. *A. de Haller* de vasis cordis propriis (Nr. 1501.) *A. C. Thebesius* (Nr. 1479.)

1542. *C. F. Wolff* de orificio v. coronariae magnae, in Act. ac. sc. Petrop. 1777. Vol. 1.

1543. *G. Lauth* Spicilegium de vena cava superiore. Strasb. 1815. 4.

1544. *J. G. Walter* de venis capitis et colli, in Obs. (Nr. 148.)

1545. *J. B. Morgagni* de sinubus durae matris, in Advers. VI.

1546. *J. D. Santorini* in Obs. c. III. Haller Icon. anat. Fasc. I. — F. Vicq d'Azyr Traité (Nr. 323.) Breschet (Nr. 1540.) (Sinus durae matris:)

1547. *F. Rosenthal* de intimis cerebri venis, in Nov. act. phys. med. ac. Leop. Carol. N. C. T. XII.

1548. *J. T. Walter* de emissariis Santorini. Fcf. a. V. 1757. 4. — Santorini Nr. 1546.

1549. *G. Breschet* (V. diploicae) in Nov. act. ac. Leop. Carol. N. C. T. XIII. — Nr. 1540.

1550. *J. G. Walter* ad G. Hunterum de venis oculi. Berol. 1778. 4. — S. Th. Sömmering (Nr. 817.)

1551. *B. Eustachius* Tract. de vena quae ἄζυγος Graecis dicitur, in Opusc. (Nr. 108.)

1552. *J. M. Lancisi* de vena sine pari, in Opp. (Nr. 135.)

1553. *J. B. Morgagni* (V. azygos) in Advers. V.

1554. *B. S. Albin* Tabula vasis chyliferi cum vena azyga. Lgd. B. 1755. Fol. — Annot. ac. Lib. IV.

1555. *C. G. Stark* Comment. an. phys. de venae azygos natura, vi atque munere. Lips. (1835.) 4. c. tabb.

1556. *G. Breschet* Essai sur les veines du rhachis, in Concours etc. Paris 1819. 4. u. Nr. 1540.

1557. *B. S. Albin* (Venae spermaticae) in Annot. ac. Lib. II.

1558. *A. Monro II.* Diss. de testibus etc. (Nr. 1305.)

1559 a. *J. D. Santorini* in Observ. anat. c. X. (Venen des Penis, Labyrinthus venosus.)

1559 b. *J. G. Walter* (Vv. uterinae) von den Krankh. des Bauchfells und dem Schlagflusse. Berl. 1785. 4. *G. Hunter* Anatomia uteri gravidi. Lond. 1774. Fol.

1560. *E. Schneider* die Blutgefäfse der Uterus, in Jahrb. d. ärztl. Vereins in München, 1835.

1561. *G. E. Stahl* resp. *Jaetke* Diss. de vena portae, porta malorum etc. Hal. 1698. 4. in Haller Disp. Vol. III.

1562. *A. F. Walther* Pr. II. de vena portae exercitationes anat. Lips. 1739—40. in Haller Disp. Vol. III.

1563. *A. Murray* resp. *Frölich*, Delineatio sciagraphica venae portae. Upsal. 1796. 4.

1564 a. *K. Hönlein* Descriptio an. systematis venae portae in homine et quibusd. brutis. Mainz 1808. Fol. c. tabb.

1564 b. *A. Retzius* über die Verbindungen der Pfortader u. der unteren Hohlader, in Tiedemann u. Treviranus Zeitschrift (Nr. 173.) Bd. V. Hft. I. 1833.

Varietäten der Venen.

Breschet (Nr. 1540.) und die bei den Varietäten der Arterien S. 819. angeführten Schriften von Meckel, Langenbeck, Otto, Petsche, Pohl, Sandifort, Kelch, Fleischmann, Breschet.

1565. *J. F. Meckel* üb. den Verlauf der Arterien u. d. Venen, im Deutsch. Archiv Bd. I.

1566. *M. J. Weber* über Varietäten der Venen in Meckels Archiv f. A. u. Phys. 1829.

1567. *A. Murray* (Herzvenen und obere Hohlvene) in Svenska Vetenskaps Acad. nya Handlingar. 1781.

1568. *P. A. Böhmer* resp. *Theune* Diss. de confluxu trium cavarum in dextro cordis atrio. Hal. 1763. 4. — Obs. an. (Nr. 141.) Fasc. I.

1569. *J. B. Morgagni* Epist. XV. (V. subclavia.)

1570. *P. Camper* Demonstrat. (Nr. 146.) (Vv. brachii.)

1571. *L. Heister* de singulari ac pulchra distributione v. azygos, in Ephem. N. C. cent. VII. VIII.

1572. *J. C. Wilde* de vena azygos trunco duplici, in Com. ac. sc. Petropol. Vol. XII.

1573. *H. A. Wrisberg* Obs. an. de vena azyga duplici, in Comment. (Nr. 156.)

1574. *C. G. Stark.* (Nr. 1555.)

1575. *E. F. Gurlt* (untere Hohlvene) Diss. de venarum deformitatibus. Vratisl. 1819. 4.

1576. *M. J. Weber* (untere Hohlvene) in Rust's Magazin Bd. XV.

1477. *Menière* (Verbindung der Vv. iliacae mit der Pfortader) in Archives gén. de Méd. 1826. Avril.

1578. *Peygot* (desgl.) Müllers Archiv 1834.

Vasa pulmonalia.

1579. *J. B. Morgagni* Advers. V.

1580. *J. D. Santorini* Observ. anat. c. VIII.

1581. *S. Aurivillius* Nr. 1468.

1582. *J. F. H. Albers* über die verschiedene Weite der beiden Zweige der A. pulmonalis, in Rust's Magazin Bd. 42. Hft. 1.

1583. *A. F. J. C. Mayer* über die Klappen in den Lungenvenen, in Tiedemann und Treviranus Zeitschrift (Nr. 173.) Bd. III.

Varietäten, vorzüglich in Hinsicht ihrer Verbindung mit den Gefäſsen des groſsen Kreislaufes und der Zahl der Lungenvenen, s. bei Meckel (Nr. 56. Bd. III. Nr. 1512.) Otto (Nr. 1513.)

Lymphgefäſssystem.

1584. *C. Asellius* de lactibus s. lacteis venis etc. Mediol. 1627. 4. u. in Manget Theatr. (Nr. 117.)

1585. *Th. Bartholinus* de lacteis thoracicis historia anat. Hafn. 1652. 4. u. a. m. — Opusc. nova anat. de lacteis thoracicis et lymphaticis vasis. Hafn. et Fcft. 1670. 8.

1586. *O. Rudbeck* Nova exercitatio anat. exhibens ductus hepatis aquosos et vasa glandularum serosa. Aros. 1653. 4. — De sero ejusque vasis. Ups. 1661. 4. u. in Haller Disp. Vol. VII.

1587. *S. Hemsterhuys* Messis aurea. Lgd. B. 1654. 12. (enthält die Schriften von Th. Bartholin und Rudbeck.)

1588. *J. Riolan* Opusc. nova anat. Paris. 1635. 8.

1589. *R. Hale* in Philos. Transact. 1720.

1590. *J. G. Duvernoy* Descr. vasorum chyliferorum, in Com. ac. sc. Petropol. Vol. I.

1591. *A. Ferrein* in Mém. de l'ac. de Paris. 1738. 1741.

1592. *A. Monro I.* u. *J. F. Meckel* sen. Opusc. anat. de vasis lymphaticis. Lips. 1760. 8. (Nr. 299. 300.)

1593. *W. Hewson* Experimental inquiries into the properties of the blood. Part. II. Lond. 1774. 8. (Nr. 282.)

1594. *P. C. F. Werner* et *C. G. Feller* Vasorum lacteorum et lymphat. anat. phys. descriptio. Fasc. I. Lips. 1784. 4. c. tabb.

1595. *J. Sheldon* The history of the absorbent system. Part. I. Lond. 1784. Fol.

1596. *W. Cruikshank* The anatomy of the absorbing vessels of the human body. Lond. 1786. 4. — 1791. 4. m. Abb. Deutsch v. C. F. Ludwig. Leipz. 1794. 4.

1597. *P. Mascagni* Vasorum lymphaticorum c. h. historia et ichnographia. Senis 1787. Fol. m. Abb.

1598. *E. A. Lauth* Essai sur les vaisseaux lymphatiques. Strasb. 1824. 4.

1599. *A. C. Bock* Darstellung der Saugadern des m. K. Leipzig 1828. 8. m. Abb. in 4. nach Mascagni. (Allg. Encycl. Nr. 60. Bd. VI.)

1600. *J. F. Meckel* S. Th. Sömmeringio gratulatur. Lips. 1828. Fol. m. Abb.

1601. *G. Breschet* Le système lymphatique, consideré sous les rapports anatomique, phys. et pathol. à Paris 1836. 8. m. Abb.

Einzelne Abtheilungen, Ductus thoracicus.

1602. *J. Pecquet* Experimenta nova anat. quibus incognitum hactenus chyli receptaculum et vasa lactea detegunter. Paris 1651. 4. u. in Manget Bibl. (Nr. 19.) Mém. de l'ac. de Paris T. I. u. X. 1667. 1699. (1733. Vol. I.)

1603. *J. v. Horne* Novus ductus chyliferus delineatus etc. Lgd. B. 1652. 4.

1604. *J. A. Wedel* Diss. de valvula venae subclaviae ductui thoracico imposita. Jen. 1714. in Haller Disp. Vol. I.

1605. *A. F. Walther* Observ. an. tres de ductu thoracico bipartito etc. Lips. 1734. 4. u. in Haller Disp. Vol. I.

1606. *F. J. Hunauld* Obs. sur les vaisseaux lymph. dans le poumon de l'homme, in Mém. de l'ac. de Paris. 1734.

1607. *A. de Haller* resp. *Bussmann* obs. de ductu thoracico. Gött. 1741. — Opp. min. T. I.

1608. *B. S. Albin* Tabula vasis chyliferi cum vena azyga etc. Lgd. B. 1757. Fol. — De insertione ductus chyliferi in vena azygos, in Annot. ac. Lib. IV.

1609. *A. Monro I.* Description of the hum. lacteal sack and duct, in dess. Works, art. VIII. und in Nr. 318.

1610. *A. Portal* Remarques sur la structure du canal thorachique, in Mém. de l'ac. de Paris. 1770.

1611. *J. Bang* de variationibus in ductu thoracico visis, in Collect. soc. med. Hafniensis Vol. I. 1774.

1612. *R. B. Sabatier* Remarques sur le canal thorachique de l'homme, in Mém. de l'ac. de Paris 1780.

1613. *J. G. Haase* de vasis cutis et intestinorum absorbentibus, plexibusque lymph. pelvis hum. annot. anat. c. icon. Lips. 1786. Fol.

1614. *S. Th. Sömmering* de trunco vertebrali vasorum absorbentium c. h. in Com. soc. reg. sc. Göttingen. Vol. XIII. 1795—98.

1615. *V. Fohmann* Mém. sur les vaisseaux lymphat. de la peau, des membranes muqueuses, séreuses, du tissu nerveux et musculaire etc. à Liege 1833. 4.

1616. *E. A. Lauth* in Mém. de la soc. d'hist. natur. de Strasbourg. T. I.

1617. *C. W. Wutzer* Einmündung des Ductus thoracicus in die V. azygos, in Müllers Archiv. 1834.

Fünftes Buch.

Vom Nervensystem.

Vom Nervensystem.
Nervenlehre. Neurologia.

Centraltheil des Nervensystems. Centrum encephalo-spinale.

Rückenmark, Medulla spinalis.

Das Rückenmark, Medulla spinalis s. dorsalis, liegt, von seinen Häuten umschlossen, locker im Hals- und Brusttheile des Canalis spinalis, den es bei Weitem nicht ausfüllt, und reicht vom Foramen magnum occipitale an bis in den ersten Bauchwirbel, selten bis in den zweiten herab. Es hat eine beinahe cylindrische, jedoch vorn und hinten abgeplattete Gestalt; seine Länge beträgt 15½″ bis 17½″, seine Dicke von vorn nach hinten 4‴; seine Breite oder Queerdm. 4½‴ bis 5‴, ist indessen nicht an allen Stellen gleich; sie nimmt nämlich in den Halswirbeln von oben nach unten zu und wiederum ab, so dafs sie im sechsten Halswirbel 6‴ beträgt: und im zehnten bis zwölften Brustwirbel wächst der Queerdurchmesser von Neuem bis zu 5½‴. Diese breiteren Stellen nennt man die Hals- und Lendenanschwellung. Oberwärts geht das Rückenmark ununterbrochen und ohne deutliche Gränze in das verlängerte Mark oder den Markknopf, *Medulla oblongata*, über, welches das eigentliche, innerhalb der Schädelhöhle liegende und zum Encephalon gerechnete, obere Ende des Rückenmarkes ist: unterwärts endigt es mit einer stumpfen Spitze, dem Markzapfen, *Conus medullaris*, welcher meistens einfach kegelförmig und von vorn nach hinten plattgedrückt

ist, zuweilen aber an seiner äufsersten Spitze zu einem kleineren, durch flache seitliche Eindrücke abgegrenzten Knötchen anschwillt.

Das Gewicht des Rückenmarks beträgt 9 bis 10 Drachmen, das spec. Gewicht 1, 0343, der räumliche Inhalt ungefähr $1\frac{3}{4}$ Kub. Zoll.

Die beiden halbcylindrischen *Seitenhälften* des Rückenmarks werden in der Mitte durch einen schmalen, 1‴ dikken Streifen, *Commissura medullae spinalis*, mit einander vereinigt; vorn und hinten aber durch die engen, in der Mittellinie herablaufenden, vordere und hintere Rückenmarksspalten, Fissurae longitudinales s. medianae medullae spinalis, von einander getrennt, indem diese bis zur Commissur eindringen. Die *Fissura longitudinalis anterior* ist fast überall $1\frac{1}{4}$‴ tief, nur am oberen und unteren Ende des Rückenmarks flacher: die *Fissura longitudinalis posterior* ist $1\frac{1}{2}$‴ bis $1\frac{3}{4}$‴ tief und so schmal, dafs die Seitenhälften des Rückenmarks hier einander berühren: da indessen die Pia mater weniger tief in diese Spalte eindringt, so scheint sie flacher, als die vordere zu sein. — An jeder Seitenfläche des Rückenmarks laufen die flachen Seitenfurchen, *Sulci laterales*, herab: der Sulcus lateralis anterior ist am oberen und mittleren Theile des Rückenmarks 1‴ bis $1\frac{1}{2}$‴, am unteren Ende aber nur $\frac{1}{2}$‴ von der Fissura longitudinalis anterior entfernt; der Sulcus lateralis posterior 2‴ von der Fissura longitudinalis posterior: beide erstrecken sich beinahe längs des ganzen Rückenmarkes herab, sind ziemlich breit und enthalten die vorderen und hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven. Der flache und schmale Sulcus lateralis medius zwischen jenen beiden, $2\frac{1}{2}$‴ von der Fissura longitudinalis anterior entfernt, und der tiefere enge Sulcus lateralis postremus, zwischen dem Sulcus lateralis posterior und der Fissura longitudinalis posterior, $\frac{1}{2}$‴ von der letzteren entfernt, erstrecken sich nur über den Halstheil des Rückenmarks. Am unteren Ende der Medulla spinalis verschwinden zuerst die Sulci laterales anterior und posterior und endlich die Fissurae longitudinales und die Commissur, so dafs beide Seitenhälften innig verschmelzen.

Der äufsere Umfang des Rückenmarks, welcher den gröfsten Theil seiner Masse ausmacht, besteht aus weifser Marksubstanz: im Innern enthält es einen Kern von grauer Substanz, welcher überhaupt im mittleren und unteren Theile des Rückenmarks ansehnlicher im Verhältnifs zur Marksubstanz ist, als im oberen Theile. Der mittlere Theil des Kerns in der Commissur ist, wie diese selbst, ein schmaler platter Streifen: die beiden ansehnlicheren Seitentheile des Kerns, die durch den mittleren Streifen verbunden sind, liegen im Inneren der Seitenhälften des Rückenmarks und haben jeder die Gestalt eines rinnenförmigen Stranges, der auf dem Queerdurchschnitte ungefähr halbmondförmig sich darstellt: der äufsere Umfang dieses Kernstranges ist concav, der innere, gegen die Commissur gerichtete convex; nach vorn und hinten läuft er in dünnere Ränder oder Hörner aus. Das hintere Horn ist durch die ganze Länge des Rückenmarks schmaler und länger als das vordere und gegen den Sulcus lateralis posterior hin gerichtet, woselbst es beinahe die hintere Oberfläche des Rückenmarks erreicht. Das vordere Horn ist kürzer und breiter, gegen den Sulcus lateralis anterior gerichtet; im oberen Ende der Medulla spinalis und im 11ten Brustwirbel ist es breit und abgerundet, so dafs hier der Kern jeder Seitenhälfte, von vorn angesehen, wie ein rundlicher Strang erscheint. Im Halstheile des Rückenmarks zeigt sich noch ein mittleres, kurzes, gegen den Sulcus lateralis medius gerichtetes Horn: und aufserdem hin und wieder schmale, tiefer in die weifse Substanz hineinragende graue Streifen. — Sonach zeigt der ganze Kern auf der Durchschnittsfläche an den meisten Stellen die Figur zweier gezackter, durch einen Mittelstreifen vereinigten Halbmonde; am oberen Ende und 2″ oberhalb des Conus medullaris aber eine mehr hufeisenähnliche Gestalt.

Die Marksubstanz bekleidet den grauen Kern der Commissur mit einer dünnen vorderen und hinteren Platte, von welchen die letztere aus Längenfasern besteht, die erstere aber aus unregelmäfsigen gezackten Bündeln, welche von der rechten und linken Seite schräg gekreuzt in einander greifen. — Das Mark der Seitenhälften besteht aus longitudinalen, von sehr zartem Neurilema eingeschlossenen

Fasern und zerfällt auf jeder Seite in drei Hauptstränge, Funiculi s. columnae medullae spinalis. Der vordere Strang, *Funiculus anterior*, neben der Fissura longitudinalis anterior, hat am Halstheile des Rückenmarks vorn eine convexe, $2\frac{1}{2}$''' breite Fläche, auf welcher der Sulcus lateralis anterior verläuft: nach innen und hinten aber ebene Flächen: äufserlich wird er durch den Sulcus lateralis medius vom mittleren Strange geschieden. Der mittlere Strang, *Funiculus medius*, hat eine dreiseitige Gestalt; seine äufsere $2\frac{1}{2}$''' breite Fläche ist stark convex und bildet die seitliche Peripherie des Rückenmarks: nur am Halstheile desselben ist er in der Richtung des Sulcus lateralis medius von dem vorderen Strange zu trennen, weiter abwärts verschmilzt er mit diesem: so dafs am mittleren und unteren Theile des Rückenmarks der ganze vordere und äufsere, gröfsere Theil der Seitenhälfte aus dem vereinigten vorderen und mittleren Strange besteht. Der hintere Strang, *Funiculus posterior*, neben der Fissura longitudinalis posterior, ist dreiseitig, keilförmig, mit hinterer convexer Fläche; er ist durch die ganze Länge des Rückenmarks von dem mittleren Strange und von den vereinigten mittleren und vorderen durch den Sulcus lateralis posterior und das hintere Horn des Kerns geschieden. — Am unteren Ende der Medulla spinalis verschmelzen zuerst auf jeder Seite die vorderen und hinteren Stränge, endlich auch die Seitenhälften selbst: am oberen Ende erscheinen dagegen neben den Hauptsträngen noch neue Bündel. Im ersten, oft schon im zweiten oder dritten Halswirbel, entwickelt sich nämlich an der inneren Seite des vorderen Stranges, aus der Fissura longitudinalis anterior hervordringend, das *Pyramidenbündel*, *Fasciculus pyramidis*, welches anfänglich schmal ist, aber im Aufsteigen breiter wird, die Vorderfläche des vorderen Stranges gröfstentheils einnimmt und an der Medulla oblongata zur Pyramide anschwillt. Das rechte und linke Pyramidenbündel durchkreuzen einander innerhalb des Atlas und an der Stelle des Übergangs des Rückenmarks in die Medulla oblongata, vermittelst mehrerer, drei bis sechs, $\frac{1}{2}$''' bis 1''' breiter Bündel, Fasciculi decussantes, welche in schräg aufsteigender Richtung einander durchkreuzend, durch die vordere Rückenmarksspalte zur entgegengesetzten

Seite hinübergehen: daher die Fissura longitudinalis anterior an der Stelle dieser Kreuzung, *Decussatio pyramidum*, sehr flach erscheint. — An der inneren Seite des hinteren Stranges, unmittelbar neben der Fissura longitudinalis posterior, erscheint längs des ganzen Halstheils des Rückenmarks, der nur ½‴ breite, zarte Strang, *Funiculus gracilis* (Burdach), welcher im Aufsteigen breiter wird und von dem gröfseren äufseren Theile des hinteren Stranges, dem Keilstrange (Burdach), durch den Sulcus postremus getrennt wird.

Hirn, Encephalon.

Das Hirn oder Gehirn ist die in der Schädelhöhle eingeschlossene gröfsere Abtheilung des Centralorgans des Nervensystems, welches theils durch eine weitere Entfaltung und Entwickelung der Theile des Rückenmarks, theils durch neu hinzukommende Gebilde zusammengesetzt wird. Es hat eine länglich rundliche, beinahe eiförmige, dem innern Raume der Schädelhöhle entsprechende Gestalt, füllt diese Höhle genau aus, und mifst in seiner gröfsten Länge von vorn nach hinten 6″ bis 6½″, in der gröfsten Breite 5″, in der gröfsten Höhe 4½″, wiegt im Mittel bei Weibern 44, bei Männern 48 Unzen und hat ein Volumen von 65½ bis 71¼ Kub. Zoll. Es zerfällt in einen oberen gröfseren Theil, das grofse Gehirn, Cerebrum: in einen unteren hinteren, das kleine Gehirn, Cerebellum: und in einen mittleren unteren, das Mittelgehirn, Mesencephalon, welcher letztere das Verbindungsglied zwischen dem Rückenmark, dem kleinen Gehirn und dem grofsen Gehirn darstellt.

Mittelgehirn, Mesencephalon.

Es nimmt die Mitte der hinteren Abtheilung der Schädelgrundfläche ein und ragt vom Foramen magnum occipitale bis zur Höhe der Proc. clinoidei posteriores und etwas über den Ausschnitt des Tentorium cerebelli herauf. Es hat eine längliche Gestalt, ein Gewicht von mehr als

7 Drachmen, ein spec. Gewicht von 1,0387, ein Volumen von $1\frac{1}{4}$ Kub. Zoll: macht daher $\frac{1}{57}$ der ganzen Masse des Encephalon aus. Es zerfällt in drei, von unten nach oben und vorn auf einander folgende Abtheilungen: das verlängerte Mark, die Brücke und die Vierhügel.

1) *Medulla oblongata, das verlängerte Mark,* oder der Markknopf, die Markzwiebel, Bulbus rhachidicus, reicht vom For. magnum occipitale bis zur Mitte des Clivus herauf, hinter welchem es zwischen den Proc. anonymi oss. occipitis liegt. Es hat die Gestalt eines mit der Spitze nach unten gerichteten abgestutzten Kegels, ist 10‴ lang, oben und hinten 1″, unten 8‴ breit, und 7‴ von vorn nach hinten dick, 100 Gran schwer, hat ein Volumen von $\frac{3}{10}$ Kub. Zoll. Es besteht fast gänzlich aus weifser Marksubstanz: oben grenzt es an die Brücke und das kleine Gehirn, unten hängt es ununterbrochen mit dem Rückenmark zusammen: als unmittelbare Fortsetzung desselben ist es durch die Fissura longitudinalis anterior und posterior in die beiden Seitenhälften getheilt, an deren jeder die drei Hauptstränge nebst Nebensträngen deutlicher hervortreten.

An den beiden vorderen Hauptsträngen werden die Pyramidenbündel (S. 832.) durch mehrere, von der Commissur und vom vorderen Theile des Kerns ausgehende Bündel verstärkt, werden dadurch breiter und dicker hervorragend, und bilden die Pyramiden des verlängerten Markes,, *Pyramides medullae oblongatae* s. *Corpora pyramidalia* s. Pyramides anteriores: deren untere schmalere Enden schon an dem Rückenmarke, woselbst sie decussiren, sichtbar sind. Die oberen breiteren Enden der Pyramiden gehen auf die Brücke zu und ziehen sich, bevor sie in den unteren Rand derselben eintreten, wieder etwas zusammen: so dafs sie äufserlich von dem Pons Varolii durch eine Queerfurche, übrigens von einander durch die fortgesetzte, 2‴ tiefe, vordere Rückenmarksspalte getrennt werden, die unter der Brücke zu einer dreieckigen Grube, *Foramen coecum,* sich erweitert. Jedoch werden sie zuweilen oberhalb der Decussation noch durch einzelne schmale Queerbündel vereinigt. — Die äufseren Bündel der vorderen Stränge, welche am Rückenmarke die vordere Fläche desselben einnehmen, werden von den Pyramiden stark nach aufsen, gegen die mittleren Stränge

und die Oliven hin, und in die Tiefe verdrängt, so dafs sie hier nur als ein sehr schmaler Streifen erscheinen (Burdach's innere Hülsenstränge): zwischen diese und die Pyramiden schiebt sich eine dünne Schicht graue Substanz ein, eine Fortsetzung des vorderen Horns des grauen Kerns der Medulla oblongata.

Die mittleren Stränge springen an der Medulla oblongata wenig hervor, sind flacher als am Rückenmark, und treten nach aufsen und hinten von den Pyramiden in den unteren Rand und die hintere oder obere Fläche des Pons Varolii. Am oberen vorderen Theile jedes mittleren Stranges ragt ein ovaler, stark gewölbter Körper hervor — die Oliven, *Olivae*, s. *Corpora olivaria*: sie stehen scharf begränzt 1‴ hoch über die Oberfläche der mittleren Stränge hervor, sind 5‴ bis 6‴ lang und 2‴ breit, gränzen vorn fast unmittelbar an die Pyramiden und werden von ihnen durch eine flache Furche, (deren Boden vom inneren Hülsenstrange gebildet wird) getrennt. Ihre oberen Enden bleiben 1‴ vom Pons Varolii entfernt: hinten werden sie von den äufseren, etwas gekrümmten Longitudinalfasern der mittleren Stränge (äufserer Hülsenstrang und vorderer Theil des Seitenstranges nach Burdach) umgeben. Ihr unterer Umfang wird häufig durch ein oberflächliches schmales Faserbündel, Processus arciformis, bezeichnet, welches hinter der Pyramide beginnend, um die untere Hälfte der Olive sich krümmt und hinter derselben aufsteigt. Äufserlich werden die Oliven von einer dünnen weifsen Markschicht gebildet: im Inneren enthalten sie einen weifsen, unregelmäfsig gestalteten, von einer wellenförmigen Schicht grauer Substanz umkleideten Kern, welcher daher auf dem Durchschnitte einen gezackten Umrifs darbietet: d. i. der Olivenkern, *Nucleus olivae* s. Corpus rhomboideum s. dentatum Olivae. Seine graue Substanz steht mit der des vorderen Stranges in Verbindung: von seiner inneren Seite, in der Tiefe der Substanz des mittleren Stranges, geht das Olivenkernbündel, *Fasciculus nuclei olivae*, aus, welcher nach oben an die hintere Fläche des Pons Varolii eindringt.

Die hinteren Hauptstränge der Medulla oblongata steigen anfangs, durch die Fissura longitudinalis posterior geschieden, gerade aufwärts, divergiren alsdann beträchtlich

seitwärts und biegen sich nach hinten um, indem sie zu dicken halbrundlichen Strängen anschwellen: diese werden die strangförmigen Körper oder seitlichen Pyramiden, *Corpora restiformia* s. Pyramides laterales genannt. Sie dringen nach hinten und oben in die Markkörper der Hemisphären des kleinen Gehirns und heifsen in dieser Beziehung Crura cerebelli ad medullam oblongatam s. Pedunculi cerebelli. Das Corpus restiforme auf jeder Seite wird vorzüglich von dem äufseren gröfseren Theile des hinteren Hauptstranges, dem Keilstrange, *Fasc. cuneatus* nach Burdach, gebildet: der innere schmale Theil, der zarte Strang, *Fasc. gracilis* Burd. (S. 833.) schwillt am unteren Ende des Corpus restiforme zu einer länglichen, oben dickeren Hervorragung an, die Keule, *Clava* s. Pyramis posterior genannt; und breitet sich von ihrem oberen Ende an, als eine dünne Schicht in die innere und vordere Fläche des Corpus restiforme aus.

Durch das Auseinanderweichen der Corpora restiformia erweitert sich die Fissura longitudinalis posterior des verlängerten Markes zu einer dreieckigen Vertiefung: d. i. die Rautengrube, *Sinus rhomboideus* s. *Fovea rhomboidalis* s. Ventriculus Arantii s. Calamus scriptorius. Diese liegt an der hinteren Fläche der Medulla oblongata: ihr nach vorn und unten liegender Boden wird von den beiden mittleren Hauptsträngen, die eine tiefe Längenspalte zwischen sich lassen, zusammengesetzt: seitwärts wird sie von den Corpora restiformia und den Ausbreitungen der zarten Stränge eingefafst: nach unten geht sie zwischen den Clavae zugespitzt in die Fissura longit. posterior des verlängerten Markes über und wird hier von einem kleinen dreieckigen Markblättchen, dem Riegel, Obex, welches queer von der einen Clava zur andern hinübergeht, nach hinten geschlossen: nach oben flieſst sie erweitert mit der vierten Hirnhöhle, Ventriculus quartus, zusammen und bildet das untere Ende dieser Höhle. Nach hinten erhält sie, aufser dem Riegel, noch zu beiden Seiten eine unvollständige Begränzung durch zwei schmale, aufwärts gerichtete Markblättchen, die von den Fortsetzungen der Clavae ausgehen: die Brückchen der Rautengrube, *Vela* s. Ponticuli *sinus rhomboidei*: sie werden von der Pia mater gestützt, welche zwischen ihnen den

Sinus rhomboideus von hinten her schliefst. — Der Boden des Sinus rhomboideus ist mit einer besonderen Schicht von grauer, mit weifsen Streifen durchzogener Substanz belegt, die man als ein plattes Hirnganglion betrachten kann. Diese graue Schicht, *Lamina cinerea sinus rhomboidei*, welche sich weit aufwärts auf dem Boden der vierten Hirnhöhle erstreckt, ist eine Ausbreitung des hinteren Theiles des grauen Kernstranges des Rückenmarks: die weifsen Streifen, *Striae medullares*, sind von sehr verschiedener Anzahl und Breite; laufen von der Längenspalte an, woselbst sie mit denen der anderen Seite nicht zusammenhangen, schräg nach oben und aufsen, zum Theil auch wagerecht und nach unten und aufsen, gegen das obere Ende des Corpus restiforme hin: zwischen ihnen dringt die graue Substanz der Lamina cinerea als schmale graue Streifen oder Leisten, *Fasciolae cinereae*, stärker hervor.

2) *Pons Varolii, die Brücke*, s. Nodus cerebri s. Protuberantia annularis s. Commissura cerebelli, der Hirnknoten, die ringförmige Erhabenheit, ist nach der Länge des Mesencephalon die mittlere und gröfste Abtheilung desselben: liegt in etwas schräg nach vorn geneigter Richtung auf dem Clivus bis zur Sattellehne hinauf, über und vor der Medulla oblongata, unter der Eminentia quadrigemina, vor dem kleinen Gehirn, unter dem grofsen Gehirn. Sie hat eine abgerundet viereckige Gestalt, ist von unten und hinten nach oben und vorn 13‴ lang, 16‴ breit und von vorn nach hinten 11‴ dick; ihr Gewicht beträgt 4½ Drachmen, ihr Volumen ⅘ Kub. Zoll. Sie ist äufserlich von weifser Farbe und überhaupt von derber härtlicher Consistenz. Die vordere (untere) gegen den Clivus hin gerichtete Fläche ist stark convex, in der Mitte mit einer breiten flachen Longitudinalfurche versehen und durch viele schmale, etwas gebogene Queerfurchen ausgezeichnet. Der untere (hintere) Rand ist convex, in der Mitte aber, woselbst er das For. coecum medullae oblongatae begränzt, concav: er ragt über die in ihn eindringenden Pyramiden und mittleren Stränge des verlängerten Markes stark hervor. Der obere (vordere) Rand ist in der Mitte noch tiefer ausgeschweift, seitwärts gleichfalls convex und mit den Pedunculi cerebri verbunden, über welche er nach vorn

hervorragt. Die Seitenflächen des Pons gehen verschmälert und ohne deutliche Grenze in die Crura cerebelli ad pontem über. Die hintere (obere) Fläche, über welche in der Mittellinie die fortgesetzte Fissura longitudinalis posterior des verlängerten Markes verläuft, liegt grofsentheils vor und unter dem Mitteltheile des kleinen Gehirns ziemlich frei, indem sie den Boden der vierten Hirnhöhle bildet: ist zu beiden Seiten dieser Höhle mit den Crura cerebelli ad eminentiam quadrigeminam verbunden: auf dem oberen Theile dieser hinteren Fläche sitzt die Eminentia quadrigemina auf.

Der Pons Varolii ist aus abwechselnden Lagen und Schichten weifser und grauer Substanz zusammengesetzt, von denen die erstere reichlicher vorhanden ist und theils aus transversalen Faserschichten, die gröfstentheils den Crura cerebelli ad pontem angehören, besteht: theils aus paarweise vorhandenen Longitudinalbündeln, welche Fortsetzungen der vorderen und mittleren Stränge der Medulla oblongata sind. Von vorn nach hinten betrachtet besteht die erste Lage aus queerlaufenden Markbündeln, welche der Vorderfläche des Pons das queergereifte Ansehen geben und in die oberflächliche Bekleidung der Crura cerebelli ad pontem übergehen: auf diese folgt graue, von zahlreichen, dünnen, queerlaufenden Markschichten durchzogene Substanz. In einer Tiefe von $1\frac{1}{2}$‴ bis 2‴ hinter der Vorderfläche zeigt sich in jeder Seitenhälfte der Brücke ein ansehnliches, 4‴ dickes Bündel longitudinaler Markfasern, die an der vorderen und hinteren Fläche des Bündels von Queerfasern und kleinen Schichten grauer Substanz durchschnitten werden. Diese Bündel, *die vorderen Pyramidenbündel* der Brücke, sind verstärkte Fortsetzungen der vorderen Fasern der Pyramiden: laufen nahe an der Mittellinie des Pons aufwärts, etwas divergirend und nach vorn gebogen, und gehen am vorderen Rande der Brücke in die Pedunculi cerebri über. Hinter diesen Bündeln liegt eine dicke Schicht grauer Substanz, von horizontalen, aus Queerfasern gebildeten, weifsen Blättern durchschnitten; diese kann man als den inneren Kern der Brücke ansehen. Hinter diesem Kern steigt in jeder Seitenhälfte eine Fortsezzung der hinteren Fasern der Pyramiden und des vorderen

Stranges der Medulla oblongata herauf, in Gestalt eines anehnlichen, etwas plattgedrückten und nach hinten gebogenen Bündels weifser Longitudinalfasern, die in die Pedunculi cerebri übergehen: man nennt sie *die hinteren Pyramidenbündel* der Brücke. Zwischen diesen und den vorderen Pyramidenbündeln ist der Kern der Brücke ziemlich vollständig eingeschlossen. — Die hintere Fläche des Pons wird von zwei Paaren platter Längenbündel zusammengesetzt, welche Fortsetzungen der mittleren Stränge der Medulla oblongata sind. Das innere Paar dieser Bündel, *Crura medullae oblongatae ad eminentiam quadrigeminam*, enthält Fasern vom vorderen Theil des mittleren Stranges, ist aber vorzüglich Fortsetzung des Olivenkernbündels (S. 835.) und läuft unter dem Boden des Ventriculus quartus, nahe an der Mittelspalte desselben, senkrecht nach oben und tritt in die Basis der Eminentia quadrigemina. Das äufsere Bündel auf jeder Seite, die *Schleife*, *Lemniscus* s. Laqueus, ist die Fortsetzung des hinteren, zwischen Olive und Corpus restiforme liegenden, Theiles des mittleren Stranges (des äufseren Hülsenstranges), geht hinter dem Anfange des vorigen und vor dem Crus cerebelli ad eminentiam quadrigeminam, nach aufsen von der vierten Hirnhöhle vorbei, steigt zwischen dem Crus cerebelli ad pontem und Crus cerebelli ad eminentiam quadrigeminam, alsdann um die äufsere Fläche des letzteren sich windend, aufwärts und etwas nach hinten: wird breiter und platter, und geht in die Seitenfläche und hinteren Hügel der Eminentia quadrigemina über.

3) *Eminentia quadrigemina s. bigemina, die Vierhügel*, s. Corpora quadrigemina, liegt auf dem vorderen Theile der hinteren Fläche des Pons Varolii, in dem Ausschnitte des Tentorium cerebelli, und bildet den obersten kleinsten Theil des Mesencephalon. Es ist ein rundlich sechsseitiger weifser Körper, an seiner Basis von vorn nach hinten 7‴ lang und 11‴ breit, 4‴ hoch; sein Gewicht beträgt eine Drachme, seine Masse $\frac{1}{6}$ Kub. Zoll. Er bietet den Bau der Hirnganglien dar, indem er gröfstentheils aus röthlich-grauer Substanz besteht und äufserlich von einer dünnen Marklage überzogen wird. Die obere, nach hinten gerichtete Fläche liegt ganz frei (vor dem Vermis cerebelli und unter dem Splenium corporis

callosi) und ist durch eine kreuzförmige Furche in vier Hügel getheilt: die vorderen, gröfseren, rundlichen *Colliculi anteriores* s. Nates und die hinteren, niedriger liegenden, von vorn nach hinten etwas abgeplatteten, kleineren Hügel, *Colliculi posteriores* s. Testes. — Die breitere *Basis* der Eminentia quadrigemina ist mit der oberen Fläche des Pons und den hinteren Enden der Pedunculi cerebri innig verschmolzen und nimmt die Fasern der Crura medullae oblongatae ad eminentiam quadrigeminam auf, welche von hier in die Substantia perforata media des grofsen Gehirns sich fortsetzen und vorzüglich die Wände eines rundlich vierseitigen Kanals bilden, der sog. Wasserleitung, *Aquaeductus Sylvii*: welcher von unten und hinten nach vorn und oben, mitten durch die Basis der Eminentia quadrigemina dringt und die vierte Hirnhöhle mit der dritten verbindet. Die hintere und vordere Mündung dieses Kanals sind etwas enger als der mittlere, nach beiden Seiten etwas erweiterte Theil desselben: an seiner oberen Wand zeigt sich ein länglicher, schmaler, nach hinten zugespitzter Vorsprung. Die Seitenflächen der Eminentia quadrigemina und die vorderen und hinteren Hügel nehmen die Fasern der Lemnisci auf, welche von hier verstärkt zu den hinteren Hirnganglien übergehen: aufserdem fliefsen die Vorderfläche und die vorderen Hügel vorn mit der Commissura posterior cerebri, seitwärts mit den hinteren Hirnganglien zusammen. Die hintere Fläche und hinteren Hügel vereinigen sich mit den Crura cerebelli ad eminentiam quadrigeminam und mit dem Velum medullare anterius: mit dem letzteren vermittelst eines schmalen, jedoch ziemlich dicken Markstreifens, Frenulum veli medullaris anterioris, welcher aus der Furche zwischen den hinteren Hügeln entspringt. Auf diese Weise verknüpft die, gewöhnlich zum grofsen Gehirn gezählte Eminentia quadrigemina die Medulla oblongata, den Pons Varolii, das kleine und das grofse Gehirn, vielfach und genau unter einander.

Kleines Gehirn, Cerebellum.

Das kleine Gehirn oder Hirnlein füllt die hintere Abtheilung der Basis cranii gröfstentheils aus, ruhet nach

unten und hinten vorzüglich in den Fossae occipitales inferiores und reicht mit seinem erhabensten Theile beinahe zu gleicher Höhe mit der oberen Ecke des Hinterhauptbeins herauf: ist nach vorn mit dem Mesencephalon verbunden, gränzt nach oben an die hinteren Lappen des grofsen Gehirns, von welchen es jedoch durch das Tentorium cerebelli getrennt wird. Es hat ungefähr die Gestalt eines, mit seinem gröfsten Durchmesser queerliegenden Elliptoids, dessen vorderer und hinterer Umfang aber in der Mitte eingebogen ist: wendet seine gröfsten Flächen nach oben und unten, und ist von breiten abgerundeten Rändern umgeben, die überall stark convex, in der Mitte aber vorn und hinten concav sind. Es ist in queerer Richtung $4\frac{1}{4}$ ″ breit, mifst von vorn nach hinten in der Mittellinie $1\frac{1}{2}$ ″, neben der Mittellinie aber $2\frac{1}{2}$ ″, und ist neben dieser 2″, an den Rändern aber nur $\frac{1}{2}$ ″ hoch: sein Gewicht beträgt $4\frac{1}{2}$ Unzen, sein spec. Gewicht 1,0415, sein Volumen $8\frac{1}{6}$ Kub. Zoll. Seine Gröfse ist in beiden Geschlechtern beinahe gleich: wegen der geringeren Gröfse des grofsen Gehirns der Weiber beträgt seine Masse bei diesen ungefähr $\frac{1}{8}$, bei Männern aber $\frac{1}{9}$ der ganzen Masse des Encephalon.

Das kleine Gehirn zerfällt in einen mittleren Theil und zwei Seitentheile oder Hemisphären: diese sind oberwärts von dem hieselbst stark hervorragenden mittleren Theile nicht deutlich geschieden und bilden mit ihm gemeinschaftlich die dachförmige, wenig gewölbte, zu beiden Seiten schräg herabsteigende obere Fläche des kleinen Gehirns. Vorn und hinten wird der Mitteltheil durch die concaven Stellen des Vorder- und Hinterrandes, den vorderen und hinteren (beutelförmigen) Ausschnitt, *Incisura marginalis anterior et posterior*, begränzt. An der unteren Fläche des kleinen Gehirns werden die beiden Hemisphären durch eine flache breite Spalte, *Scissura longitudinalis cerebelli*, oder das Thal, Vallecula, (Reil), von einander getrennt, in welcher die unteren Abtheilungen des Mitteltheiles liegen: sie erstreckt sich über und hinter dem Mesencephalon von vorn nach hinten, woselbst der hintere Ausschnitt noch zu ihr gehört; dagegen sie nach vorn das Dach der vierten Hirnhöhle bildet.

Hemisphaerae cerebelli.

Jede der beiden Hemisphaerae oder Hemisphaeria cerebelli hat ziemlich die Gestalt eines halben Elliptoids, ist an ihrem inneren dickeren Theil mit dem Mitteltheil verschmolzen, übrigens durch einen vorderen, einen äufseren und einen hinteren Rand begränzt, welche abgerundet in einander übergehen und neben dem vorderen und hinteren Ausschnitt stumpfe Ecken bilden. Die obere Fläche ist ziemlich eben und senkt sich schräg gegen die Ränder herab; die untere Fläche ist stark convex und zeigt nur eine, von vorn und aufsen nach hinten und innen gerichtete, flache Vertiefung, welche dem Proc. anonymus und dem Rande des For. magnum occipitale entspricht. In ihrem Innern enthält die Hemisphäre einen Markkörper, welcher durch drei Schenkel mit dem Mesencephalon zusammenhängt: äufserlich zerfällt sie durch tiefere Furchen in Lappen, welche aus zahlreichen gebogenen Blättern zusammengesetzt sind. Die Ränder dieser, mit grauer Substanz belegten Blätter erscheinen an der Oberfläche der Hemisphären als 1‴ bis 1½‴ breite Randwülste, *Gyri cerebelli*, und werden durch enge, 1‴ bis 6‴ tief zwischen die Blätter eindringende Furchen, *Sulci cerebelli*, von einander getrennt. Sowohl der Markkörper als die Gyri hangen mit dem Markkörper und den Gyri des Mitteltheils ununterbrochen zusammen.

1) *Lappen.* Die Hemisphäre wird äufserlich durch die grofse Horizontalfurche, *Sulcus magnus horizontalis* s. Fossa peduncularis, in eine obere und untere Hälfte getheilt: diese läuft am vorderen, äufseren und hinteren Rande der Hemisphäre, erstreckt sich vorn bis zum Seitenrande des Pons, hinten bis in die Incisura marginalis posterior, und dringt 1″ tief, die oberen und unteren Lappen von einander trennend, ein. — Die obere Hälfte zerfällt durch den 7‴ tiefen *Sulcus superior* in zwei Lappen: 1) *Lobus superior anterior* s. quadrangularis, vorderer Oberlappen, ungleich vierseitig, nach innen breiter, nach aufsen schmaler: seine Blätter und Gyri laufen von innen und hinten nach aufsen und vorn. Die vordersten kurzen Gyri dieser Lappen bilden den sog. Flügel des Centralläppchens, *Ala lobuli centralis.* 2) *Lobus superior posterior* s. semilu-

naris, hinterer Oberlappen, halbmondförmig, nach innen schmaler, nach aufsen breiter: seine Gyri gehen in stark nach hinten convexen Bögen von innen und hinten nach aufsen und vorn. — Die untere Hälfte der Hemisphäre enthält vier Lappen: 1) *Lobus inferior posterior* s. semilunaris, hinterer Unterlappen, liegt unter dem Lobus superior posterior und unter der grofsen Horizontalfurche; hat eine halbmondförmige Gestalt und stark nach hinten und aufsen gekrümmte Gyri; ist an seinem inneren Ende, neben der Incisura marginalis posterior, dicker als am äufseren Ende. 2) *Lobus inferior anterior* s. biventer s. cuneiformis, vorderer Unterlappen, wird von dem vorigen durch den 6‴ tiefen *Sulcus inferior externus* getrennt, ist keilförmig, nach aufsen und vorn breit, nach innen und hinten, gegen die Scissura longitudinalis hin, schmal; seine Gyri laufen leicht nach aufsen gebogen von hinten nach vorn. Der hintere äufsere Theil dieses Lappens wird der zarte Lappen, oder Lobus inferior medius s. gracilis, genannt; der vordere innere ragt an der unteren Fläche der Hemisphäre, über dem Seitenrande des Hinterhauptloches und hinter der Medulla oblongata, stark abwärts. 3) *Tonsilla cerebelli* s. Lobus inferior internus, die Mandel, liegt hinter dem Corpus restiforme an der inneren Seite des vorigen, durch den *Sulcus inferior internus* von ihm getrennt; ist unterwärts länglich rundlich, dick, mit von vorn nach hinten laufenden und nach innen gebogenen Gyri versehen; nach oben, gegen die Scissura longitudinalis hin, wird sie schmaler und dünner. 4) *Flocculus* s. Floccus, die Flocke, ist der kleinste Lappen der Hemisphäre, liegt vor der Mandel und dem Lobus inferior anterior, vor dem Crus cerebelli ad pontem, unter dem vorderen Ende des Lobus superior anterior: nach vorn, unten und zu beiden Seiten erscheint er von kurzen grauen Gyri gebildet; oberwärts hängt er an dem schmalen, platten, markigen Flockenstiel, *Pedunculus flocculi*, welcher an der inneren Seite der Tonsilla, hinter dem Crus cerebelli ad pontem und dem Corpus restiforme herabsteigt und an der hinteren Fläche des Flocculus zwischen den Gyri sichtbar bleibt.

2) *Corpus medullare hemisphaerae cerebelli*, der Markkörper der Hemisphäre des kleinen Gehirns, oder

das Marklager, entspricht in seiner Gestalt ungefähr der Gestalt der Hemisphäre selbst, ist von oben nach unten plattgedrückt, an seinem inneren und vorderen Theile beträchtlich dicker (8 ‴) als an seinem äufseren und hinteren Umfange, und erstreckt sich horizontal in der Masse der Hemisphäre von innen und vorn nach aufsen und hinten, ungefähr in gleicher Entfernung zwischen der oberen und unteren Oberfläche, reicht aber weiter zum vorderen als zum hinteren Rande. In seinem inneren vorderen Theile liegt der länglich-plattrunde Kern, *Nucleus cerebelli* s. *Corpus rhomboideum* s. *ciliare* s. dentatum s. fimbriatum: eine Markmasse mit höckeriger Oberfläche, die von einer Schicht grauer Substanz eingehüllt wird und sich auf der Durchschnittsfläche als ein weifser, von einem gezackten grauen Saume umgebener Körper darstellt. Nach innen ist der Markkörper der Hemisphäre mit dem Markkörper des Wurms verschmolzen, nach innen und vorn vereinigt er sich mit dem Mesencephalon durch drei dicke Bündel, Schenkel oder Arme, Crura cerebelli, genannt. Von der oberen und unteren Fläche bis zum äufseren Rande hin, so wie vom hinteren Rande, gehen dicke Markblätter oder platte Markstämme aus, gegen die Oberfläche der Hemisphäre hin, welche die markige Grundlage der gröfseren Lappen bilden, alsdann durch mehrmalige Spaltung in dünnere Markblätter, Laminae medullares, sich theilen, an ihren Flächen und ihrem freien peripherischen Rande von grauer Substanz belegt und durch die flacheren Sulci getrennt sind: auf diese Weise werden die einander ziemlich parallelen und gröfstentheils nach hinten und aufsen gebogenen Gyri der Oberfläche gebildet. Bricht man die Blätter und Blättchen ab, so erscheinen da, wo sie von dem Markkörper oder von den dickeren Blättern ausgehen, erhabene Streifen, sog. Riffe, welche die Basis der Blätter bilden und durch seichte Furchen getrennt werden: daher die Oberfläche des von den Blättern befreieten Markkörpers ein wellenförmiges Ansehen darbietet. Diese baumförmige Vertheilung des Markkörpers in die Lappen und Gyri nennt man den Markbaum der Hemisphäre, *Arbor medullaris hemisphaerae cerebelli* s. *Arbor vitae*; die dickeren Markblätter oder Markstämme sind die Äste, die dünneren nicht mehr getheilten Blätter sind die

Blätter des Markbaums. Die Anzahl der Äste wechselt zwischen 10 und 15: der oberste vorderste gehört der Ala lobuli centralis an: die 6 bis 7 oberen aufwärts stehenden und theils nach vorn, theils nach hinten geneigten Äste dem Lobus superior anterior: ein starker, hinterer oder liegender, in mehrere grofse Zweige sich theilender Ast, welcher gleichsam den nach hinten gerichteten Wipfel des Hemisphärenbaums darstellt, bildet die Grundlage des Lobus superior posterior. Von den abwärts gerichteten oder hängenden Ästen gehört der hintere starke zum Lobus inferior posterior; ein senkrecht hängender zum hinteren Theile des Lobus inferior anterior oder zarten Lappen: der vordere Theil des Lobus inferior anterior enthält zwei, die Tonsilla einen, schräg nach vorn und unten gerichtete Äste: der Lobulus erhält einen kleinen Ast, welcher an seiner hinteren Fläche nicht in Blätter sich theilt, hieselbst frei liegt und mit dem Crus cerebelli ad pontem genau zusammen zu hängen scheint, d. i. der Pedunculus flocculi (S. 843).

3) *Crura cerebelli*, die Schenkel des kleinen Gehirns, sind dicke Markbündel, die von dem vorderen Theile des Markkörpers der Hemisphäre zu den drei Abtheilungen des Mesencephalon gehen. 1) Der obere plattrundliche Schenkel, *Crus cerebelli ad eminentiam quadrigeminam*, der Vierhügelschenkel oder Bindearm, geht nach oben und vorn, mit dem der anderen Seite etwas convergirend; wird oben, hinten und aufsen von dem vorderen inneren Theile des Lobus superior anterior verborgen, auswärts von dem Lemniscus (S. 839.) umgürtet: und verschmilzt mit der hinteren Fläche und den Colliculi posteriores der Eminentia quadrigemina. 2) Der mittlere Schenkel, *Crus cerebelli ad pontem*, der Brückenschenkel oder Brückenarm, ist der längste und stärkste, erstreckt sich nach vorn und innen, an Dicke zunehmend und geht ohne deutliche Gränze in den Seitenrand des Pons Varolii über: er wird oben und hinten vom äufseren Theile des Lobus superior anterior, unten vom Lobus inferior anterior und vom Flocculus bedeckt; sein äufserer Umfang liegt frei im vorderen Theile des Sulcus magnus horizontalis. 3) Der untere Schenkel, *Crus cerebelli ad medullam oblongatam*, Markknopfschenkel, ist das

Corpus restiforme, wird hinten von dem Lobus inferior anterior und dem Pedunculus flocculi bedeckt.

Mittlerer Theil des kleinen Gehirns.

Dieser enthält den sog. Wurm, Vermis, die Marksegel, Vela medullaria, und die vierte Hirnhöhle, Ventriculus quartus cerebri.

1) Der *Wurm*, *Vermis*, ist die obere ansehnlichste Masse das Mitteltheils und im äufseren Ansehen und Bau den Hemisphären ähnlich: gleich diesen enthält er im Innern einen Markkörper, welcher nach der Peripherie hin in Äste und Blätter sich theilt: diese sind mit grauer Substanz belegt und bilden an der Oberfläche die Gyri des Wurms, welche meistens queer verlaufen und kürzer als die der Hemisphären sind. So wie der Markkörper des Wurms zu beiden Seiten mit den Markkörpern der Hemisphären zusammenfliefst, so gehen die Gyri des Wurms gröfstentheils ununterbrochen in die Gyri der Hemisphären über und bilden dadurch die Commissuren derselben.

Der *obere Wurm*, *Vermis superior*, ist die zwischen den oberen Lappen liegende obere Hälfte des Wurms, welche in der Mitte der oberen Fläche des kleinen Gehirns den hervorragendsten Theil desselben bildet. Die vorderste kleine Abtheilung des oberen Wurms, über dem vorderen Marksegel und hinter der Eminentia quadrigemina, ist der *Lobulus centralis*, das Centralläppchen, zu beiden Seiten in die vordersten Blätter der Lobi superiores anteriores, die sog. Alae lobuli centralis, übergehend. Der gröfste Theil des oberen Wurms ist der Berg, *Monticulus cerebelli*, an welchem man den vorderen höchsten Theil oder Gipfel, Culmen, und den hinteren Abhang, Declive, unterscheidet: er vereinigt die Lobi superiores anteriores. Hinter dem Declive monticuli, in der Incisura marginalis posterior, befindet sich die schmale einfache Commissur der inneren dünnen Enden der Lobi superiores posteriores, *Commissura tenuis* oder das Wipfelblatt, *Folium cacuminis* (Burpach): ein einfaches, nicht in Gyri getheiltes, auf der oberen und unteren Fläche nur queergefurchtes Blatt.

Der *untere Wurm*, *Vermis inferior*, liegt zwischen den

unteren Lappen beider Hemisphären, hinter und über der Medulla oblongata und dem Pons Varolii, in der Scissura longitudinalis cerebelli verborgen. Er besteht von hinten nach vorn aus folgenden Abtheilungen, welche gleich den Abtheilungen des oberen Wurms durch tiefere Sulci von einander getrennt werden: 1) *Commissura brevis* loborum inferiorum posteriorum, nach Burdach der Klappenwulst, *Tuber valvulae*, die hinteren Unterlappen verbindend: die hinteren Gyri desselben in der Incisura marginalis posterior sind kürzer, die vorderen unteren länger. 2) *Pyramis vermis*, die Wurmpyramide, deren Gyri stark nach hinten gebogen sind, daher sie vorn breiter, hinten stumpf zugespitzt sich darstellt: vereinigt die Lobi inferiores anteriores. 3) *Uvula vermis*, der Zapfen, eine längliche, schmale, aus kurzen queeren Blättern zusammengesetzte Hervorragung zwischen den Tonsillae. 4) *Nodulus*, das Knötchen, ein kleiner, rundlicher, aus kurzen queeren Blättern bestehender Körper, vereinigt die Flocculi mit einander, aber nicht unmittelbar, sondern vermittelst des mit seinem vordersten Blatte verschmolzenen hinteren Marksegels.

Der Markkörper des Vermis, *Corpus medullare vermis*, ist bei Weitem kleiner als die Markkörper der Hemisphären, von unten nach oben nur 1‴ bis 1½‴ dick, enthält keinen Kern oder Corpus rhomboidum, liegt horizontal von vorn nach hinten, und bildet durch baumförmige Theilung in Äste (meistens 7) und Blätter den Markbaum des Wurms, *Arbor medullaris vermis*. Vorn hängt er mit den Marksegeln zusammen und sein vorderster Ast gehört der Lingula des vorderen Marksegels an: die anderen 6 gröfseren Äste gehen nach oben, hinten und unten in die einzelnen Abtheilungen des oberen und unteren Wurms über. Die beiden oberen oder stehenden Äste dringen in den Lobulus centralis und das Culmen monticuli: der ansehnliche horizontale, nach hinten gerichtete oder liegende Ast schickt Blätter nach oben in das Declive monticuli, ein Blatt nach hinten in die Commissura tenuis (Folium cacuminis), und mehrere nach hinten und unten in die Commissura brevis der hinteren Unterlappen: die drei abwärts gerichteten Äste gehen in die Pyramis, die Uvula und den Nodulus.

2) Die *Marksegel*, *Vela medullaria*, sind dünne,

zum Theil mit unvollständigen Gyri belegte Markblätter, welche unterhalb des Vermis liegen. Das vordere Marksegel oder die Hirnklappe, *Velum medullare anterius s. Valvula cerebri s.* cerebelli, ist länglich viereckig, schräg von unten und hinten nach oben und vorn sich erstreckend, 6‴ lang, vorn 3‴, hinten 4‴ breit: es ist vorn mit den hinteren Hügeln der Eminentia quadrigemina und den Enden der Lemnisci, seitwärts mit den Crura cerebelli ad eminentiam quadrigeminam, hinten mit dem vorderen Theile des Arbor medullaris vermis verschmolzen, und über der vierten Hirnhöhle ausgespannt. Seine untere, glatte, weifse Fläche wird von dem vordersten Aste des Arbor medullaris vermis gebildet: der vordere Rand und die obere Fläche nimmt in der Mittellinie ein schmales Markbündel, *Frenulum veli medull. anterioris*, auf, welches aus der Furche zwischen dem hinteren Hügelpaar herabsteigt, und an welchem man einen mittleren, hinterwärts zugespitzten und zwei seitliche Markstreifen unterscheiden kann. Der mittlere und hintere Theil der oberen Fläche des vorderen Marksegels wird von fünf queeren, schmalen, sehr niedrigen Gyri belegt, welche eine platte, vorn abgerundete, zungenförmige Schicht, die sog. *Lingula*, bilden: diese hangen mit den Gyri des Lobulus centralis, welcher das vordere Marksegel gröfstentheils bedeckt, zusammen. — Das hintere Marksegel, *Velum medullare posterius*, s. Valvulae semilunares oder die hintere kleine Hirnklappe, ist ein zartes Markblättchen, dessen Mitte mit dem unmittelbar hinter ihm liegenden Nodulus durch sehr niedrige kurze Gyri verschmolzen ist; zu beiden Seiten aber, halbmondförmig gestaltet und 3‴ breit, nach vorn und aufsen zu den Flocculi sich erstreckt und in diese, vor den Pedunculi flocculorum, übergeht. Sein hinterer oberer Rand fliefst mit dem Markkörper des Wurms und dem hinteren Rande des Velum medullare anterius zusammen: sein unterer, schräg nach vorn gerichteter, concaver Rand hängt frei am Dache der vierten Hirnhöhle.

3) Die *vierte Hirnhöhle, Ventriculus quartus cerebri s.* Ventriculus cerebelli, befindet sich in der Mitte zwischen dem Mesencephalon und Cerebellum; erstreckt sich in ihrer gröfsten Länge von unten und hinten nach oben

und vorn, vom unteren Ende des Sinus rhomboideus bis zum Aquaeductus Sylvii der Eminentia quadrigemina, und hat eine ungefähr rautenförmige Gestalt, unten und oben enger, in der Mitte nach beiden Seiten erweitert. Ihre untere vordere Wand oder Boden wird vom Sinus rhomboideus medullae oblongatae und der hinteren oberen Fläche des Pons gebildet: insbesondere von den Crura medullae oblongatae ad eminentiam quadrigeminam, zwischen welchen die fortgesetzte Fissura longitudinalis posterior heraufsteigt, — und von der, jene Crura grofsentheils bedeckenden Lamina cinerea sinus rhomboidei mit den Striae medullares (S. 837). Zu beiden Seiten wird der Ventriculus quartus von den Corpora restiformia, den Markkörpern der Hemisphaerae cerebelli und den Crura cerebelli ad eminentiam quadrigeminam begränzt. Die obere hintere Wand oder das Dach der vierten Hirnhöhle wird gebildet vom vorderen Theile der Uvula, vom Nodulus und von den Vela medullaria: den nach hinten und oben eindringenden Winkel zwischen dem oberen Rande des hinteren und dem hinteren Rande des vorderen Marksegels nennt man den Giebel oder das Zelt der vierten Höhle: die Vertiefungen hinter den Seitentheilen des hinteren Marksegels, zwischen diesen, dem Nodulus, Uvula und den Tonsillae, heifsen die Nester oder Schwalbennester. Vorn und oben wird der Ventriculus quartus durch die Eminentia quadrigemina geschlossen und steht unter dieser durch den Aquaeductus Sylvii mit dem Ventriculus tertius in Verbindung: hinten ist er offen durch die *Fissura transversa cerebelli* s. Fiss. transversa parva cerebri: ein Queerschlitz zwischen dem Sinus rhomboideus, den Corpora restiformia, der Uvula und den inneren Flächen der Tonsillae, welcher nur von den Vela sinus rhomboidei, der Tun. arachnoidea und Pia mater geschlossen wird (S. 836.). Die innere Oberfläche der Höhle wird vom Ependyma oder Epithelium ventriculorum cerebri bekleidet.

Grofses Gehirn, Cerebrum.

Das grofse Gehirn liegt vor und über dem Mesencephalon und Cerebellum, ruhet mit seiner unteren Fläche, der

Basis cerebri, in der vorderen und mittleren Abtheilung der Basis cranii und auf dem Tentorium cerebelli und füllt den ganzen oberen gröfsten Theil der Schädelhöhle genau aus. Es hat eine ungefähr halb-eiförmige Gestalt und ist der ansehnlichste Theil des Encephalon, im männlichen Geschlechte merklich gröfser als im weiblichen: mifst in gröfster Länge von vorn nach hinten 6″ bis 6½″, in gröfster Breite 4¾″ bis 5¼″ und in der Höhe 3¾″ bis 4″, ist vorn und hinten aber beträchtlich niedriger und und schmaler. Sein mittleres Gewicht und Volumen betragen im weiblichen Körper 38 Unzen und 56 Kub.-Zoll, im männlichen 42 Unzen, und 61 Kub. Zoll: das spec. Gewicht 1, 0361. Seine Masse ist im männlichen Geschlecht ungefähr $^6/_7$, im weiblichen etwas mehr als $^5/_6$ der ganzen Hirnmasse, so dafs in letzterem das Mesencephalon und Cerebellum gröfser im Verhältnifs zum grofsen Gehirn sind, als im männlichen.

Das Cerebrum besteht aus zwei einander gleich gebildeten Seitenhälften, Hemisphaerae s. Hemisphaeria cerebri, und einem Mitteltheile, welcher die mittlere untere Gegend des grofsen Gehirns einnimmt. Die beiden Hemisphären machen den bei Weitem gröfsten Theil der Masse des grofsen Gehirns aus und werden vorn, oben und hinten durch eine tiefe Spalte, *Scissura longitudinalis cerebri* s. Incisura pallii, von einander getrennt, welche bis zu dem Mitteltheil eindringt. Diese Spalte ist vorn in horizontaler Richtung 2″ tief, oben in senkrechter Richtung 1½″, hinten 1¾″ tief: vorn und oben nur 1‴ bis 2‴, an ihrem hinteren Ende aber ½″ breit. Jede Hemisphäre ist vorzüglich aus dem Hirnstiel, den Hirnganglien, der ansehnlichen markigen Centralmasse oder Markkörper, und aus grauen Wülsten der Oberfläche zusammengesetzt und enthält in ihrem Innern die Seitenhöhle des Gehirns. Der Hirnstiel, Pedunculus cerebri, ist der Anfang des Markstammes des grofsen Gehirns, *Caudex cerebri*, welcher vom Mesencephalon aus in das Innere der Hemisphäre aufsteigt und sich mit zahlreichen Bündeln und Fasern nach allen Seiten strahlenförmig entfaltet, so dafs hauptsächlich seine Ausstrahlungen, verbunden mit den Ausstrahlungen des Mitteltheils, vorzüglich des Balken, und mit einigen accessorischen Markbündeln, den Markkörper bilden. An die Strahlungen des

Markstammes und zwischen dieselben legen sich die Ganglien des grofsen Gehirns — Ganglion cerebri posterius und Ganglion cerebri anterius, welche aus der Vereinigung weifser und grauer Substanz gebildet sind — und einige andere Gebilde von eigenthümlicher Form und Zusammensetzung, welche theils an der äufseren Oberfläche, theils an den Wänden der Seitenhöhle hervorragen. Diese Höhle, Ventriculus lateralis cerebri, steht durch die grofse Queerspalte oder den Queerschlitz des grofsen Gehirns, *Fissura transversa cerebri,* mit der äufseren Oberfläche im Zusammenhange, so dafs ihre Wände als innere Oberfläche der Hemisphären angesehen werden können. (Der mittlere Theil der Fissura transversa cerebri befindet sich vor dem Monticulus cerebelli, dringt über der Eminentia quadrigemina und dem Conarium und den hinteren Hirnganglien oder Thalami optici, unter dem Splenium corporis callosi ein: und verlängert sich seitwärts als enger Spalt zwischen dem Pedunculus cerebri und Tractus opticus, und dem Gyrus hippocampi.) — Die Oberfläche des Markkörpers geht in zahlreiche gewundene Markblätter über, die an der Oberfläche der Hemisphäre von einer Rinde grauer Substanz bekleidet werden: auf diese Weise entstehen die durch Furchen von einander getrennten Windungen oder Randwülste, Gyri cerebri; deren Vereinigungen zu gröfseren, durch tiefere Einschnitte gesonderten Abtheilungen, die Hirnlappen, Lobi cerebri, darstellen. Die oberflächlichen, an der Peripherie des Markkörpers liegenden Theile, insbesondere die Lappen und ihre Gyri, werden im Gegensatze zu dem inneren Theile oder dem Kern des Gehirns, als Mantel des Gehirns, Pallium, bezeichnet.

Der Mitteltheil des grofsen Gehirns besteht aus mehreren kleineren unpaaren Organen, welche theils mit beiden Hemisphären verschmolzen, diese genau vereinigen, wirkliche Commissuren bilden und einzelne Gebilde der Hemisphären zusammensetzen helfen: theils als mehr selbstständige Organe freier zwischen den Hemisphären liegen. Es gehören zu ihnen das Corpus callosum oder der Balken, das Septum pellucidum mit seiner kleinen Höhle, der Fornix mit seinen Bulbi und Schenkeln, die Commissura anterior, Commissura mollis und Commissura posterior, die auf

letzterer ruhende Zirbel, Conarium s. Glandula pinealis: — und an der Basis cerebri die Substantia perforata media, das Tuber cinereum mit dem Infundibulum und der Hypophysis cerebri, das Chiasma opticum: — und endlich eine enge Höhle, Ventriculus tertius, welche von einzelnen der genannten Theile und den beiden Hemisphären gemeinschaftlich eingeschlossen wird.

Hemisphären des grofsen Gehirns.

A. Betrachtung der Oberfläche.

Jede Hemisphäre hat eine längliche Gestalt mit abgerundetem vorderen und hinteren Ende — einer inneren, platten, bis zum Balken senkrecht herabsteigenden Fläche, welche mit der der anderen Hemisphäre die Scissura longitudinalis begränzt — einer convexen oberen Fläche, die durch den oberen, stark gebogenen, abgerundeten Rand an die innere Fläche stöfst, nach unten aber allmählig in die äufsere, gleichfalls convexe Fläche übergeht — und einer unteren, ungleich vertieften und erhabenen Fläche. Alle diese freiliegenden Flächen sind, mit Ausnahme des inneren Theiles der unteren Fläche, von grauen, in verschiedenen Richtungen gekrümmten *Gyri* gebildet, die 4‴ bis 8‴ breit sind und durch schmale, ½″ bis 1″ tiefe Furchen, *Sulci cerebri*, auch durch kleine dreieckige Zwischenräume an den Stellen des Zusammenflusses zweier Furchen, von einander getrennt werden. Die Gyri und Sulci der einen Hemisphäre sind denen der anderen, hinsichtlich der Anzahl, Gröfse und Richtung, nicht völlig gleich.

An der unteren Fläche der Hemisphäre und zwar in ihrer inneren mittleren Gegend, zeigt sich der weifse freiliegende Umfang des Pedunculus cerebri und neben demselben, nach aufsen und vorn, ein nach innen sich krümmender Markstreifen, Tractus opticus. An der äufseren Seite und vor dem vorderen Ende des letzteren zeigt sich eine ebene, theils graue, theils weifse Stelle, die von vielen Löchern durchbohrte Siebplatte, *Lamina cribrosa cerebri* s. Substantia perforata antica. Vom äufseren Ende der letzteren beginnt eine sehr tiefe Spalte, *Fossa Sylvii* s. Fissura

nferior et superior oder das Thal: diese läuft an der unte-
en Fläche der Hemisphäre nach aufsen, indem sie einen
Bogen nach vorn beschreibt; steigt alsdann an der äufseren
Fläche aufwärts und nach hinten. Durch diese Spalte wird
die Hemisphäre, jedoch nur an ihrer unteren und äufseren
Fläche, in den vorderen und hinteren Hauptlappen, *Lobus
erebri anterior et posterior*, getheilt. Der hintere Theil
les vorderen Lappens wird an der äufseren Fläche der He-
nisphäre von dem vorderen Theile durch eine senkrechte
iefere Furche, (Fissura anterior, die nicht immer deutlich
orhanden ist) abgegränzt und bildet den Oberlappen (Bur-
lach), dessen unterster, über dem hinteren oberen Theile
er Fossa Sylvii hangender Theil der Klappdeckel, Oper-
ulum oder das Dach der Sylvischen Grube, genannt wird.
Der vordere untere Theil des Lobus posterior, zwischen
er Fossa Sylvii, der Lamina cribrosa und dem Tractus
pticus, ist der mittlere oder Unterlappen, *Lobus cerebri
nedius* s. inferior: er liegt in der mittleren Abtheilung der
Basis cranii, endigt nach vorn und unten in eine stumpfe
bgerundete Spitze und ist hinten durch einen seichten
ueeren Eindruck an seiner unteren Fläche, welche dem
beren Winkel der Pyramide des Schläfenbeins entspricht,
on dem eigentlichen Hinterlappen abgegränzt, macht übri-
ens mit diesem eine zusammenhangende Masse aus: so wie
berhaupt an der oberen und inneren Fläche der Hemi-
phäre eine Theilung derselben in Lappen nicht Statt findet.

An der unteren Fläche des Lobus cerebri anterior, wel-
he vorn auf der Pars orbitalis des Stirnbeins ruhet und
eicht ausgehöhlt ist, bemerkt man, unmittelbar vor der
amina cribrosa und mit ihr zusammenhangend, die *Ca-
uncula mammillaris*, eine dreiseitig pyramidalische Erhaben-
eit, aus grauer Substanz gebildet, in welche drei weifse
treifen eingelegt sind: der innere und der äufsere längste,
ach aufsen und hinten sich krümmende Streifen erstrecken
ich in die Lamina cribrosa selbst, der kurze mittlere en-
igt in der Basis der Caruncula. Von der Caruncula mam-
illaris aus läuft der dreiseitig prismatische, $1\frac{1}{3}$ ‴ dicke
iechstreifen, *Tractus olfactorius*, nach vorn und etwas nach
nnen: dieser liegt in einer Furche, Sulcus tractus olfacto-
ii, zwischen zwei geraden parallelen Gyri eingesenkt,

besteht aus Markfasern und grauer Substanz, und schwillt an seinem vorderen, auf der Lamina cribrosa oss. ethmoidei ruhenden Ende zu dem länglich rundlichen, plattgedrückten, $2\frac{1}{4}'''$ breiten und $3'''$ bis $4'''$ langen Riechkolben, *Bulbus olfactorius* s. cinereus, an. Übrigens werden die Oberflächen des vorderen Lappens von gekrümmten Gyri gebildet, die nach hinten und oben in die des Oberlappens und Klappdeckels übergehen und hieselbst breiter, als am vorderen Ende des Vorderlappens sind. An der inneren Fläche des vorderen Lappens, vor dem Genu corporis callosi, beginnt der sog. Zwingenwulst, *Gyrus cinguli,* welcher über dem Seitenrande des Balkens bogenförmig nach hinten fortlaufend in den hinteren Lappen, und dann nach vorn und unten in den Lobus medius übergeht.

An der unteren Fläche des Lobus medius zeigt sich, nach aufsen vom Tractus opticus und diesen zum Theil verdeckend, ein stark gekrümmter, nach innen concaver und weifser, nach aufsen mit grauer Substanz belegter Wulst, *Gyrus hippocampi*, s. Subiculum cornu ammonis: sein hinteres Ende fliefst mit dem Zwingenwulste zusammen: sein vorderes Ende krümmt sich hinter der Lamina cribrosa nach innen und hinten und bildet den Haken, *Uncus*: d. i. ein kurzer, nach hinten gerichteter Wulst, der in seinem Innern aus weifser und grauer Substanz zusammengesetzt ist, daher auch das Hakenganglion genannt wird. Die longitudinalen Gyri an der äufseren Fläche dieses Lappens werden Gyri fasciculi arcuati genannt: die übrigen Gyri haben nichts Ausgezeichnetes: die vordere stumpfe Spitze dieses Lappens ist der abhängigste Theil der Hemisphäre und liegt unmittelbar unter der Fissura orbitalis superior.

In der Tiefe der Fossa Sylvii verborgen, neben der Lamina cribrosa nach aufsen, über dem Lobus medius und unter dem Klappdeckel, zeigt sich, wenn man diese Theile auseinander biegt, die sog. *Insel* oder der Stammlappen (Burdach), *Insula* s. Lobus caudicis. Diese ist eine länglich ovale, von vorn nach hinten ungefähr $2''$ lange Erhabenheit, die an ihrer nach innen und unten gerichteten Basis mit dem Markkörper der Hemisphäre, dem vorderen und mittleren Lappen verschmolzen ist: ihr erhabenster freier Theil bildet einen von vorn nach hinten laufenden Rücken:

an ihrer unteren Fläche laufen vier, vom Lobus medius ausgehende, divergirende kurze Gyri: die fünf bis sechs Gyri ihrer oberen Fläche gehen durch den hinteren oberen Theil der Fossa Sylvii in die Gyri der unteren Fläche des Klappdeckels über.

Der Hinterlappen ruhet mit seiner unteren, schwach concaven Fläche auf der oberen Fläche des Tentorium cerebelli, mit seiner hinteren abgerundeten Spitze in der Fossa occipitalis superior. An seiner inneren Fläche läuft ein tiefer Sulcus, die Hinterspalte, Fissura posterior, von dem oberen Rande schräg nach vorn gegen die untere Fläche herab: diese schliefst mit einem anderen tieferen Sulcus, der von der hinteren Spitze nach vorn läuft, den keilförmigen, aus mehreren Gyri bestehenden sog. Zwickel, *Cuneus*, ein, dessen nach vorn gerichtete Spitze mit den hinteren Enden des Zwingenwulstes und des Gyrus hippocampi zusammenfliefst.

B. Zusammensetzung des Inneren der Hemisphäre.

1) *Pedunculus cerebri* s. *Crus cerebri* (ad pontem), der Hirnstiel oder Hirnschenkel, ist ein äufserlich weifser Körper von der Gestalt eines abgestutzten Kegels, welcher vom oberen vorderen Rande des Pons Varolii aus, schräg nach oben, vorn und aufsen sich erstreckt: er ist ungefähr 10‴ lang, an seinem hinteren unteren Ende 7‴ breit, an seinem oberen vorderen Ende 10‴ breit und ungefähr 9‴ dick. Sein hinteres unteres Ende hängt mit dem oberen vorderen Ende des Pons Varolii ununterbrochen zusammen und wird von demselben nur äufserlich durch eine tiefe gebogene Queerfurche abgegränzt: seine vordere untere Fläche und seine Seitenflächen liegen frei an dem mittleren inneren Theil der unteren Fläche der Hemisphäre: sein oberes vorderes dickeres Ende wird vom Tractus opticus umgürtet und geht, von diesem und dem Gyrus hippocampi verborgen, in die Hirnganglien und den Markkörper über: auf seiner oberen hinteren Fläche liegen die Eminentia quadrigemina, das hintere Hirnganglion und der hintere Theil des vorderen Hirnganglion, mit welchen sie innig verschmolzen ist. — Die freie vordere oder untere und die Seitenflächen sind weifs und der Länge nach

gefurcht: nur ein schmaler gekrümmter queerer Markstreifen läuft nahe vor dem Pons über diese Flächen hinweg. Der Pedunculus cerebri wird äufserlich von einer 2‴ dikken Schicht starker longitudinaler und divergirender Markbündel gebildet, welche ihm das gefurchte Ansehen verleihen: auf diese folgt eine 1½‴ dicke Schicht einer dunkel schwarzgrauen Substanz, Substantia nigra pedunculi, welche gleich der oberflächlichen Schicht eine rinnenförmige Gestalt hat. In der Aushöhlung der schwarzgrauen Schicht liegt ein dickes rundliches Bündel longitudinaler, mit grauer Substanz untermischter Markfasern, welche vorzüglich das Innere des Pedunculus bildet. Die oberflächlichen Longitudinalbündel und das tiefe innere Bündel sind die unmittelbaren Fortsetzungen der vorderen und hinteren Pyramidenbündel (S. 838.), welche aus dem Pons in den Pedunculus übergehen: die schwarzgraue Substanz hängt mit dem Kern der Brücke zusammen.

2) *Ganglion cerebri posterius* s. *Thalamus opticus* s. Thalamus nervi optici, das hintere Hirnganglion oder der Sehhügel, ist ein länglich sechsseitiger Körper, von vorn nach hinten 1½″ lang, vorn 6‴ breit und 8‴ hoch, hinten 10‴ breit und hoch. Seine untere Fläche ist mit dem Pedunculus cerebri verschmolzen: die schmale vordere und die äufsere, welche abgerundet in einander übergehen, gränzen an das Corpus striatum, von welchem sie jedoch durch die Taenia semicircularis getrennt werden: der innere Theil der vorderen Fläche liegt hinter den Crura anteriora fornicis und der Commissura anterior. Die obere weifse Fläche liegt frei in der Cella lateralis des Ventriculus lateralis und bildet einen Theil seines Bodens: ihr äufserer Theil ist mehr gewölbt und trägt am vorderen Ende einen kleinen rundlichen Hügel, *Tuberculum superius anterius:* ihr innerer Theil ist mehr eben und liegt unter dem Corpus und Crus posterius fornicis. Die innere, mit einer dünnen Schicht hellgrauer Substanz belegte Fläche ist leicht ausgehöhlt und steigt fast senkrecht herab: sie bildet die Seitenwand des Ventriculus tertius und liegt frei, nur mit der Commissura mollis verschmolzen, welche beide Thalami mit einander vereinigt. Der obere innere Rand des Thalamus, zwischen der oberen und inneren Fläche, ist

scharf und wird von einem Longitudinalbündel von Markfasern gebildet, welches sich hinterwärts vom Thalamus ablöset, frei wird und zum Conarium geht: d. i. der Zirbelstiel, *Pedunculus conarii s. glandulae pinealis.* Die weifse hintere Fläche ist nach innen mit der Commissura posterior und der Eminentia quadrigemina verschmolzen: nach aufsen liegt sie frei in der Fissura cerebri magna unter dem Splenium corporis callosi. Man bemerkt an ihr drei Erhabenheiten: die gröfsere obere ist das Polster, *Pulvinar s.* Tuberculum superius posterius, durch welches die obere und hintere Fläche in einander übergehen: unter diesem liegen die beiden rundlichen Kniehöcker, *Corpora geniculata, internum et externum*: beide stehen mit den Vierhügeln durch plattrundliche Markbündel, Brachia corporum quadrigeminorum, im Zusammenhange, nämlich das Corpus geniculatum internum mit dem vorderen Hügel, das Corpus geniculatum externum mit dem hinteren Hügel der Eminentia quadrigemina.

Das Innere des hinteren Hirnganglion ist aus grauer und weifser Substanz zusammengesetzt: die graue Substanz bildet einen inneren, äufseren und oberen grauen Kern, welche durch Schichten von Markfasern getrennt und zum Theil von dünneren Markblättern durchdrungen werden, so dafs sie auf Durchschnitten fein streifig erscheinen. Die Markfasern sind gröfstentheils Fortsetzungen des Pedunculus cerebri und haben ihre Hauptrichtung schräg von unten nach oben: andere mehr von hinten nach vorn sich ausbreitende Fasern stammen aus der Eminentia quadrigemina, sind Fortsetzungen der Brachia corporum quadrigeminorum und mittelbar zum Theil des Lemniscus, und dringen unter dem Pulvinar zwischen und durch die Corpora geniculata hin: noch andere, theils queere, theils gekrümmt absteigende gehören der Commissura posterior und Commissura mollis und dem Fornix an. Eine oberflächliche, den vorderen oberen und unteren äufseren Umfang des Sehhügels umgebende Schicht longitudinaler gekrümmter Fasern ist Burdach's Stratum zonale.

Tractus opticus s. Radix nervi optici, der Sehstreifen oder die Wurzel des Sehnerven, entsteht an der hinteren Fläche des Thalamus opticus, theils von der Substanz

desselben unter dem Polster und vor dem Corpus geniculatum internum, theils vom Corpus geniculatum externum, als ein platter, 4‴ breiter weifser Streifen; krümmt sich alsdann in einem nach aufsen convexen Bogen nach unten und vorn, nach der unteren Fläche der Hemisphäre (S. 852.), umgürtet das vordere Ende des Pedunculus cerebri und liegt zwischen diesem und dem Gyrus hippocampi, von letzterem überragt und verborgen: ist an seinem hinteren Theile mit den oberflächlichen Fasern des ersteren da, wo diese in den Markkörper der Hemisphäre eintreten, verschmolzen, mehr nach vorn aber von ihm getrennt und frei. Zwischen Tuber cinereum und Lamina cribrosa nach vorn und innen sich erstreckend, verschmälert er sich bis auf 2‴ Breite, wird aber dabei dicker und rundlicher und geht in das Chiasma opticum über.

3) *Ganglion cerebri anterius*, das vordere Hirnganglion, liegt an der vorderen und äufseren Seite des Thalamus opticus und zerfällt in einen inneren gröfseren Theil, den gestreiften Körper, Corpus striatum, und einen äufseren kleineren Theil, den Linsenkern, Nucleus lentiformis.

Corpus striatum, der gestreifte Körper oder Streifenhügel, hat eine gekrümmt keulenförmige Gestalt und ist von vorn nach hinten 2½″ lang: sein vorderer dickerer Theil oder Kolben mifst in schräger Höhe von unten und innen nach oben und aufsen 11‴ bis 13‴, in queerer Richtung 5‴; sein hinteres Ende, Cauda corporis striati, ist aber nur 2‴ breit und hoch. Er liegt in seiner ganzen Länge neben dem Thalamus opticus, jedoch durch die Taenia semicircularis von diesem getrennt, und zwar liegt der Kolben vor dem Sehhügel, der mittlere Theil und das hintere Ende neben demselben nach aufsen: letzteres biegt sich neben dem hinteren Ende des Sehhügels nach unten um und geht in Gestalt eines schmalen grauen Streifen nach vorn in das Dach des Cornu descendens über. Nach unten ist der Streifenhügel mit dem vorderen Ende des Pedunculus cerebri verschmolzen, indem er Markbündel aus diesem aufnimmt: nach aufsen wird er durch die Capsula interna von dem Linsenkerne geschieden: seine obere, auf dem Boden des Ventriculus lateralis frei liegende Fläche ist etwas nach innen gewendet, convex, und von bräunlich grauer, von

ıelleren Streifen durchzogener Färbung. Im Innern besteht las Corpus striatum aus abwechselnd gelagerten Blättern ron dunkelgrauer, hellgrauer und weifser Substanz: indem zahlreiche platte Markbündel des Pedunculus cerebri durch den Streifenhügel schräg aufsteigen und sich vorzüglich in der Richtung nach oben, vorn und aufsen, weniger nach hinten, fächerförmig ausbreiten: die Schichten grauer Substanz aber zwischen diese Bündel eingeschoben sind.

Nucleus lentiformis, der Linsenkern, meistens als der ufsere Theil des Corpus striatum betrachtet, liegt neben em letzteren und dem hinteren unteren Theile des Sehügels nach aufsen und nirgends frei, überall von der übrien Masse der Hemisphäre umgeben. Er hat ungefähr die estalt einer halben biconvexen Linse, ist von vorn nach inten $1\frac{1}{2}$ ″ lang, ungefähr 5‴ breit, vorn etwas breiter ls hinten, und 10‴ hoch. Seine untere Fläche oder Basis uhet auf dem äufseren Ende des Pedunculus cerebri, auf er Commissura anterior und der Lamina cribrosa; die conexen Seitenflächen sind nach innen und aufsen, der scharfe ogenförmige Rand nach oben, vorn und hinten, gegen den Iarkkörper der Hemisphäre hin gerichtet. Die innere Seienfläche ist weniger convex als die äufsere; sie fliefst nach nten zum Theil mit dem Corpus striatum zusammen, ist ber gröfstentheils von diesem durch die Capsula interna eschieden: die äufsere Fläche ist gegen die Basis der Insel in gewandt und wird von der Capsula externa umgeben. ie Zusammensetzung des Linsenkerns ist der des Corpus riatum ähnlich: er besteht gröfstentheils aus bräunlich rauer, in seinem hinteren Theile mehr hellgrauer Substanz, elche von schräg aufsteigenden Markbündeln durchzoen wird.

4) Die *Markblätter*, welche von dem Pedunculus erebri aufsteigen, die drei gangliösen Gebilde, den Sehügel, den Streifenhügel und den Linsenkern, zum Theil mgeben nnd ziemlich vollständig von einander trennen, nd die Taenia semicircularis, die Capsula interna und die apsula externa. Die *Taenia semicircularis* s. Lamina corea s. Centrum geminum semicirculare ist ein weifses, nach ıfsen convexes, 1‴ dickes Blatt, welches zwischen der orderen und äufseren Fläche des Thalamus opticus und

der inneren Fläche des Corpus striatum sich einschiebt, und mit seinem oberen Rande zwischen den oberen Flächen jener beiden Ganglien auf dem Boden des Ventriculus lateralis sichtbar wird. Dieser obere Rand, *Stria terminalis* s. cornea, Gränz- oder Hornstreif genannt, enthält von vorn nach hinten verlaufende Fasern, welche die Enden der von dem Pedunculus emporsteigenden Fasern mit einander verbinden, und ist an seinem vorderen Theile mit einer Schicht bräunlich-grauer Substanz belegt, in seinem hinteren Theile aber weifs: an seinem vorderen Ende geht er eine oberflächliche Verbindung mit dem Crus anterius fornicis ein; verläuft sodann auf dem Boden des Ventriculus lateralis nach aufsen und nach hinten, die Gränze zwischen den oberen Flächen des Sehhügels und Streifenhügels bezeichnend: und verliert sich mit seinem hinteren Ende in das Dach des Cornu inferius ventriculi lateralis. — Die dickere *Capsula interna* nuclei lentiformis steigt mehr gerade, die *Capsula externa* mehr auswärts gebogen, schräg nach aufsen empor: erstere zwischen dem Kolben und Cauda des Streifenhügels und dem hinteren Theile des Sehhügels einerseits, und der inneren Fläche des Linsenkerns andererseits: letztere an der äufseren Fläche des Linsenkerns, zwischen diesem und dem Fasciculus arcuatus, auf welchem die Insel aufsitzt. Am oberen Rande des Linsenkerns vereinigen sich die innere und äufsere Kapsel und gehen in den Stabkranz über.

5) *Corpus medullare hemisphaerae cerebri* s. Centrum semiovale medullare, der Markkörper der Hemisphäre, hat eine halbeiförmige Gestalt, umgiebt von aufsen, oben, vorn und hinten das vordere Ende des Pedunculus cerebri und die Hirnganglien und bildet die innere gröfste Masse der Hemisphäre. Er wird zusammengesetzt aus den strahlenförmig ausgebreiteten Fortsetzungen oder Radiationen des Pedunculus cerebri (Hirnstammes), aus den Radiationen des Balkens und aus den accessorischen Markbündeln. — Nachdem die Markbündel des Pedunculus cerebri theils durch die Hirnganglien selbst, theils zwischen und neben denselben als Capsula interna und externa, theils hinter dem Sehhügel aufgestiegen sind, breiten sie sich wie die Stäbe eines Fächers nach vorn, oben, aufsen, unten und hinten gegen die Hirnlappen und deren Gyri hin aus: die

Anfangsstelle dieser Ausbreitung bildet einen Kranz um die obere und äufsere Grenze der Ganglien, besonders des Linsenkerns und wird, indem man die starken Markbündel mit Stäben verglichen hat, der Stabkranz, *Corona radiata s. Radiatio centralis*, die Stammstrahlung, genannt: sie nimmt vorzüglich die Mitte des Markkörpers der Hemisphäre ein und bildet dessen ansehnlichsten Theil. — Die Balkenstrahlung, *Radiatio corporis callosi*, besteht aus den queerlaufenden Markbündeln des Corpus callosum, welche theils vom Seitenrande desselben über dem Corpus striatum in den Markkörper eindringen, sich zwischen die longitudinal emporgestiegenen Bündel des Stabkranzes einschieben und an diese anlegen und mit ihnen gegen die Gyri der oberen Fläche hin sich ausbreiten, theils auf ähnliche Weise vom Knie und der Zange des Balkens in den Vorder- und Hinterlappen dringen. — Die accessorischen Markbündel gehen nicht von jenen beiden Radiationen aus, haben eine verschiedene Richtung, gehen aber mit ihnen vereinigt in die Markblätter der Gyri über; die ansehnlichsten sind: 1) Die Zwinge, *Cingulum*, läuft über dem Seitenrande des Corpus callosum an der inneren Seite des Corpus medullare, dringt nach vorn, neben dem Genu corporis callosi sich umbiegend, in den Lobus anterior, nach hinten neben dem hinteren Ende des Balkens in den Lobus posterior (mit dem Mark des Zwickels sich vereinigend) und dann nach unten und vorn in den Lobus medius, in dem Gyrus hippocampi endigend. Ihr unteres inneres Bündel bildet die sog. Stria longitudinalis lateralis corporis callosi (S. 867.) und geht in die Fascia dentata hippocampi (S. 865.) über. 2) Das sehr starke Bogenbündel oder die intermediäre Marksubstanz, *Fasciculus arcuatus*, läuft in ähnlich gebogener Richtung an der äufseren Seite des Corpus medullare, und zwar des Stabkranzes, erstreckt sich vom Lobus anterior an durch den Klappdeckel in den Lobus posterior und wieder nach vorn und unten in den Lobus medius: sein mittlerer Theil bildet vorzüglich das Mark der Insel und liegt zwischen dieser und der Capsula externa, wird jedoch von letzterer durch eine Schicht grauer Substanz (Burdach's Vormauer, Claustrum) getrennt. 3) Das Hakenbündel, *Fasciculus uncifornis*, ist stark gekrümmt, liegt mit seinem mittleren Theile

in dem vorderen Ende der Insel, und neben der Lamina cribrosa nach aufsen; biegt sich nach vorn über die Fossa Sylvii hinweg in den Lobus anterior, nach hinten unter die Fossa Sylvii herabsteigend in die Spitze des Lobus medius. 4) Das untere Längenbündel, *Fasciculus longitudinalis inferior*, erstreckt sich unter dem Fasciculus arcuatus und der Capsula externa, über dem Fasciculus unciformis, durch die untere Fläche des Lobus anterior, medius und inferior. — Die Markbündel und Fasern des Stabkranzes, der Balkenstrahlung und der accessorischen Bündel legen sich sämmtlich, wo sie zusammentreffen, sehr genau an einander, oft durch Einschiebung und unvollkommene Kreuzung, und bilden vereinigt an der Oberfläche des Markkörpers die Markblätter der Gyri, von denen einige indessen vorzugsweise von der einen oder anderen Strahlung oder Bündel ihre Grundlage zu erhalten scheinen: so z. B. die unteren Gyri an der inneren Fläche der Hemisphäre von der Zwinge; die am oberen Rande, der oberen und der äufseren Fläche der Hemisphäre von der Balkenstrahlung und dem Stabkranze, die der äufseren Fläche auch von dem Fasciculus arcuatus; die der unteren Fläche von dem Stabkranze, der Balkenstrahlung, der Zwinge und dem Fasciculus longitudinalis inferior; die der Insel und der benachbarten Theile des Lobus anterior und medius vom Stabkranze, dem Fasciculus arcuatus und Fasciculus unciformis.

In der Marksubstanz des Lobus medius, in der vorderen stumpfen Spitze desselben und vor dem Ende des Cornu inferius ventriculi lateralis, findet sich ein Klumpen grauer Substanz, von Burdach der Mandelkern, Nucleus amygdalae genannt.

6) *Ventriculus lateralis cerebri* s. tricornis, s. magnus, die Seitenhöhle des Gehirns, eine Höhle, deren Wände in gesundem Zustande wahrscheinlich an den meisten Stellen eng an einander liegen, befindet sich im Innern der Hemisphäre und besteht aus einer mittleren, zwischen Balken, Hirnganglien und Markkörper eingeschlossenen Abtheilung, und aus drei in den vorderen, hinteren und mittleren Lappen eindringenden und blind endigenden Verlängerungen oder Hörnern. Die mittlere Abtheilung oder die Seitenkammer, *Cella lateralis*, hat eine längliche Gestalt,

ist von vorn nach hinten ungefähr 1½″ lang, vorn 8‴, hinten 1″ breit, und von oben nach unten da, wo ihr Dach und Boden einander nicht berühren, 1‴ bis 2‴ hoch. Sie gränzt nach innen an den Verbindungstheil der Hemisphären, liegt 1″ bis 1½″ unter der oberen Fläche, und 1½″ bis 2″ von der äufseren Fläche der Hemisphären entfernt. Ihre obere Wand oder Dach, *Tegmentum ventriculi lateralis* s. Centrum ovale Vieussenii, ist von dem Seitenrande des Balkens und dem Übergange der Balkenstrahlung in den Markkörper gebildet (hinterwärts namentlich von der sog. Tapete, der untersten Faserschicht des hinteren Endes des Balkens): die nach innen abhängige untere Wand oder der Boden wird von der oberen Fläche des Sehhügels, dem mittleren Theile und der Cauda des Corpus striatum und der Stria terminalis zwischen beiden, zusammengesetzt: nach aufsen wird sie von dem Markkörper, und namentlich von den aus dem Corpus striatum in den Stabkranz übergehenden Bündeln und deren Vereinigung mit der Balkenstrahlung begränzt: nach innen vom hinteren Theile des Septum pellucidum und vom Fornix. Nach vorn geht sie in das Cornu anterius, nach hinten in die Fissura transversa cerebri und das Cornu posterius und descendens über. — *Cornu anterius*, das vordere Horn, erstreckt sich von der Cella lateralis aus in der Länge von ½″ bis ¾″ nach vorn in den Lobus anterior, ist ungefähr 2‴ weit, dreiseitig, wird oben vom vorderen Ende des Balkens, welcher sein Dach bildet, nach innen vom vorderen Theile des Septum pellucidum, nach aufsen von dem Kolben des Corpus striatum, nach vorn vom Genu corporis callosi eingeschlossen. — *Cornu posterius* s. Fovea digitata, das hintere Horn, hat eine dreiseitig pyramidalische Gestalt, 1″ bis ¾″ lang, vorn 4‴ bis 6‴, hinten nur 2‴ weit: es geht vom hinteren äufseren Ende der Cella lateralis, leicht nach aufsen sich biegend nach hinten in die Markmasse des Lobus posterior, ziemlich nahe an der inneren Fläche desselben, und endigt ½″ von dem hinteren Ende dieses Lappens entfernt. Sein Dach wird von der Forceps corporis callosi und der Tapete gebildet. An der inneren Wand dieses Horns ragt ein weifser, länglicher, öfters durch mehrere longitudinale Kerben getheilter Vorsprung hervor, *Unguis* s. *Calcar avis*

s. Eminentia digitalis s. Pes hippocampi minor, der Sporn, die Vogelklaue, der kleine Seepferdfufs: welcher dadurch entsteht, dafs das Mark des Zwickels wegen des unter demselben verlaufenden Sulcus sich im Inneren des hinteren Horns hervordrängt. — *Cornu descendens* s. *inferius* s. laterale, das absteigende oder untere Horn, hat eine längliche bogenförmige, nach aufsen convexe Gestalt und erstreckt sich vom hinteren äufseren Ende der Cella lateralis nach unten und vorn in die Markmasse des Lobus medius, bis in dessen vordere stumpfe Spitze; ist $^5/_4$ ″ bis $1^1/_2$ ″ lang, in seiner Mitte 5‴ bis 6‴, an seinem unteren vorderen Ende 9‴ weit. Sein Eingang liegt in der Fissura transversa cerebri zwischen der hinteren Fläche des Thalamus opticus und dem Splenium corporis callosi, vor dem Eingange des Cornu posterius, woselbst es eine dreieckige, mit der Spitze nach aufsen und hinten gerichtete Erweiterung bildet. Sein Dach wird von der Balkenstrahlung (Tapete), dem hinteren Ende der Taenia semicircularis, der Cauda corporis striati und dem Fasciculus arcuatus, seine äufsere Wand von der Tapete, dem Stabkranz und dem Fasciculus arcuatus gebildet: sein Boden von dem Gyrus hippocampi und dem Fasciculus longitudinalis inferior zusammengesetzt. Nach innen gränzt es in seinem oberen hinteren Theile an den Tractus opticus und Pedunculus cerebri, ohne mit diesen Theilen verschmolzen zu sein, indem es von ihnen durch die seitliche Verlängerung der Fissura transversa cerebri (S. 851.) getrennt und hier nur von der Tun. arachnoidea und Pia mater verschlossen wird: in seinem unteren vorderen Theile wird es nach innen durch den Uncus (S. 854.) geschlossen. Sein vorderes erweitertes Ende gränzt an den Mandelkern (S. 862). Auf dem Boden des Cornu descendens liegt der *Hippocampus* s. *Cornu ammonis* s. Pes hippocampi major, der Seepferdfufs oder das Ammonshorn: ein weifser gekrümmter Wulst, welcher in derselben Richtung, wie das untere Horn selbst verläuft, nach aufsen convex, nach innen concav: sein oberes, 4‴ breites Ende beginnt am Eingange des absteigenden Horns, von dem Splenium corporis ausgehend oder wenigstens mit demselben innigst verschmolzen: sein unteres vorderes Ende erstreckt sich nicht ganz bis zum Ende des Cornu descendens, ist 7‴ bis 8‴ breit, 3‴

noch, und an seiner oberen Fläche durch drei bis fünf, meistens durch vier Kerben in fünf kurze Hervorragungen, sog. Zehen des Seepferdfufses) getheilt, und geht nach innen n den Haken (Uncus) über. Der Hippocampus wird vorzüglich dadurch gebildet, dafs der Gyrus hippocampi, welcher an der unteren Fläche des Lobus medius verläuft S. 854.) und die Zwinge und den Zwickel aufnimmt, sich nach oben in die Höhle des Cornu descendens eindrängt: r wird an seiner Oberfläche von einem dünnen umgerollen Markblatt (die Mulde) gebildet, welches theils vom plenium corporis callosi, theils vom Marke des Gyrus hippocampi herstammt: sein Inneres besteht aus zwei dickeren chichten grauer Substanz, welche durch ein inneres, von em inneren concaven Umfange des Gyrus hippocampi hertammendes, gleichfalls gerolltes Markblatt getrennt werden. Auf dem Queerdurchschnitte des Ammonshorns zeien sich daher zwei weifse und zwei graue, um einander erollte Schichten: letztere hangen mit der grauen Substanz n Inneren des Haken (dem sog. Hakenganglion) zusamen. — An dem inneren concaven Umfang des Hippocamus ist ein dreiseitiger, mit einem scharfen concaven Rande ersehener, sichelförmiger Markstreifen angeheftet, d. i. der aum, *Fimbria s.* Taenia, eine Fortsetzung des Crus posteius fornicis, welche längs des Ammonshorns herabsteigend n den Uncus übergeht. Von der Fimbria bedeckt erscheint, leichfalls an der inneren Seite des Ammonshorns, die gehnte Leiste, *Fascia dentata*, ein grauer, vielfach eingeerbter Streifen, welcher der innere Rand der innersten rauen Schicht des Cornu ammonis ist und das innere unere Bündel der Zwinge aufnimmt. — In der dreieckigen rweiterung neben dem Eingange des Cornu descendens und or dem Eingange des Cornu posterius findet sich in selteen Fällen eine rundliche Erhabenheit, oder ein kurzer, iedriger, nach aufsen vom Hippocampus herabsteigender Vulst: d. i. die Eminentia collateralis Meckelii.

Alle im Ventriculus lateralis frei liegenden Theile des irns werden vom Ependyma überzogen, welches die Oberäche aller Hirnhöhlen bekleidet (S. Pia mater).

Mittlerer Theil des grofsen Gehirns.

1) *Corpus callosum* s. Trabs cerebri s. Commissura magna, der *Balken* oder die Hirnschwiele, ist ein länglicher, von vorn nach hinten gerichteter, platter weifser Streifen, welcher von allen Commissuren am meisten nach oben liegt, den Boden der Scissura longitudinalis cerebri bildet und vorzüglich die Markkörper der Hemisphären verbindet und zu ihrer Zusammensetzung wesentlich beiträgt. Er besteht aus queerlaufenden Markfasern, welche gröfstentheils zu senkrecht stehenden Blättern vereinigt sind. Man unterscheidet an ihm den mittleren Theil, den Balkenstamm, *Truncus corporis callosi*: das vordere Ende, welches als Balkenknie, Genu corporis callosi, sich umrollt und in den nach unten und hinten gerichteten Balkenschnabel, Rostrum corp. callosi, übergeht: das hintere Ende, welches den Balkenwulst, Splenium corp. callosi, bildet: die obere und untere Fläche, und die Seitenränder. Die Länge des Balkens vom Genu zum Splenium beträgt meistens 3″; die Breite vorn $^5/_4$″ bis $1^1/_2$″, hinten 2″; die senkrechte Dicke oder Höhe am Truncus 2‴ bis 3‴, am Genu 4‴, am Splenium 6‴. Die Queerfasern, aus welchen die Masse des Balkens besteht, sind zu platten Bündeln oder dicken Blättern vereinigt, deren Ende an den Seitenrändern des Balkens als Balkenstrahlung, *Radiatio corporis callosi,* in die Hemisphären übergehen und sich gröfstentheils an die Bündel des Stabkranzes genau anlegen (S. 861).

Die obere Fläche des Balkens ist leicht convex, liegt nur in der Mittellinie auf dem Boden der Scissura longitudinalis ganz frei und ist hier durch die *Chorda longitudinalis* s. Raphe externa corp. callosi ausgezeichnet, welche vom Genu bis zum Splenium verläuft und aus zwei schmalen, etwas erhabenen, durch eine flache Furche getrennten Streifen besteht. Neben der Mittellinie wird die obere Fläche des Balkens von dem unteren Gyrus cinguli überragt und ist weiter gegen den Seitenrand hin von dem Mark der Zwinge (Cingulum S. 861.) völlig bedeckt und ohne Abschälung der Zwinge nicht sichtbar: das unterste innerste Bündel der Zwinge ist auf jeder Seite mit der oberen Fläche des Balkens innig vereinigt und bildet die sog.

striae longitudinales laterales des Balken oder die bedeck-
en Bänder. Die untere Fläche des Balkenstammes ist vorn
n der Mittellinie mit dem Septum pellucidum, hinten in
röfserer Breite mit dem Fornix vereinigt; zu beiden Sei-
en liegt sie frei, als Dach des vorderen Horns und der Sei-
enkammer des Ventriculus lateralis, und ist mit Ependyma
berzogen: sie ist überhaupt breiter als die obere Fläche,
eren Fasern am Seitenrande des Balkenstammes schon nach
ufsen von der Zwinge in den Markkörper der Hemisphäre
bergehen, dagegen die Fasern der unteren Fläche erst
berhalb des vorderen Hirnganglion in den Markkörper
intreten. — Das vordere stark convexe Ende des Balken
iegt sich als Balkenknie, *Genu corp. callosi*, stark nach un-
en und alsdann nach hinten, gegen die untere Fläche des
ehirns hin, woselbst es sehr verdünnt mit einem scharfen
ande, *Rostrum corporis callosi*, Balkenschnabel, endigt,
elcher rückwärts gegen die Commissura anterior gerichtet
t. Die Seitenränder des Balkenknies gehen rechts und
nks mit fächerförmig ausgebreiteten Bündeln in den Mark-
örper vor dem vorderen Hirnganglion über: die des Ro-
rum unter jenem Ganglion bis zur Capsula externa. Vom
ostrum aus erstreckt sich noch ein dünnes schmales Mark-
latt, *Lamina genu* nach Burdach, rückwärts über dem Chi-
ma opticum bis zum Tuber cinereum und geht seitwärts
die Laminae cribrosae an der unteren Fläche der Lobi
nteriores über: von jeder Seite dieses Blattes aber läuft
n zarter Streifen, Taeniola corporis callosi, über die Com-
issura anterior hinweg zum Crus anterius fornicis. — Das
ntere Ende des Balken ist der dickste Theil desselben
nd bildet den vorzüglich an der unteren Fläche hervor-
genden Balkenwulst, *Splenium corporis callosi*, welche über
er Eminentia quadrigemina und den Polstern der Sehhügel
egt und unterwärts mit dem hinteren Ende des Fornix
Lyra und Crus posteriora) verschmolzen ist, die Fissura
ansversa cerebri oberwärts begränzt, und rückwarts frei-
egend gegen den Monticulus cerebelli hin gerichtet ist.
uf jeder Seite gehen vom Splenium corp. callosi drei Fort-
tzungen aus: 1) die Balkenzange, *Forceps corp. callosi*,
n etwas gekrümmtes, zugespitzt endigendes Markbündel,
elches rückwärts in den Lobus posterior tritt und an der

oberen inneren Seite des Cornu posterius ventriculi lateralis verläuft, mit dem Mark des Zwickels sich vereinigend: 2) die Tapete, *Tapetum*, eine dünne, aus divergirenden Fasern bestehende Schicht, welche das Dach und äufsere Wand des Cornu posterius und Cornu descendens bildet: 3) seitwärts geht das Splenium in die oberflächliche Schicht (Mulde) des Hippocampus über.

2) *Fornix* s. Trigonum cervicale, das Gewölbe, der Bogen, die Zwillingsbinde, ist ein länglicher, stark gebogener, vorn und hinten in zwei Schenkel gespaltener Markstreifen, fast gänzlich aus longitudinalen Fasern zusammengesetzt. Sein mittlerer Theil, *Corpus fornicis*, erstreckt sich in der Richtung von vorn nach hinten, ist ungefähr 1″ lang, 4‴ bis 5‴ breit, 1½‴ dick, von dreiseitig prismatischer Gestalt: die eine Fläche nach oben gerichtet, unter dem Septum pellucidum und dem Corpus callosum und mit diesen Theilen verbunden; die Seitenflächen sind schräg nach unten gewendet und bedecken nebst ihren scharfen Seitenrändern die inneren oberen Ränder und einen Theil der oberen Flächen der Thalami optici, ohne mit ihnen verschmolzen zu sein: der untere stumpfe Rand liegt frei über der dritten Hirnhöhle. Der hintere Theil des Corpus wird beträchtlich breiter und läuft in die beiden dreiseitigen hinteren Schenkel des Gewölbes, *Crura posteriora fornicis*, aus, welche stark divergirend nach aufsen und unten sich biegen und auf jeder Seite in die Fimbria des Hippocampus (S. 865.) ununterbrochen übergehen. Sie werden durch ein dreieckiges, aus longitudinalen und queeren Fasern bestehendes Markblättchen vereinigt, die sog. Leyer, *Lyra* s. Psalterium: dieses ist oberwärts, so wie die Crura posteriora selbst, mit der unteren Fläche des Corpus callosum, namentlich mit dem Splenium, verschmolzen; unterwärts aber frei und mit seichten Queerfurchen versehen. — Am vorderen Ende theilt sich das Corpus fornicis in zwei dünnere rundliche Stränge, die vorderen Schenkel, *Crura anteriora* s. Columnae fornicis. Indem diese anfänglich 1‴ weit divergirend, einen stark nach oben und vorn convexen Bogen beschreiben, erstrecken sie sich über die vorderen Enden der Thalami optici hinaus, so dafs zwischen ihnen und dem letzteren eine halbmondförmige Lücke, *Foramen*

Monroi, bleibt: biegen sich alsdann hinter der Commissura anterior nach unten, woselbst sie mit der Taenia semicularis eine Verbindung eingehen, und senken sich in die inneren Wände der Thalami optici; laufen in der Substanz der Sehhügel, nach aufsen gebogen, bis zur unteren Fläche des grofsen Gehirns herab und erscheinen hier, zwischen Substantia perforata media und Tuber cinereum, als zwei weifse, 2‴ dicke, rundlich dreieckige Erhabenheiten, *Bulbi fornicis s.* Globuli s. Eminentiae candicantes s. medullares s. Corpora mammillaria, die Markkügelchen, brustförmigen Körper: diese sind an ihren inneren Flächen mit einander verschmolzen und enthalten im Inneren graue Substanz. Von den Markkügelchen aus, steigen Fortsetzungen der Crura anteriora in Gestalt ansehnlicher Markbündel wiederum in die Höhe, welche in der Substanz der Sehhügel unter und hinter den Tubercula anteriora superiora sich verbreiten, und mit den von der Eminentia quadrigemina herstammenden Faserschichten der Sehhügel und mit den vorderen Enden der Taeniae semiculares sich verweben: — betrachtet man diese Bündel als Anfänge des Gewölbes, so sind sie als absteigende Wurzeln desselben zu bezeichnen (Burdach).

3) *Septum pellucidum*, die halbdurchsichtige Scheidewand, ist ein zwischen dem vorderen Theile des Corpus callosum und des Fornix senkrecht ausgespanntes, doppeltes Blatt, welches die Cornua anteriora und den vorderen Theil der Seitenkammern der Ventriculi laterales von einander scheidet. Sie ist dreieckig, vorn und oben dicker als hinten: der obere längste Rand an die untere Fläche des Corpus callosum, der untere vordere Rand an das Rostrum und Lamina genu des Balkens, der untere hintere Rand an die obere Fläche des Corpus fornicis geheftet: die hintere spizige Ecke ist an die Stelle der Vereinigung des Balkens und des Gewölbes, die vordere abgerundete Ecke an die concave Hinterseite des Genu corporis callosi befestigt: die untere Ecke bildet den doppelten Stiel der Scheidewand, *Pedunculus septi pellucidi*, welcher in Gestalt zweier schmaler Markblätter rechts und links in die Laminae cribrosae, vor der Commissura anterior, unterhalb der Linsenkerne, sich erstreckt. Die beide dünnen, auf beiden Seiten mit Epen-

dyma belegten Markblätter, welche das Septum bilden, sind durch einen sehr schmalen, überall geschlossenen Zwischenraum oder Spalte, *Ventriculus septi*, Incisura septi, Ventriculus cerebri primus s. quintus, von einander getrennt; dieser ist in der Mitte der Länge des Septum und hinter dem Genu corporis callosi am weitesten.

4) *Commissura anterior*, die vordere Commissur, ist ein plattrundes, aus queeren Markfasern bestehendes Bündel, 2‴ hoch und 1‴ von vorn nach hinten dick, welches in einer Länge von ungefähr 4″ aus der einen Hemisphäre in die andere sich erstreckt, und zwar in queerer, nach vorn und unten convex gebogener Richtung. Ihr mittlerer Theil liegt nur in der Länge von 1½‴ frei an der vorderen Wand des Ventriculus tertius vor den auseinander weichenden Crura anteriora fornicis: von hier an läuft sie auf jeder Seite nach aufsen, hinter dem Pedunculus septi, vor dem Thalamus opticus, über der Lamina cribrosa, unter und hinter dem Kolben des Corpus striatum und dem vorderen Ende des Linsenkerns; dringt hinter dem Fasciculus unciformis in die Insel und endigt, pinselförmig sich ausbreitend, in dem Mark des Lobus medius über dem Cornu inferius.

5) *Commissura mollis*, die weiche Commissur, ein plattgedrückter Streifen, von vorn nach hinten 3‴ breit, 1½‴ hoch, mit vorderem und hinterem zugeschärften Rande; geht brückenartig queer durch die dritte Hirnhöhle und verbindet die inneren Flächen der Sehhügel mit einander: besteht gröfstentheils aus grauer Substanz mit wenigen queeren Markfasern und zerreifst daher sehr leicht.

6) *Commissura posterior*, die hintere Commissur, ist ein stark gekrümmtes, aus Queerfasern bestehendes Markblatt an der hinteren Wand der dritten Hirnhöhle, welches die Sehhügel mit einander und der Eminentia quadrigemina und dem Conarium vereinigt. Es hat eine rautenförmige Gestalt und ist an seiner breitesten Stelle zwischen seinen beiden seitlichen Ecken umgerollt, so dafs es in eine untere und eine obere dreieckige Hälfte zerfällt, die beide nach hinten gerichtet sind; dagegen die Stelle der Umrollung nach vorn gewendet ist und wie ein rundlicher, zwischen beiden Sehhügeln und vor der Eminentia quadrige-

ina ausgespannter Queerstreifen erscheint. Die beiden seitchen Ecken gehen in die hinteren Enden der inneren Flächen beider Thalami optici über: die untere dreieckige älfte, *Trigonum inferius commissurae posterioris*, liegt horizontal und schiebt sich zwischen die Grundflächen der rderen Hügel der Eminentia quadrigemina ein: die obere, ıfwärts und rückwärts gerichtete Hälfte, *Trigonum superius commissurae posterioris*, liegt frei über den Colliculi teriores, unter den Pedunculi conarii, und trägt das vorre Ende der Zirbel.

7) *Conarium* s. *Glandula pinealis*, die Zirbel oder rbeldrüse, hat eine eiförmige Gestalt mit abgerundeter nterer Spitze, von vorn nach hinten 3‴ bis 4‴ lang, ‴ bis 3‴ breit und 2‴ dick; besteht aus derber röthh-grauer Substanz und enthält in ihrem Inneren eine eine, nach vorn offene Höhle. Sie liegt fast gänzlich ei, mitten in der Fissura transversa cerebri, unter dem lenium corporis callosi und über den Colliculi anteriores r Eminentia quadrigemina, ist nur an ihrer unteren Seite t der hinteren oberen Ecke (Trigonum superius) der Comssura posterior verschmolzen, an ihrem vorderen Ende er durch zwei dünne Markstreifen, *Pedunculi conarii* s. ndulae pinealis, mit den inneren Flächen der Sehhügel rbunden (S. 857.). In der Höhle der Zirbel oder in ihrer bstanz finden sich harte, gelbe, rundlich eckige Körner, r Hirnsand, *Acervulus cerebri*, welche aus phosphorsaurem lk und Talk und Eiweifs bestehen.

8) *Substantia perforata media* s. Basis ventriculi tii, ist ein, an seiner unteren Fläche mit dunkelgrauer bstanz belegtes, von vielen Löchern durchbohrtes Markatt, welches in der Mitte der unteren Fläche des grofsen hirns den Boden der Grube zwischen beiden Pedunculi rebri bildet und die inneren Flächen derselben mit einder vereinigt. Ihre obere Fläche bildet den hinteren Theil s Bodens des Ventriculus tertius; hinten steht sie mit m vorderen Rande des Pons Varolii, vorn mit den Bulbi rnicis und dem Tuber cinereum in Verbindung.

9) *Tuber cinereum*, der graue Höcker, ist ein weies, graues, ziemlich dünnes Blatt, welches an der Basis rebri, vor der Substantia perforata media und den Bulbi

fornicis, zwischen den beiden Tractus optici und unter der Commissura anterior hervorragt und den vorderen Theil des Bodens der dritten Hirnhöhle bildet. Seine vordere, ziemlich senkrecht von der Commissura anterior zum Chiasma opticum herabsteigende Fläche wird die graue Endplatte, *Lamina terminalis*, genannt. Nach vorn und unten geht das Tuber cinereum in den Trichter, *Infundibulum*, über: ein kegelförmiger, nach unten sich zuspitzender Zapfen von 3‴ Länge und 1½‴ bis ¾‴ Dicke, welcher hinter dem Chiasma opticum schräg nach vorn herabsteigt, einen kurzen, trichterförmigen, nach unten stark verengerten und geschlossenen Kanal einschliefst, und mit seinem etwas verdickten, nicht hohlen Ende in die Hypophysis sich einsenkt.

10) *Hypophysis cerebri* s. *Glandula pituitaria*, der Hirnanhang, ein länglich-rundlicher, an seiner oberen Fläche abgeplatteter Körper von grauröthlicher Farbe und ziemlich fester Consistenz, liegt in der Sella turcica und wird an seiner oberen Fläche von der Dura mater dergestalt überzogen, dafs nur die Einsenkungsstelle des Infundibulum frei bleibt; durch dieses hängt er mit dem Tuber cinereum zusammen. Er mifst in queerer Richtung 6‴, von vorn nach hinten 3‴, von oben nach unten 2½‴ bis 3‴. Er wird von einem vorderen, gröfseren, bohnenförmigen, hinterwärts ausgeschweiften Lappen und einem kleineren, hinteren, rundlichen Läppchen zusammengesetzt, welche genau mit einander verschmolzen sind: der vordere Lappen besteht äufserlich aus graurother, inwendig aus weifser Substanz; das hintere Läppchen dagegen nur aus weicherer hellgrauer Substanz.

11) *Chiasma opticum* s. Commissura tractuum opticorum, ein weifser, viereckiger, platter Körper, von vorn nach hinten 3‴ lang, 4‴ bis 5‴ breit, 2‴ hoch, ist die Stelle der Vereinigung beider Tractus optici und des Ursprunges der Sehnerven, und der Mittelpunkt der von den Sehstreifen und den Sehnerven gebildeten Figur eines X. Er liegt zwischen den Laminae cribrosae, unmittelbar vor dem Tuber cinereum und ist mit der Lamina terminalis des letzteren verschmolzen. In seinem mittleren Theile kreuzen die gebogenen Fasern der Tractus optici einander,

idem die des rechten Tractus opticus zum linken Nervus pticus, und die des linken Tractus opt. in den rechten N. pticus übergehen: die seitlichen Fasern jedes Tractus pticus gehen aber an dem Seitenrande des Chiasma in den ehnerven derselben Seite über: so dafs die *Decussatio actuum* (oder nervorum) *opticorum* nicht ganz vollständig ist.

12) *Ventriculus tertius cerebri*, die dritte Hirnhle, ist ein schmaler, von vorn nach hinten sich etwas weiternder, von hinten nach vorn sich etwas vertiender Spalt zwischen den beiden Thalami optici: ungehr 1″ lang, ½″ tief, und 1½‴ bis 2‴ breit. Die itenwände dieser Höhle werden von den inneren Flächen r Sehhügel, ihr Dach von dem Corpus fornicis und der it dem Splenium corporis callosi vereinigten Lyra gebilt: vorn wird sie von den Crura anteriora fornicis, der ommissura anterior und der Lamina terminalis, hinten von r Commissura posterior und der Eminentia quadrigemina schlossen: ihr Boden wird von der Substantia perforata edia, den Bulbi fornicis und dem Tuber cinereum zusamengesetzt. Queer durch die Mitte der Höhle erstreckt h die Commissura mollis. Auf dem Boden des Ventricus tertius findet sich eine hintere und eine vordere Verfung: in die erstere, unter der Commissura posterior und r Basis eminentiae quadrigeminae, *Aditus ad aquaeductum lvii* genannt, mündet der Aquaeductus Sylvii, durch welen die vierte und dritte Höhle mit einander communien: die vordere, tiefere und geräumigere Grube, unter r Commissura anterior, ist der *Aditus ad infundibulum*; höhlt das Tuber cinereum aus und geht in den inneren um des Trichters über. Nach hinten und oben, oberhalb r Commissura posterior und dem Conarium, ist der Venticulus tertius offen vermittelst der Fissura transversa cebri: nach vorn und oben steht er zu beiden Seiten durch e Foramina Monroi (S. 868.) mit den Ventriculi laterales Verbindung.

* * *

Aus der vorstehenden Beschreibung der Lage und des ues der einzelnen Theile des Centrum encephalo-spinale giebt sich, dafs die einfach angeordneten, aus Längen-

fasern zusammengesetzten Hauptstränge des Rückenmarks, jeder für sich, in das Encephalon übergehen, hier sich weiter entfalten und verstärken: und mit den Queerfasern der Commissuren und mit grauer Substanz, unter Bildung von Hirnganglien, sich vereinigend, an der Zusammensetzung vieler einzelner gröfserer und kleinerer Gebilde des Encephalon wesentlichen Antheil nehmen. Verfolgt man den Lauf der Faserung durch das ganze Centrum encephalospinale, so erkennt man in jeder Seitenhälfte drei ununterbrochen fortgesetzte Hauptzüge longitudinaler Fasern, dagegen die transversalen und schräg laufenden Fasern der mittleren unpaaren Verbindungstheile in abgesonderte, gröfsere und kleinere Bündel zerfallen, welche unter einander wenig zusammenhangen, aber mit den Longitudinalfasern theils unmittelbar, theils durch eingemischte graue Substanz, vielfach und genau sich verbinden.

Die Hauptzüge der longitudinalen Fasern kann man als Systeme der vorderen, seitlichen und hinteren Hauptstränge bezeichnen:

1) *System der vorderen Stränge.* Zu diesem gehören die vorderen Stränge der Medulla spinalis und oblongata mit den Pyramiden, die vorderen und hinteren Pyramidenbündel des Pons Varolii, die Pedunculi cerebri und die Entfaltung derselben in Bündel, welche theils durch die grofsen Hirnganglien dringen, theils zwischen und neben denselben als Taenia semicircularis und Capsula interna et externa aufsteigen: sämmtlich aber als Stammstrahlung oder Stabkranz den mittleren Theil des Corpus medullare der Hemisphaerae cerebri bilden.

2) *System der mittleren Stränge.* Dieses enthält die mittleren Stränge der Medulla spinalis et oblongata nebst den Oliven, die Crura medullae oblongatae ad eminentiam quadrigeminam, die Lemnisci und die Eminentia quadrigemina, welche den gangliösen Centralpunkt dieses Systems bildet. Die Vereinigung dieses Systems mit dem grofsen Gehirn wird durch die, von den Vierhügeln zu den Sehhügeln übergehenden Brachia corporum quadrigeminorum, auch durch die Commissura posterior vermittelt: ob es noch mit anderen Gebilden des grofsen Gehirns, und mit

welchen, in unmittelbarem Zusammenhange stehe, ist noch nicht mit Sicherheit erforscht.

3) *System der hinteren Stränge.* Zu diesem gehören die hinteren Stränge der Medulla spinalis et oblongata, die Corpora restiformia und ihre Entfaltung in den Hemisphaerae cerebelli: es ist nicht unmittelbar mit dem grofsen Gehirn verbunden, sondern nur vermittelst der Eminentia quadrigemina, welche die von den Markkörpern des kleinen Gehirns ausgehenden Crura cerebelli ad eminentiam quadrigeminam aufnimmt.

Häute des Rückenmarks und Hirns, Meninges.

Das ganze Centrum encephalo-spinale wird von drei Hirnhäuten, einer innersten Gefäfshaut, einer mittleren serösen und einer äufseren fibrösen Haut umgeben.

1) *Meninx vasculosa* s. *Pia mater* s. Tun. cerebri propria, die Gefäfshaut des Hirns oder weiche Hirnhaut, ist eine dünne, halbdurchsichtige, leicht zerreifsbare, aus Zellstoff gewebte Haut, welche überall die freien Oberflächen des Hirns und Rückenmarks sehr genau bekleidet, in die Vertiefungen, Spalten und Höhlen eindringt und die Stämmchen der Arterien und Venen dieser Organe (S. 666. 669—671. 764.) enthält, die in ihr sich vielfach und fein verästeln, bevor sie in die Nervensubstanz eintreten oder aus ihr hervordringen. Ihre äufsere freie Fläche ist glatt und feucht; die innere angewachsene liegt unmittelbar auf der Nervensubstanz und hängt mit ihr nur durch die zarten dünnhäutigen, aber ungemein zahlreichen Arterienreiser und Venenwurzeln ziemlich fest zusammen.

Die Gefäfshaut des Rückenmarks, *Pia mater medullae spinalis*, ist dicker und fester, umschliefst sehr eng die Masse des Rückenmarks, so dafs letztere bei Ein- und Durchschnitten durch die Elasticität dieser Haut hervorgepresst wird: sie dringt mit Falten in die Fissurae longitudinales, nicht aber in die Sulci laterales ein, und bildet an dem rechten und linken seitlichen Umfange des Rückenmarks eine niedrige Longitudinalfalte, mit welcher die Zacken des Lig. denticulatum (S. 880.) sich verbinden. Vom Conus

medullaris an bildet sie einen plattrundlichen, 1‴ dicken Strang, *Filum terminale medullae spinalis*, welcher zwischen den langen Wurzeln der Lumbar- und Sacralnerven bis zum unteren Ende des von der Dura mater gebildeten länglichen Sackes herabläuft und mit demselben verwächst; er enthält Gefäfse und das letzte Paar der Rückenmarksnerven.

Die *Pia mater encephali* ist zarter, weniger elastisch und weniger fest mit der Oberfläche des Hirns verbunden, dringt aber unter Bildung von Falten sehr genau in alle Vertiefungen des Mesencephalon und der Basis cerebri, und in die Tiefe aller Sulci des kleinen und grofsen Gehirns. An den Fissurae transversae cerebelli und cerebri ist sie brückenförmig zwischen den, diese Öffnungen begränzenden Theilen ausgespannt und verschliefst dadurch von hinten her den Ventriculus quartus und tertius: setzt sich aber von hier aus in die Höhlen selbst fort, theils als Ependyma, theils als Plexus choroidei.

Das *Ependyma* s. Epithelium ventriculorum cerebri s. Lamina medullaris ventriculorum cerebri, ist eine äufserst feine, durchsichtige, vielleicht nicht allein von der verdünnten Pia mater, sondern auch von der Tun. arachnoidea gebildete Haut, welche die Wände der Ventrikel überall genau auskleidet und mit der Oberfläche der Organe, welche in den Hirnhöhlen frei liegen, so genau verschmolzen ist, dafs man sie von diesen nur in Verbindung mit einer dünnen, ihrer inneren Fläche anklebenden Lage von Nervensubstanz abziehen kann. Daher erscheint die eigenthümliche Zusammensetzung und die oberflächlicheren Faserungen der Hirnganglien, des Balken, des Gewölbes u. a. m. erst nach der Entfernung dieses, aus Hirnhäuten und Hirnsubstanz gebildeten Überzugs. An vielen Stellen enthält das Ependyma sehr zarte Fasern und feine Fältchen, welche als sog. Chorden oder Chordensystem, und deren einzelne Abtheilungen unter den Namen der Garbe, des Fächel, der Tonleiter u. a. m. beschrieben worden sind (Bergmann): welche jedoch hinsichtlich ihres Vorkommens überhaupt, und hinsichtlich ihrer Anzahl, Richtung und Form, in den Gehirnen verschiedener Menschen und in den Seitenhälften eines und desselben Hirns, grofse Abweichungen darbieten.

Die *Plexus choroidei*, Adergeflechte, sind Verlängerungen

der Pia mater im Inneren der Höhlen, von der Gestalt länglicher, plattrunder, vielfach gefalteter und eingekerbter Stränge, welche im Inneren der Höhle ziemlich frei liegen, indem sie meistens nur mit dem einen Rande und den Enden locker angeheftet sind, und zahlreiche sehr gewundene Blutgefäfse enthalten. — Das Adergeflecht der vierten Hirnhöhle, *Plexus choroideus ventriculi quarti,* geht von der Vorderfläche der *Tela choroidea inferior* aus, d. i. das Blatt der Pia mater, welches an die Tonsillae, die Uvula, die Flocculi und die Corpora restiformia geheftet und die Vela sinus rhomboidei einwickelnd, die Fissura transversa cerebelli verschliefst: es hängt an den Pedunculi flocculorum, an dem freien Rande des Velum medullare posterius und am Nodulus, und schickt eine dünne, aus zarten Gefäfsen bestehende Fortsetzung nach vorn, unter dem Velum medullare anterius und durch den Aquaeductus Sylvii, vermittelst welcher es mit dem Plexus choroideus ventriculi tertii zusammenhängt. — Die Adergeflechte der dritten Höhle und der Seitenhöhlen gehen von der *Tela choroidea superior* s. Velum choroides s. Plexus choroideus tertius, dem Gefäfsvorhange, aus. Dieses ist ein dreieckiges, hinterwärts breiteres Blatt, welches in die Fissura transversa cerebri eindringt, das Conarium vollständig einwickelt, alsdann nach vorn läuft, indem es mit seiner oberen Fläche an das Splenium corporis callosi, die Lyra und das Corpus fornicis geheftet ist, mit seiner unteren Fläche aber den Ventriculus tertius und den inneren Theil der oberen Flächen der Sehhügel bedeckt: sein vorderes Ende erstreckt sich bis in die Foramina Monroi, seine Seitenränder unter dem Fornix hinweg bis auf den Boden der Seitenkammern der Ventriculi laterales. Es enthält aufser vielen kleinen Gefäfsen die Venae cerebrales internae, die in seinem hinteren Theile zur Vena cerebralis magna Galeni zusammenfliefsen (S. 765.). Von seiner unteren Fläche hängt der *Plexus choroideus ventriculi tertii,* meistens in Gestalt zweier dünner Stränge herab, welcher sich rückwärts oberhalb der Commissura mollis in den Aditus ad aquaeductum Sylvii erstreckt und mit dem Plexus choroideus ventriculi quarti anastomosirt. An die Seitenränder der Tela choroidea sind die ansehnlichen *Plexus choroidei laterales,* dexter et sinister,

geheftet: jeder derselben beginnt im Foramen Monroi und läuft in der Cella lateralis und Cornu descendens, längs des Seitenrandes des Corpus fornicis und längs der Fimbria, rückwärts und sodann nach unten und vorn: im Eingange des Cornu descendens bildet er einen etwas dickeren Klumpen, *Glomus choroideus;* in der Verlängerung des Queerschlitzes an der inneren Wand des Cornu descendens hängt er mit der Pia mater und den Gefäfsen an der unteren Fläche der Hemisphaera cerebri zusammen und nimmt hier die A. choroidea auf (S. 666.); dagegen im Foramen Monroi die Vena choroidea lateralis (S. 766.) aus ihm in die Tela choroidea übergeht.

In der Pia mater finden sich öfters, vorzüglich bei älteren Menschen, einzelne Haufen kleiner, rundlicher, weifslicher oder röthlicher, weicher Körper, Granulationes cerebrales s. Glandulae Pacchioni genannt: sie sind keine Drüsen, sondern abnorme Bildungen und zeigen sich am häufigsten auf den obersten innersten Gyri des grofsen Gehirns, an den Rändern der Scissura longitudinalis cerebri, auch in der Nähe der Flocculi cerebelli, an den Fissurae transversae cerebri und cerebelli, an den Plexus choroidei, auf dem Boden der vierten Hirnhöhle u. a. Stellen. Die Plexus choroidei enthalten zuweilen Hirnsand, dem der Glandula pinealis durchaus ähnlich.

2) *Meninx serosa* s. *Tunica arachnoidea*, die Spinnwebenhaut oder mittlere Hirnhaut, ist eine sehr zarte, durchsichtige, seröse Haut, deren äufserer Sack mit der inneren Fläche der Dura mater innigst verwachsen ist, deren eingestülpter Theil dagegen die Hirn- und Rückenmarks-Gefäfse und die Nervenwurzeln einwickelt und sodann das ganze Centrum encephalo-spinale ziemlich locker überzieht, auch mit den Telae choroideae in die Höhlen eindringt, die Plexus choroidei mit einer sehr dünnen Hülle bekleidet, vielleicht auch Antheil an der Zusammensetzung des Ependyma nimmt. Am Rückenmark bildet der eingestülpte Theil der Spinnwebenhaut einen sehr länglichen, ziemlich weiten Sack, welcher das Rückenmark und die Nervenwurzeln bis zu ihrem Austritt aus der Dura mater locker umgiebt und bis zum unteren Ende des von der Dura mater gebildeten Sackes hinabreicht. In der Schädelhöhle überzieht der

eingestülpte Theil der Tun. arachnoidea die Oberfläche des Encephalon ziemlich locker, indem diese Haut über die tieferen Sulci zwischen den Lappen des kleinen Gehirns, über die Fossa Sylvii und über den Raum an der unteren Fläche des Encephalon zwischen Pons Varolii und Chiasma opticum, brückenförmig ausgespannt ist: auf den Gyri aber mit der Pia mater genauer verwachsen ist und in die engeren Sulci zwischen den Gyri einzudringen scheint. Über die Fissura transversa cerebelli ist sie locker hingespannt, so dafs dieser Schlitz unmittelbar nur von der Pia mater geschlossen wird; jedoch dringt sie mit der Tela choroidea posterior in die vierte Hirnhöhle ein: an der Fissura transversa cerebri ist sie fest mit der Tela choroidea superior verwachsen, trägt wesentlich zur Verschliefsung dieses Schlitzes bei, bildet einen kurzen Kanal um die Vena cerebralis magna, und dringt mit der Tela choroidea in die Ventriculi tertius und laterales ein, die Plexus choroidei umhüllend.

3) *Meninx fibrosa* s. *Dura mater* s. Tun. cerebri fibrosa, die harte Hirnhaut, ist eine weifsliche, glänzende, halbdurchsichtige, sehr starke und wenig elastische, fibröse Haut: ihre äufsere Fläche ist rauh, die innere Fläche aber überall von dem äufseren Sacke der Tun. arachnoidea bekleidet und innig mit ihr verwachsen, daher sie vollkommen glatt und feucht erscheint. Sie bildet eine geschlossene, nur von Gefäfsen und Nerven durchbohrte Höhle, welche mehr die Gestalt der Schädelhöhle und des Rückgratkanals, als die der Oberfläche des Hirns und Rückenmarks nachahmt und daher von diesen Organen nicht ganz vollständig ausgefüllt wird.

Die harte Rückenmarkshaut, *Dura mater medullae spinalis*, ist dünner und ausdehnbarer als die des Hirns, gröfstentheils aus Längenfasern gewebt, und bildet einen langen Sack, welcher mit einer weiten Öffnung im Foramen magnum occipitale beginnt, durch den Canalis spinalis, welchen er aber nicht ausfüllt, herabsteigt und im Herabsteigen weiter wird, bis er, mit einer stumpfen Spitze sich schliefsend, innerhalb des zweiten oder dritten Wirbels des Kreuzbeins endigt. Im Umfange des Foramen magnum und im Atlas ist er mit der Beinhaut dieser Knochen, mit dem

Apparatus ligamentosus und dem Lig. obturatorium posterius fest verwachsen und hieselbst von den Aa. vertebrales durchbohrt: übrigens wird er vorn durch kurzen Zellstoff an das Lig. longitudinale posterius der Wirbelsäule befestigt, seitwärts und hinterwärts von vielem schlaffen, fett- und gefäfsreichen Zellstoff umgeben: sein unteres Ende aber durch fünf bis sechs sehnige Fäden im unteren Ende des Canalis sacralis an die Knochen und das Lig. sacrococcygeum posterius angeheftet. Er ist beträchtlich weiter als der Umfang des Rückenmarks, kann sich jedoch wegen seiner lockeren Befestigung demselben anschmiegen. An jeder Seite giebt er 31 weitere und engere, röhrenförmige Scheiden ab, deren Eingang meistens eine vordere und hintere ovale Öffnung darbietet: diese schliefsen die Wurzeln der Nn. spinales ein, dringen mit diesen durch die For. intervertebralia, woselbst sie sich etwas erweitern, und gehen in das Neurilema der kurzen Stämme dieser Nerven über: aufserdem wird er nur von kleinen Gefäfslöchern durchbohrt.

Im Inneren des Sackes der harten Rückenmarkshaut findet sich an jeder Seite, zwischen den vorderen und hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven, das gezahnte Band, *Ligamentum denticulatum* s. serratum medullae spinalis: d. i. eine zusammenhangende Reihe von ungefähr 20 platten Zacken, die mit ihrer breiteren Basis von den Seitenfalten der Pia mater (S. 875.) ausgehen, an ihrer vorderen und hinteren Fläche von der Tun. arachnoidea überzogen werden, und mit dickeren, plattrundlichen, glänzenden fibrösen Spitzen in die innere Fläche der Dura mater übergehen. Dieses Band, an welchem das Rückenmark innerhalb des Sackes der Dura mater schwebend aufgehangen ist, wird daher von dieser und der Pia mater gemeinschaftlich gebildet. Die oberste Zacke befindet sich im For. magnum occipitale, die unterste im zwölften Brust- oder ersten Bauchwirbel: die oberen Zacken stehen enger beisammen und sind queer gerichtet, die unteren mit schräg nach unten gerichteter Spitze. Gewöhnlich findet sich am oberen Theile des Rückenmarks eine Zacke zwischen jedem höheren und tieferen Nervenursprunge, jedoch ist ihre Anzahl veränderlich. Am Conus medullaris und am Filum terminale zei-

gen sich keine Zacken, sondern nur ein sehniger Faden an jeder Seite.

Die harte Hirnhaut, *Dura mater encephali*, bildet eine, den inneren Raum der Schädelhöhle und der Oberfläche des Encephalon genauer angepafste Höhle, indem sie die innere Fläche der Schädelknochen überall bekleidet und die Stelle einer besonderen Beinhaut vertritt (daher auch Pericranium internum geuannt wird): und aufserdem erstrecken sich von ihr platte Fortsätze, Processus durae matris, in das innere der Schädelhöhle hinein, welche in den Zwischenraum zwischen dem grofsen und kleinen Gehirn und in die Fissurae longitudinales zwischen den Seitenhälften dieser Organe eindringen. Sie ist fester und unnachgiebiger als die harte Rückenmarkshaut, an verschiedenen Stellen von ungleicher Dicke, und aus kürzeren, longitudinalen und schrägen, einander durchkreuzenden Fasern gewebt, welche an den dickeren Stellen dieser Haut, die sich vorzüglich an der Basis cranii finden, in mehreren Schichten über einander liegen. An einzelnen Stellen ist sie in zwei, von einander abstehende Blätter gespalten, welche längliche Kanäle von dreiseitiger oder plattrundlicher oder unregelmäfsiger Gestalt zwischen sich lassen. Die meisten dieser Kanäle enthalten Venen und sind die S. 762. beschriebenen Sinus venosi durae matris: andere lassen Nerven hindurchgehen. Aufserdem bemerkt man an der Dura mater zahlreiche wirkliche Öffnungen: diese sind theils Mündungen innerer Kanäle, theils einfache Löcher, gröfstentheils aber kurze hohle Fortsätze von cylindrischer oder plattgedrückter Gestalt, welche durch sämmtliche Löcher und Spalten an den Wänden der Schädelhöhle sich erstrecken, Scheiden für die durch diese Öffnungen gehenden Nerven und Gefäfse bilden und in die äufsere Beinhaut der Schädelwände übergehen. Durch diese Scheiden, durch Gefäfse und sehr kurzen straffen Zellstoff ist die äufsere Fläche der Dura mater fest an die innere Fläche der Schädelknochen geheftet, und zwar am innigsten in der Mitte der Basis cranii und an den Suturen. Diese äufsere Fläche ist daher sehr rauh und enthält die Stämmchen der Vasa meningea, welche mit ihrem Umfange über diese Fläche hervorragen.

Am Schädelgewölbe und den Seitenwänden des Schädels

ist die Dura mater, mit Ausnahme der Stellen der Suturen, lockerer befestigt und bildet in der Mittellinie des Schädelgewölbes die obere Wand des Sinus longitudinalis superior. In der Basis cranii ist sie an den Partes orbitales oss. frontis und an den äufseren Theilen der oberen Flächen der Pyramiden der Schläfebeine dünn, und locker angeheftet: dicker und auch inniger mit den Knochen verbunden ist sie dagegen an der Lamina cribrosa oss. ethmoidei, an dem Os sphenoideum, an den Spitzen und hinteren Flächen der Pyramiden der Schläfebeine, am Clivus und in den Fossae occipitales inferiores. Vermittelst zahlreicher röhrenförmiger, durch das For. coecum und die Foramina cribrosa dringender Scheiden steht sie mit der Beinhaut der Nasenhöhle in Verbindung: durch das For. opticum und die Fissura orbitalis superior fliefst sie mit der Periorbita zusammen. Sie bekleidet den Boden der Sella turcica, bildet aber aufserdem ein zwischen den Processus clinoidei anteriores und posteriores horizontal über den Sattel hingespanntes Blatt, welches nur von einer kleinen Öffnung für das Infundibulum durchbohrt ist: auch neben der Sella turcica auf jeder Seite zerfällt sie in zwei Blätter, von denen das tiefere den Sulcus caroticus bekleidet; hingegen das oberflächliche zwischen dem Proc. ensiformis und der Spitze der Pyramis oss. temporum ausgespannt ist, und die obere und die äufsere Wand des Sinus cavernosus, einer zwischen beiden Blättern eingeschlossenen unregelmäfsigen Höhle, bildet. Die obere Wand des Sinus cavernosus enthält eine weite Öffnung für die A. carotis cerebralis und zwei enge Kanäle; die hintere, zwischen der Sattellehne und dem Felsenbein ausgespannte Wand dieses Sinus nur eine einfache Öffnung: diese und jene Kanäle sind für die Augenmuskelnerven bestimmt: die äufsere Wand des Sinus bildet aufserdem durch Spaltung in zwei Blätter einen platten Raum für das Ganglion Gafseri, in welchen eine hinter dem Proc. clinoideus posterior befindliche ovale Öffnung führt. An der Pyramide des Schläfebeins überzieht die Dura mater den Hiatus canalis Fallopii, ohne röhrenförmig in ihn sich einzusenken: dringt dagegen an der hinteren Fläche der Pyramide in den Meatus auditorius internus bis auf dessen Boden und in den Canalis Fallopii ein, schickt auch eine

platt-trichterförmige blinde Verlängerung in den Aquaeductus vestibuli, welche mit der dünnen Beinhaut des Vorhofs zusammenstöfst. An den oberen Winkeln der Pyramiden schliefst sie die Sinus petrosi superiores, in der Mitte des Clivus die Sinus basilares, neben dem Clivus die Sinus petrosi inferiores zwischen ihre Blätter ein. Durch jedes Foramen jugulare schickt sie, für die einzelnen durch diese Löcher gehenden Nerven und die V. jugularis interna, besondere röhrenförmige Scheiden, durch jedes For. condyloideum anterius aber nur eine einfache Scheide: in den Fossae sigmoideae oss. temporum enthält sie die unteren Strecken der Sinus transversi. Im Umfange des For. magnum occipitale hängt sie sehr fest an den Knochen, geht in die Dura mater medullae spinalis über und enthält platte Kanäle für den Plexus circularis foraminis magni.

Die innere, von der Tun. arachnoidea bekleidete, glatte feuchte Fläche der Dura mater encephali steht fast überall mit der Oberfläche des Hirns in Berührung, ist mit derselben aber auf keine andere Weise, als durch die Venae cerebrales verbunden, welche in die Sinus durae matris sich einsenken. Die an dieser inneren Fläche sichtbaren Öffnungen sind die Eingänge der oben aufgezählten röhrenförmigen Scheiden für Gefäfse und Nerven, in welche der äussere Sack der Tun. arachnoidea nur eine kurze Strecke weit eindringt und alsdann, gegen das Hirn sich zurückliegend, in den inneren Sack dieser Haut übergeht.

Die drei platten Fortsätze der Dura mater sind mit ihren äufseren, längeren, angewachsenen Rändern an die Schädelwände befestigt und ragen mit ihren inneren kürzeren Rändern frei in die Schädelhöhle hinein. Auf der Protuberantia occipitalis interna stofsen sie zusammen und schliefsen an dieser Stelle gemeinschaftlich eine unregelmäfsig gestaltete Höhle, den sog. Confluens sinuum ein: sie bilden in ihrer Vereinigung mit einander die Figur eines Kreuzes, dessen Mittelpunkt vor der Protuberantia occipitalis interna liegt, dessen Seitenarme von den beiden Seitenhälften des Tentorium cerebelli, dessen oberer vorderer, längster Schenkel von der Falx cerebri, und dessen unterer hinterer, kürzester Schenkel von der Falx cerebelli gebildet wird.

Tentorium cerebelli, das Hirnzelt, ist in queerer, nach

der Mitte und nach vorn aufsteigender Richtung, über die hintere Abtheilung der Basis cranii, wie ein Dach ausgespannt. Seine hinteren convexen Ränder sind zu beiden Seiten an die Lineae cruciatae transversae oss. occipitis angeheftet, die äufseren, mehr geraden Ränder an die oberen Winkel der Pyramiden der Schläfebeine befestigt und erstrecken sich nach vorn bis zu den Proc. clinoidei posteriores, woselbst sie in die Wände der Sinus cavernosi übergehen: erstere enthalten die oberen Strecken der Sinus transversi, letztere die Sinus petrosi superiores. Die beiden inneren, nicht an Knochen befestigten, concav ausgeschweiften Ränder des Tentorium gehen von den Proc. clinoidei posteriores aus nach hinten, stofsen in mittlerer Entfernung zwischen diesen und der Protuberantia occipitalis interna in Gestalt eines V zusammen und bilden dadurch eine fast ovale, vorn durch die Sattellehne geschlossene Öffnung, *Incisura tentorii cerebelli*, in welcher der Pons Varolii und die Basis der Eminentia quadrigemina liegen. Die obere Fläche des Tentorium ist gewölbt, trägt die Hinterlappen des grofsen Gehirns, und vereinigt sich an ihrem erhabensten Theile oder Scheitel, in der Mittellinie hinter der Incisur, mit dem hinteren Ende der Falx cerebri: die untere ausgehöhlte Fläche bedeckt die obere Fläche des kleinen Gehirns vollständig, der Scheitel den Monticulus cerebelli. Der hintere Winkel der Incisur gränzt nach vorn an die Fissura transversa cerebri.

Falx cerebri s. Proc. (durae matris) falciformis cerebri, die Hirnsichel, läuft längs der Mittellinie des Schädelgewölbes von vorn nach hinten und ragt in die Scissura longitudinalis cerebri zwischen den beiden Hemisphären senkrecht herab. Ihr vorderes, nur $^1/_2$ ″ breites Ende ist an die Crista galli befestigt; ihr oberer convexer Rand an die Crista frontalis interna und an die Seitenränder des Sulcus longitudinalis des Schädelgewölbes, längs der Pars coronalis des Stirnbeins, der Sutura sagittalis und der oberen Kreuzlinie des Hinterhauptbeins, vermittelst zweier divergirender Blätter angeheftet, welche mit dem, den Sulcus longitudinalis bekleidenden Blatte der Dura mater, den Sinus longitudinalis superior einschliefsen. Der untere, concave, freie Rand der Hirnsichel läuft 1 ‴ oberhalb der

Mittellinie des Corpus callosum bis hinter das Splenium esselben und enthält den Sinus longitudinalis inferior. In irem Verlaufe nach hinten nimmt die Hirnsichel mehr nd mehr an Breite zu und endigt, $1\frac{1}{2}''$ breit, mit einem zwei Blätter gespaltenen Rande, welcher in den Scheitel es Tentorium cerebelli übergeht und mit diesem den Sinus ectus einschliefst.

Falx cerebelli s. Proc. (durae matris) falciformis cerebelli, die Sichel des kleinen Gehirns, steigt von der Protuerantia occipitalis interna und vom Confluens sinuum an, urch welchen sie mit dem Tentorium zusammenhängt, ngs der Crista occipitalis interna bis zum hinteren Rande es For. magnum occipitale herab und endigt hier, meistens it zwei niedrigen divergirenden Falten. Sie ragt in die ncisura marginalis posterior und Scissura longitudinalis erebelli hinein und ist zwar dicker als die Falx cerebri, ber beträchtlich kürzer und schmaler, oben breiter als nten, in der Mitte $3'''$ bis $4'''$ breit: und enthält die inus occipitales posteriores.

Nerven, Nervi.

Hirn-Rückenmarksnerven, Nervi encephalo-spinales.

Bei der Beschreibung dieser Nerven geht man von ihrem Centralende (Wurzel oder Ursprunge) aus, und betrachtet vorzüglich die Stelle des Ursprungs, den Verlauf des Nerven zwischen anderen Theilen, die Art seiner Verästelung und Verbindung mit anderen Nerven, und endlich das peripherische Ende des Nerven in Organen, welche durch ihn mit dem Centralorgane des Nervensystems in Verbindung gesetzt worden. Da die Hirn-Rückenmarksnerven paarweise vorhanden sind und in allen jenen Verhältnissen, mit sehr wenigen Ausnahmen, vollkommen symmetrisch sich verhalten: so gilt die Beschreibung jedes einzelnen in der einen Körperhälfte zugleich für den entsprechenden, in der anderen Körperhälfte verbreiteten Nerven.

Gewöhnlich theilt man diese Nerven in zwei Klassen: *Hirnnerven, Nervi encephali* s. cerebrales, und *Rückenmarksnerven, Nervi spinales.* Zu den ersteren rechnet man 12 Nervenpaare, welche von sehr verschiedenen Stellen des grofsen Gehirns, des Mittelgehirns und des oberen Endes des Rückenmarks entspringen und durch Löcher oder Spalten der Basis cranii hervordringen: zu den Nervi spinales aber 30 (richtiger 31) Paare, welche vom Rückenmarke in dessen ganzer Länge entspringen und durch die For. intervertebralia und sacralia gehen.

Die Nn. encephali zählt man von vorn nach hinten nach Ordnung der Löcher der Basis cranii, durch welche sie hervortreten, ab:

ar	I.	Nn.	olfactorii	Geruchsnerven	
»	II.	»	optici	Sehnerven	
»	III.	»	oculomusculares communes s. oculo-motorii	gemeinschaftliche Augenmuskelnerven	
»	IV.	»	oculomusculares superiores s. trochleares	obere Augenmuskelnerven	
»	V.	»	trigemini	dreigetheilte Nerven	
»	VI.	»	oculomusculares externi s. abducentes	äufsere Augenmuskelnerven	
»	VII.	»	faciales	Antlitznerven	VII.
»	VIII.	»	acustici	Hörnerven	
»	IX.	»	glossopharyngei	Zungenschld.-kopfnerven	VIII.
»	X.	»	vagi s. pneumogastrici	Lungenmagennerven	
»	XI.	»	accessorii	Beinerven	
»	XII.	»	hypoglossi	Zungenfleischnerven	IX.

Einer älteren Zählung zufolge werden nur neun Paare ngenommen, nämlich Nn. faciales und acustici als Par sepmum, Nn. glossopharyngei, vagi und accessorii als Par ctavum, und Nn. hypoglossi als Par nonum.

Die Nervi spinales werden abgetheilt nach den Strecken er Wirbelsäule, aus deren Löchern sie hervortreten, in

Nn.	cervicales,	Par	I. — VIII.	Halsnerven	8 Paare,
»	dorsales,	»	I. — XII.	Rückennerven	12 »
»	lumbares,	»	I. — V.	Lendennerven	5 »
»	sacrales,	»	I. — V.	Kreuznerven	5 »
»	coccygei,	»	I.	Steifsnerven	1 »

der anstatt des letzteren wurde ein sechstes Paar der Kreuzerven angenommen. —

Nach den Verhältnissen des Ursprungs — in sofern nämch der Nerv eine einfache oder doppelte Wurzel besitzt, ie von dem einen oder anderen, oder von zwei Systemen er Hauptstränge (S. 874.) ausgeht — nach besonderen Eienthümlichkeiten des Verlaufs und der Verbindung, und ach der physiologischen Bedeutung, lassen sich sämmtliche irn-Rückenmarksnerven in folgende Klassen ordnen:

Erste Klasse: eigentliche *Sinnesnerven*, drei Paare, Nn. lfactorii, Geruchsnerven, Nn. optici, Sehnerven, Nn. acu-

stici, Hörnerven. Sie entspringen jeder, unmittelbar oder mittelbar, von einem besonderen ganglienartigen Gebilde des Encephalon, bilden dicke, verhältnifsmäfsig kurze sog. Stämme, welche eigentlich strangförmige Fortsätze des Hirns sind: diese gehen nur sehr wenige und schwache Verbindungen mit dem Gangliensysteme ein, verlaufen meistens ungetheilt bis zu den Organen der drei höheren Sinne, des Geruchs, Gesichts und Gehörs, und breiten sich in einzelnen Häuten dieser Organe auf eigenthümliche Weise aus. Sie bestehen gänzlich aus Empfindungsfasern, besitzen aber nur eine besondere, auf Reize eigenthümlicher Art beschränkte Sensibilität: der Geruchsnerv nur für riechende Stoffe in Dunst- oder Gasform, der Sehnerv für das Licht, der Hörnerv für den Schall.

Zweite Klasse: Nerven vom System der *vorderen* Stränge mit einfachen Wurzeln entspringend: drei Paare, die des N. oculomuscularis communis, N. oculomuscularis externus und N. hypoglossus. Sie bestehen an ihrem Ursprunge nur aus Bewegungsnervenfasern, gehen bei kurzem Verlaufe und regelmäfsiger Spaltung nur wenige Verbindungen mit anderen Hirn-Rückenmarksnerven und dem Gangliensystem ein, wodurch sie wahrscheinlich einige Empfindungsfasern zugemischt erhalten: vertheilen sich nur an Muskeln und rufen in diesen willkührliche Bewegungen hervor.

Dritte Klasse: Nerven vom System der *mittleren* Stränge mit einfachen Wurzeln entspringend. Hieher gehören fünf Paare, die des N. oculomuscularis superior, N. facialis, N. glossopharyngeus, N. vagus und N. accessorius. Sie haben meistens einen gekrümmten, nicht die kürzeste Richtung haltenden, und streckenweise asymmetrischen Verlauf; gehen sehr zahlreiche Verbindungen unter einander und mit anderen Nerven, vorzüglich mit dem Gangliensysteme ein, und zwar theils vermittelst Ganglien an ihren Wurzeln, theils vermittelst ganglienartiger Anschwellungen an ihren Stämmen oder Stammganglien, theils indem ihre Äste mit anderen Nerven unter Bildung von Plexus oder Ganglienplexus zusammenhangen. An ihren Ursprüngen wahrscheinlich gänzlich oder gröfstentheils aus Bewegungsnervenfasern bestehend, (deutlich getrennte, vom System der hinteren Stränge entspringende sensitive Wurzeln sind an ihnen

nicht nachzuweisen, obgleich namentlich der N. vagus sensitive Fasern vielleicht schon in seinen Wurzeln enthält) — erhalten sie durch ihre vielfachen Verbindungen mit anderen Nerven Empfindungsfasern zugemischt. Sie verbreiten sich nur an solche Muskel- und Schleimhaut-Apparate des Kopfes, Halses, der Brust- und Bauchhöhle, welche zum Ausdruck der Gemüthsaffecte, zur Bildung der Stimme, zur Respiration und zur Ingestion und Digestion der Nahrungsmittel dienen; verleihen diesen Organen Empfindlichkeit und rufen in ihnen Muskelbewegungen hervor. Eine Reizung ihrer sensitiven Fasern bringt nicht immer eine deutliche Vorstellung zuwege: ihre motiven Fasern stehen zwar unter dem Einflusse des Willens und regen die Muskeln, in welchen diese Nerven sich verbreiten, zu freiwilligen Bewegungen an: sie stehen aber auch unter der Einwirkung der Instincte, der Gemüthsaffecte und Leidenschaften, und rufen daher auch sehr häufig unfreiwillige Bewegungen hervor: zu welchen entweder der Anreiz allein vom Gehirn ausgeht, oder welche nach einem örtlich angebrachten Reize, der öfters keine deutliche Empfindung und entsprechende Willensäufserung erregte, erfolgen (sog. Reflexionsbewegungen).

Vierte Klasse: Nerven von den Systemen der *vorderen* und der *hinteren* Stränge mit doppelten Wurzeln entspringend. Zu dieser Klasse gehören 32 durch den ganzen Körper sich verbreitende Nervenpaare, nämlich auf jeder Seite der N. trigeminus, 8 Nn. spinales cervicales, 12 Nn. spinales dorsales, 5 Nn. spinales lumbares, 5 Nn. spinales sacrales und ein N. spinalis coccygeus. Die vorderen schwächeren und hinteren stärkeren Wurzeln dieser Nerven entspringen vollkommen von einander getrennt und vereinigen sich, nachdem die hintere Wurzel zu einem Wurzelganglion angeschwollen ist, meistens zu einfachen kurzen Stämmen, welche alsbald durch regelmäfsige symmetrische Spaltung in gestreckt verlaufende Äste zerfallen und an einige Muskeln des Kopfes und sämmtliche Muskeln des Stammes und der Extremitäten, an die ganze äufsere Haut und an einige Schleimhäute sich verbreiten. Alle Nervenpaare dieser Klasse gehen schon an ihren Wurzeln, vorzüglich vermittelst der hinteren, regelmäfsige Verbindungen mit dem

Gangliensysteme ein: ihre Äste vereinigen sich durch Ansae und Plexus vielfach unter einander und mit Nerven anderer Klassen, auch mit dem Gangliensysteme, indem sie zu einzelnen Knoten desselben Zweige schicken oder von denselben empfangen. Von der Vereinigung ihrer Wurzeln an sind sie durchgängig aus motiven und sensitiven Nervenfasern zusammengesetzt, die sich indessen bei der Verästelung zum Theil wieder von einander trennen: sie verleihen den Organen, in welchen sie endigen, die allgemeine Empfindlichkeit für Reizungen sehr verschiedener Art, die durch sie zum Gehirn geleitet, deutliche Vorstellungen erwecken; und regen die von ihnen versorgten Muskeln zu Contractionen an, welche unter der Herrschaft des Willens stehen und in der Regel freiwillig erfolgen.

Erste Klasse. Sinnesnerven.

I. *N. olfactorius* s. Par primum nm. encephali, Riech- oder Geruchsnerv. Als Stamm des Geruchsnerven wird gemeiniglich der Riechstreifen, Tractus olfactorius (S. 853.) bezeichnet, welcher von der Caruncula mammillaris und vielleicht auch vom Linsenkern ausgeht, aber ein Theil des grofsen Gehirns ist. — Aus dem Bulbus olfactorius treten zahlreiche, dünne und weiche *Nn. olfactorii* hervor, welche in zwei Reihen, einer inneren und äufseren, in die röhrenförmigen Scheiden der Dura mater sich einsenken, welche durch die Löcher der Lamina cribrosa oss. ethmoidei in die Nasenhöhle sich erstrecken, und nach dieser Bekleidung von Dura mater dicker, härter und weifser erscheinen. Diese Nerven breiten sich, in die Nasenhöhle gelangt, nach vorn und hinten divergirend aus, indem sie zuerst in der Beinhaut der Nasenhöhlenwände und zum Theil in Kanälchen und Furchen der Knochen, durch Spaltung und netzförmige Vereinigung einen Plexus bilden: und alsdann mit platten und stellenweise pinselförmig ausgebreiteten Bündeln sehr feiner und vielfach verschlungener Fädchen, in der freien Fläche der Nasenschleimhaut endigen. Die innere Reihe von 9 bis 12 dickeren Nerven gehört der Nasenscheidewand an, verbreitet sich am vorderen Theile derselben weiter abwärts als am hinteren, am mitteren Theile aber bis bei-

nahe zum Boden der Nasenhöhle herab und verbindet sich mit Fädchen von den Nn. nasales septi: die äufsere Reihe, 12 bis 16 dünnere Nerven enthaltend, verbreitet sich in einem mehr weitmaschigen Plexus an der Seitenwand der Nasenhöhle, namentlich an der inneren Wand des Labyrinthus oss. ethmoidei, reicht nur bis zum unteren Rande der Concha media herab und verbindet sich mit den Fädchen von den Nn. nasales posteriores.

II. *N. opticus* s. Par secundum nm. encephali, der Sehnerv, entspringt nahe neben dem der anderen Seite vom Chiasma opticum (und vermittelst desselben und des Tractus opticus vom Thalamus opticus, S. 857.) und zwar so, dafs er theils Fasern des Tractus opticus derselben Seite, theils decussirende Fasern vom Tractus opticus der entgegengesetzten Seite in sich aufnimmt. Er ist rund, anfänglich von oben nach unten etwas plattgedrückt, 2‴ dick, mit einem ziemlich starken Neurilem versehen, welches eine unmittelbare Fortsetzung der Pia mater ist und ihn sowohl äufserlich umgiebt, als in seinem Inneren starke Bündel der Markfasern in geräumige röhrenförmige Scheiden einschliefst. Er läuft in der Richtung nach vorn und aufsen; dringt an der inneren und oberen Seite der A. ophthalmica durch das Foramen opticum in die Augenhöhle ein, nimmt die A. centralis retinae in seine Substanz auf: geht im hinteren Theile der Augenhöhle durch den von den Mm. recti oculi eingeschlossenen kegelförmigen Raum nach vorn, etwas nach aufsen sich biegend, und gelangt an den inneren Theil des hinteren Umfanges des Augapfels. Hier durchbohrt er die Sclerotica, Choroidea und Membrana pigmenti, indem er sich kegelförmig zuspitzt, so dafs er beim Eintritt in das Loch der Sclerotica noch $1\frac{1}{3}$‴, in der Choroidea aber nur $\frac{1}{5}$‴ im Dm. hält: und breitet sich in der Retina aus (S. 415). Vom Foramen opticum bis zur Sclerotica wird er von einer, $\frac{1}{5}$‴ dicken fibrösen Scheide, Vagina fibrosa n. optici, umgeben, welche von der Dura mater herstammt, im For. opticum mit der Periorbita innig verschmolzen ist und vorn in die Sclerotica übergeht. Seine Verbindung mit dem Gangliensysteme wird wahrscheinlich vermittelt durch ein oder mehrere feine, die A. centralis retinae begleitende Nervenfädchen, welche aus dem Plexus caroticus

internus oder aus dem Ganglion ciliare, nicht selten auch aus dem Ganglion sphenopalatinum herstammen: auch durch Vermischung einzelner Fädchen der Nn. ciliares mit dem Mark der Retina.

III. *N. acusticus* s. auditivus s. auditorius, Par octavum nm. encephali s. Portio mollis paris septimi, der Hörnerv. Er entspringt auf dem Boden des Ventriculus quartus, von der Lamina cinerea sinus rhomboidei und den Striae medullares (S. 837.) mit zwei Bündeln, von welchen das hintere in theils horizontalem, theils abwärts gerichtetem Laufe, nach aufsen und vorn um das Corpus restiforme sich windet: das vordere aber zwischen dem Corpus restiforme und den Bündeln des mittleren Stranges der Medulla oblongata, mit beiden innig verschmolzen, nach aufsen dringt. Der durch die Vereinigung beider Wurzelbündel gebildete Nerv erscheint sodann in dem Raume zwischen der Olive, dem Flocculus cerebelli und dem Crus cerebelli ad pontem und ist an beide letztgenannte Theile angeheftet: ist $1^1/_3$ ‴ dick, weich, aus vielfach mit einander verflochtenen Fasern zusammengesetzt und an seinem vorderen und oberen Umfange mit einer Furche zur Aufnahme des N. facialis versehen, mit welchem er durch zarte Fäden zusammenhängt. Er dringt, von der Tunica arachnoidea eingewickelt, schräg nach aufsen, vorn und oben gerichtet, in den Meatus auditorius internus und spaltet sich in demselben in den N. vestibuli und N. cochleae, welche bis zum Boden des inneren Gehörganges genau an einander geschmiegt bleiben.

1) *N. vestibuli*, der Vorhofsnerv, ist der kleinere, nach hinten und oben liegende Ast des Hörnerven: er spaltet sich in vier kurze Äste, welche, in einzelne Filamente getheilt, durch die zu der Macula cribrosa superior und inferior führenden Löcher auf dem Boden des Meatus auditorius internus, in das Vestibulum gelangen. Die Äste sind der *N. sacculoris major* zum Sacculus hemiellipticus s. Alveus communis: der *N. ampullaris superior*, *N. ampullaris externus* und *N. ampullaris inferior* zur Ampulla superior, externa und inferior der Tubuli semicirculares (S. 389).

2) *N. cochleae*, der Schneckennerv, der dickere vordere untere Ast des Hörnerven, giebt zuerst den *N. sacculoris*

minor ab, welcher durch die Macula cribrosa recessus hemisphaerici an den Sacculus rotundus des Vorhofs geht: dringt alsdann durch die Löcher des Tractus spiralis in die Schnecke mit zahlreichen Filamenten, welche durch den Tubulus spiralis und Tubulus centralis zur Lamina spiralis gelangen. (S. 392.)

Zweite Klasse. Nerven vom System der vorderen Stränge.

I. *N. oculomuscularis communis s. oculomotorius s.* oculi motorius s. Par tertium nm. encephali, der gemeinschaftliche Augenmuskelnerv oder Augenbewegende Nerv, entspringt mit mehreren in einer Reihe stehender Fäden von den Längenfasern des Pedunculus cerebri an dessen innerer Seite; einige Wurzelfäden kommen auch von den vorderen Pyramidenbündeln des Pons Varolii und erscheinen am oberen Rande der Brücke, andere von der Substantia perforata media. Der Anfang des Nerven ist plattgedrückt und liegt zwischen der A. cerebri profunda und A. cerebelli superior: bald wird er rundlich, $1\frac{1}{4}$''' dick und läuft schräg nach vorn und aufsen: durchbohrt die Dura mater neben dem Proc. clinoideus posterior und geht in der oberen Wand des Sinus cavernosus, an der äufseren Seite der A. carotis cerebralis vorbei (woselbst er durch einen oder zwei Fädchen mit dem Plexus caroticus internus des Gangliensystems in Verbindung steht?). Sodann dringt er, nachdem er in einen oberen und unteren Ast sich getheilt hat, die anfänglich noch eng beisammen liegen, durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle, indem er schräg von oben nach unten an der äufseren Seite des N. opticus, an der inneren Seite des N. oculomuscularis superior und ophthalmicus vorbeigeht.

1) *Ramus superior* ist kleiner und geht oberhalb der Nn. opticus und nasociliaris — mit letzterem oder mit der Radix longa ganglii ciliaris durch ein Fädchen verbunden — in die untere Fläche des M. rectus oculi superior, und mit einem längeren Zweige an den M. levator palpebrae superioris.

2) *Ramus inferior* ist beträchtlich dicker, liegt unter dem N. nasociliaris, giebt einen Ast an die äufsere Fläche

des M. rectus oculi internus, einen etwas dünneren an die obere Fläche des M. rectus oculi inferior, und einen langen Ast zum M. obliquus oculi inferior, welcher auf dem Boden der Augenhöhle, am äufseren Rande des M. rectus oc. inferior nach vorn läuft und durch einen kurzen starken Ast, *Radix brevis ganglii ciliaris* genannt, mit dem Ganglion ciliare zusammenhängt.

II. *N. oculomuscularis externus s. abducens s.* Par sextum nm. encephali, der äufsere Augenmuskelnerv, entspringt mit mehreren, öfters in zwei Bündel abgetheilten Wurzelfäden vom oberen Ende der Pyramide des verlängerten Marks am unteren Rande des Pons Varolii: ist $^3/_4$‴ dick, läuft an der vorderen Fläche des Pons Varolii nach oben, vorn und etwas nach aufsen: dringt am Clivus durch ein Loch in der hinteren Wand des Sinus cavernosus in in diese Höhle ein, und läuft in derselben horizontal nach vorn, an der äusseren Seite der zweiten Biegung der A. carotis cerebralis und genau an sie geschmiegt, auswärts von der Vene dieses Sinus umgeben. An dieser Stelle, 4‴ oberhalb des Foramen caroticum internum, erscheint er etwas dicker, indem die Fäden seines unteren Umfanges lokkerer an einander liegen und mit einem, zwei bis vier Fäden des Plexus caroticus internus des Gangliensystems sich verbinden: wodurch ein kleines Geflecht entsteht, in welchem aber ein oder mehrere Fäden des Gangliensystems sich nur an den Nerven anlegen, um später sich wieder von ihm zu trennen. Alsdann durchbohrt der Nerv die vordere Wand der Sinus cavernosus, unmittelbar oberhalb der Einmündung der V. ophthalmica superior in diesen Sinus: dringt in die Augenhöhle durch die Fissura orbitalis superior, nach oben an den N. oculomuscularis communis, nach aufsen an den N. ophthalmicus gränzend: läuft etwas nach aufsen, an die innere Fläche des M. rectus oculi externus und vertheilt sich nur in diesem Muskel.

III. *N. hypoglossus* s. lingualis medius s. loquens, s. Par duodecimum s. nonum nm. encephali, der Zungenfleisch- oder Unterzungennerv, entspringt vom vorderen Strange der Medulla oblongata, nämlich von der Pyramide und dem hinter ihr liegenden Theile des vorderen Stranges (dem inneren Hülsenstrange) mit zahlreichen kurzen Wur-

zelfäden, welche zwischen Pyramide und Olive in einer leicht gebogenen Reihe zum Vorschein kommen. Diese Wurzelfäden vereinigen sich zu 12 bis 16 stärkeren Fäden und diese zu drei bis vier Bündeln, welche vor der Olive und hinter der A. vertebralis convergirend nach aufsen laufen, in seltenen Fällen ein Fädchen von der hinteren Wurzel des N. cervicalis primus aufnehmen; und entweder noch in zwei Bündel getrennt, oder schon zu einem einfachen Nervenstamm sich vereinigend, die Dura mater durchbohren. Der beinahe 1 ‴ dicke Stamm tritt durch das For. condyloideum anterius hervor und liegt hiernach an der inneren und hinteren Seite des N. vagus und der V. jugularis cerebralis, genau an den ersteren geheftet: steigt sodann, um den hinteren und äufseren Umfang der V. jugularis interna, des N. vagus und der A. carotis interna sich windend, nach unten und aufsen herab bis unter den hinteren Bauch des M. digastricus maxillae inferioris: läuft von hier an nach vorn, indem er im Trigonum cervicale einen nach unten convexen Bogen beschreibt und nach innen an die V. jugularis interna und die Aa. carotides interna und externa gränzt; von aufsen aber durch die V. facialis communis und die Glandula salivalis submaxillaris bedeckt wird. Hiernach geht er nach vorn und oben, oberhalb des Cornu majus oss. hyoidei, an der äufseren Fläche des M. hyoglossus und oberhalb der Mm. mylohyoideus und geniohyoideus: alsdann in Begleitung der A. lingualis, zwischen Mm. styloglossus und genioglossus bis zur unteren Fläche der Zungenspitze. Verbindungen und Verästelung:

1) Vor dem Proc. transversus atlantis verbindet er sich durch kurze, aber ziemlich starke Äste mit dem Plexus ganglioformis des N. vagus, mit dem Ganglion cervicale superius des N. sympathicus und mit der ersten Schlinge der Nn. spinales cervicales.

2) *Ramus cervicalis* s. descendens n. hypoglossi, der stärkste und längste Ast, entspringt vom absteigenden Theile des Stammes am Anfange des Bogens und läuft durch das Trigonum cervicale und an der äufseren und vorderen Seite der A. carotis communis herab: erhält einen Verstärkungszweig vom N. vagus, (in dessen Neurilema eingeschlossen er zuweilen eine beträchtliche Strecke verläuft und vom

N. vagus zu entspringen scheint) und zwei, öfters zusammenfliefsende Äste von der zweiten Schlinge des Plexus cervicalis (zweiten und dritten Halsnerven): — giebt Äste an die beiden Bäuche des M. omohyoideus, an die Mm. sternothyreoideus und sternohyoideus, zuweilen einen Verbindungsast zum N. phrenicus, und endlich einen langen dünnen *Ramus cardiacus*, welcher hinter dem M. sternothyreoideus herabsteigend zu dem Plexus cardiacus gelangt und vielleicht dem N. vagus angehört.

3) Äste zu den Mm. thyreohyoideus und geniohyoideus, selten zum M. mylohyoideus.

4) *Rami linguales*, zahlreiche Äste an die Mm. hyoglossus, styloglossus, lingualis und vorzüglich an den M. genioglossus, welche mit Zweigen des N. lingualis und unter einander Schlingen bilden: die vordersten dieser Äste gelangen mit dem M. styloglossus bis zur Zungenspitze, ohne mit denen der anderen Seite Verbindungen einzugehen.

Dritte Klasse. Nerven vom System der mittleren Stränge.

I. *N. oculomuscularis superior* s. trochlearis s. patheticus s. Par quartum nm. encephali, oberer Augenmuskelnerv, entspringt am hinteren Rande der Eminentia quadrigemina von dem Lemniscus, da wo dieser in die Colliculi posteriores sich einsenkt, mit mehreren Fäden, von welchen zuweilen einige aus der oberen Fläche des Velum medullare anterius hervorzugehen und mit denen der anderen Seite zusammenzuhangen scheinen. Der kaum $\frac{1}{2}$ ‴ dicke Stamm des Nerven windet sich, anfangs nach aufsen, dann nach vorn und innen, um das Crus cerebelli ad eminentiam quadrigeminam und um den Pedunculus cerebri, unmittelbar unter dem inneren Rande des Tentorium cerebelli verlaufend: tritt hinter dem Proc. clinoideus posterior in ein ziemlich langes Kanälchen der Dura mater, welches an der Gränze der oberen und äufseren Wand des Sinus cavernosus verläuft: und alsdann durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle. In jenem Kanälchen liegt er anfangs unter, dann nach aufsen, endlich über dem N.

oculomuscularis communis: oberhalb des Ganglion Gasseri und dem N. ophthalmicus, mit welchem er zuweilen durch ein kurzes Fädchen eine Verbindung eingeht. In der Augenhöhle läuft er unter dem Dach derselben schräg nach vorn und innen zum M. obliquus oculi superior und senkt sich in der Mitte seines Muskelbauchs ein. Zuweilen verbindet er sich durch einen langen, über diesen Muskel hinlaufenden Faden mit dem N. infratrochlearis.

II. *N. facialis* s. communicans faciei s. Par septimum nm. encephali s. Portio dura paris septimi, der Antlitznerv, entspringt vom mittleren Strange der Medulla oblongata mit zwei Bündeln, von denen das gröfsere oberhalb und hinter der Olive, genau am unteren Rande des Pons Varolii sichtbar wird, das kleinere (Portio intermedia Wrisbergii) mehr aus der Tiefe, vom Anfange des Olivenkernbündels herstammt und innigst an das vordere Bündel des N. acusticus geschmiegt ist. Anfänglich an den unteren Rand des Pons Varolii angeheftet, löset er sich von diesem ab und läuft in der Furche am vorderen oberen Umfange des Hörnerven in den Meatus auditorius internus, woselbst das kleinere Bündel durch zarte Fädchen mit dem N. acusticus sich verbindet; alsdann aber beide Bündel zu einem rundlichen, $^4/_5$ ‴ dicken Nervenstamm sich vereinigen. Dieser dringt in den Canalis Fallopii, füllt den Kanal genau aus und erhält von der Beinhaut desselben eine starke fibröse Scheide: er läuft in ihm anfangs nach aufsen, dann aber plötzlich in einem rechten Winkel gebogen nach hinten. Diese Biegung, welche im sog. Knie des Fallopischen Kanals (S. 394.) sich befindet, wird das Knie des Antlitznerven, Genu n. facialis, genannt: an der vorderen Seite desselben bildet sich durch Aufnahme von Gangliennerven ein dreieckiges Stammganglion, *Ganglion geniculum*, aus welchem mehrere Äste hervorgehen. Von dem Knie an läuft der Stamm des N. facialis, nach der Richtung des Fallopischen Kanals, rückwärts über der Fenestra ovalis, dann aber hinter der Paukenhöhle abwärts, tritt aus dem Foramen stylomastoideum hervor und giebt hier Äste ab. Hiernach läuft er unter dem Meatus auditorius externus, zwischen den Läppchen der Parotis, an der äufseren Seite der A. carotis externa, nach vorn und aufsen und spaltet

sich am hinteren Rande des Ramus maxillae inferioris in einen oberen stärkeren und unteren schwächeren Hauptast, welche durch Spaltung in viele Zweige, und deren Vereinigung zu zahlreichen Schlingen, ein ansehnliches Geflecht, *Plexus parotideus* n. facialis, bilden.

A. *Ganglion geniculum*, s. Intumescentia ganglioformis n. facialis, das Knieganglion, hat eine dreieckige Gestalt: seine 1‴ breite Basis nimmt die vordere convexe Seite des Knie's des Antlitznerven ein, seine Spitze ist gegen den Hiatus canalis Fallopii gerichtet und nimmt den N. petrosus superficialis major und den oberen Ast des N. petrosus superficialis minor auf. Die von dem Ganglion ausgehenden Äste sind durch Vermischung von Fäden des N. facialis und des Gangliensystems gebildet:

1) Ein kleiner Zweig, welcher rückwärts und nach innen läuft und sich mit dem N. vestibuli vereinigt;

2) *Nervulus stapedius*, ein dünner Nerv für den M. stapedius, welcher im Canalis Fallopii und in der Scheide des N. facialis bis hinter die Paukenhöhle herabläuft und dann nach vorn in die Höhle der Eminentia papillaris eindringt.

3) *Chorda tympani*, die Paukensaite, ein langer, ziemlich dünner Nerv, läuft, in die Scheide des N. facialis eingeschlossen, durch den Canalis Fallopii bis nahe oberhalb des For. stylomastoideum herab, trennt sich hier vom N. facialis und steigt durch den Canalis chordae (S. 394.) wiederum aufwärts und nach vorn, tritt durch die Apertura canalis chordae in die Paukenhöhle; läuft in dieser bogenförmig nach vorn, zwischen Manubrium mallei und Crus longum incudis hindurchgehend: verläfst alsdann die Paukenhöhle, indem er, über die Sehne des M. mallei externus hinweg, durch eine Spalte zwischen dem vorderen Winkel der Pyramis oss. temporum und der Spina angularis oss. sphenoidei dringt und hieselbst zuweilen mit einem Faden des Plexus tympanicus sich vereinigt. — Von der Spina angularis oss. sphenoidei an steigt die Paukensaite schräg nach vorn herab, zwischen Lig. maxillare internum und M. pterygoideus internus und verbindet sich hier zuweilen mit einem Faden vom Ganglion oticum: gelangt unter einem spitzen Winkel an den hinteren Umfang des N. lingualis, läuft eine Strecke in der Scheide desselben und

paltet sich in zwei Äste, von welchen der vordere mit den asern des N. lingualis sich vermischt, der hintere aber om N. lingualis sich trennt und in das Ganglion maxillare ch einsenkt.

B. Äste des N. facialis unterhalb des Foramen stylomatoideum:

1) *N. auricularis posterior profundus*, hinterer tiefer hrnerv, läuft rückwärts am vorderen Rande des Proc. mastoideus und hinter der Auricula in die Höhe, verbindet ch mit dem Ramus auricularis n. vagi, auch mit Zweigen on den Nn. auricularis magnus und occipitalis minor, und eht mit einem vorderen Aste zu den Mm. auriculares posteriores, mit einem hinteren Aste zum M. occipitalis.

2) 3) *Ramus stylohyoideus* zum gleichnamigen Muskel, und *amus digastricus* zum hinteren Bauche des M. digastricus axillae inferioris: beide stehen durch dünne Fäden mit em N. glossopharyngeus, N. laryngeus superior und Plexus aroticus internus in Verbindung.

4) Zwei nach vorn und aufwärts sich biegende Verindungsäste zum N. auriculotemporalis.

5) Ein absteigender Verbindungsast zum N. auricularis agnus.

C. *Plexus parotideus n. facialis*, dessen oberer Theil ach den Namen *Pes anserinus* führt. Dieses Geflecht liegt or dem hinteren Rande des Ramus maxillae inferioris, an er äufseren Fläche des M. masseter, aber von den Läppen der Parotis überall, vorzüglich nach aufsen hin, umeben und verborgen. Der stärkere obere und der schwächere untere Hauptast des Antlitznerven theilen sich unächst in mehrere, überhaupt 5 bis 8 Äste, welche durch heils bogenförmige, gröfstentheils aber spitzige Ansae sich iederum vereinigen, und von Neuem sich spaltend, 10 is 12, nach oben, nach vorn und nach unten divergirend usstrahlende Zweige abgeben. Diese treten als Nn. faciales temporales, zygomatici, buccales, subcutanei maxillae inferioris und subcutanei colli — von welchen die drei ersteren vorzüglich dem oberen Hauptaste, die beiden letzteren insbesondere dem unteren Hauptaste angehören — am beren, vorderen und unteren Rande der Gl. parotis hervor, verbreiten sich über Schläfe, Stirn, Gesicht und oberen

Theil des Halses, für deren Muskeln sie bestimmt sind, mit zahlreichen untergeordneten Zweigen, welche sämmtlich sowohl unter einander, als mit Ästen des N. trigeminus und des Plexus cervicalis der Spinalnerven, durch Schlingen sich verbinden und durch diese Vereinigung das Ansehen erhalten, als erstreckten sie sich auch zur Haut der genannten Gegenden, welches nicht Statt findet.

1) *Nn. faciales temporales*, Schläfenerven, zwei bis drei, steigen über den Arcus zygomaticus und die Fascia temporalis schräg nach vorn in die Höhe, vertheilen sich an die Mm. auricularis anterior, auricularis superior, orbicularis palpebrarum, corrugator supercilii und frontalis: verbinden sich mit Zweigen des N. temporalis superficialis, des N. temporalis profundus anterior, welche die Fascia temporalis durchbohren, des N. lacrymalis und des N. supraorbitalis.

2) *Nn. zygomatici* s. malares s. faciales superiores, Wangennerven, zwei bis drei, von denen der stärkste gewöhnlich sehr nahe über der A. transversa faciei verläuft: gehen über das Wangenbein hinweg zum äufseren und unteren Theile der Augengegend: verbreiten sich an die Mm. zygomatici, orbicularis palpebrarum, lacrymalis, levator labii superioris alaeque nasi: verbinden sich mit den Nn. subcutaneus malae, lacrymalis, infraorbitalis und infratrochlearis.

3) *Nn. buccales* s. faciales medii, Backennerven, zwei bis vier, gehen ziemlich horizontal vorwärts über die Mitte des M. masseter hinweg: der oberste oder der zweite ist der stärkste und läuft sehr nahe über oder unter dem Ductus Stenonianus. Sie verbreiten sich an der Seitenfläche des Gesichts vom inneren Augenwinkel bis zur Unterlippe herab, an die Mm. zygomatici, levator anguli oris, levatores labii superiores, an sämmtliche Nasenmuskeln, Mm. buccinator, orbicularis oris und depressor anguli oris: verbinden sich mit den Ästen der Nn. infraorbitalis, infratrochlearis, ethmoidalis und buccinatorius.

4) *Nn. subcutanei maxillae inferioris* s. faciales inferiores, Unterhautnerven des Unterkiefers, zwei an der Zahl: gehen längs des Unterkiefers nach vorn bis zum Kinn: der untere, N. marginalis maxillae inferioris genannt, läuft nahe unter der Haut: der obere stärkere wird vom M. depressor anguli oris bedeckt. Sie vertheilen sich an die Mm. bucci-

ator, risorius Santorini, depressor anguli oris, quadratus enti, orbicularis oris und levator menti; verbinden sich it den Nn. buccinatorius und mentalis.

5. *Nn. subcutanei colli* superiores, Unterhautnerven des alses, einer oder zwei, steigen in die Regio submaxillaris nd bis zum Trigonum cervicale herab, vertheilen sich an as Platysma myoides und den vorderen Bauch des M. digastri- us maxillae inferioris, und verbinden sich in grofsen bo- enförmigen Schlingen mit dem N. cervicalis superficialis.

III. *N. glossopharyngeus* s. Par nonum nm. ence- hali s. Portio minor paris octavi, der Zungenschlundkopf- erv, entspringt mit vier bis sechs in einer Reihe stehender äden von dem mittleren Strange der Medulla oblongata, inter der Olive, unter dem N. facialis, unmittelbar über em N. vagus. Diese Wurzelfäden laufen vor dem Floccu- us cerebelli nach aufsen und dringen, in eine besondere cheide der Dura mater eingeschlossen und von den Wur- eln des N. vagus getrennt, in die vordere Abtheilung des oramen jugulare, woselbst einige der hinteren Wurzelfä- en vereinigt zu einem kleinen, weichen, grauröthlichen Wurzelganglion, *Ganglion jugulare n. glossopharyngei* s. anglion Mülleri, anschwellen. Alsdann treten die Wur- eln zu einem $^3/_5$ ''' dicken Stamm zusammen, welcher un- ittelbar unter dem For. jugulare einen Faden vom Ganglion ervicale superius des N. sympathicus erhält und zu einem tammganglion, *Ganglion petrosum*, dem Felsenknoten, an- hwillt. Dieses ist länglich rundlich, 1 ''' dick, nimmt orzüglich den vorderen Umfang des Stammes ein und liegt n der Fossula petrosa an der unteren Fläche der Pyramide es Schläfebeins. Alsdann geht der Stamm des Nerven ach unten und vorn, vor der V. jugularis cerebralis, zwi- chen A. carotis interna und A. carotis externa, an der in- eren Seite des M. stylopharyngeus, und giebt in seinem urzen Verlaufe folgende Äste ab:

1) Einen Verbindungszweig zum Ramus auricularis n. agi, welcher vom oberen Ende des Ganglion petrosum ntspringt und in der Fossa jugularis, an der inneren Seite es Bulbus venae jugularis, nach hinten geht.

2) *N. tympanicus* s. Jacobsonii, entspringt aus dem Gan- lion petrosum und dringt durch den engen, in der Fossula

petrosa oder in der Fossa jugularis beginnenden Knochenkanal aufwärts in die Paukenhöhle, woselbst er in den Plexus tympanicus übergeht (s. Gangliensystem).

3) Zweige zur Verbindung mit dem N. vagus, den Rami stylohyoideus und digastricus des N. facialis und mit dem Plexus caroticus externus s. nm. mollium: einer der letzteren geht zuweilen in den N. cardiacus superior über.

4) *Ramus pharyngobasilaris*, ein aufwärts sich krümmender Ast, welcher, die Fascia buccopharyngea durchbohrend, in die Mm. constrictor pharyngis superior, tensor und levator veli palatini dringt.

5) *Rami pharyngei*, drei bis fünf, gehen in den Plexus pharyngeus (S. 905.) über.

6) *Ramus stylopharyngeus*, zum gleichnamigen Muskel.

7) *Ramus lingualis*, der stärkste und längste Ast oder Fortsetzung des Stammes, biegt sich am hinteren Rande des M. stylopharyngeus etwas nach aufsen und vorn; gelangt an der inneren Seite des M. styloglossus zur Zungenwurzel, indem er einen Bogen, Arcus tonsillaris, unterhalb der Mandel beschreibt: giebt zahlreiche kleine Äste, nämlich aufsteigende zur Tonsilla und Mm. glossopalatinus und styloglossus: — hintere Zweige zum M. hyoglossus und zur Schleimhaut der Epiglottis: — vordere Zweige zu den Mm. lingualis und styloglossus und zur Schleimhaut des Rückens der Zungenwurzel, welche bis in die Papillae vallatae sich erstrecken (?).

IV. *N. vagus s. pneumogastricus s.* Par decimum s. octavum nm. encephali, der herumschweifende oder Lungenmagen- oder Stimmnerv, entspringt mit 12 bis 16 feinen Fäden vom mittleren Strange der Medulla oblongata, hinter der Olive und nahe vor dem Corpus restiforme, unter dem N. glossopharyngeus: vielleicht stammen einige dieser Fäden mehr aus der Tiefe vom Corpus restiforme selbst. Diese Wurzelfäden vereinigen sich zu drei bis fünf parallelen Bündeln, laufen als ein platter, 2‴ breiter, von der Tun. arachnoidea umhüllter Strang, in queerer Richtung vor dem Flocculus cerebelli, nach aufsen zum Foramen jugulare, und dringen in die vordere Abtheilung dieses Loches; in eine besondere Scheide der Dura mater eingeschlossen und dadurch von dem N. glossopharyngeus und der V. ju-

ularis interna getrennt. Im For. jugulare vereinigen sich ie Wurzelfäden zu einem rundlichen, grauröthlichen, 2‴ icken Wurzelganglion, *Ganglion jugulare n. vagi*, in wel- hes ein Faden vom Ganglion cervicale superius n. sympa- nici eindringt, und von welchem der Ramus auricularis n. agi ausgeht. Unterhalb dieses Knotens ist der aus dem or. jugulare hervortretende Stamm des N. vagus rundlich nd $^5/_4$‴ dick, liegt hinter dem N. glossopharyngeus, vor er V. jugularis interna und dem N. accessorius und hypo- lossus, ist mit diesen Nerven durch kurzen straffen Zell- off genau zusammengeheftet, nimmt die vorderen Bündel es N. accessorius in sich auf und steht auch mit dem N. ypoglossus durch einen oder zwei kurze Fädchen in Ver- indung: wendet sich aber alsbald vor dem Proc. transver- is atlantis an die innere Seite der V. jugularis interna und eigt zwischen dieser und dem äufseren Umfange der A. arotis interna und des Ganglion cervicale superius n. sym- athici herab. An dieser Stelle, $^1/_2$″ bis $^3/_4$″ unterhalb es For. jugulare, bildet der Stamm des N. vagus eine $^1/_2$″ nge, etwas platte, $2^1/_2$‴ dicke Anschwellung, *Plexus gan- lioformis n. vagi* s. Plexus nodosus, in welchem seine ein- elnen Fäden mehr als an anderen Stellen geflechtartig ver- rickt, zuweilen auch mit grauer Substanz untermischt nd: in welchem Falle die Anschwellung ein wirkliches tammganglion darstellt und das Ganglion jugulare kleiner t. Der Plexus ganglioformis steht mit dem Ganglion cer- cale superius, dem N. glossopharyngeus und dem Plexus rvicalis nervorum spinalium durch mehrere Fäden in Ver- indung: aus ihm gehen die Nn. pharyngei und der N. la- yngeus superior hervor. — Alsdann läuft der nunmehr $^1/_3$‴ dicke N. vagus an der hinteren inneren Seite der V. gularis interna und communis, an der äufseren hinteren eite der A. carotis interna und communis, also in der Fur- he zwischen beiden Gefäfsen, am Halse herab, in der cheide jener Gefäfse eingeschlossen, von diesen nur durch ine Zellstoffschicht, aber durch die Scheide selbst von dem inter ihm liegenden N. sympathicus getrennt: giebt im rigonum cervicale einen Verbindungsast zum Ramus cer- icalis n. hypoglossi, und in der Mitte des Halses die Rami rdiaci ab. Hiernach tritt der N. vagus durch die obere

Öffnung des Brustkastens in die Brusthöhle ein nnd zwar an beiden Seiten hinter der V. anonyma; der rechte N. vagus steigt aber an der äufseren Seite der A. carotis communis dextra, vor der A. subclavia dextra, und an der äufseren Seite der A. anonyma — der linke N. vagus längs der äufseren Seite der A. carotis communis sinistra, vor der Wurzel der A. subclavia sinistra und vor dem Arcus aortae herab: an diesen Stellen geben sie auf jeder Seite die Nn. tracheales inferiores und den N. recurrens ab. Sodann wenden sich beide Nn. vagi hinter die Bronchi und bilden zuerst die Plexus pulmonales, dexter und sinister, hiernach aber, an der Speiseröhre herablaufend, die Plexus oesophagei, posterior und anterior: dringen durch den Hiatus oesophageus des Zwerchfells und endigen als Plexus gastrici, posterior und anterior.

1) *Ramus auricularis n. vagi*, der Ohrast des Lungenmagennerven, entsteht vom Ganglion jugulare oder unmittelbar unterhalb desselben, erhält aber anch einen dünnen Faden vom N. glossopharyngeus (S. 901.); läuft nach hinten und aufsen, anfänglich in der Fossa jugularis oss. temporum, am inneren Umfange des Bulbus venae jugularis; alsdann durch den Canaliculus mastoideus, (welcher in queerer Richtung nach aufsen, von der Fossa jugularis an bis zum vorderen Rande des Proc. mastoideus, durch die Knochenmasse dieses Fortsatzes, hinter dem Canalis Fallopii, verläuft). Indem er in diesem Kanälchen mit dem hinteren Umfange des N. facialis sich kreuzt, giebt er ihm einen oder zwei Verbindungsäste: tritt alsdann hinter dem äufseren Ohre aus dem Canaliculus mastoideus in zwei Äste gespalten hervor, von welchen der eine mit dem N. auricularis posterior profundus sich verbindet und diesen verstärkt; der andere zum hinteren Umfange des Meatus auditorius externus dringt.

2) *Nn. pharyngei*, Schlundkopfnerven. Regelmäfsig entspringt ein N. pharyngeus superior s. major vom oberen Theile des Plexus ganglioformis, welcher auch einen Theil der aus dem N. accessorius stammenden Fasern aufnimmt: meistens auch ein N. pharyngeus inferior s. minor oberhalb oder unterhalb des N. laryngeus superior. Diese Schlundkopfnerven steigen vor der A. carotis cerebralis schräg nach vorn herab und vereinigen sich mit den Rami

pharyngei n. glossopharyngei und den Rami pharyngei des Ganglion cervicale superius des N. sympathicus, zum Schlundkopfgeflechte, *Plexus pharyngeus*, welches an der Seitenwand des Schlundkopfs in der Höhe des M. constrictor pharyngis medius liegt, die A. pharyngea adscendens umstrickt, mit dem Plexus caroticus externus und dem N. laryngeus superior Verbindungen eingeht, und mit zahlreichen kurzen Zweigen die Mm. constrictores pharyngis und pharyngopalatinus und die Schleimhaut des Schlundkopfs versorgt.

3) *N. laryngeus superior*, oberer Kehlkopfnerv. Er steigt an der inneren Seite der A. carotis interna (selten zwischen ihr und der A. carotis externa) schräg nach vorn herab und spaltet sich in einen äufseren und inneren Hauptast. Der Stamm oder die Hauptäste, welche zuweilen abgesondert von dem Plexus ganglioformis entspringen, stehen durch mehrere Fäden mit dem Plexus pharyngeus, dem Ganglion cervicale superius und dem Plexus caroticus externus in Verbindung.

a) N. *laryngeus superior externus*, der äufsere Ast, zuweilen mit dem Ganglion cervicale superius oder mit dem N. cardiacus superior durch ein Fädchen verbunden, steigt längs des M. constrictor pharyngis inferior und der äufseren Fläche der Lamina cartilaginis thyreoideae abwärts, vertheilt sich an die Mm. constrictor pharyngis inferior und cricothyreoideus, auch öfters an die Mm. sternothyreoideus und thyreohyoideus.

b) *N. laryngeus superior internus*, der innere Ast des oberen Kehlkopfnerven, gelangt in Begleitung der A. thyreoidea superior und der A. laryngea superior zwischen das Cornu majus oss. hyoidei und die Seitenplatte des Schildknorpels, vom hinteren Rande des M. thyreohyoideus bedeckt; durchbohrt die Membrana hyothyreoidea und spaltet sich in vier divergirende Äste, welche an sämmtliche eigene Muskeln des Kehlkopfs und an dessen Schleimhaut sich verbreiten. Der oberste innerste Ast vertheilt sich an die Mm. thyreoepiglotticus und aryepiglotticus und die Schleimhaut der Epiglottis: der zweite Ast geht hinter den Mm. arytaenoideus obliquus und cricoarytaenoideus posticus herab, vereinigt sich mit dem inneren Aste des N. laryngeus inferior zu-

sammen und vertheilt sich mit letzterem gemeinschaftlich an die genannten Muskeln und die Schleimhaut an der hinteren Wand des Kehlkopfes. Der dritte Ast geht zum M. arytaenoideus transversus und die Schleimhaut der Stimmritze: der vierte äufserste, welcher zuweilen vom N. laryngeus superior externus stammt, dringt zu den Mm. thyreoepiglotticus, thyreoarytaenoideus, cricoarytaenoideus lateralis und cricothyreoideus und an die Schleimhaut, welche hinterwärts jene Muskeln überzieht.

4) Verbindungszweige aus dem unteren Theile des Plexus ganglioformis zum Plexus caroticus externus, oft zum N. cardiacus superior, und zum Ramus cervicalis n. hypoglossi, welcher den Ramus cardiacus des letzteren zu bilden scheint.

5) *Rami cardiaci*, an der rechten Seite zwei bis drei, an der linken einer bis zwei, laufen an der A. carotis communis abwärts, verbinden sich zuweilen mit dem N. cardiacus superior, und senken sich in den Plexus cardiacus.

6) *N. recurrens* s. laryngeus inferior, zurücklaufender Nerv, der ansehnlichste Ast des N. vagus: der rechte kürzere entspringt unmittelbar unter der A. subclavia und steigt hinter ihr und der A. carotis communis in die Höhe; der linke längere aber entsteht weiter abwärts in der Brusthöhle, vor dem linken Ende des Arcus aortae und windet sich nach aufsen von der Chorda ductus arteriosi und unter dem Arcus aortae nach hinten, steigt alsdann hinter dem Aortenbogen und der A. carotis communis sinistra aus der oberen Öffnung der Brusthöhle hervor. Beide Nn. recurrentes laufen alsdann hinter dem seitlichen Umfange der Luftröhre, in der Furche zwischen ihr und der Speiseröhre, bis zum Schlund- und Kehlkopfe aufwärts und geben zahlreiche, zum Theil geflechtartig verbundene dünne Zweige:

a) Verbindungszweige mit dem Ganglion cervicale inferius und medium, und Rami cardiaci zum Plexus cardiacus.

b) *Nn. tracheales superiores*, obere Luftröhrenäste, welche die Luftröhre, vorzüglich den Halstheil derselben, umstricken.

c) *Rami oesophagei* an den Halstheil der Speiseröhre.

d) *N. laryngeus inferior*, unterer Kehlkopfnerv, ist das

obere Ende des Stammes des N. recurrens, durchbohrt in der Höhe des Ringknorpels den M. constrictor pharyngis inferior und giebt ihm Äste: tritt hinter dem Lig. cricothyreoideum laterale an die hintere Wand des Kehlkopfes und spaltet sich in einen inneren und einen äufseren Ast, welche an die Schleimhaut und die Muskeln des Kehlkopfs, mit Ausnahme der Muskeln des Kehldeckels, sich vertheilen. Der innere Ast fliefst auf der hinteren Fläche des M. cricoarytaenoideus posticus mit dem zweiten Aste des N. laryngeus superior internus zusammen: der äufsere Ast giebt Zweige an die Mm. arytaenoideus transversus, cricoarytaenoideus lateralis, thyreoarytaenoideus und cricothyreoideus.

7) *Nn. tracheales inferiores*, untere Luftröhrennerven, vier bis sechs, gehen zur Spaltungsstelle der Luftröhre, hangen mit den Nn. tracheales superiores zusammen und gelangen an der vorderen Fläche des Bronchus meistens bis zur Lungenwurzel, in welcher sie ein kleines weitmaschiges Geflecht bilden, welches man als *Plexus pulmonalis anterior* von dem eigentlichen Plexus pulmonalis unterscheidet.

8) *Plexus pulmonalis* s. pulmonalis posterior, *dexter et sinister*, das Lungengeflecht, entsteht, indem der gröfste Theil des N. vagus in zahlreiche dicke Äste sich auflöset, welche unter einander und mit Ästen vom Ganglion cervicale inferius, von den drei bis vier oberen Ganglia thoracica des N. sympathicus und von dem Plexus cardiacus eng vereinigt, viele enge Ansae bilden. Aus diesem Plexus, welcher an der hinteren Fläche des Bronchus und der die Lungengefäfse umgebenden Stelle des Herzbeutels liegt, gehen zahlreiche dünne Äste hervor, welche den Bronchus und die Lungengefäfsstämme umstricken und die Verästelungen derselben in die Lungenwurzel und eine ziemliche Strecke in die Lungensubstanz hinein begleiten.

9) *Plexus oesophagei, anterior et posterior*, s. Chordae ventriculi, die Schlundgeflechte, sind die in mehrere, durch zahlreiche Ansae zusammenhangende Äste gespaltenen Fortsetzungen der Stämme der Nn. vagi, welche auch einige Zweige aus den Plexus pulmonales und von den Ganglia thoracica der Nn. sympathici aufnehmen. Sie laufen vorzüglich an der vorderen und hinteren Fläche der Speise-

röhre, auf der Muskelhaut derselben herab, umstricken aber diese Röhre auch seitwärts durch Verbindungszweige und bilden überhaupt ein zusammenhangendes weitmaschiges Netz. Der Plexus oesophageus anterior wird vorzüglich vom linken, der stärkere Plexus oesoph. posterior vom rechten N. vagus gebildet.

10) *Plexus gastrici, anterior et posterior*, das vordere und hintere Magengeflecht, Fortsetzungen der Plexus oesophagei, verbreiten sich zum Theil auf der vorderen und hinteren Wand des Magens mit divergirend ausstrahlenden Ästen: zum Theil aber tragen sie zur Bildung der vom Gangliensysteme abstammenden Plexus coronarii ventriculi bei. Das hintere Magengeflecht schickt aufserdem einige Äste zum Plexus coeliacus und hepaticus.

V. *N. accessorius* (ad vagum) s. accessorius Willisii s. spinalis accessorius s. Par undecimum nm. encephali s. respiratorius externus superior (Ch. Bell), der Beinerv: entspringt vom mittleren Strange der Medulla oblongata und spinalis mit zehn bis eilf dünnen Fäden, welche nach oben und aufsen sich wendend in ein rundliches Stämmchen übergehen. Die 6 bis 7 von der Medulla spinalis kommenden Fäden sind meistens einfach, liegen zwischen den vorderen und hinteren Wurzeln der Nn. cervicales, und zwar hinter dem Lig. denticulatum, den hinteren Wurzeln näher als den vorderen, so dafs sie vom hinteren Rande des mittleren Stranges zu entstehen scheinen: der unterste dieser Fäden ist der dünnste, entspringt gewöhnlich nahe oberhalb der Wurzel des N. cervicalis VII., selten höher: der siebente Faden von unten ist gewöhnlich mit der hinteren Wurzel des N. cervicalis I. genau verklebt und oft durch ein zartes Fädchen verbunden: eine Vereinigung, welche auch, obgleich seltener, zwischen den tiefer entsprungenen Fäden und den Wurzeln des zweiten bis fünften Halsnerven Statt findet. Die drei bis vier von der Medulla oblongata abgehenden Fäden, von welchen der oberste an die Wurzel des N. vagus gränzt, sind in dünnere Fädchen gespalten und treten unter stumpferen Winkeln an das Stämmchen des Nerven. Dieses Stämmchen nimmt schon im Canalis spinalis durch die Vereinigung der untersten Fäden seinen Anfang, steigt neben dem Rückenmarke, hinter dem Lig. den-

iculatum aufwärts und durch das For. magnum occipitale n die Schädelhöhle: im Heraufsteigen alle übrige Wurzelfäden aufnehmend, wodurch es eine Dicke von $^2/_3$ ‴ erhält: und dringt durch das For. jugulare, genau an den hinteren Umfang des Ganglion jugulare des N. vagus geschmiegt und demselben einige zarte Fäden abgebend. Am unteren Theile jenes Ganglion geht ein ansehnlicher Theil der Bündel des Beinerven (sein sog. Ramus internus) — indem sie eine grauliche weichere Anschwellung bilden, die mehr oder weniger genau mit dem Wurzelknoten des N. vagus verschmolzen ist, — in den Stamm des N. vagus und dessen Plexus ganglioformis über und lassen sich bis in den N. pharyngeus superior verfolgen. Der gröfsere hintere äufsere Theil des Stammes aber (sein sog. Ramus externus) verläfst den N. vagus, wendet sich hinter der V. jugularis cerebralis nach hinten und unten, durchbohrt den M. sternocleidomastoideus in seinem oberen Drittheil oder geht nur an seiner inneren Seite vorbei und giebt ihm mehrere Äste: läuft alsdann durch den oberen Theil der Fossa supraclavicularis schräg nach hinten herab, bildet Ansae mit zwei oder mehreren Ästen des Plexus cervicalis, und gelangt endlich an die vordere Fläche des M. cucullaris, in welchem er sich mit langen Fäden, bis zu dessen unterem Ende hin, verbreitet.

Vierte Klasse. Nerven vom System der vorderen und hinteren Stränge.

N. trigeminus.

N. trigeminus s. divisus s. trifacialis s. Par quintum m. encephali, der dreigetheilte oder Drillingsnerv, ist der ansehnlichste der sog. Hirnnerven. Seine hintere stärkere Wurzel, die sog. Portio major, entspringt vom Corpus restiforme und geht in Gestalt eines plattgedrückten, $2^2/_3$ ‴ breiten Stranges, in der Hauptrichtung nach vorn, aufsen und oben, aber einen leichten Bogen nach oben und innen beschreibend, durch den Seitenrand des Pons Varolii, und erscheint in mehr rundlicher Gestalt und nur $1^2/_3$ ‴ dick, an der vorderen Fläche des Crus cerebelli ad pontem, aus einer Spalte zwischen den Queerfasern desselben hervor-

dringend. Von hier an wird sie $2\frac{1}{2}$ ‴ breit und $1\frac{1}{2}$ ‴ dick, und besteht aus ungefähr funfzig Bündeln feiner, geflechtartig verstrickter Fäden. Die vordere kleinere Wurzel, die sog. Portio minor, entsteht mit zahlreichen, sehr feinen Fäden im Pons Varolii selbst von dem vorderen Pyramidenbündel, tritt mit zwei oder mehreren Bündeln aus mehreren Spalten zwischen den Queerfasern der Brücke hervor und legt sich nun, 1 ‴ dick, an den inneren oder vorderen und oberen Rand der hinteren Wurzel, ohne mit dieser sich zu verflechten. Der $3\frac{1}{2}$ ‴ breite und $1\frac{3}{4}$ ‴ dicke, aus beiden nur an einander geschmiegten Wurzeln bestehende Stamm des Nerven geht alsdann schräg nach oben, vorn und aufsen; tritt durch die ovale Öffnung der Dura mater im vorderen Zipfel des Tentorium cerebelli, welche über dem oberen Winkel der Pyramide des Schläfebeins und nahe hinter dem Proc. clinoideus posterior sich befindet; und liegt nun zwischen den Blättern der Dura mater an der äufseren Wand des Sinus cavernosus, von der Höhle des letzteren nur durch ein dünnes Blatt getrennt. Hier schwillt die hintere Wurzel, indem ihre geflechtartig verstrickten Fäden auseinander weichen und von weicher, röthlich grauer Substanz umgeben werden, zu einem halbmondförmigen, 7 ‴ breiten und $1\frac{1}{2}$ ‴ dicken Wurzelknoten an: *Ganglion Gasseri s. semilunare s.* Intumescentia semilunaris n. trigemini, dessen Convexität nach unten und aufsen gerichtet ist und an seiner inneren Fläche einige Fäden des Gangliensystems vom Plexus caroticus internus aufnimmt: beide Flächen des Ganglion adhaeriren genau an die Blätter der Dura mater. Die vordere Wurzel steht nur durch einige wenige zarte Fäden mit dem Ganglion Gasseri in Verbindung und windet sich um den vorderen Rand des Stammes an die innere Fläche des Ganglion und zum hinteren Theile desselben. Von dem convexen Rande des Ganglion Gasseri gehen drei ansehnliche plattrundliche Nerven ab, am meisten nach vorn der N. ophthalmicus, in der Mitte der N. maxillaris superior, am meisten nach hinten der N. maxillaris inferior, welcher letztere die ganze vordere Wurzel in sich aufnimmt.

Die untergeordneten Zweige dieser drei Hauptäste, von denen wahrscheinlich der erste und zweite gänzlich, der

dritte grofsentheils aus sensitiven Fasern besteht, sind theils für die Schleimhäute des Ohrs, des Auges, der Nase, des Mundes und Schlundkopfes und die secernirenden Drüsen dieser Apparate bestimmt, und gehen zu dem Ende nicht allein mit Zweigen des Gangliensystems vielfache Verbindungen ein, sondern nehmen auch wesentlichen Antheil an der Bildung der im Kopfe zerstreuten Ganglien: — theils versorgen sie die vorzüglichsten Organe des Kauapparats, namentlich die Kaumuskeln und die Zähne: — theils verbreiten sie sich an die äufsere Haut des Kopfes, sowohl des Schädeltheils desselben mit Ausnahme des Hinterkopfs, als des Gesichts bis unterhalb des Kinns, und gelangen auch, indem sie mit Ästen des N. facialis vielfältig sich verbinden, an die äufseren Kopf- und Gesichtsmuskeln.

I. *N. ophthalmicus s. Ramus primus* s. superior n. trigemini, der Augennerv, ist platt und $1\frac{1}{2}$ ''' breit, läuft an der äufseren Wand des Sinus cavernosus nach vorn und oben, indem er Fäden vom Plexus caroticus internus aufnimmt (welche zum Theil sich wieder von ihm ablösen): und tritt durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle, unterhalb des N. oculomuscularis superior, an der äufseren Seite der Nn. oculomusculares communis und externus, durch kurzen Zellstoff genau an diese Nerven geheftet und mit den beiden ersteren zuweilen durch sehr kurze Fäden verbunden. In jener Spalte oder schon früher theilt er sich in drei Äste, Nn. lacrymalis, frontalis und nasociliaris, von welchen der N. lacrymalis der dünnste, der plattgedrückte N. frontalis aber der stärkste ist.

1) *N. lacrymalis*, der Thränennerv, geht an dem Winkel zwischen der äufseren und oberen Wand der Augenhöhle, am oberen Rande des M. rectus oculi externus, nach vorn und aufsen, im Allgemeinen neben der A. lacrymalis: erhält einen Zweig vom Ganglion ciliare und giebt zuweilen einen *N. ciliaris longus externus*, welcher die A. ciliaris longa externa begleitet. Hinter der oberen Thränendrüse spaltet er sich in einen äufseren und inneren Ast. Der Ramus externus verbindet sich mit dem N. subcutaneus malae und vertheilt sich mit diesem gemeinschaftlich (S. 914.): der Ramus internus dringt mit drei bis vier, oft durch Schlingen verbundenen Zweigen zwischen die Läppchen der oberen

Thränendrüse ein, giebt dieser und der unteren Thränendrüse zarte Zweige; vertheilt sich aber alsdann am äufseren Augenwinkel an die Conjunctiva, die Haut und den Schliefsmuskel der Augenlieder, mit Zweigen der Nn. faciales temporales sich vereinigend.

2) *N. frontalis*, der Stirnnerv, geht unmittelbar unter dem Dache der Augenhöhle über dem M. levator palpebrae superioris nach vorn, und spaltet sich im vorderen Theile der Augenhöhle in drei Äste:

a) *N. supratrochlearis*, der Oberrollnerv, gewöhnlich der dünnste dieser Äste, läuft oberhalb des M. obliquus oculi superior nach vorn und innen und verbindet sich durch einen Zweig mit dem N. infratrochlearis; biegt sich über der Trochlea des M. obliquus oc. sup. um den Margo supraorbitalis und steigt zwischen Mm. orbicularis palpebrarum und corrugator supercilii aufwärts, vertheilt sich in die Haut des oberen Augenliedes und der Glabella, an die genannten Muskeln und den M. frontalis.

b) *N. frontalis*, der Stirnnerv, dringt in Begleitung der A. frontalis zwischen der Trochlea und dem Foramen supraorbitale aus der Augenhöhle hervor und steigt zur Stirngegend in die Höhe:

c) *N. supraorbitalis*, Oberaugenhöhlennerv, gewöhnlich der stärkste Ast, dringt weiter nach aufsen, die A. supraorbitalis begleitend, durch das For. supraorbitale und alsdann genau am Arcus superciliaris anliegend, aufwärts zur Stirn. — Beide vereinigen sich unter einander und mit dem N. supratrochlearis durch Schlingen und vertheilen sich an die Haut und Muskeln des oberen Augenliedes als *Nn. palpebrales superiores*, und an die der Augenbraue und der Stirn bis zur Scheitel- und Schläfegegend hin, indem sie mit Ästen der Nn. faciales temporales zusammenfliefsen.

3) *N. nasociliaris* s. naso-ocularis s. Ramus nasalis n. ophthalmici, der Nasenaugennerv, begleitet die A. ophthalmica und geht mit ihr anfänglich an der äufseren Seite des Sehnerven vorwärts, woselbst er die Radix longa ganglii ciliaris abgiebt: geht sodann über den N. opticus hinweg gegen die innere Wand der Augenhöhle hin und giebt einen oder zwei Nn. ciliares longi interni ab, und endigt zwi-

chen den Mm. obliquus superior und rectus internus oculi urch Spaltung in die Nn. ethmoidalis und infratrochlearis.

a) *Radix longa ganglii ciliaris* ist ein dünner, einfacher der doppelter Faden, welcher vom unteren Umfange des . nasociliaris ausgehend nach vorn zur oberen hinteren cke des Ganglion ciliare läuft: er besteht wahrscheinlich icht allein aus Fasern vom N. nasociliaris, sondern auch us Fädchen des Plexus caroticus internus, die mit dem N. phthalmicus sich vereinigt hatten, enthält auch öfters die adix media ganglii ciliaris in sein Neurilem eingeschlos- en. (S. Gangliensystem.)

b) *Nn. ciliares longi interni*, einer oder zwei, nehmen enselben Verlauf wie die anderen Nn. ciliares (S. 412).

c) *N. ethmoidalis s. nasalis anterior*, Riechbeinnerv oder orderer Nasennerv; trennt sich, zuweilen mit zwei Wur- eln entstehend, unter einem rechten Winkel vom N. infra- ochlearis: tritt durch das For. ethmoideum anterius auf ie obere Fläche der Lamina cribrosa oss. ethmoidei, als- ann durch ein Loch dieser Platte und ein Kanälchen an er hinteren Seite der Spina frontalis externa in die Nasen- öhle: läuft hieselbst an der hinteren Fläche des Nasen- eins und neben dem vorderen Rande der Nasenscheidewand wärts: giebt drei bis fünf *Nn. nasales anteriores interni* ur Schleimhaut des vorderen Theiles der Scheidewand und eitenwand der Nasenhöhle, welche zum Theil bis zum asenloch herab sich verbreiten. Alsdann dringt er, als . *nasalis anterior externus*, zwischen dem unteren Rande es Nasenbeins und dem Cartilago nasalis lateralis, an die eitenwand der äufseren Nase, nahe neben dem Nasenrük- en und verästelt sich bis zur Nasenspitze herab an die aut und Muskeln der Nase, mit einem N. buccalis vom . facialis sich verbindend.

d) *N. infratrochlearis*, der Unterrollnerv, läuft mit der . ophthalmica an der inneren Wand der Augenhöhle vor- ärts, bildet eine Schlinge mit einem Aste des N. supra- ochlearis, aus welcher ein Fädchen für die Schleimhaut es Sinus frontalis hervorgeht: und theilt sich alsdann in nen oberen und unteren Ast. Der obere durchbohrt den . orbicularis palpebrarum unter der Trochlea, über dem ig. palpebrale internum, und vertheilt sich gemeinschaftlich

mit dem N. supratrochlearis an das obere Augenlied, die Augenbraue und die Glabella: der untere, (welcher sich in seltenen Fällen mit einem Zweige vom N. oculomuscularis superior vereinigt) giebt Äste an den M. lacrymalis, den Thränensack, die Caruncula lacrymalis, die Tun. conjunctiva, auch Rami tarsei an die Augenliedränder: dringt gleichfalls oberhalb des Lig. palpebrale internum durch den M. orbicularis palpebrarum und vertheilt sich, mit einem N. zygomaticus vom N. facialis verbunden, am inneren Augenwinkel und an der Nasenwurzel in der Haut und den Muskeln.

II. *N. maxillaris superior* s. *Ramus secundus* s. medius n. trigemini, der Oberkiefernerv, ist plattrundlich, 2‴ breit und ¾‴ dick; tritt bald nach seinem Ursprunge aus dem Ganglion Gasseri durch das For. rotundum in die Fossa pterygopalatina. Hieselbst wird er mehr rundlich, läuft nach vorn und etwas nach aufsen, oberhalb der Endigung der A. maxillaris interna, gegen die Fissura orbitalis inferior hin und giebt die Nn. subcutaneus malae, sphenopalatinus und dentalis superior posterior ab: tritt alsdann in den Canalis infraorbitalis ein und erhält von hier an den Namen N. infraorbitalis.

1) *N. subcutaneus malae*, Wangenhautnerv, ein dünner Ast, dringt unmittelbar oberhalb des N. maxillaris superior durch die Fissura orbitalis inferior in die Augenhöhle, läuft an der äufseren Wand derselben vorwärts und etwas nach oben, fliefst mit dem äufseren Aste des N. temporalis zusammen und verläfst, nachdem er sich in einen oberen und unteren Ast getheilt hat, die Augenhöhle durch den Canalis zygomaticus. Der obere Ast, *Ramus temporalis*, welcher gewöhnlich den Ast vom N. lacrymalis aufnimmt und zwar entweder noch in der Augenhöhle selbst oder im Canalis zygomaticus, gelangt durch diesen Kanal und das For. zygomaticum temporale in die Schläfengrube, durchbohrt den M. und die Fascia temporalis, verbindet sich mit einem N. facialis temporalis und vertheilt sich an die Haut der Schläfe und des äufseren Theiles der Stirn. Der untere Ast, *Ramus facialis*, geht durch den Canalis zygomaticus und For. zygomaticum faciale und vertheilt sich, mit einem N. zygomaticus vom N. facialis und dem N. palpebralis

nferior externus verbunden, an Haut und Muskeln der Wangengegend und des unteren Augenliedes.

2) *N. sphenopalatinus* s. pterygopalatinus, ein sehr kurer und dicker, oft doppelter Ast, geht nach innen und enkt sich in das Ganglion sphenopalatinum, an dessen Bilung er vorzüglichen Antheil nimmt und aus welchem die interen Nasennerven, die Gaumennerven u. a. m. hervorehen (s. Gangliensystem).

3) *N. dentalis superior posterior* s. alveolaris posterior ajor et minor, oberer hinterer Zahnnerv, oft mit zwei der drei Fäden entspringend, welche die A. alveolaris suerior zwischen sich fassen, läuft auf dem Tuber maxillare bwärts und etwas vorwärts und spaltet sich in den hineren Ramus buccalis und vorderen Ramus dentalis, welche fters jeder für sich vom N. maxillaris superior abgehen. Der *Ramus buccalis* geht zum M. buccinator und pterygoieus externus und zum Zahnfleisch des letzten Backenzahns. Der *Ramus dentalis* dringt einfach oder gespalten in eins der mehrere der For. maxillaria superiora, läuft bogenförig nach vorn in dem Canalis alveolaris posterior zwischen en Knochenplatten der Superficies facialis des Oberkiefereins, und fliefst mit den Nn. dentales superiores medius nd anterior zum Plexus dentalis superior zusammen. (S. 916.)

4) *N. infraorbitalis*, Unteraugenhöhlennerv, die dicke ortsetzung des Stammes des Oberkiefernerven, geht durch en Canalis infraorbitalis, oberhalb und nach aufsen von er A. infraorbitalis, nach vorn; giebt in diesem Kanale die Nn. dentales superiores medius und anterior ab und spaltet ich in die Nn. palpebrales inferiores, labiales superiores nd nasales laterales, welche in dicke Bündel zusammengerängt aus dem For. infraorbitale hervortreten, hier von lem M. levator labii superioris proprius bedeckt sind und nach oben, unten und vorn auseinanderstrahlen.

a) *N. dentalis superior medius* s. alveolaris anterior minor, oberer mittlerer Zahnnerv, geht schon aus dem hineren Ende des Canalis infraorbitalis in den Canalis alveoaris medius abwärts und nach vorn zum Plexus dentalis uperior. Fehlt nur selten.

b) *N. dentalis superior anterior* s. alveolaris anterior ajor s. nasodentalis, oberer vorderer Zahnnerv, geht mehr

nach vorn in den Canalis alveolaris anterior und spaltet sich in einen (zuweilen doppelt oder dreifach vorhandenen) *Ramus dentalis* zum Plexus dentalis superior, und in den *Ramus nasalis*, welcher neben der Spina nasalis anterior in den vorderen Theil der Nasenhöhle dringt, und an die Schleimhaut des vorderen Theiles des Meatus narium inferior und des Nasenflügels, auch an den Ductus nasolacrymalis und Canalis nasopalatinus sich verbreitet.

Plexus dentalis superior, das obere Zahngeflecht, entsteht durch die Vereinigung des Ramus dentalis des N. dentalis superior posterior, des N. dentalis superior medius und des Ramus dentalis des N. dentalis superior anterior. Es hat eine von vorn nach hinten längliche, bogenförmige Gestalt; sein oberer Theil, welcher aus gröfseren Ästen und Schlingen jener Nerven besteht, liegt zwischen den Knochenplatten der Superficies facialis oss. maxillaris superioris in engen Kanälen und Rinnen, und enthält oberhalb der Wurzel des Eckzahns ein plattes, ungefähr 1‴ im Dm. haltendes Ganglion, den Oberkieferknoten, *Ganglion supramaxillare;* in diesem vereinigen sich Fäden von den Nn. dentales superiores anterior und medius und ein Faden des N. nasalis posterior medius (vom Ganglion sphenopalatinum stammend), welcher durch ein kleines Loch der Superficies nasalis oss. maxillaris superioris zu diesem Ganglion gelangt. Der untere Theil des Geflechts besteht aus mehr zahlreichen kleineren, zum Theil von dem Ganglion supramaxillare ausgehenden Zweigen und Schlingen, und liegt in der Knochenmasse der Wurzel des Proc. alveolaris des Oberkieferbeins und unter dem Sinus maxillaris. Aus diesem Geflecht gehen hervor: a) kleine Zweige an die Schleimhaut des Sinus maxillaris; b) *Nervuli dentales superiores*, so viele als Zahnwurzeln vorhanden, in welche sie bis zum Zahnkern dringen: die der grofsen Backenzähne stammen vorzugsweise von dem N. dentalis superior posterior, die der kleinen Backenzähne von dem N. dent. sup. medius, die des Eckzahns und der Schneidezähne vom N. dent. sup. anterior; c) *Nervuli gingivales superiores*, von denen für das Zahnfleisch zwischen je zwei Zähnen ein gröfserer und mehrere kleinere vorhanden sind: die gröfseren entstehen zum Theil mit gemeinschaftlichen Stämmchen, welche

urch Löcher der Superf. facialis des Oberkieferbeins her-
ordringen und in mehrere Äste sich spalten: die kleineren
ringen aus den Zwischenwänden der Alveoli hervor.

c) *Nn. palpebrales inferiores, internus et externus,* untere
ugenliednerven. Der erstere schwächere steigt gerade
ufwärts zwischen M. levator labii superioris proprius und
. levator labii sup. alaeque nasi und vertheilt sich in der
egend des inneren Augenwinkels an das untere Augenlied
nd die Nase, mit Ästen des N. infratrochlearis und eines
. zygomaticus sich verbindend. Der stärkere N. palp. inf.
ternus durchbohrt den M. levator labii sup. proprius,
indet sich um die Vena facialis anterior nach aufsen und
erbreitet sich im unteren Augenliede, indem er mit den
n. subcutaneus malae und zygomatici sich verbindet.

d) *Nn. nasales laterales* s. subcutanei s. superficiales nasi,
eitennerven der Nase, zwei bis drei, vertheilen sich an der
eitenwand der Nase, am Nasenflügel und Septum mobile
die Haut und Muskeln, mit den Nn. labiales superiores,
. nasalis anterior externus vom N. ethmoidalis und Nn.
uccales vom N. facialis sich verbindend.

e) *Nn. labiales superiores,* Oberlippennerven, drei bis
er, gehen hinter dem M. levator labii sup. proprius diver-
rend nach unten und vertheilen sich mit oberflächlichen
nd tiefen Zweigen an die äufsere Haut, Schleimhaut und
uskeln der Unterlippe, indem sie mit Zweigen der Nn.
uccales Schlingen bilden.

III. *N. maxillaris inferior* s. *Ramus tertius* s. infe-
or n. trigemini, der Unterkiefernerv, entsteht aus einem
nteren äufseren Bündel von Nervenfasern, welches aus
m hinteren Theile des Ganglion Gasseri hervorgeht, und
s einem vorderen inneren Bündel, welches die vordere
Wurzel des N. trigeminus ist. Beide Bündel treten sogleich
urch das For. ovale und vereinigen sich in demselben zu
nem sehr kurzen, $2\frac{1}{2}$ ‴ breiten und $1\frac{1}{2}$ ‴ dicken Stamm,
elcher aber schon unmittelbar unter dem For. ovale und
nter dem M. pterygoideus externus sich wiederum in einen
eren vorderen und unteren hinteren Ast spaltet.

A. *Ramus superior* s. *N. crotaphitico-buccina-
rius*; besteht gröfstentheils aus Fasern der vorderen
Wurzel, ist kleiner als der hintere Ast und sehr kurz und

platt; liegt genau an der unteren Fläche der hinteren Ecke der Ala magna oss. sphenoidei, steht durch einen oder mehrere kurze Fäden mit dem Ganglion oticum in Verbindung und theilt sich sogleich in die Nerven für die Kaumuskeln, Nn. massetericus, temporales profundi anterior et posterior, buccinatorius und pterygoidei, internus und externus: welche aber gewöhnlich nicht sämmtlich einzeln entspringen, sondern oft die Nn. temporales gemeinschaftlich, oder der N. temporalis profundus posterior mit dem N. massetericus, der N. temp. prof. anterior und pterygoideus externus mit dem N. buccinatorius u. a. m.

1) *N. massetericus*, Kaumuskelnerv, geht an der unteren Fläche des Tuberculum articulare oss. temporum, oberhalb des M. pterygoideus externus und hinter dem M. temporalis nach aufsen und dringt durch die Incisura semilunaris maxillae inferioris in die innere Fläche des M. masseter ein.

2) *Nn. temporales profundi, anterior* s. internus und *posterior* s. externus, tiefe Schläfenerven, von welchen der letztere gewöhnlich der stärkere ist, laufen zuerst an der unteren Fläche der Ala magna oss. sphenoidei nach aufsen und biegen sich alsdann in die Höhe, um sich gänzlich in dem M. temporalis zu vertheilen.

3) *N. buccinatorius*, Backenmuskelnerv, der ansehnlichste Ast des Ramus superior, geht nach vorn, aufsen und unten zwischen Mm. temporalis und pterygoideus externus, oder den letzteren durchbohrend, selten zwischen beiden Mm. pterygoidei hindurch: giebt dem M. pterygoideus externus Zweige, tritt zwischen Mm. masseter und buccinator und giebt hier Zweige an die Mm. buccopharyngeus und mylopharyngeus ab. Endlich vertheilt er sich mit zwei bis drei ansehnlichen Ästen, welche mit den Nn. buccales und subcutanei maxillae inferioris Schlingen bilden und die V. facialis anterior umstrickend, in die Mm. buccinator, orbicularis oris, levator und depressor anguli oris, in die äufsere Haut und Schleimhaut der Backe und des Mundwinkels.

4) *N. pterygoidei, internus et externus*, Flügelmuskelnerven, kleine zu den Mm. pterygoidei gehende Nerven; der N. pter. externus entspringt sehr oft vom N. buccinatorius und ist meistens doppelt vorhanden. Der stärkere N. pterygoideus internus entsteht häufig zugleich aus dem

beren und unteren Ast des Unterkiefernerven; steht mit em Ganglion oticum in Verbindung, welches zuweilen von m durchbohrt wird; giebt einen Ast zum M. tensor veli alatini (? Arnold), ein Fädchen zum M. mallei internus, und eht zum inneren Flügelmuskel.

B. *Ramus inferior* s. descendens, der untere hintere Ast es Unterkiefernerven, ist beträchtlich stärker als der vor- ere obere, enthält gröfstentheils die aus dem Ganglion Gas- ri stammenden Fasern und steht durch kurze zarte Fäden it dem Ganglion oticum, welches unmittelbar an seinem neren Umfange liegt, in Verbindung. Er steigt zwischen m. pterygoideus internus und externus etwas nach aufsen rab und spaltet sich in den N. auriculotemporalis, lin- alis und mandibularis, von welchen der erstere der hwächste, der letztere der stärkste ist und als Fortsetzung s Stammes des N. maxillaris inferior betrachtet wird.

1) *N. auriculotemporalis* s. *temporalis superficialis* s. au- cularis anterior, der Ohr-Schläfenerv oder oberflächliche hläfennerv, entsteht mit zwei Wurzeln, welche die A. eningea media zwischen sich fassen und jede durch einen den mit dem Ganglion oticum in Verbindung steht. Zu- eilen sind drei bis vier Wurzeln vorhanden, von denen ne aus dem N. mandibularis stammt. Der Nerv selbst uft anfangs zwischen dem Condylus maxillae inferioris d dem Ursprunge des Lig. maxillare internum nach hin- n, sodann aber in einem schwachen nach unten gerichteten gen nach aufsen, und zwar hinter dem Condylus maxillae ferioris, unter dem äufseren Gehörgange, zwischen Aa. rotides interna und externa, von den Läppchen der Paro- umgeben: und steigt endlich an der äufseren Seite der Wurzel des Proc. zygomaticus oss. temporum, vor dem ragus in die Höhe. Auf diesem Wege giebt er folgende te ab:

a) Verbindungszweige zum N. facialis und zum Plexus roticus externus am Ursprunge der Aa. maxillaris interna d temporalis superficialis, aus welchen letzteren Verbin- ngen wiederum Zweige zur Gl. parotis abgehen.

b) *Nn. meati auditorii externi*, inferior et superior, zu- eilen drei, dringen in den äufseren Gehörgang zwischen m knorpeligen und knöchernen Theile desselben ein. Der

untere und einige Äste des oberen Gehörgangsnerven vertheilen sich an der vorderen, unteren und hinteren Wand des Gehörganges und in der Concha auriculae an die Haut und Ohrenschmalzdrüsen: andere Zweige des oberen gehen an die obere Wand des Gehörganges, und einer derselben, *N. membranae tympani*, dringt am oberen Rande des Paukenfelles zwischen die Blätter desselben ein, verbindet sich auch (nach Bock) mit der Chorda tympani.

c) *Nn. auriculares anteriores*, vordere Ohrnerven, einer oder zwei, zur Haut des Tragus und Helix.

d) *N. temporalis superficialis* s. subcutaneus, oberflächlicher Schläfennerv, die Fortsetzung des N. auriculotemporalis, steigt hinter der A. temporalis superficialis in die Höhe und vertheilt sich mit mehreren Ästen, die mit Zweigen der Nn. faciales temporales, frontalis und occipitales sich verbinden, an die Haut der ganzen Schläfegegend.

2) *N. lingualis* s. gustatorius, der Zungen- oder Geschmacksnerv, trennt sich oberhalb der horizontalen Strecke der A. maxillaris interna vom N. mandibularis: steigt nahe vor diesem Nerven, mit welchem er gewöhnlich noch durch einen schrägen Verbindungsfaden zusammenhängt, zwischen Mm. pterygoidei externus und internus, an der inneren Seite der A. maxillaris interna herab, und verbindet sich hier mit der Chorda tympani (S. 898.). Sodann geht er nachdem er zuweilen Zweige zu den Mm. pterygoideus internus und mylopharyngeus gegeben hat, oberhalb der Gland. submaxillaris, an der äufseren Seite des M. styloglossus und hyoglossus, des N. hypoglossus und Ductus Whartonianus bogenförmig nach vorn und giebt ab: a) Äste an die Schleimhaut des Arcus glossopalatinus; b) drei bis vier Verbindungsäste mit dem unter ihm liegenden Ganglion maxillare die theils vom N. lingualis zum Ganglion, theils vom Ganglion zum Zungennerven zu gehen scheinen; c) Äste für die Gl. sublingualis und die Schleimhaut auf dem Boden der Mundhöhle bis zum Zungenbändchen; d) Verbindungsäste mit dem N. hypoglossus. Endlich spaltet er sich in zahlreiche Zweige, welche zu platten Bündeln vereinigt theils zwischen Mm. styloglossus und lingualis, theils zwischen Mm. lingualis und genioglossus, nach oben und vorn gebogen in die Zunge eindringen und mit zahlreichen feinen

Reisern in der Schleimhaut und den Papillen des Zungenrückens, vorzüglich aber der Seitenränder und Spitze der Zunge, sich vertheilen.

3) *N. mandibularis* s. maxillaris inferior, eigentlicher Unterkiefernerv, steigt hinter dem N. lingualis, an der inneren Seite der A. maxillaris interna, an der äufseren Seite des M. pterygoideus internus und des Lig. maxillare internum herab, giebt den N. mylohyoideus ab und spaltet sich in den N. dentalis inferior und N. mentalis, welche beide vor der A. alveolaris inferior in das For. maxillare posterius eindringen und von einer gemeinschaftlichen starken fibrösen Scheide umhüllt durch den Canalis maxillaris laufen.

a) *N. mylohyoideus*, Zungenbeinkiefernerv, ein dünner langer Nerv, geht durch den Sulcus mylohyoideus maxillae inferioris, zwischen diesem Knochen und dem M. pterygoideus internus, nach vorn, begleitet die A. submentalis und giebt Äste an die Gl. submaxillaris, den M. mylohyoideus, den vorderen Bauch des M. digastricus max. inferioris und in die Haut der Unterkinngegend.

b) *N. dentalis inferior* s. alveolaris inferior, unterer Zahnnerv, läuft im Canalis maxillaris oberhalb des N. mentalis und spaltet sich in zahlreiche Zweige, welche unter einander und mit Zweigen des N. mentalis durch spitzwinkelige Schlingen zusammenhangen und das längliche, eng zusammengedrängte, die A. alveolaris inferior umstrickende, untere Zahngeflecht, *Plexus dentalis inferior*, bilden. Aus demselben gehen die *Nervuli dentales* und *gingivales inferiores* hervor, welche hinsichtlich ihrer Anzahl und Endigung sich den oberen Zahn- und Zahnfleischnerven (S. 916.) gleich verhalten.

c) *N. mentalis*, der Kinnnerv, ist dicker als der N. dentalis inferior, tritt, nachdem er Zweige vorzüglich zum vorderen, für Eckzahn und Schneidezähne bestimmten Theil des unteren Zahngeflechtes gegeben, aus dem For. mentale hervor, verbindet sich mit den Nn. subcutanei maxillae inferioris, besonders mit dem oberen derselben, und spaltet sich, vom M. depressor anguli oris bedeckt, in zwei bis drei *Nn. labiales inferiores* und einen *N. mentalis*, welche mit vielen Zweigen in der Haut und den Muskeln der Unterlippe und des Kinns sich verbreiten.

Nervi spinales.

Rückenmarksnerven.

Die 31 Paare der Nn. spinales entspringen vom Rückenmarke in dessen ganzer Länge, treten durch Öffnungen des Rückgratskanals hervor und werden nach der Lage dieser Öffnungen in 8 Nn. spinales cervicales, 12 Nn. spinales dorsales, 5 Nn. spinales lumbares, 5 Nn. spinales sacrales und 1 N. spinalis coccygeus abgetheilt, und diese wiederum von oben nach unten abgezählt. Sind als Varietät 32 Spinalnerven auf jeder Seite vorhanden, so werden sechs Nn. sacrales oder zwei Nn. coccygei gezählt.

Alle Rückenmarksnerven entspringen von den vorderen und den hinteren Strängen des Rückenmarks, mit deutlich getrennten *doppelten Wurzeln*, einer vorderen und einer hinteren. Die vorderen Wurzeln sind schwächer, mit Ausnahme der des ersten N. cervicalis, entstehen mit sehr feinen Fädchen, welche, wie es scheint, mit der grauen Substanz des vorderen Stranges in Berührung stehen; diese treten aus dem Sulcus lateralis anterior des Rückenmarks hervor und vereinigen sich zu stärkeren convergirenden Fäden, welche zu einem einfachen Bündel sich zusammendrängen. Die stärkeren hinteren Wurzeln, die mit der grauen Substanz des hinteren Stranges zusammenzuhangen scheinen, treten aus dem Sulcus lateralis posterior schon mit dickeren und weniger zahlreichen Bündeln hervor. Beide Wurzelreihen werden durch das Lig. denticulatum von einander getrennt. Die beiden letzten Rückenmarksnerven, der fünfte N. sacralis und der N. coccygeus, entstehen vom Conus medullaris; und da in diesem die vorderen und hinteren Stränge und selbst die Seitenhälften des Rückenmarks inniger verschmelzen, so sind ihre vorderen und hinteren Wurzeln eng an einander gedrängt und bilden scheinbar nur eine einfache Wurzel, obgleich sie in der That gleich den übrigen Nn. spinales sich verhalten.

Indem die Wurzeln der einzelnen Spinalnerven in den Sulci laterales zum Vorschein kommen, stehen sie eng an einander, so dafs sie auf jeder Seite eine vordere und eine hintere Reihe an einander gränzender Wurzelfäden bilden. Die rechte und linke Reihe laufen aber an der vorderen

nd hinteren Fläche des Rückenmarks nicht senkrecht her-
b, sondern es stehen die Wurzeln der oberen rechten und
nken Nn. dorsales am meisten von einander entfernt, die
er rechten und linken Nn. sacrales aber sehr nahe an ein-
nder, und die des Par coccygeum eng an einander ge-
chmiegt. Indem die Fäden zur Bildung der Wurzeln der
inzelnen Nerven sich sammeln, erreicht manche Wurzel
er einen Seite nicht dieselbe Stärke als die entsprechende
Wurzel der anderen Seite: ist indessen eine Wurzel eines
inzelnen Nerven besonders schwach, so erscheint die zu-
ächst obere oder untere derselben Seite um so stärker.
ufserdem steht oft eine Wurzel mit der zunächst höher
der tiefer entsprungenen durch einen einzelnen Faden in
erbindung: diese Vereinigung kommt zwischen den hin-
eren Wurzeln häufiger vor als zwischen den vorderen, und
war am öftersten an den vier oberen Nn. cervicales und
en zwei untersten Nn. cervicales und zwei obersten Nn.
orsales. Zuweilen findet man an einzelnen Fäden der hin-
eren Wurzeln ein sehr kleines rundliches Knötchen.

Die Wurzeln laufen, von der Tun. arachnoidea locker
mhüllt, gegen den seitlichen Umfang des von der Dura
nater medullae spinalis gebildeten langen Sackes hin, und
war die kurzen Wurzeln der Nn. cervicales ziemlich ho-
izontal, die längeren Wurzeln der Nn. dorsales schräg
erabsteigend: die sehr langen und etwas geschlängelten
Wurzeln der Nn. lumbares, sacrales und coccygeus steigen
eben dem Filum terminale medullae spinalis, an welches
er letztere genau geheftet ist, eine bedeutende Strecke ge-
ade abwärts, indem sie ein dickes Bündel zahlreicher lan-
er Stränge darstellen, welches das ganze untere Ende des
ackes der Dura mater ausfüllt und der Pferdeschweif,
auda equina, genannt wird. Nachdem sich die vordere und
intere Wurzel eines jeden Spinalnerven einander sehr ge-
ähert haben, durchbohren sie die Dura mater und zwar
eistens jede vermittelst einer besonderen Spalte dieser
laut; werden aber noch eine kurze Strecke von einer ge-
einschaftlichen, genau anliegenden Scheide, einer röhren-
örmigen Fortsetzung der Dura mater, eingeschlossen. Als-
ann schwillt die hintere Wurzel zu einem länglich rund-
chen, grauen Wurzelknoten, *Ganglion spinale*, an, dessen

Gröfse mit der Dicke der Wurzel im Verhältnifs steht. Die vordere Wurzel ist genau an die vordere Fläche des Ganglion geheftet und zuweilen, vorzüglich an den Nn. cervicales, etwas röthlich und verdickt, ohne aber jemals ein wirkliches Ganglion zu bilden. Die Ganglia spinalia der Nn. cervicales, dorsales und lumbares liegen in den For. intervertebralia, die der Nn. sacrales und coccygeus aber im Canalis sacralis, nahe unter dem unteren Ende des Sackes der Dura mater: sämmtlich von lockerem Zellstoff und Fett umhüllt: das Ganglion des N. coccygeus befindet sich zuweilen noch innerhalb des Sackes der Dura mater.

Unmittelbar unterhalb der Ganglien beginnt der rundliche *Stamm* der Nn. spinales, indem die vordere und hintere Wurzel zusammenfliefsen: der Stamm theilt sich aber alsbald regelmäfsig in einen vorderen und hinteren Ast. An den Nn. cervicales, dorsales und lumbares ist der Stamm sehr kurz und theilt sich schon im For. intervertebrale in die beiden Äste, welche getrennt aus diesen Löchern hervordringen: an den Nn. sacrales und coccygeus ist hingegen der Stamm länger und verläuft bei den drei ersten Nn. sacrales eine kürzere, bei den beiden letzten Nn. sacrales und N. coccygeus, eine längere Strecke im Canalis sacralis. Der erste bis vierte N. sacralis spaltet sich in der Höhe der entsprechenden For. sacralia und schickt seinen vorderen und hinteren Ast durch das For. sacrale anterius und posterius hinaus: — der fünfte N. sacralis geht durch die untere Öffnung des Canalis sacralis, indem er unterhalb des Cornu sacrale das Lig. sacrococcygeum posterius durchbohrt und noch auf der hinteren Fläche des Os sacrum sich theilt, wonach der vordere Ast durch die Incisura sacrococcygea oder ein fünftes For. sacrale anterius dringt: — der N. coccygeus durchbohrt das Lig. sacrococcygeum posterius etwas tiefer, unterhalb des Cornu coccygeum, und spaltet sich auf der hinteren Fläche des ersten Steifsbeinwirbels: zuweilen aber erfolgt bei diesem Nerven die Bildung des Ganglion der hinteren Wurzel und die Zusammensetzung und Spaltung des Stammes noch innerhalb des Sackes der Dura mater.

Die Dicke der Stämme ist sehr verschieden, so dafs ihr Dm. von 3‴ bis zu $\frac{1}{3}$‴ wechselt und unter den Nn.

pinales die dicksten wie die dünnsten Nervenstämme des Körpers sich finden. Ihre Dicke entspricht ziemlich genau der Breite und Dicke des Rückenmarks an den Ursprungsstellen: es nimmt daher im Allgemeinen die Dicke der Nn. cervicales vom ersten bis zum siebenten zu, alsdann bis zum zweiten N. dorsalis wiederum ab: die mittleren Nn. dorsales sind einander an Dicke beinahe gleich, die unteren wiederum stärker: der Dm. der Nn. lumbares wächst regelmäfsig vom ersten bis zum fünften, der der Nn. sacrales nimmt eben so regelmäfsig wiederum ab. Der N. lumbaris V ist der dickste, dann folgen der N. sacralis I, N. lumbaris IV, N. cervicalis VII und N. sacralis II: — hiernach die Nn. cervicales V, VI, VIII und Nn. lumbares II und III: — alsdann die Nn. cervicales II, III und IV, N. dorsalis I und N. sacralis III: — ferner die Nn. dorsales X, XI und XII und N. lumbaris I: — hiernach die Nn. dorsales II bis IX und N. sacralis IV: — sodann der N. cervicalis I: — der N. sacralis V und endlich der N. coccygeus, welcher der dünnste ist.

Von den beiden Ästen, in welche die Nn. spinales sich spalten, sind die *Rami posteriores*, mit Ausnahme derer der Nn. cervicales I und II, nicht allein beträchtlich schwächer, als die Rami anteriores, sondern überhaupt dünn und stehen durchaus nicht im Verhältnifs zur Dicke der Stämme, so dafs sie namentlich bei dem N. lumbaris V und den Nn. sacrales einen vorzüglich geringen Durchmesser darbieten. Die Rami posteriores dringen sämmtlich nach hinten, indem die der Nn. cervicales, dorsales und lumbares von den For. intervertebralia aus zwischen den Queerfortsätzen der Wirbel hindurch, die der Nn. sacrales I—IV durch die For. sacralia posteriora gehen: sie vereinigen sich öfters unter einander durch Schlingen, welche zwischen den hinteren Ästen der oberen Nn. cervicales, der unteren Nn. lumbares, der Nn. sacrales und coccygeus am häufigsten angetroffen werden: und vertheilen sich nach kurzem Verlaufe an die dritte und vierte Schicht der Nacken- und Rückenmuskeln und an die Haut des Hinterkopfes, des Nackens, der Rücken-, Lenden-, Kreuz- und Gesäfsgegend.

Die *Rami anteriores* entsprechen hinsichtlich ihrer Dicke im Allgemeinen den Stämmen, welchen sie angehören: sind

merklich plattgedrückt und wenden sich nach vorn und aufsen, so dafs sie vor den Proc. transversi vertebrarum und vor der vorderen Fläche des Os sacrum erscheinen. Hier stehen sie sämmtlich durch einen oder zwei Fäden mit den zunächst liegenden Ganglien des N. sympathicus, seltner mit dem sog. Stamme desselben, in Verbindung. Die Fasern dieser Verbindungsfäden mischen sich zwar zum Theil geradezu den Rami anteriores ein: gröfstentheils aber dringen sie in den kurzen Stamm der Rückenmarksnerven und in das Ganglion der hinteren Wurzel, zum Theil auch in die vordere Wurzel ein. — Hiernach vereinigen sich die vorderen Äste der einander benachbarten Nn. spinales sehr häufig, indem ein solcher Ast entweder gänzlich in den unmittelbar unter ihm liegenden übergeht: oder sich in zwei Äste spaltet, von welchen der kleinere zu dem nächst oberen aufsteigt, der gröfsere zu dem nächst unteren sich herabsenkt. Die auf solche Weise gebildeten, meistens spitzwinkeligen, selten bogenförmigen Ansae sind an den Nn. dorsales sparsam und unbeständig vorhanden, an den Nn. cervicales, lumbares, sacrales und coccygeus dagegen regelmäfsig und niemals fehlend, öfters auch durch abermalige Spaltung und Wiedervereinigung doppelt vorhanden und bilden dadurch Geflechte, *Plexus nervorum spinalium*: welche nahe vor den Proc. transversi der Hals- und Lendenwirbel und an der vorderen Fläche des Kreuzbeins, zum Theil zwischen den hieselbst angehefteten Muskelbündeln versteckt liegen. Die von den vorderen Ästen der Nn. spinales entspringenden Nerven entstehen daher selten von einem N. spinalis allein, sondern meistens von zwei oder mehreren, aus einer Ansa oder einem Plexus. Sie vertheilen sich an die Muskeln und die Haut der Seitenfläche des Kopfes, des seitlichen und vorderen Umfanges des Stammes, einschliefslich des Zwerchfells, des Dammes und der äufseren Geschlechtstheile, und an die oberen und unteren Extremitäten, in seitlich symmetrischem und meistens gestrecktem Verlaufe: und sind bei Weitem zahlreicher, ansehnlicher und wichtiger, als die von den Rami posteriores entspringenden Nerven.

Nn. spinales cervicales I — VIII, Halsnerven.

Ihre Wurzeln sind kurz, queerlaufend; die des ersten is vierten und die des siebenten und achten sind gewöhnch, die des fünften und sechsten aber seltener, durch einen ünnen Faden mit der zunächst benachbarten vereinigt. Die intere Wurzel des ersten Halsnerven ist (gegen die Regel) chwächer als die vordere, entspringt weiter nach vorn als ie hinteren Wurzeln der übrigen Halsnerven; ist genau a mehrere Wurzelfäden oder den Stamm des N. accessous geheftet und mit ihnen, so wie in selteneren Fällen ach mit der Wurzel des N. hypoglossus, durch Fädchen erbunden: zuweilen findet eine ähnliche Verbindung der Vurzel des zweiten bis fünften Halsnerven mit dem Beierven Statt. — Die Stämme treten durch die For. intervertebralia cervicalia: der des ersten Halsnerven, zwischen s occipitis und Arcus posterior atlantis, hinter der Massa teralis atlantis, liegt weiter nach hinten als die übrigen: wird auch *N. infraoccipitalis* s. *suboccipitalis* genannt nd von Einigen zu den Hirnnerven gerechnet und alsdann ur sieben Halsnerven gezählt: der des achten geht zwihen dem siebenten Halswirbel und ersten Rückenwirbel indurch. Der erste liegt unter der letzten Biegung der A. ertebralis, der zweite bis sechste gehen hinter dieser Arrie queer durch den Canalis vertebralis.

Hintere Äste. Sie wenden sich um die Gelenke der roc. obliqui nach hinten, woselbst meistens die drei bis ier obersten durch Ansae sich vereinigen. Der hintere Ast es N. cervicalis I ist beträchtlich stärker als die vordere: itt unter der A. vertebralis in den dreieckigen Raum zwihen den Mm. rectus capitis posterior major und obliqui apitis inferior und superior; vertheilt sich an diese Museln und die Mm. rectus capitis posterior minor, rectus caitis lateralis, biventer und complexus. — Der hintere Ast es N. cervicalis II ist gleichfalls stärker als der vordere; eht unter dem M. obliquus capitis inferior nach hinten, iebt Äste an diesen und die Mm. multifidus spinae, semipinalis colli, trachelomastoideus, biventer cervicis, complexus und splenii. Alsdann steigt er unter dem Namen des

grofsen Hinterhauptnerven, *N. occipitalis major* s. magnus, bogenförmig in die Höhe, nimmt einen Zweig vom hinteren Aste des N. cervicalis III auf, durchbohrt die oberen Enden des M. biventer cervicis und des M. cucullaris, nahe an der Protuberantia occipitalis externa und an der inneren Seite der A. occipitalis: und vertheilt sich mit zahlreichen, strahlenförmig divergirenden Zweigen an den M. occipitalis und die Haut des Hinterkopfes bis zum Scheitel hin, mit den Zweigen des N. occipitalis minor sich verbindend. — Die hinteren Äste der Nn. cervicales III—VIII, von welchen der letzte der schwächste ist, vertheilen sich an die Mm. interspinales colli, multifidus, semispinalis colli, cervicalis adscendens, transversalis cervicis, trachelomastoideus, biventer, complexus und splenii, durchbohren den M. cucullaris unweit des Lig. nuchae und endigen in der Haut des Nackens.

Vordere Äste. Sie sind, vom dritten Halsnerven an, stärker als die hinteren Äste und scheinen bei plattgedrückter Gestalt sogar stärker als die Stämme zu sein: der des zweiten Halsnerven hält ungefähr $1\frac{1}{2}$ ‴, die des dritten und vierten $1\frac{3}{4}$ ‴, der des fünften 2 ‴, die des sechsten und achten $2\frac{1}{3}$ ‴, der des siebenten $2\frac{1}{2}$ ‴ im Dm. Der des ersten tritt zwischen Mm. rectus capitis anterior minor und rectus capitis lateralis hervor: die übrigen zwischen den vorderen und hinteren Mm. intertransversarii colli, sodann vor oder zwischen den Bündeln der Mm. scalenus medius und levator scapulae, hinter den Mm. rectus capitis anterior major, longus colli und scalenus anterior: und wenden sich sämmtlich nach aufsen. Zuerst geben sie allen diesen genannten Muskeln kurze Äste und verbinden sich durch einen, oder öfters zwei Äste mit dem N. sympathicus: nämlich die drei ersten mit dem Ganglion cervicale superius desselben, der vierte und fünfte mit dem Ganglion cervicale medium oder mit dem Stamme des N. sympathicus; der sechste, siebente und achte mit dem Ganglion cervicale inferius unmittelbar, oder mit dem von diesem Ganglion aufsteigenden Plexus vertebralis. Alsdann bilden diese vorderen Äste die acht Halsnervenschlingen, *Ansae cervicales.* Die Ansa cervicalis I wird vom ersten und einem aufsteigenden Aste des zweiten Halsnerven

ebildet, ist bogenförmig und liegt vor dem Proc. lateralis
lantis: die Ansa cerv. II entsteht durch den Zusammen-
ufs eines absteigenden Astes vom zweiten Halsnerven mit
em dritten: die Ansa cerv. III durch die Vereinigung des
ritten und vierten Halsnerven, die schwächere Ansa cerv.
V durch die eines absteigenden Astes des vierten Halsner-
en mit dem fünften. Die Ansae cervicales V — VIII ent-
ehen durch die unter sehr spitzigen Winkeln erfolgende
ereinigung der ganzen vorderen Äste des fünften und
chsten, des sechsten und siebenten, des siebenten und ach-
n Halsnerven, und des achten Halsnerven mit dem ersten
. dorsalis. Die vier ersten Ansae cervicales setzen den
lexus cervicalis, die vier letzten den Plexus brachialis
isammen.

Plexus cervicalis, Halsgeflecht.

Es liegt vor den oberen Enden der Mm. scalenus medius
id levator scapulae, hinter dem Trigonum cervicale und
er V. jugularis interna und communis, vom M. sterno-
eidomastoideus bedeckt. Aufser den vier oberen eigent-
chen Ansae cervicales enthält es noch kleinere Schlingen,
elche theils die Vereinigung der vorderen Äste der Nn.
rvicales I — IV noch inniger machen, theils aber auch
irch den Zusammenflufs kleinerer, von jenen Ansae aus-
hender Äste zu gröfseren Nerven entstehen. — Aus dem
lexus cervicalis gehen folgende Nerven hervor:

1) Kurze Verbindungszweige mit dem Plexus ganglio-
rmis n. vagi und zum Stamm des N. hypoglossus, welche
er Ansa cerv. 1 angehören.

2) Längere, von der Ansa cerv. II und III stammende
erbindungszweige: zwei vordere zum Ramus cervicalis n.
ypoglossi, welche an der äufseren Seite der V. jugularis
ommunis nach vorn herabsteigen: und zwei bis drei hin-
re zum N. accessorius, welche mit dem Beinerven zu den
m. sternocleidomastoideus und cucullaris gelangen; zum
heil auch, noch bevor sie jene Verbindung eingehen, ab-
sonderte Zweige zum M. sternocleidomastoideus geben.

3) *N. occipitalis minor* s. parvus, kleiner Hinterhaupt-
erv, öfters doppelt: entsteht von der Ansa cerv. II, hängt mit
m N. accessorius zusammen, tritt am hinteren Rande des

M. sternocleidomastoideus hervor und steigt über den Proc. mastoideus hinweg zum Hinterhaupt hinauf: vertheilt sich an die Haut des vorderen Theiles des Hinterkopfes, an die Mm. occipitalis, auriculares posteriores und superior, und verbindet sich mit dem N. occipitalis major und den Nn. auriculares posteriores.

4) *N. auricularis magnus*, grofser Ohrnerv: entsteht vorzüglich vom dritten Halsnerven, biegt sich um den hinteren Rand und die äufsere Fläche des M. sternocleidomastoideus aufwärts, vor der V. jugularis externa aufsteigend; und spaltet sich in einen vorderen und einen hinteren Ast. Ersterer, *N. auricularis inferior*, unterer Ohrnerv, dringt in die Gl. parotis, verbindet sich mit den unteren Ästen des N. facialis, und vertheilt sich mit zahlreichen Zweigen an die Parotis, die Haut unter dem Ohre, die Haut und Muskeln des Tragus, Antitragus, des Ohrläppchens und des unteren Theiles der Concha. Der hintere Ast, *N. auricularis posterior superficialis*, oberflächlicher hinterer Ohrnerv, steigt hinter dem Ohre in die Höhe, verbindet sich mit den Nn. auricularis posterior profundus und occipitalis minor (von welchem letzteren er zuweilen ersetzt wird), geht an die Haut hinter und über dem Ohre, an die hintere Fläche des Ohres, und mit einem den Ohrknorpel durchbohrenden Aste auch an die vordere concave Fläche des Ohres, woselbst dieser Ast an dem oberen Umfange der Concha, am Anthelix und Helix sich verbreitet.

5) *N. cervicalis superficialis*, oberflächlicher Halsnerv, windet sich unterhalb des grofsen Ohrnerven um den hinteren Rand und die äufsere Fläche des M. sternocleidomastoideus nach vorn, verbindet sich mit den Nn. subcutanei colli vom N. facialis und vertheilt sich an die Haut der vorderen und seitlichen Fläche des Halses, von der Unterkinngegend bis zum Schlüssel- und Brustbein herab. Seine gröfseren Äste, welche zuweilen jeder für sich vom Plexus cervicalis abgehen, werden auch als Nn. subcutanei colli medius und inferior bezeichnet.

6) *Nn. supraclaviculares*, Oberschlüsselbeinnerven, 3 bis 4 an der Zahl, entstehen vorzüglich vom vierten Halsnerven, laufen am hinteren Rande des M. sternocleidomastoideus, vom Platysma myoides bedeckt, in der Fossa supra-

avicularis herab, kreuzen sich mit der A. cervicalis super-
cialis und spalten sich in überhaupt 8 bis 9 divergirende
ste, welche als Nn. supraclaviculares anteriores, medii
id posteriores unterschieden werden. Die *Nn. supraclav.*
iteriores gehen vor dem Schlüsselbein herab zur Haut der
egio sternalis und mammillaris; die *Nn. supraclav. medii*
ufen über Schlüsselbein und Acromion zur Haut der Fossa
fraclavicularis und der Achsel: die *Nn. supraclav. poste-*
ores aber theils oberflächlich über den vorderen Rand des
. cucullaris hinweg zur Haut der oberen Schulterblatt-
gend, theils mehr in der Tiefe, mit dem N. accessorius
ch verbindend, zum M. cucullaris, levator scapulae und
m hinteren Bauche des M. omohyoideus.

7) *N. phrenicus* s. respiratorius internus (Ch. Bell),
werchfellnerv, entsteht mit seiner stärksten Wurzel vom
. cervicalis IV, mit schwächeren vom N. cervicalis III und
ters von der zweiten Halsnervenschlinge: diese Wurzeln
heinen nicht selten mit den Verbindungsfäden zwischen
n Halsnerven und dem Ganglion cervicale superius n.
mpathici zusammenzuhangen. Indem der Zwerchfellnerv
r dem M. scalenus anterior herabsteigt, nimmt er noch
nige schwächere Wurzeln von den Nn. cervicales V und
[auf und steht zuweilen durch besondere Fäden mit dem
nglion cervicale medium oder inferius, dem N. vagus
er dessen Rami cardiaci, und mit dem Ramus cervicalis
hypoglossi in Verbindung. Alsdann tritt er hinter dem
fseren Theile der Articulatio sternoclavicularis, hinter der
subclavia, vor der A. subclavia, an der äufseren Seite
r A. mammaria interna in die Brusthöhle, wendet sich
was nach innen und vorn, und steigt alsdann vor der Lun-
nwurzel, genau an die Seitenwand des Herzbeutels gehef-
t und von dem Blatt des vorderen Mittelfells überzogen,
r oberen Fläche des Zwerchfells herab. Der linke N.
renicus läuft etwas weiter nach hinten und um die Spitze
s Herzens nach innen sich krümmend; der rechte über-
upt mehr vorwärts, vor der V. cava superior vorbei,
d mehr gestreckt. Hiernach spaltet er sich in zahlreiche,
ahlenförmig divergirende Äste, welche theils in die Pars
stalis des Zwerchfells sich vertheilen, theils als sog. Rami
renico-abdominales das Zwerchfell durchbohren, oder

durch das For. quadrilaterum und den Hiatus oesophageus gehen und in die Pars lumbaris diaphragmatis dringen. Dies Äste verbinden sich an mehreren Stellen, vorzüglich an der rechten Seite, mit den Plexus phrenici des Gangliensystems.

Plexus brachialis, Armgeflecht.

Es besteht aus den ansehnlichen vorderen Ästen der Nn. cervicales V, VI, VII und VIII und des N. dorsalis I, welcher letztere über die erste Rippe sich aufwärts biegt. Diese fünf Äste treten sämmtlich hinter dem M. scalenus anterior, zum Theil zwischen und hinter den Zipfeln des M. scalenus medius hervor; und zwar der des fünften, sechsten und siebenten N. cervicalis oberhalb der A. subclavia, der des achten N. cervicalis und ersten N. dorsalis hinter und unter dieser Arterie: sie laufen alsdann convergirend nach aufsen und unten, durch den unteren Theil der Fossa supraclavicularis bis hinter das Schlüsselbein und vereinigen sich theils früher, theils später, zur Ansa cervicalis V—VIII; gewöhnlich bildet sich die achte Schlinge schon zwischen den Mm. scaleni, die siebente aber weiter auswärts hinter dem Schlüsselbein. Von diesem oberen Theile des Plexus brachialis, Pars supraclavicularis, welcher noch am Halse oberhalb und hinter der Clavicula liegt, die A. transversa colli umfafst und nach oben durch die vierte Ansa cervicalis mit dem Plexus cervicalis zusammenhängt, gehen hervor die beiden untersten Wurzeln des N. phrenicus, der N. subclavius, N. suprascapularis, Nn. thoracici posteriores, Nn. thoracici anteriores und Nn. subscapulares: und zwar entspringt jeder dieser Nerven fast immer von mehr als einem jener Nn. cervicales, öfters aber auch bevor letztere zu Schlingen sich vereinigt haben. — In der oberen Öffnung der Achselhöhle, unterhalb des Schlüsselbeins und hinter der Fossa infraclavicularis, zieht sich der Plexus brachialis auf einen kleineren Raum zusammen und umgiebt die A. axillaris sehr genau, indem er drei Bündel bildet, welche durch kürzere und mehr unbeständige Schlingen zusammenhangen, an den äufseren, inneren und hinteren Umfang der A. axillaris sich anschmiegen, und nach dieser Lage als äufseres (oberes), inneres (unteres) und hinteres Bündel

zeichnet werden können. Das äufsere Bündel entsteht rzüglich aus den N. cervicalis VII, VI und V, erhält er auch einen kurzen starken Ast aus dem inneren Bün-l, welcher vom N. cervicalis VIII und N. dorsalis I ammt und vor der A. axillaris schräg auswärts vorbei-uft: so dafs an dieser Stelle (hinter dem M. pectoralis inor und unter dem Ursprunge der A. thoracico-acromia-s) die Achselschlagader auf allen Seiten von dicken Ner-n umgeben wird. Das innere Bündel wird vorzüglich m N. cervicalis VIII und N. dorsalis I gebildet, erhält erstärkungen aus dem N. cervicalis VII, weniger von den n. cerv. VI und V, und liegt unmittelbar hinter der Vena illaris: das hintere Bündel wird meistens von den Nn. rvicales VII, VI und V zusammengesetzt und vom N. cer-calis VIII, zuweilen auch vom N. dorsalis I verstärkt. on diesem unteren Theile des Plexus brachialis, Pars in-aclavicularis, welcher vorzugsweise als Plexus brachialis trachtet wird, entstehen die sieben Stämme der Armner-n, *Nn. brachiales;* nämlich die drei schwächeren sog. autnerven des Arms, Nn. cutanei brachii interni, minor major, und der N. musculocutaneus: und die vier stär-ren sog. Muskelnerven des Arms, Nn. medianus, ulnaris, rcumflexus und radialis. Aus dem äufseren Bündel ent-ehen die Nn. medianus und musculocutaneus, aus dem in-ren die Nn. ulnaris und cutanei interni, aus dem hinte-n die Nn. circumflexus und radialis.

A. Pars supraclavicularis plexus brachialis.

1) *N. subclavius*, ein dünner Ast vom fünften Halsner-n, welcher zum M. subclavius gerade herabsteigt.

2) *N. suprascapularis* s. scapularis superior, Oberschul-rblattnerv, stammt vom fünften und sechsten Halsnerven, ht neben dem hinteren Bauche des M. omohyoideus und it der A. transversa scapulae nach aufsen und hinten, rch die Fossa supraclavicularis und über der Incisura scapu-e zum M. supraspinatus — und hinter dem Collum scapu-e in die Fossa infraspinata zum M. infraspinatus.

3) *Nn. thoracici* s. pectorales *posteriores*, hintere Brust-stennerven, gewöhnlich zwei, entstehen mit mehreren Wurzeln vom fünften, sechsten und siebenten Halsnerven,

verbinden sich mit einander, steigen hinter dem Plexus brachialis herab und durchbohren den M. scalenus medius. Der eine schwächere, *N. dorsalis scapulae*, begleitet die gleichnamige Arterie und geht zu den Mm. levator scapulae, rhomboideus und serratus posticus superior. Der stärkere mehr nach vorn liegende *N. thoracicus longus* s. respiratorius externus inferior (Ch. Bell), steigt mit der gleichnamigen Arterie zwischen Mm. subscapularis und serratus anterior major herab und vertheilt sich an letzteren Muskel.

5) *Nn. thoracici* s. pectorales *anteriores*, vordere Brustkasten- oder Brustmuskelnerven, zwei bis drei, entstehen von der fünften und sechsten, seltener auch von der siebenten Ansa cervicalis und gehen an die Mm. pectorales major und minor und an die Portio clavicularis des M. deltoides.

5) *Nn. subscapulares*, Unterschulterblattnerven, gewöhnlich drei, entspringen aus der fünften bis siebenten Ansa cervicalis, der mittlere auch oft vom N. circumflexus, der untere seltener vom N. radialis. Sie gehen sogleich nach unten und hinten: der obere und mittlere zu den Mm. subscapularis und teres major; der untere längere, *N. thoracico-dorsalis* s. subscapularis longus, aber mit dem Ramus thoracicodorsalis der A. subscapularis zu den Mm. latissimus dorsi und serratus posticus inferior.

B. Pars infraclavicularis plexus brachialis, Nn. brachiales, Armnerven.

1) *N. cutaneus brachii internus minor*, kleiner innerer Hautnerv des Arms, vom inneren Bündel und vorzüglich vom N. dorsalis I abstammend, läuft an der hinteren und inneren Seite der Vena axillaris durch die Achselhöhle und giebt in der unteren Öffnung dieser Höhle einen Zweig, welcher mit dem Ramus cutaneus pectoralis des zweiten, oft auch des dritten N. dorsalis sich verbindet: aus dieser Vereinigung entsteht ein dünner Nerv, *N. cutaneus brachii internus posterior*, der sich in der Haut an der inneren und hinteren Seite des Oberarms, welche das Caput internum m. tricipitis bedeckt, verbreitet. — Der Stamm des N. cutaneus internus minor durchbohrt die Fascia brachialis in der Mitte des Oberarms und verästelt sich in der Haut an der inneren

eite desselben bis unterhalb und hinter dem Condylus ternus oss. brachii.

2) *N. cutaneus brachii internus major* s. cutaneus medius, öfserer innerer oder mittlerer Hautnerv des Arms, stammt m inneren Bündel des Armgeflechts und zwar vorzüglich vom . dorsalis I; läuft an der inneren Seite der Vena axillaris, vor m N. ulnaris, und alsdann längs der V. basilica herab: ebt Zweige an die Haut der inneren Seite des Oberarms, ingt neben der V. basilica durch die halbmondförmige alte der Fascia brachialis (S. 249.) unter die Haut, und gleitet im Allgemeinen jene Vene bis zum Handgelenke it langen Zweigen, die an die Haut des Vorderarms sich rtheilen. Gemeiniglich theilt er sich noch oberhalb des ondylus internus oss. brachii in einen Ramus cutaneus lmaris, welcher unter oder über die V. mediana hinweg, f der Aponeurosis m. bicipitis und der Fascia antibrachii der inneren Fläche des Vorderarms herabsteigt: und nen Ramus cutaneus ulnaris, welcher in Begleitung der . basilica die Haut der Ulnarseite des Vorderarms ver- rgt.

3) *N. musculocutaneus* s. cutaneus brachii externus s. rforans Casserii, Muskelhautnerv, stammt vom äufseren indel des Armgeflechts, vorzugsweise vom sechsten und nften, auch vom siebenten Halsnerven und ist stärker als e Nn. cutanei interni; er wendet sich sogleich nach au- en, durchbohrt den M. coracobrachialis und giebt ihm d dem M. biceps Äste, auch einen Zweig für den M. achialis internus. Alsdann läuft er zwischen Mm. biceps d brachialis internus schräg nach aufsen herab, durch- hrt die Fascia brachialis nahe oberhalb der Ellenbogen- ube, zwischen der Cauda des M. biceps und dem Kopfe s M. supinator longus: und steigt mit der V. cephalica der inneren und vorderen Seite des Vorderarms herab. ier giebt er lange Äste, welche die Haut der Radialseite d eines Theiles der inneren und der äufseren Fläche des orderarms versorgen und bis zur Haut des Daumenballen d selbst der Hohlhand reichen: sein stärkster Ast beglei- t die V. cephalica bis zur Rückenfläche der Mittelhand, rbindet sich mit dem N. radialis superficialis und nimmt ntheil an der Bildung der Nn. digitales dorsales des Daumens.

4) *N. circumflexus brachii s. axillaris,* der Kranzner des Arms oder Achselnerv, stammt vom hinteren Bünde des Armgeflechts, insbesondere vom sechsten, auch von fünften und siebenten Halsnerven: geht sogleich nach sei nem Ursprunge hinter der A. axillaris nach hinten un unten, windet sich mit der A. circumflexa humeri posterio um das Collum oss. brachii, zwischen diesem und dem Ca put longum m. tricipitis nach hinten dringend: giebt eine Ast zur Kapsel des Schultergelenks, einen Ast zum M. tere minor und öfters den mittleren N. subscapularis: alsdan den *N. cutaneus posterior brachii*, welcher sich um de hinteren Rand des M. deltoides herumschlägt oder diese Muskel durchbohrt und sich mit auf- und absteigende Zweigen in der, die Mm. deltoides und triceps bedeckende Haut verbreitet. — Der Stamm des N. circumflexus dring hiernach mit vielen Zweigen in die innere Fläche des M deltoides.

5) *N. medianus*, Mittelarmnerv, stammt vom äufsere Bündel, hauptsächlich vom siebenten und sechsten, wenige vom fünften Halsnerven, nimmt dazu aber den Verstärkungs ast aus dem inneren Bündel vom achten Halsnerven un ersten Rückennerven auf, so dafs er mit seinen Wurzel die A. axillaris umfafst: ist nächst dem N. radialis de stärkste Armnerv. Er läuft längs der äufseren Seite der A axillaris und brachialis, vom M. biceps bedeckt herab un verbindet sich oft durch einen Zwischenast mit dem N musculocutaneus: wendet sich aber am unteren Ende de Oberarms über die A. brachialis hinweg an ihre inner Seite, an welcher er durch die Plica cubiti, nur von de Aponeurosis m. bicipitis bedeckt, herabsteigt. Alsdann läuf er über die Wurzel der A. ulnaris hinweg, bedeckt vo den Mm. pronator rotundus und flexor carpi radialis un giebt hieselbst Muskeläste ab: geht sodann in der Mitte de inneren Fläche des Vorderarms abwärts, zwischen den Mm flexores digitorum communes sublimis und profundus, von ersteren bedeckt, und giebt hier den Ramus palmaris longu ab: tritt mit den Sehnen der Mm. flexores digitorum unte dem Lig. carpi volare proprium in die Vola manus un spaltet sich, meistens nahe oberhalb jenes Ligaments, in

vei Äste, die sogleich in die Nn. digitales volares communes I — IV zerfallen.

a) *Rami musculares* gehen zu den Mm. pronator rotundus, flexor carpi radialis, palmaris longus und flexor digitorum sublimis: der stärkste und längste dieser Zweige, *interosseus internus* genannt, versorgt den M. flexor digitorum profundus, läuft genau an der inneren Fläche des g. interosseum antibrachii herab, giebt dem M. flexor pollicis longus einen Ast und endigt im M. pronator quadratus.

b) *Ramus palmaris longus n. mediani*, ein langer dünner veig, entspringt in der Mitte des Vorderarms, durchbohrt Fascia antibrachii, läuft neben der Sehne des M. palmalongus und verbreitet sich an die Haut der Hohlhand.

c) *Nn. digitales volares communes I — IV*, der erste bis rte gemeinschaftliche Hohlhand-Fingernerv, sind die rksten Äste des N. medianus: sie laufen divergirend zwien den Sehnen der Mm. flexores pollicis und digitorum ge- die Finger hin und werden vom Daumen an gezählt. r erste ist der schwächste, versorgt die Mm. abductor vis, flexor brevis und opponens pollicis und die Haut Daumenballen und endigt als *N. volaris pollicis radialis.* r zweite giebt Äste zu der Haut zwischen Daumen und gefinger und zum ersten M. lumbricalis, und spaltet in den *N. volaris pollicis ulnaris* und *N. volaris indicis ialis.* Der dritte giebt Zweige zur Haut zwischen Zeige- Mittelfinger und zum zweiten M. lumbricalis und theilt in den *N. volaris indicis ulnaris* und *N. volaris dig. lii radialis.* Der vierte giebt Zweige zur Haut zwischen ttel- und Ringfinger und zum dritten M. lumbricalis, verdet sich durch einen Ast mit dem N. ulnaris volaris sucialis, und zerfällt in den *N. volaris dig. medii ulnaris N. volaris dig. annularis radialis.*

6) *N. ulnaris* s. cubitalis, Ellenbogennerv, vom innen Bündel des Armgeflechts, vorzüglich vom achten Hals- ersten Rückennerven, auch vom siebenten Halsnerven mmend, aber nur wenige Fäden vom sechsten und fünf- Halsnerven aufnehmend: läuft anfänglich an der inneren te der A. axillaris und brachialis, hinter der V. axillaris; ndet sich alsdann weiter nach hinten und steigt in Beitung der A. collateralis ulnaris superior herab, nur von

der Fascia brachialis bedeckt, hinter dem Lig. intermuscu lare internum und hinter dem Condylus internus oss. bra chii, zwischen diesem Knorren und dem Olecranon. Nun wendet er sich wiederum etwas nach vorn an die innere Fläche des Vorderarms und läuft zwischen Mm. flexor carp ulnaris und flexor digitorum profundus, an der hinteren oder Ulnarseite der A. ulnaris herab. Hier giebt er Äst an die genannten Muskeln und den *Ramus palmaris longu nervi ulnaris*, welcher zwischen den Sehnen jener Muskel die Fascia antibrachii durchbohrt und sich an die Haut de Handgelenks und der Hohlhand begiebt: und spaltet sich $1\frac{1}{2}$ ″ bis 2 ″ oberhalb des Handgelenks in den dünneren N. ulnaris dorsalis und den dickeren N. ulnaris volaris.

a) *N. ulnaris dorsalis* s. *Ramus dorsalis n. ulnaris*, de Rücken-Ellenbogennerv, windet sich oberhalb des Capitu lum ulnae zwischen der Sehne des M. flexor carpi ulnari und der Ulna zum Rücken des Handgelenks, durchbohrt di Fascia antibrachii, giebt Zweige an die Haut des Rücken des Handgelenks und der Mittelhand, welche zuweilen mi den Endästen des Ramus ulnaris des N. cutaneus internu major sich verbinden: und theilt sich in vier bis fünf Äste welche an die Rückenfläche des kleinen und Ringfingers, al *Nn. dorsales dig. minimi ulnaris* und *radialis*, und als *Nn dorsales dig. annularis ulnaris* und *radialis* gelangen: mi Ästen des N. radialis superficialis sich vereinigen und häu fig mit diesen gemeinschaftlich noch den N. dorsalis dig medii ulnaris zusammensetzen.

b) *N. ulnaris volaris* s. *Ramus volaris nervi ulnaris*, de Hohlhand-Ellenbogennerv, geht zur Hohlhand zwischen de A. ulnaris und der Sehne des M. flexor carpi ulnaris un Os pisiforme, nur vom Lig. carpi volare commune und M palmaris brevis bedeckt, giebt diesem Muskel und der Hau des Handgelenks kleine Zweige und spaltet sich in die Nn ulnares volares, superficialis und profundus.

aa) *N. ulnaris volaris superficialis* theilt sich in de fünften und sechsten gemeinschaftlichen Hohlhand-Finger nerven, *Nn. digitales volares communes* V und VI. Erstere giebt einen Verbindungsast zum N. digitalis communis quar tus oder zum N. volaris dig. annularis radialis, Zweige a den vierten M. lumbricalis und an die Haut zwischen den

ing- und kleinen Finger, und spaltet sich in den *N. vola-*
s dig. annularis ulnaris und *N. volaris dig. minimi radialis.*
- Der N. digit. volaris communis VI giebt Äste an den M.
lmaris brevis und an die Haut des Ulnarrandes der Hohl-
nd und endigt als *N. volaris dig. minimi ulnaris.*

bb) *N. ulnaris volaris profundus*, tiefer Hohlhandnerv,
ldet mit einem Zweige des N. ulnaris dorsalis eine Schlinge
m das Os pisiforme und dringt zwischen Mm. abductor
nd flexor brevis dig. minimi in die Tiefe der Hohlhand
nter die Sehnen der Mm. flexores communes digitorum,
dem er vor dem Arcus volaris profundus bogenförmig
nläuft: giebt Äste an die Mm. abductor, flexor brevis und
ductor dig. minimi, an die Mm. interossei interni und
terni und endigt im M. adductor pollicis.

7) *N. radialis*, Speichennerv, entsteht vom hinteren
indel des Plexus brachialis und zwar von sämmtlichen vier
nteren Halsschlingen, vorzüglich aber vom siebenten, ach-
n und sechsten Halsnerven, und ist der stärkste unter den
rmnerven. Er steigt zuerst hinter der A. axillaris und
m N. ulnaris, alsdann zwischen Caput longum und inter-
m m. tricipitis und hinter dem Os brachii, zwischen die-
m Knochen und dem Bauche des M. triceps herab, wo-
lbst er den N. cutaneus externus antibrachii abgiebt, und
uft alsdann mehr nach vorn gerichtet abwärts, so dass er
h in sehr schräger Richtung um die ganze hintere Fläche
s Oberarmbeins von hinten nach vorn windet und die
profunda brachii und collateralis radialis begleitet: ge-
ngt alsdann zwischen M. brachialis internus und dem
pfe des M. supinator longus an die vordere innere Seite
s Condylus externus oss. brachii, giebt noch Muskeläste
und spaltet sich in die Nn. radiales profundus und su-
rficialis.

a) Rami musculares an die drei Köpfe des M. triceps,
e zum Theil bis zum Ellenbogen herabsteigen, auch Zweige
die Haut der hinteren Seite des Oberarms geben; zuwei-
n entsteht auch der N. thoracico-dorsalis (S. 934.) vom
radialis.

b. *N. cutaneus externus antibrachii* s. cut. externus su-
rior brachii, der äufsere Hautnerv des Vorderarms, durch-
hrt die Fascia brachialis zwischen den Mm. triceps und

supinator longus, läuft zwischen Olecranon und Condylus externus oss. brachii zum Vorderarm herab und vertheilt sich in der Haut der äufseren Fläche desselben, zwischen den Zweigen des N. musculocutaneus und des N. cutaneus internus major. Er reicht nicht ganz bis zum Handgelenk herab.

c) Rami musculares an die Mm. brachiales internus, supinator longus und extensor carpi radialis longus.

d) *N. radialis profundus* s. Ramus profundus s. muscularis n. radialis, tiefer Speichennerv, wendet sich dicht auf dem M. supinator brevis oder ihn durchbohrend nach der äufseren Seite des Vorderarms, giebt Äste an die Mm. extensores carpi radiales, extensor digitorum communis, extensor dig. minimi proprius, extensor carpi ulnaris und anconaeus; sein längster Ast, *N. interosseus externus* genannt, vertheilt sich an die Mm. abductor pollicis longus und extensores pollicis und indicis und endigt in der Kapsel des Handgelenks.

e) *N. radialis superficialis* s. Ramus superficialis s. dorsalis s. cutaneus n. radialis, oberflächlicher Speichennerv, ist schwächer als der tiefe Speichennerv, läuft, vom M. supinator longus und der Fascia antibrachii bedeckt, an der vorderen oder Radialseite der A. radialis herab: tritt sodann zwischen dem Radius und der Sehne des M. supinator longus hindurch, die Fascia durchbohrend, an die äufsere Seite des Vorderarms und den Rücken des Handgelenks: — und spaltet sich gewöhnlich in einen vorderen und hinteren Ast, welche die Haut des Daumenballen und die vordere Hälfte des Rückens der Handwurzel und Mittelhand versorgen und fünf bis sieben, gewöhnlich sechs Rückenfingernerven abgeben. Der vordere Ast, welcher sich mit dem Ende des N. musculocutaneus verbindet, giebt den *N. dorsalis pollicis radialis;* der hintere giebt die *Nn. dorsales pollicis ulnaris, indicis radialis* und *ulnaris, digiti medii radialis* und *ulnaris* und vereinigt sich durch eine oder mehrere Schlingen mit den Ästen des N. ulnaris dorsalis, so dafs die Nn. dorsales des Mittel- und Ringfingers zuweilen mehr aus dem N. radialis superficialis, zuweilen mehr aus dem N. ulnaris dorsalis abzustammen scheinen. —

Nn. digitales, Fingernerven. Jeder Finger erhält zwei

Nn. digitales volares und zwei Nn. digitales dorsales, welche an dem Radial- und Ulnarrande der Hohlhand- und Rückenfläche der Finger verlaufen und folgendermafsen von den gröfseren Nervenstämmen entspringen:

Nn. digitales volares

pollicis	radialis	vom	N.	dig.	communis	I	N. medianus	
	ulnaris							
indicis	radialis	»	»	»	»	II		
	ulnaris							
dig. medii	radialis	»	»	»	»	III		
	ulnaris							
g. annularis	radialis	»	»	»	»	IV		
	ulnaris							
dig. minimi	radialis	»	»	»	»	V	N. ulnaris volaris	
	ulnaris	»	»	»	»	VI		

Nn. digitales dorsales

pollicis	radialis	vom N. radial. superfic. u. N. musculocutan.	
	ulnaris		
indicis	radialis	vom N. radialis superficialis	
	ulnaris		
dig. medii	radialis		
	ulnaris		
g. annularis	radialis		
	ulnaris	"	N. ulnaris dorsalis
ig. minimi	radialis		
	ulnaris		

Die Nn. digitales volares sind beträchtlich stärker als e Rücken-Fingernerven, laufen an der inneren Seite der a. digitales volares bis zu den Fingerspitzen, versorgen berhaupt die Volarfläche der Finger und geben am ersten ngergliede längere Äste ab, welche um die Ränder der nger zum Rücken des zweiten Gliedes laufen: aufserdem irzere Zweige zum Rücken des dritten Gliedes. Sie endien in der Haut der rundlichen Fingerspitze und in der aut unter dem Nagel, ohne Schlingen zu bilden. — Die hwächeren Nn. digitales dorsales reichen nur bis zum ücken des ersten Fingergliedes, bilden aber Schlingen mit en Ästen der Nn. digitales volares: nur die Rückennerven es Daumens gelangen bis zum Nagelgliede.

Nervi spinales dorsales I — XII.
Rückennerven.

Die Nn. spinales dorsales s. spinales thoracici s. intercostales, Rücken- oder Brustwirbelnerven, treten durch die For. intervertebralia dorsalia hervor, der erste zwischen dem ersten und zweiten Brustwirbel, der zwölfte zwischen dem zwölften Brust- und ersten Lendenwirbel. Die Stämme sind sehr kurz, der des ersten der dickste von allen, die des zweiten bis neunten schwächer (und unter diesen der des zweiten, fünften, siebenten und neunten zuweilen, aber nicht immer, stärker als die vorderen): der des zehnten bis zwölften nehmen wiederum an Dicke zu. Die Spaltung in den überall stärkeren vorderen und schwächeren hinteren Ast findet im Ausgange des For. intervertebrale Statt bei den meisten am inneren Rande des Lig. colli costae internum: die Verbindungsfäden mit dem nächstgelegenen Ganglion thoracicum des N. sympathicus sind verhältnifsmäfsig stark und häufig doppelt.

Hintere Äste, Rami posteriores s. dorsales dringen zwischen den Ligg. colli costae internum und externum und den Queerfortsätzen der Brustwirbel hindurch und hinter den Mm. levatores costarum nach hinten, und spalten sich jeder in einen inneren und einen äufseren Ast; bei den sieben obersten ist der innere, bei den fünf untersten der äufsere Ast der stärkere. — 1) Die inneren Äste wenden sich nach hinten und innen mehr gegen die Proc. spinosi hin, vertheilen sich an die Mm. multifidus spinae, intertransversarii und interspinales dorsi, semispinalis dorsi et colli und spinalis dorsi, und vom ersten an bis zum siebenten auch an die Haut der Schulterblatt- und Rückengegend, (indem sie die zweite und erste Schicht der Rückenmuskeln nur durchbohren, ohne ihnen sichtbare Zweige zu geben, Bock). — 2) Die äufseren Äste wenden sich nach aufsen und hinten zwischen die Mm. longissimus dorsi und sacrolumbalis, vertheilen sich an diese und die Mm. transversalis cervicis, cervicalis adscendens und levatores costarum, hin und wieder auch an die Haut des Rückens: vom achten an bis zum zwölften durchbohren sie regelmäfsig die Mm. cucullaris, latissimus dorsi und serratus posticus

nferior und vertheilen sich an die Haut der Regiones dor-
alis, lumbaris und iliaca, bis zur Crista oss. ilium herab.

Vordere Äste, Nn. intercostales s. subcostales, Zwischenrippennerven, treten jeder etwas aufsteigend vor em Lig. colli costae internum und M. levator costae in das nterstitium intercostale, der zwölfte aber unter die zwölfte ippe: und laufen im Zwischenrippenraume unter der A. ntercostalis und zwischen Mm. intercostales internus und xternus nach aufsen und vorn, anfänglich am unteren Rande er Rippe, nachher mehr in der Mitte des Interstitium in-ercostale. Sie spalten sich zuweilen in zwei parallele Äste, ie sich bald wieder vereinigen: verbinden sich nicht unter inander zu Plexus, wie die vorderen Äste der übrigen Nn. pinales, sondern schicken einander nur hin und wieder inen einzelnen Faden zu, welcher über die innere Fläche er hinteren Extremität der Rippe läuft: solche Verbindun-en kommen am häufigsten zwischen dem zweiten bis vier-en Intercostalnerven vor. Sie geben Äste an die Mm. in-ercostales und serrati postici und spalten sich noch im interen Theile der Interstitia intercostalia in einen äufse-en oberflächlichen und einen inneren tieferen Ast. Der ufsere Ast des ersten, welcher der stärkste von allen aus en Nn. spinales dorsales stammenden Nerven ist, wendet ich sogleich über die erste Rippe und geht in das innere ündel des Plexus brachialis über (S. 932.): die äufseren ste der folgenden eilf Nn. intercostales durchbohren die Muskeln an den Seitenwänden des Brustkastens und des auches, gehen vorzüglich zur Haut und werden vom zwei-en bis zum siebenten Nn. cutanei pectorales, vom achten is zwölften Nn. cutanei abdominales genannt. — Die in-eren oder tiefen Äste der Nn. intercostales setzen ihren auf in den Interstitia intercostalia oder zwischen den seit-ichen Bauchmuskeln fort und werden vom ersten bis sie-enten Nn. intercostales anteriores s. pectorales interni, vom achten bis zwölften Nn. musculares abdominales genannt.

1) *Nn. cutanei pectorales* s. Rami pectorales laterales, lie sechs Hautnerven der Brust, spalten sich jeder in einen vorderen und hinteren Ast, welche nahe neben einander an ler inneren Wand der Achselhöhle und in der Mitte der

Regio costalis die Mm. intercostalis externus und serratus anterior major durchbohren. Die vorderen Äste biegen sich um den unteren Rand des M. pectoralis major nach vorn und oben, vertheilen sich in der Haut der Regio mammillaris, hypochondriaca und epigastrica, auch an die Milchdrüse und Brustwarze. Die hinteren Äste wenden sich nach hinten zur Haut der Schulterblatt- und Rückengegend: der des zweiten und dritten aber, welche sich oft vereinigen, versorgen auch die Haut der Achselhöhle mit mehreren Zweigen: der zweite nimmt jedesmal wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung des N. cutaneus brachii internus posterior (S. 934.).

2) *Nn. cutanei abdominales*, die fünf Hautnerven des Bauches, sind stärker als die vorigen und verhalten sich ihnen ähnlich: sie durchbohren die Mm. intercostales externi und den M. obliquus externus abdominis in der Regio hypochondriaca und iliaca: die hinteren schwächeren Äste wenden sich gegen die Regio lumbaris hin; die vorderen verbreiten sich schräg herabsteigend an den M. obliquus externus abdominis und an die Haut der seitlichen und vorderen Bauchwand bis in die Regio inguinalis und hypogastrica: der vom zwölften N. intercostalis geht über die Crista oss. ilium hinweg zur äufseren Hüftgegend.

3) *Nn. intercostales anteriores* s. pectorales interni s. profundi, die sieben vorderen Intercostalnerven, von welchen der erste der dünnste: laufen durch die Interstitia intercostalia bis neben den Rand des Brustbeins, geben den Mm. intercostales, triangularis sterni und den oberen Enden der Mm. transversus und rectus abdominis Äste, durchbohren den Ursprung des M. pectoralis major, wenden sich nach aufsen und vertheilen sich in die Haut der Regio sternalis und des inneren Theiles der Regio mammillaris bis zur Brustwarze.

4) *Nn. musculares abdominales*, die fünf Muskelnerven des Bauches. Die vier ersten gehen noch eine kurze Strecke zwischen den Mm. intercostales und geben ihnen Äste: alsdann gehen sie hinter den Knorpeln der achten bis zwölften Rippe, der fünfte aber unter der zwölften Rippe, in die Bauchwände über: laufen zwischen Mm. obliquus internus und transversus abdominis schräg nach unten und vorn,

idem sie unter einander, der unterste auch mit dem N. ilio-
ypogastricus, Schlingen bilden, und dringen zwischen die
lätter der Fascia recta abdominis. Sie versorgen die Mm.
oliqui, transversus, rectus und pyramidalis abdominis: ihre
ndigungen durchbohren das vordere Blatt der Fascia recta
odominis neben der Linea alba und gelangen an die Haut
er vorderen Bauchwand.

Nervi spinales lumbares, sacrales, coccygeus, Lenden-, Kreuz- und Steifsnerven.

Die Nn. lumbares I — V, s. lumbales, Lenden- oder
auchwirbelnerven, die Nn. sacrales I — V, Kreuz- oder
eiligbeinnerven, und der N. coccygeus I, Steifs- oder
chwanzwirbelnerv (aufser welchem nur selten ein N. coc-
geus II als Varietät vorhanden), stehen so mit einander
Verbindung, dafs sie am bequemsten gemeinschaftlich
trachtet werden. Die langen Wurzeln dieser eilf Nerven
ufen eine beträchtliche Strecke im Canalis spinalis ab-
ärts, bilden die sog. Cauda equina (S. 923.) und stehen nur
lten durch Zwischenfäden in Verbindung. Die Ganglien
r hinteren Wurzeln der Nn. lumbares liegen in den For.
tervertebralia lumbaria, die der Nn. sacrales und des N.
ccygeus im Canalis sacralis, die des letzteren zuweilen
ch innerhalb der Dura mater: die Verbindungsfäden mit
m Gangliensystem, welche durch die vorderen Äste und
ämme dieser Nerven bis zu den Wurzeln, besonders zu
n Wurzelganglien gelangen, sind meistens doppelt oder
eifach vorhanden und stammen für die Nn. lumbares von
n Ganglia lumbaria, für die Nn. sacrales I — IV von den
anglia sacralia, für die Nn. sacralis V und coccygeus vom
anglion coccygeum des N. sympathicus. Die Stämme der
n. lumbares sind sehr kurz und treten durch die For. in-
rvertebralia lumbaria, der erste zwischen dem ersten und
veiten Lendenwirbel, der fünfte zwischen dem fünften
endenwirbel und dem Kreuzbein. Die längeren Stämme
r Nn. sacrales und coccygeus laufen im Canalis sacralis
wärts: die der Nn. sacrales I — IV spalten sich in die
rderen und hinteren Äste in gleicher Höhe mit den For.
cralia, der des N. sacralis V neben dem Cornu sacrale,

der des N. coccygeus neben dem Cornu coccygeum. Ihre Dicke nimmt vom ersten N. lumbaris bis zum fünften zu und vom ersten N. sacralis an wiederum ab.

Hintere Äste. Sie sind im Verhältnifs zu den vorderen Ästen sehr dünn und werden vom ersten bis zum fünften Lendennerven dünner, alsdann bis zum dritten Sacralnerven oft wiederum dicker, dagegen die der beiden letzten Nn. sacrales und des N. coccygeus sehr zart sind. Die der Nn. lumbares treten zwischen den Proc. transvers. der Lendenwirbel hindurch nach hinten und theilen sich jeder in einen inneren und einen äufseren Zweig: die inneren gehen an die Mm. multifidus spinae und interspinales lumborum und an die Haut der Lendengegend; die äufseren sind meistens stärker, dringen an die Mm. intertransversarii lumborum und M. sacrospinalis, bilden Schlingen unter einander und laufen über den hinteren Theil der Crista ossilium herab zur Haut der Hüfte und des Gesäfses als *Nn. cutanei clunium superiores.* — Die hinteren Äste der Nn. sacrales I — IV dringen durch die For. sacralia posteriora, die des N. sacralis V und des N. coccygeus durch die untere Öffnung des Canalis sacralis und das Lig. sacrococcygeum posterius hervor, verbinden sich mit den hinteren Ästen der beiden letzten Nn. lumbares und sämmtlich untereinander zu dem kleinen, sehr länglichen *Plexus sacralis posterior*, welcher dicht hinter der Symphysis sacroiliaca und dem Ursprunge des Lig. sacrotuberosum von oben nach unten sich erstreckt: aus diesem Geflecht entstehen zwei bis drei hintere Hautnerven des Gesäfses, *Nn. cutanei clunium posteriores*, welche den Ursprung des M. gluteus maximus durchbohren: und kleine Äste für die Haut der Kreuzgegend, die sich bis unterhalb der Spitze des Steifsbeins verbreiten.

Vordere Äste. Ihre Stärke verhält sich wie die der Stämme, so dafs die des N. lumbaris V und N. sacralis I die dicksten sind: diese haben einen Dm. von 3 ‴ bis 3½ ‴, dagegen der des N. lumbaris I ungefähr 1½ ‴ und der des N. sacralis V ½ ‴ dick ist. Sie wenden sich sogleich nach vorn und aufsen, so dafs die der ersten vier Lendennerven zwischen dem M. quadratus lumborum und M. psoas und zwischen den Bündeln des letzteren, der des fünften Lenden-

erven hinter dem inneren Rande des M. psoas, die der
n. sacrales und coccygeus zwischen den Bündeln der Mm.
yriformis und coccygeus und alsdann vor diesen Muskeln
um Vorschein kommen. Nachdem sie kurze dünne Äste
n diese Muskeln gegeben haben, fliefsen sie, meistens in
inen oberen und unteren Ast getheilt, jeder mit dem nächst
enachbarten höheren und tieferen zusammen. Auf solche
Veise entstehen fünf *Ansae lumbares* und fünf *Ansae sacrales*;
ie erste Ansa lumbaris wird von den Nn. lumbaris I und
, die fünfte Ansa lumbaris vom N. lumbaris V und N.
acralis I gebildet: die erste Ansa sacralis vom N. sacralis
und II, die fünf Ansa sacralis vom N. sacralis V und N.
occygeus. Das aus diesen zehn Ansae und einigen unter-
eordneten, durch neue Spaltung und Vereinigung gebilde-
n Schlingen von unbeständiger Anzahl, zusammengesetzte
hr grofse Geflecht ist der *Plexus lumbosacralis*, das
enden-Kreuzgeflecht: es zerfällt in die vier untergeord-
eten Plexus lumbaris, ischiadicus, pudendalis und coccygeus,
on denen die beiden ersten die ansehnlichsten sind, die
icksten Nerven enthalten und abgeben. Der *Plexus lum-
aris* enthält die erste, zweite und dritte Ansa lumbaris und
wird von den drei ersten Nn. lumbares und dem oberen
ste des vierten gebildet: der *Plexus ischiadicus* besteht aus
er vierten und fünften Ansa lumbaris und der ersten und
weiten Ansa sacralis und ist sonach aus dem unteren Aste
es vierten Lendennerven, aus dem fünften N. lumbaris und
sten N. sacralis (welche vereinigt als N. lumbosacralis
on Einigen bezeichnet werden), aus dem zweiten N. sacra-
s und einem Aste des dritten zusammengesetzt: der *Plexus
udendalis* enthält die dritte Ansa sacralis, nämlich den vier-
n N. sacralis und einen Ast des dritten, auch einige Zweige
us dem Plexus ischiadicus, welche mit dem vierten Sacral-
erven kleine Schlingen bilden: der Plexus coccygeus er-
ält mit der vierten und fünften Ansa sacralis den fünften
. sacralis, den N. coccygeus und einen Ast vom vierten
. sacralis.

Plexus lumbaris,
Lendengeflecht.

Das Lendengeflecht liegt theils hinter dem M. psoas
major, theils zwischen dessen Bündeln und giebt aufser klei-

nen Ästen zu den Mm. quadratus lumborum und psoas major und minor sechs Nerven ab: Nn. iliohypogastricus, ilioinguinalis, genitocruralis, cutaneus femoris anterior externus, obturatorius und cruralis, von welchen der N. cruralis und nach diesem der N. obturatorius die stärksten sind.

1) *N. iliohypogastricus*, Hüftbeckennerv, entsteht vorzüglich vom ersten N. lumbaris, geht durch den M. psoas und vor dem M. quadratus lumborum nach aufsen und unten, durchbohrt den M. transversus abdominis oberhalb des vorderen Theiles der Crista oss. ilium, giebt einen Hautast zum vorderen Theile der äufseren Hüftgegend: läuft alsdann zwischen Mm. transversus und obliquus internus abdominis, ihnen Äste gebend, bis nahe oberhalb des Canalis inguinalis nach vorn herab, verbindet sich mit dem untersten N. muscularis abdominalis und dem N. ilioinguinalis, und endigt in der Haut oberhalb des Annulus inguinalis anterior und der des Mons pubis.

2) *N. ilioinguinalis*, Hüftleistennerv, schwächer und unbeständiger als der vorige, von welchem er oft ersetzt wird. Entspringt meistens vom ersten N. lumbaris, durchbohrt den M. psoas major und läuft an dessen äufserem Rande und vor der Fascia iliaca herab, durchbohrt die Fascia transversalis und den M. transversus abdominis an der inneren Seite der Spina anterior superior oss. ilium und oberhalb des Arcus cruralis: geht zwischen den Mm. obliquus internus und transversus abdominis und durch den Canalis inguinalis, oberhalb des Samenstranges oder des Lig. uteri rotundum: tritt aus dem Annulus inguinalis anterior hervor und gelangt an die Haut des Mons pubis, der Wurzel des Penis, der vorderen Wand des Hodensackes oder des oberen Theiles der grofsen Schaamlefzen, mit mehreren Ästen, *Nn. scrotales* oder *labiales anteriores* genannt.

3) *N. genitocruralis* s. inguinalis, Scham-Lendennerv, entsteht aus der ersten Ansa lumbaris, vorzüglich vom zweiten Lendennerven, dringt durch den M. psoas major nach vorn und läuft an dessen vorderer Fläche, neben der Sehne des M. psoas minor, bis zur Leistengegend herab, und spaltet sich höher oder tiefer in einen inneren und einen äufseren Ast, N. spermaticus externus und N. lumboinguinalis,

welche aber zuweilen jeder für sich aus dem Plexus lumbaris hervorgehen.

a) *N. spermaticus externus* s. pudendus externus, äufserer Schamnerv: giebt einen Zweig, welcher unmittelbar vor der Vena iliaca externa herabläuft, an der inneren Seite dieser Vena durch den Annulus cruralis geht und sich in die, die Fovea ovalis fasciae latae bedeckende Haut vertheilt. Alsdann gelangt er in den Canalis inguinalis, indem er durch den hinteren Leistenring oder die hintere Wand dieses Kanals dringt, und tritt an der vorderen Seite des Samenstranges aus dem Annulus inguinalis anterior hervor, verästelt sich an den M. cremaster und die Tunica sartos und gelangt bis in den Grund des Hodensackes, woselbst er mit wenigen zarten Fäden die Tunica vaginalis communis durchbohrt und in der Epididymis endigt. — Im weiblichen Geschlecht ist er dünner und geht an das Lig. uteri rotundum, an die Haut vor dem vorderen Leistenringe und in die grofsen Schamlefzen.

b) *N. lumboinguinalis,* Lenden-Leistennerv, durchbohrt unter dem Annulus inguinalis posterior die Fascia transversalis und die Vereinigungsstelle des Arcus cruralis mit dem tiefen Blatte der Fascia lata, gelangt vor der A. circumflexa ilium, nach aufsen vom Annulus cruralis, zwischen die beiden Blätter der Fascia lata, durchbohrt das oberflächliche Blatt derselben und vertheilt sich in der Haut des Oberschenkels nach aufsen von der Fovea ovalis. Zuweilen ist er ein Ast des folgenden.

4) *N. cutaneus femoris anterior externus*, vorderer äufserer Hautnerv des Oberschenkels, entsteht nur von der zweiten Ansa lumbaris oder von der ersten und zweiten: geht durch den M. psoas major und vor der Fascia iliaca nach unten und aufsen: durchbohrt die Vereinigungsstelle des Arcus curalis mit der Fascia lata, sehr nahe unterhalb der Spina anterior superior oss. ilium und hinter der A. circumflexa ilium, gelangt vor dem Kopfe des M. sartorius in den Oberschenkel und läuft nunmehr, nachdem er das oberflächliche Blatt der Fascia lata durchbohrt hat, an der vorderen äufseren Seite des Oberschenkel herab, vor dem M. vastus externus, bis zur äufseren Seite der Kniescheibe: indem er theils die Haut der Vorderfläche des Oberschen-

kels, vorzüglich aber, vermittelst mehrerer, nach aufsen sich biegender Äste, die der äufseren Fläche desselben versorgt.

5) *N. obturatorius* s. cruralis posterior, der Hüftlochnerv: entsteht vom zweiten, dritten und vierten Lendennerven mit mehreren, zu Schlingen vereinigten Wurzeln; tritt am inneren Rande des M. psoas hinter der A. und V. iliaca communis hervor und läuft an der Seitenwand der Beckenhöhle, etwas auswärts gebogen nach unten und vorn, nahe unterhalb der Linea innominata, oberhalb der A. obturatoria, an der inneren Fläche der Fascia pelvis: tritt durch den Canalis obturatorius, giebt einen Ast für den M. obturator internus, und spaltet sich gleich unterhalb des For. obturatum in einen hinteren und vorderen Ast, welche vor dem M. obturator externus und zwischen Mm. adductor brevis und magnus am Oberschenkel herabsteigen. Der hintere Ast giebt einen Zweig an das Hüftgelenk, vertheilt sich an den M. obturator externus und vorzüglich an den M. adductor magnus: der stärkere vordere Ast giebt Zweige zu den Mm. gracilis, pectineus, adductor brevis und longus; tritt endlich zwischen beiden letztgenannten Muskeln nach vorn, durchbohrt die Fascia lata und verbindet sich mit dem N. cutaneus femoris internus, oder verästelt sich in seltneren Fällen abgesondert in der Haut der inneren Fläche des Oberschenkels bis zur inneren Seite des Knies herab.

6) *N. cruralis* s. *femoralis*, der Schenkelnerv, entsteht von der ersten bis dritten Ansa lumbaris, vorzüglich vom dritten und vierten Lendennerven, und ist der stärkste Nerv des Plexus lumbaris. Er geht zwischen Mm. psoas major und iliacus internus nach aufsen, alsdann am äufseren Rande des ersteren, hinter der A. iliaca externa und hinter der Fascia iliaca herab und tritt hinter dem Arcus cruralis an den Oberschenkel, woselbst er an der äufseren Seite der A. femoralis liegt, aber vom tiefen Blatte der Fascia lata bedeckt und durch dasselbe von der Arterie getrennt wird. Oberhalb des Arcus cruralis giebt er nur kurze Äste für die Mm. psoas und iliacus internus: unmittelbar unterhalb des Arcus cruralis, oder zuweilen schon früher, giebt er die Nn. cutanei femoris internus und anterior internus ab

ıd spaltet sich in ansehnliche Muskeläste und den N. phenus.

a) *N. cutaneus femoris internus* s. saphenus superior s. inor, der innere Hautnerv des Oberschenkels oder der leine Rosennerv, geht vor den Vasa femoralia, den Mm. ectineus und adductor longus schräg nach innen herab, urchbohrt die Fascia lata oberhalb der Mitte des Ober- henkels, verbindet sich bald höher, bald tiefer, mit dem orderen Aste des N. obturatorius, und verästelt sich in er Haut der inneren Fläche des Oberschenkels bis zum nie herab.

b) *N. cutaneus femoris anterior internus* s. anterior me- us, vorderer innerer Hautnerv des Oberschenkels, durch- ohrt unterhalb der Fovea ovalis den M. sartorius, wel- ner einen Ast erhält, und die Fascia lata: geht, meistens zwei gröfsere Äste gespalten, in der Mitte der Vorder- iche des Oberschenkels herab und verzweigt sich in der aut bis zur Kniescheibe.

c) *Rami musculares*, fünf bis acht: kleinere derselben hen zu den Mm. pectineus, sartorius und zum oberen nde der Mm. cruralis und vastus internus: stärkere und ngere Muskeläste dringen zu den Mm. vastus externus, ctus femoris und cruralis: der längste Ast begleitet die . femoralis an ihrer äufseren Seite, bis dieselbe durch den palt des M. triceps nach hinten sich wendet: dringt als- nn in den M. vastus internus und giebt einen Ast zur niegelenkkapsel.

d) *N. saphenus* s. saphenus major, der grofse Rosen- erv, der längste und ziemlich dicke Ast des N. cruralis, eigt anfangs an der äufseren, alsdann an der vorderen Seite r A. femoralis — am unteren Drittheil des Oberschenkels er in der Furche zwischen Mm. vastus internus und ad- uctor magnus — bis zur inneren Seite des Kniegelenks erab, immer vom M. sartorius und der Fascia lata bedeckt. ı der Mitte des Oberschenkels giebt er einen Hautzweig , welcher am inneren Rande des M. sartorius die Fascia urchbohrt und mit dem N. cutaneus femoris internus, zu- eilen auch mit dem vorderen Aste des N. obturatorius ch verbindet: alsdann einen zweiten Zweig vor dem Con- ylus internus oss. femoris, welcher den M. sartorius und

die Fascia lata durchbohrt, in die Haut der inneren Seite des Knies, und unterhalb desselben nach vorn sich biegend, in die Haut des Unterschenkels sich vertheilt. Alsdann durchbohrt der N. saphenus die Fascia lata hinter der Cauda des M. sartorius, folgt dem Laufe der Vena saphena magna am Unterschenkel: giebt Hautäste an die innere und vordere Fläche desselben, auch an die Haut des inneren Theiles der Wade — *Nn. cutanei cruris interni* und *posterior internus* —: gelangt vor dem inneren Knöchel zum inneren Fufsrande, giebt Zweige zur Haut desselben; und verbindet sich häufig mit dem inneren Aste des N. peronaeus superficialis, wodurch er Antheil an der Bildung des N. dorsalis hallucis internus nimmt.

Plexus ischiadicus, *Hüftgeflecht.*

Der Plexus ischiadicus s. sacralis liegt in theils schräg absteigender, theils queerer Richtung vor dem M. pyriformis, hinter den Aa. hypogastrica, ischiadica und pudenda communis, von der vorderen Fläche des Kreuzbeins bis in die Incisura ischiadica superior hineinragend; und enthält aufser der vierten und fünften Ansa lumbaris und der ersten und zweiten Ansa sacralis zuweilen noch mehrere gesonderte Schlingen; oder häufiger liegen die aus jenen Ansae entstandenen starken Nervenstämme ziemlich locker und nur vermittelst dünner Bündel verflochten genau neben einander: so dafs der Plexus die Gestalt eines breiten platten Stranges erhält, welcher den Theil der Incisura ischiadica superior über und vor dem M. pyriformis ausfüllt. Aus dem Plexus ischiadicus gehen einige Fäden zum Plexus hypogastricus inferior des Gangliensystems und vier ansehnliche Nerven hervor, Nn. gluteus superior, gluteus inferior, cutaneus femoris posterior und ischiadiacus.

1) *N. gluteus superior*, oberer Gesäfsnerv, entsteht vom hinteren Theil der vierten und fünften Ansa lumbaris, giebt einen Ast an den M. pyriformis und tritt über diesen Muskel hinweg, in Begleitung der A. glutea, durch die Incisura ischiadica superior nach aufsen und hinten, vertheilt sich an die Mm. glutei medius und minimus und mit einem

ste, welcher zwichen beiden Muskeln nach vorn läuft, an
en M. tensor fasciae latae.

2) *N. gluteus inferior*, unterer Gesäfsnerv, vom hinte-
en und äufseren Theile der Hüftgeflechts aus der fünften
nsa lumbaris und ersten Ansa sacralis: geht mit der A.
chiadica vor und unter dem M. pyriformis durch die In-
sura ischiadica superior und vertheilt sich an den M. glu-
us maximus.

3) *N. cutaneus femoris posterior*, hinterer Hautnerv des
berschenkels, kommt vom unteren hinteren Theil des Plexus
chiadicus aus der ersten und zweiten, selten auch aus der
ritten Ansa sacralis, geht mit der A. ischiadica unter dem
. pyriformis durch die Incisura ischiadica superior, ver-
ndet sich mit dem N. gluteus inferior; giebt Äste an den
. gluteus maximus: — alsdann zwei bis drei untere Haut-
rven des Gesäfses, *Nn. cutanei clunium inferiores*, welche
n den unteren Rand des M. gluteus maximus sich in die
öhe schlagen und in die Haut des Gesäfses dringen: —
nen Verbindungszweig zum N. perinaei, welcher um das
ber ischii nach oben und vorn sich windet: — zwei bis
ei Hautzweige zum oberen Theile der inneren Fläche
s Oberschenkels: — und endlich starke Hautäste, die an
r hinteren Seite des Oberschenkels bis zur Kniekehle
rabsteigen.

4) *N. ischiadicus*, der Hüftnerv, ist der stärkste Nerv
s Körpers, 5‴ bis 6‴ breit und 2½‴ dick, und nimmt
n gröfsten Theil der Bündel des Plexus ischiadicus aus
mmtlichen vier Hauptschlingen desselben auf. Er geht
rch die Incisura ischiadica superior, unter dem M. pyri-
rmis, dann vom unteren Rande des M. gluteus maximus
nterwärts bedeckt, in der Mitte zwischen Tuber ischii
d Trochanter major, und vor den Mm. gemelli, obtu-
tor internus und quadratus femoris herab, ihnen Äste ge-
nd. Sodann steigt er an der hinteren Seite des Ober-
nenkels senkrecht herab, an der hinteren Fläche des M.
ductor magnus, anfänglich von den vereinigten Köpfen
r Mm. semintendinosus und semimembranosus und dem
put longum bicipitis hinterwärts bedeckt, späterhin in
r Mitte zwischen Mm. semitendinosus und semimembra-
sus einerseits und M. biceps femoris andererseits: giebt

einzelne Äste an diese Muskeln, an den M. adductor magnus und einen Verbindungsast zum N. cutaneus femoris posterior: und spaltet sich in der Mitte des Oberschenkels oder schon höher, (selten schon in der Incisura ischiadica superior) in den schwächeren N. peronaeus und den stärkeren N. tibialis, welche bis zur Kniekehle nahe neben einander herablaufen, am oberen Ende derselben aber aus einander weichen.

I. *N. peronaeus* s. fibularis, der Wadenbeinnerv, steigt durch den äufseren Theil der Kniekehle herab, längs des inneren Randes des M. biceps, hinter den Condyli externi des Os femoris und der Tibia, vor dem Kopfe des M. gastrocnemius externus, bis hinter das Capitulum fibulae: giebt in dieser Strecke Zweige zum Caput breve m. bicipitis, zur Kapsel des Kniegelenks, und zwei *Nn. cutanei cruris posteriores, medius* und *externus*, welche in der Kniekehle die Fascia durchbohren und alsdann in der Haut der Wade bis zum Anfange des Tendo Achillis abwärts sich vertheilen: der erstere, welcher zuweilen vom N. tibialis stammt, läuft ziemlich über die Mitte der Wade herab; der letztere, auch Ramus communicans n. peronaei genannt, steigt über die äufsere Hälfte der Wade herab und geht zuletzt in den N. suralis über. — Alsdann spaltet sich der N. peronaeus hinter dem Capitulum fibulae in die Nn. peronaei, superficialis und profundus, welche beide um das Collum fibulae nach vorn sich wenden.

1) *N. peronaeus superficialis* s. cutaneus dorsi pedis communis, oberflächlicher Wadenbeinnerv, durchbohrt, in schräger Richtung nach unten und vorn, den M. peronaeus longus, läuft vor dem M. peronaeus brevis herab, giebt beiden Äste; durchbohrt die Fascia cruris ungefähr 5″ oberhalb des äufseren Knöchels, vor dem M. extensor digitorum pedis longus; und läuft in zwei Äste gespalten über die Vorderfläche des Fufsgelenks zum Fufsrücken hin. Hier verbindet sich der innere Ast, *N. cutaneus dorsi pedis internus*, mit dem Ende des N. saphenus und einem Aste des N. peronaeus profundus: der äufsere Ast, *N. cutaneus dorsi pedis medius*, mit dem N. suralis: beide versorgen die Haut des Fufsrückens und bilden durch gabelförmige Spaltungen sieben Zehenrückennerven, *Nn. digitales dorsales digitorum*

pedis, interni et externi, nämlich den N. dorsalis hallucis nternus, den N. dorsales externus der zweiten Zehe, die Nn. dorsales interni und externi der dritten und ierten Zehe, und den N. dorsalis internus der kleinen Zehe.

2) *N. peronaeus profundus* s. Ramus muscularis n. peroaei s. N. tibialis anterior, tiefer Wadenbeinnerv, wendet ich unmittelbar vor der Fibula, die Köpfe der Mm. peroaeus longus und extensor digitorum longus durchbohrend, n das Interstitium interosseum cruris und läuft an der vorderen Fläche des Lig. interosseum herab, an der äufseren eite der A. tibialis anterior, anfangs zwischen Mm. extensor digitorum longus und tibialis anterior, alsdann zwischen Mm. extensor longus hallucis und tibialis anterior: und iebt allen diesen Muskeln Äste. Alsdann läuft er, mit der ehne des M. extensor longus hallucis und der A. dorsalis edis, durch die mittlere Scheide des Lig. cruciatum und heilt sich auf dem Fufsrücken in zwei Äste: der äufsere eht zu den Mm. extensor brevis hallucis und extensor digitorum brevis; der innere begleitet die A. interossea dorsalis I in das erste Interstitium interosseum metatarsi, giebt einen Ast an den ersten M. interosseus dorsalis, verbindet sich mit dem N. cutaneus dorsi pedis internus vom N. peronaeus superficialis und spaltet sich in zwei *Nn. dorsales, externus hallucis* und *internus digit. secundi.*

II. *N. tibialis*, Schienbeinnerv, (dessen erste Strecke zuweilen N. popliteus genannt wird) steigt senkrecht durch die Mitte der Kniekehle herab, hinter und etwas mehr auswärts als die Vasa poplitea, genau am hinteren äufseren Umfange der Vena poplitea: giebt in der Kniekehle den N. suralis und Zweige an das Gelenk und die Muskeln: tritt sodann in Begleitung der A. tibialis postica vor den M. soleus und hinter den M. tibialis posticus, giebt Muskeläste: läuft sodann längs der äufseren Seite der Arterie hinter und unter den Malleolus internus, woselbst er Rami cutanei plantares giebt, und bis unter den Proc. lateralis calcanei; hier theilt er sich in den stärkeren N. plantaris internus und den schwächeren N. plantaris externus.

1) *N. suralis s. cutaneus longus cruris et pedis* s. saphenus inferior s. Ramus communicans n. tibialis, der Waden-

nerv oder lange Hautnerv des Unterschenkels und Fufses, läuft über die Mitte der Wade herab, in der Furche zwischen beiden Mm. gastrocnemii und von der Fascia cruralis bedeckt: durchbohrt die Fascia hinter dem Anfange des Tendo Achillis und verstärkt sich durch Aufnahme des Endes des N. cutaneus cruris posterior externus vom N. peronaeus. Hiernach begleitet er die Vena saphena parva an der äufseren Seite des Tendo Achillis und hinter dem Malleolus externus, giebt hier Zweige an die Haut des äufseren Knöchels und der äufseren Seite der Ferse: wendet sich unter dem Malleolus externus nach vorn auf den Fufsrükken und läuft längs des äufseren Fufsrandes als *N. cutaneus dorsi pedis externus*, indem er mit dem N. cutaneus dorsi pedis medius (äufseren Aste des N. peronaeus superficialis) sich verbindet, Hautzweige zum Fufsrücken, zum äufseren Fufsrande und zur Fufssohle giebt und als *N. dorsalis dig. minimi externus* endigt.

2) Zwei bis drei dünne Zweige an die Kniegelenkkapsel.

3) *Rami musculares* zu den Mm. gastrocnemii, plantaris, soleus, tibialis posticus, flexores longi digitorum und hallucis.

4) *Rami cutanei plantares*, Hautnerven der Fufssohle, zwei bis drei: die kürzeren gehen an die innere Seite der Ferse, ein längerer an den hinteren Theil der Fufssohle.

5) *N. plantaris internus*, innerer Sohlennerv, läuft oberhalb des M. abductor hallucis und alsdann oberflächlicher durch die Fufssohle nach vorn, zwischen jenem Muskel und dem M. flexor digitorum pedis brevis, ihnen Zweige gebend; und spaltet sich zuerst in einen schwächeren inneren und stärkeren äufseren Hauptast. Diese geben Zweige an die Mm. abductor und flexor brevis hallucis, lumbricales I und II und an die Haut der Fufssohle, und endigen alsdann, (wie in der Hand der N. medianus) mit vier kurzen *Nn. digitales plantares communes I—IV*, aus welchen, nachdem sie die Fascia plantaris durchbohrt haben, Hautzweige und sieben *Nn. digitorum pedis plantares*, *interni* und *externi*, vom inneren Sohlennerven der grofsen Zehe an bis zum inneren Sohlennerven der vierten Zehe entstehen.

6) *N. plantaris externus*, äufserer Sohlennerv, biegt sich

mit der A. plantaris externa zwischen den Mm. flexor brevis digitorum und quadratus nach aufsen und vorn, giebt Zweige an diese Muskeln, den M. abductor digiti minimi und die Haut der Fufssohle und spaltet sich in einen oberflächlichen und tiefen Ast. a) *Ramus superficialis* verhält sich wie der N. ulnaris volaris superficialis, giebt Hautäste, Zweige zum dritten und vierten M. lumbricalis und die *Nn. digitales plantares communes V* und *VI*, welche die Fascia plantaris durchbohren und in die Nn. plantares externus der vierten und internus und externus der kleinen Zehe sich spalten. b) *Ramus profundus* ist dem N. ulnaris volaris profundus ähnlich: begleitet den Arcus plantaris profundus oberhalb der Sehnen des M. flexor digitorum longus und vertheilt sich an die Mm. abductor und flexor brevis digiti minimi, interossei plantares und dorsales, transversalis plantae und adductor hallucis.

Nn. digitales pedis, Zehennerven, werden als Nn. plantares und dorsales digitorum pedis, Sohlen- und Rücken-Zehennerven, und diese wiederum als interni und externi, je nachdem sie am inneren oder äufseren Zehenrande laufen, unterschieden: sie entstehen in folgender Ordnung:

Nn. digitales plantares

dig. I	internus	N. plantaris internus.	N. tibialis.
	externus		
» II	internus		
	externus		
» III	internus		
	externus		
» IV	internus	Ramus superfic. n. plantaris externi.	
	externus		
» V	internus		
	externus		

Nn. digitales dorsales

dig. I	int.	N. cut. dorsi pedis internus	vom N. peron. superfic.
	ext.	N. saphenus	" N. cruralis.
» II	int.	N. peronaeus profundus	
	ext.		
» III	int.	N. cut. dorsi pedis internus	N. peron. superfic.
	ext.		
» IV	int.	N. cut. dorsi pedis medius	N. peron. superfic.
	ext.		
» V	int.	N. cut. dorsi pedis externus	N. suralis.
	ext.		

Sie verhalten sich im Allgemeinen gleich den Fingernerven, sind aber dünner und kürzer: die Nn. dig. dorsales, welche nicht viel schwächer sind als die Nn. dig. plantares, reichen bis zum Nagelgliede: die Nn. digitales plantares versorgen die Haut der Sohlenfläche und der Ränder der Zehen und endigen in der gewölbten Spitze derselben und in der Haut unter den Nägeln.

Plexus pudendalis,
Schamgeflecht.

Es liegt vor dem unteren Rande des M. pyriformis, unter dem Plexus ischiadicus, mit welchem es durch mehrere Schlingen zusammenhängt und als ein kleiner Anhang desselben erscheint. Nach unten hängt es mit dem Plexus coccygeus zusammen und steht mit dem Plexus hypogastricus inferior des Gangliensystems durch mehrere, verhältnifsmäfsig ansehnliche Äste in Verbindung. Aus ihm gehen die Nn. haemorrhoidalis medii und inferior und des N. pudendus hervor.

1) *Nn. haemorrhoidales medii,* mittlere Mastdarmnerven, vier bis sechs dünne Nerven, kommen von der vierten Ansa sacralis, verbinden sich mit Zweigen des Plexus hypogastricus inferior, gehen zum Theil in die Ganglien und Schlingen desselben über und verbreiten sich, theils mit jenen gemeinschaftlich, theils abgesondert, an den Theil des Mastdarms nahe oberhalb des M. levator ani, an den Fundus, Collum und M. sphincter vesicae als *Nn. vesicales inferiores*, an die Mutterscheide als *Nn. vaginales*, und an den vorderen Theil des M. levator ani.

2) *N. haemorrhoidalis inferior*, unterer Mastdarmnerv, stärker als die vorigen und öfters ein Zweig des N. pudendus: tritt durch die Incisura ischiadica superior hinter das Lig. sacrospinosum und alsdann durch die Incisura ischiadica inferior nach vorn in die Fossa perinaei und vertheilt sich an den M. sphincter ani externus und die Haut des Afters.

3) *N. pudendus* s. pudendus communis, Schamnerv, der stärkste der aus dem Plexus pudendalis hervorgehenden Nerven, liegt etwas weiter nach aufsen als der vorige, indem er, wie dieser, durch die Incisura ischiadica superior

us dem Becken tritt und durch die Incisura ischiadica in-erior wiederum nach vorn in den Beckenausgang sich wen-et. Er begleitet die A. pudenda communis längs des Ra-ius adscendens oss. ischii, wird von der Fascia perinaei edeckt, giebt Verbindungszweige zum Plexus cavernosus enis, und spaltet sich, öfters schon in der Incisura ischia-ica inferior, in den N. perinaei und N. dorsalis penis s. litoridis.

a) *N. perinaei* s. pudendus inferior s. internus, Damm-der Mittelfleisch- oder unterer Schamnerv, läuft oberfläch-cher und mehr nach innen durch die Fossa perinaei nach orn, in Begleitung der A. perinaei; vertheilt sich mit ober-ächlichen Ästen an die Haut des vorderen Theiles des Af-ers und die des Dammes und verbindet sich mit einem Aste es N. cutaneus femoris posterior: die tieferen Zweige da-egen laufen oberhalb des M. transversus perinaei nach orn, vertheilen sich an diesen Muskel und den vorderen heil des M. sphincter ani externus; aufserdem im männli-hen Geschlecht an den M. bulbocavernosus, den Bulbus rethrae, und als *Nn. scrotales posteriores* an die hintere läche des Hodensackes: im weiblichen Geschlecht, woselbst iese Äste stärker sind, an den M. constrictor cunni, und, ls *Nn. labiales posteriores*, an die grofsen und kleinen chamlefzen, an das Ostium vaginae, Vestibulum und Harn-öhre.

b) *N. dorsalis penis* s. pudendus superior s. externus, uthen- oder oberer Schamnerv, begleitet die A. dorsalis enis anfangs zwischen Mm. bulbocavernosus und ischioca-ernosus, letzterem einen Ast gebend, bis er unter der Sym-hysis pubis auf die obere Fläche der Crura corporum ca-ernosorum penis gelangt. Alsdann läuft er an der äufse-en Seite der A. dorsalis penis, vom Lig. supensorium und der Fascia penis bedeckt, unmittelbar auf der Tunica albu-ginea der Zellkörper, gegen die Eichel herab; spaltet sich n zahlreiche platte Äste, die nicht nur unter einander, ondern auch mit Fäden des Plexus cavernosus geflechtähn-ich zusammenhangen: letztere verbinden auch den rechten nd linken N. dorsalis penis durch Fäden, welche hinter der Vena dorsalis penis hinübergehen, mit einander. Er giebt Rami cavernosi, welche die Tun. albuginea durch-

bohren und in das Innere der Corpora cavernosa dringen; viele Zweige an die Haut der Ruthe und das Praeputium: vorzüglich aber dringen seine Endäste am Collum glandis in die Eichel und vertheilen sich in der Haut derselben und an das vordere Ende der Harnröhre.

N. dorsalis clitoridis, Kitzlernerv, im weiblichen Geschlecht ist dünner, läuft zwischen Mm. constrictor cunni und ischiocavernosus, versorgt diese, die Clitoris, vorzüglich ihre Eichel, ihr Praeputium und den vorderen Theil der Labia minora.

Plexus coccygeus,
Steifsgeflecht.

Ein kleines, aus sehr dünnen Nerven gebildetes Geflecht, welches zu beiden Seiten des unteren Endes des Kreuzbeins und des Steifsbeins und vor den Ursprüngen des M. coccygeus und des Lig. sacrospinosum liegt: wird von der vierten und fünften Ansa sacralis und von Verbindungsfäden derselben mit dem Plexus pudendalis und mit den hinteren Ästen der untersten Nn. sacrales und N. coccygeus zusammengesetzt: steht auch mit dem vierten oder fünften Ganglion sacrale und dem Ganglion coccygeum des N. sympathicus in Verbindung. Es gehen aus ihm vier bis fünf dünne, kürzere und längere Nerven, *Nn. anococcygei*, hervor, welche sich an den M. coccygeus, den hinteren Theil des M. levator ani, an die Haut neben und vor der Spitze des Steifsbeins und am hinteren Umfange des Afters verbreiten.

Gangliennervensystem, Systema nervorum gangliosum.

Bei der speciellen Betrachtung des Gangliensystems ist vorzüglich zu berücksichtigen: die Anzahl und Gestalt der Ganglien, welche indessen ziemlich häufigen Verschiedenheiten unterworfen ist, — und ihre Lage und Anordnung, welche bei Weitem weniger seitlich symmetrisch erscheint, als die der Hirn-Rückenmarksnerven: — ferner die zahlreichen, kurzen und dünnen Nerven, welche theils die ein-

elnen Ganglien unter einander zu Reihen oder zu Plexus ereinigen, theils ihre Verbindungen mit den Hirn-Rükenmarksnerven vermitteln: — endlich die aus den Ganien zu den Organen gehenden Nerven, welche zahlreich, er im Allgemeinen dünn und kurz sind und zum Theil em Gangliensystem allein oder vorzugsweise anzugehören heinen, zum Theil aber sehr deutlich aus Nervenfasern nd Fädchen des Gangliensystems und der Hirn-Rückenarksnerven zugleich bestehen, indem solche in den Ganien unter einander gemischt werden.

Das Gangliensystem enthält zwei Hauptabtheilungen:

1) Nervus sympathicus dexter et sinister, eine doppelte, der rechten und linken Seite neben und vor der Wirelsäule herablaufende Reihe von Ganglien, welche unter nander durch einen einfachen oder doppelten Nervenfaden, n sog. Stamm des N. sympathicus, verbunden werden.

2) Einzelne Ganglien und Ganglienplexus, welche weir nach vorn als die Nn. sympathici, am Kopfe, Halse, in r Brust- und Bauchhöhle liegen und theils nur mit den n. sympathici in unmittelbarer Verbindung stehen, theils er einer Vereinigung oder Verschmelzung von Ganglienrven und Hirn-Rückenmarksnerven ihre Entstehung vernken.

Nervus sympathicus.

Der N. sympathicus s. sympatheticus s. sympathicus agnus s. maximus s. N. gangliosus s. trisplanchnicus s. intercostalis maximus, sympathischer Nerv, Gangliennerv, ränzstrang des Gangliensystems, ist doppelt vorhanden und mmetrisch angeordnet, daher früherhin als 44stes Nervenar des Körpers bezeichnet. Er liegt genau an der seitlien und vorderen Fläche der Wirbelsäule, überall vor den ocessus transversi, und hat keinen deutlichen Anfang noch de, indem er nach allen Seiten mit den übrigen Theilen s Gangliensystems und mit den Hirn-Rückenmarksnerven sammenhängt: bei der Beschreibung aber setzt man gehnlich seinen Anfang an den oberen Theil des Halses, in Ende an das Steifsbein, und theilt ihn nach den Gegenn der Wirbelsäule in die Pars cervicalis, thoracica und

lumbosacralis s. abdominalis, den Halstheil, Brusttheil und Lendenkreuztheil oder Bauchtheil.

I. Pars cervicalis n. sympathici.

Der Halstheil des sympathischen Nerven enthält drei Ganglia cervicalia und den diese Ganglien verbindenden sog. Stamm.

1) *Ganglion cervicale superius* s. supremum, oberer Halsknoten, ist das ansehnlichste Ganglion des N. sympathicus. Es hat eine spindelförmige Gestalt und ist ungefähr 6‴ bis 8‴ lang, 3‴ breit und 1½‴ bis 2‴ dick: zuweilen aber beträchtlich länger (1½″ bis 2″), schmaler und mehr cylindrisch gestaltet: auch wohl durch eine Einschnürung in der Mitte seiner Länge in eine obere und untere Abtheilung geschieden. Es liegt in der Höhe der Proc. transversi des zweiten und dritten, oft auch des ersten Halswirbels, vor dem M. rectus capitis anterior major, hinter der A. carotis interna, an der vorderen und inneren Seite der Nn. vagus und hypoglossus, an welche es durch kurzen Zellstoff geheftet ist. Folgende Nerven gehen von ihm aus:

a) Verbindungszweige zu den Nn. spinales cervicales I — III — IV, zum N. hypoglossus, zum Ganglion jugulare und Plexus ganglioformis des N. vagus und zum Ganglion petrosum des N. glossopharyngeus.

b) *N. caroticus internus* s. adscendens, öfters sehr ansehnlich oder von Anfang an doppelt, geht aus dem oberen Ende des Knotens hervor, steigt an der A. carotis interna herauf und geht in den Plexus caroticus internus (S. 968.) über.

c) *Rami laryngo-pharyngei*, drei bis sechs kurze Nerven, gehen an der inneren und äufseren Seite der A. carotis interna nach vorn und unten und verbinden sich theils mit den Nn. pharyngei vom N. glossopharyngeus und N. vagus zum Plexus pharyngeus (S. 905.), theils vereinigen sie sich mit dem N. laryngeus superior.

d) *Nn. carotici externi* s. *molles*, zwei bis sechs, oft vermittelst eines gemeinschaftlichen kurzen Stämmchens entspringende zarte Nerven, laufen an der A. carotis interna bis zur Spaltungsstelle der A. carotis communis herab und bilden von hier an den Plexus caroticus externus (S. 970.).

e) *N. cardiacus superior s. superficialis*, oberer oder oberflächlicher Herznerv, vom vorderen unteren Ende des Ganglion cervicale-superius ausgehend, läuft auf dem M. longus colli, an der inneren Seite des Stammes des N. sympathicus, hinter der A. thyreoidea inferior herab zum Herzgeflecht (s. Plexus cardiacus).

f) Der Stamm des N. sympathicus, gewöhnlich einfach, selten doppelt, steigt genau an der Vorderfläche der Mm. rectus capitis anterior major und longus colli herab, hinter der A. carotis communis, etwas mehr nach hinten und innen als der N. vagus und weiter nach aufsen als der N. cardiacus superior. Er giebt öfters die Verbindungsäste zu den Nn. spinales cervicales IV und V; bildet zuweilen oberhalb der A. thyreoidea inferior ein unbeständiges kleines Knötchen, Ganglion thyreoideum superius (s. cervicale medium): zuweilen spaltet er sich so, dafs er jene Arterie zwischen sich fafst.

2) *Ganglion cervicale medium* s. thyreoideum, bei Einigen Gangl. cervicale inferius), mittlerer Halsknoten, ist länglich rundlich, plattrundlich oder dreieckig, von verschiedener Gröfse, immer aber kleiner, als das Ganglion cervicale superius: fehlt aber nur selten. Es liegt am inneren und vorderen Umfange des Truncus thyreocervicalis oder an der A. thyreoidea inferior selbst, sehr nahe oberhalb der A. subclavia.

a) Verbindungszweige zum fünften, oft auch zum sechsten N. spinalis cervicalis, zu den Nn. cardiacus superior, vagus, recurrens, zuweilen auch zum N. phrenicus.

b) Zarte Zweige, welche die A. carotis communis und die A. thyreoidea inferior umstricken und den *Plexus thyreoideus inferior* bilden, welcher zur Schilddrüse, Kehl- und Schlundkopfe gelangt.

c) *N. cardiacus medius* s. *magnus* s. profundus, der mittlere oder grofse Herznerv, entspringt mit drei bis sechs Wurzeln, welche sich zu einem kurzen, einfachen oder doppelten Stamme vereinigen, sehr oft aber nur ein längliches, plattes, strangförmiges Geflecht bilden. Er läuft an dem vorderen und inneren Umfange der A. subclavia, alsdann hinter derselben und rechterseits hinter der A. ano-

nyma, gegen den Arcus aortae herab, woselbst er in den Plexus cardiacus übergeht.

d) Der Stamm, welcher zum Ganglion cervicale inferius geht, ist doppelt und besteht aus einem hinteren und vorderen Faden: ersterer ist sehr kurz und wendet sich sogleich hinter der A. subclavia abwärts: der vordere ist länger und dünner, steigt vor der A. subclavia herab, und hinter ihr wiederum aufwärts, um sich in das Ganglion cervicale inferius einzusenken: bildet auf diese Weise eine Schlinge um die A. subclavia, *Ansa subclavialis* s. Vieussenii genannt.

3) *Ganglion cervicale inferius* (bei Einigen Gangl. thoracicum primum) unterer Halsknoten, ist zuweilen gröfser, zuweilen kleiner als das Ganglion cervicale medium; meistens von plattrundlicher unregelmäfsiger Gestalt; es liegt hinter der A. subclavia und an der hinteren und äufseren Seite der Wurzel der A. vertebralis, zwischen dem Proc. transversus des siebenten Halswirbels und dem Halse der ersten Rippe: daher in beinahe gleicher Höhe mit dem Ganglion cervicale medium, aber weiter nach hinten als dieses.

a) Verbindungszweige zu den Nn. spinales cervicales VI, VII und VIII und dorsalis I: zuweilen zum N. phrenicus; meistens auch zu den Nn. vagus, recurrens und zum Plexus pulmonalis.

b) Dünne Zweige, welche die A. subclavia und die Äste derselben umstricken und kleine, die Arterien begleitende Plexus bilden. Unter diesen sind der *Plexus mammarius internus* und besonders der *Plexus vertebralis* am deutlichsten entwickelt: letzterer begleitet die A. vertebralis durch den Canalis vertebralis, verbindet sich mit mehreren Nn. spinales cervicales und gelangt in die Schädelhöhle bis zur A. basilaris.

c) *N. cardiacus inferior s. parvus*, unterer oder kleiner Herznerv, entspringt mit zwei bis drei Wurzeln, die zu einem einfachen oder doppelten Stämmchen zusammenfliefsen, welches mit dem N. cardiacus medius und mit den Rami cardiaci des N. recurrens zusammenhängt, und hinter der A. subclavia, rechterseits auch hinter der A. anonyma, nach innen herabsteigt. Häufig, vorzüglich an der

ıken Seite, gehen die Wurzeln des unteren Herznerven nzlich in den Stamm oder den geflechtartigen Strang des , cardiacus medius über, in welchem Falle der letztere *cardiacus crassus*, dicker Herznerv, genannt wird.

d) Der Stamm geht zum Ganglion thoracicum primum, t sehr kurz, oft doppelt: fehlt häufig, so dafs die Ganglia rvicale inferius und thoracicum primum zusammenfliefsen, ler nur durch eine leichte Einschnürung getrennt sind.

II. Pars thoracica n. sympathici.

Sie erstreckt sich an der Hinterwand des Brustkastens on oben nach unten, vor den Queerfortsätzen der Wirbel nd den Rippenköpfen oder den Anfängen der Rippenhälse, ch aufsen vom hinteren Mittelfell: — an ihrer vorderen äche von der Pleura costalis überzogen. Sie enthält eilf, lten zwölf *Ganglia thoracica*, Brustknoten, welche wischen den Capitula costarum vor den Proc. transversi r Rückenwirbel, oder vor den Rippenköpfen selbst liegen: eistens sind diese Ganglien plattlänglich, oft dreieckig oder ereckig und im Allgemeinen kleiner als die Halsganglien: e oberen und unteren sind etwas gröfser als die mittlen: das erste ist das ansehnlichste und fliefst oft nicht nur it dem unteren Halsknoten, sondern auch mit dem zweiı Brustknoten zusammen. Der Stamm, welcher von dem nen dieser Ganglien zum anderen geht und sie verbindet, kurz, verhältnifsmäfsig stark, oft doppelt, und läuft vor n Capitula costarum, den Vasa intercostalia und den vorren Ästen der Nn. spinales dorsales herab.

Aus den Ganglia thoracica entstehen:

1) Verbindungsäste zu dem ersten oder zweiten bis völften Nn. spinales dorsales, dringen nach oben, aufsen nd hinten in die Interstitia intercostalia, sind kurz, ziemch stark und häufig doppelt.

2) Zahlreiche dünne Zweige, welche nach innen und rn in das Cavum mediastini posterioris laufen und

a) den rechten und linken N. sympathicus mit einder verbinden;

b) die A. aorta descendens thoracica umstricken, den lexus aorticus thoracicus bilden und mit der Arterie durch

den Hiatus aorticus des Zwerchfells bis zum Plexus coeliacus gelangen:

c) zu den Plexus pulmonales und oesophagei gehen und diese Geflechte verstärken (S. 907).

3) *Nn. splanchnici*, Eingeweidenerven, sind zwei stärkere Nervenstämme, welche mehr nach vorn und innen als der N. sympathicus, an der seitlichen und vorderen Fläche der Wirbelkörper, an der Gränze des Cavum mediastini posterioris — aber noch von der Pleura überzogen, linkerseits neben der Aorta, rechterseits neben der V. azygos, und vor den Vasa intercostalia — herablaufen. Sie entstehen aus ansehnlichen, von den sechs unteren Ganglia thoracica entspringenden Ästen, welche von hinten nach vorn herabsteigend, unter spitzigen Winkeln in die Stämme der Nn. splanchnici sich einsenken; und dringen durch das Zwerchfell in die Bauchhöhle.

a) *N. splanchnicus major*, grofser Eingeweidenerv, erhält seine fünf bis sieben Wurzeln aus dem sechsten, siebenten, achten und neunten Ganglion thoracicum, oft auch noch aus dem fünften und zehnten: tritt zwischen dem Crus internum und medium diaphragmatis, selten durch den Hiatus aorticus, in die Bauchhöhle, und geht in den Plexus coeliacus über.

b) *N. splanchnicus minor*, kleiner Eingeweidenerv, entsteht aus dem zehnten und eilften Ganglion thoracicum, erhält oft auch eine Wurzel aus dem neunten oder vom N. splanchnicus major: dringt neben dem letzteren, oder das Crus medium des Zwerchfells durchbohrend, in die Bauchhöhle: und gelangt mit einem kleinen Aste zum Plexus coeliacus, dagegen mit einem stärkeren einfachen oder doppelten Aste, *Nn. renales posteriores* genannt, zum Plexus renalis.

4) Der Stamm des N. sympathicus geht vom eilften Ganglion aus zwischen Crus medium und externum des Zwerchfells, oder das Crus externum durchbohrend, in die Bauchhöhle zum ersten Ganglion lumbare.

III. Pars lumbosacralis s. abdominalis n. sympathici.

Sie enthält die Ganglia lumbaria, sacralia und coccygeum und den diese Ganglien verbindenden Stamm.

1) *Ganglia lumbaria*, Lendenknoten, vier bis fünf, von plattlänglich-eckiger Gestalt, sind kleiner als die meisten Brustknoten, liegen entfernter von einander und der Mittellinie der Wirbelsäule näher, am inneren Rande des M. psoas major, linkerseits hinter der A. aorta desc. abdominalis, rechterseits hinter der V. cava inferior. Der verbindende Stamm ist ziemlich lang und dünn.

a) Verbindungsäste zu den Nn. spinales lumbares, zwei bis drei für jeden, durchbohren die Köpfe des M. psoas major.

b) Verbindungsäste zwischen beiden Nn. sympathici, die an der vorderen Fläche der Wirbelsäule queer hinter der Aorta und Hohlvene laufen.

c) Äste zu den Plexus renalis und spermaticus, vorzüglich zahlreiche aber zu den Plexus aorticus abdominalis und hypogastricus superior.

2) *Ganglia sacralia*, Kreuzknoten, gewöhnlich vier, selten fünf; sind kleiner als die Lendenknoten und nehmen auch unten an Gröfse ab. Sie liegen in einer, mit der der andern Seite convergirenden Reihe an der Vorderfläche des Os sacrum, vor dem inneren Umfange der For. sacralia anteriora. Der Stamm des N. sympathicus zwischen ihnen ist dünn und öfters gespalten.

a) Verbindungsäste zu den Nn. spinales sacrales, zwei bis vier für jeden.

b) Verbindungszweige beider Nn. sympathici an der vorderen Fläche des Kreuzbeins.

c) Zahlreiche zarte Zweige zum Plexus hypogastricus inferior und den von diesem ausgehenden Plexus.

3) *Ganglion coccygeum*, Steifsknoten, ist unpaar, dreieckig und gewöhnlich das kleinste Ganglion der Nn. sympathici, zuweilen aber ansehnlich und die unteren Ganglia sacralia ersetzend. Es liegt auf der vorderen Fläche des Steifsbeins, nimmt die dünnen Stämme des rechten und linken N. sympathicus auf, und steht durch sehr zarte

Zweige mit den Nn. spinales sacrales V und coccygeus und dem von diesen gebildeten Plexus coccygeus in Verbindung.

Einzelne Ganglien und Plexus des Gangliensystems.

I. Am Kopfe und Halse.

Am Kopfe und Halse finden sich auf jeder Seite die Plexus carotici internus, externus und communis, das Ganglion ciliare, sphenopalatinum (nasopalatinum, supramaxillare), oticum, der Plexus tympanicus und das Ganglion maxillare. Diese Geflechte und Knoten sind von sehr gemischter Zusammensetzung, indem sie auch Fäden von den Hauptästen des N. trigeminus und vom N. oculomuscularis communis, von den Nn. facialis, glossopharyngeus und vagus enthalten. Aufserdem nimmt hier das Gangliensystem wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung des Plexus pharyngeus und der Nn. laryngei.

1) *Plexus caroticus internus*, inneres Kopfschlagadergeflecht, umstrickt die A. carotis interna während ihres Verlaufes durch den Canalis caroticus und den Sinus cavernosus. Es entsteht aus dem N. caroticus internus des Ganglion cervicale superius, welcher gewöhnlich schon im For. caroticum externum in zwei Äste sich theilt, von denen der eine an der äufseren und vorderen Seite, der andere am hinteren und inneren Umfange der A. carotis interna aufzusteigen pflegen. Diese Äste theilen sich in kleinere Zweige, welche in Schlingen zusammenfliefsen und die Arterie genau umgeben: im unteren Theile des Sinus cavernosus sind sie am zahlreichsten und fliefsen zum Theil in einem Knötchen zusammen, aus welchem neue Zweige hervordringen. Jenes Knötchen ist das *Ganglion caroticum* s. cavernosum, der carotische Knoten: er hat eine platte, eckige oder sternförmige Gestalt und liegt gewöhnlich am Anfange der zweiten Biegung der A. carotis interna, im unteren Theile des Sinus cavernosus, unterhalb des N. oculomuscularis externus, am vorderen und äufseren Umfange der Arterie: selten liegt es höher oder tiefer: zuweilen fehlt es gänzlich und findet sich an seiner Statt ein kleines,

ufserst engmaschiges Geflecht (Plexus cavernosus n. carotici: ach Arnold ist dieses das regelmäfsige Verhältnifs). — om Plexus caroticus internus gehen in der Ordnung von nten nach oben folgende Zweige aus:

a) *N. carotico-tympanicus inferior* dringt durch ein och in der hinteren Wand des Canalis caroticus in den orderen unteren Theil der Paukenhöhle und geht zum lexus tympanicus.

b) *N. carotico-tympanicus superior* s. N. petrosus profundus minor, geht etwas weiter oberhalb, in der Höhe des or. caroticum internum, aus dem Plexus caroticus internus ervor; ist länger und dünner als der vorige: dringt in ückwärts gerichtetem Verlaufe durch ein Kanälchen zwischen Canalis caroticus und Pars ossea tubae Eustachii in ie Paukenhöhle und geht in den Plexus tympanicus über.

c) *N. petrosus profundus* s. petrosus profundus major s. amus profundus n. Vidiani, früherhin als Radix n. sympathici a nervo Vidiano bezeichnet, der tiefe Felsennerv, n längerer, öfters aus mehreren getrennten Fäden zusammengesetzter Nerv, welcher von der Gegend des For. caroticum internum aus durch den Fibrocartilago basilaris und en Canalis Vidianus bis in die Fossa pterygopalatina nach orn läuft und in das Ganglion sphenopalatinum sich einnkt.

(Mit dem Namen Nervus Vidianus wurden ehemals der . petrosus profundus und der N. petrosus superficialis major, so weit diese an einander geschmiegt durch den Canalis Vidianus laufen, belegt: und ersterer als Ramus profundus, letzterer als Ramus superficialis des Vidischen Nerven ggesehen. S. 973.)

d) Drei bis fünf zarte, sehr kurze Zweige zum Ganglion Gasseri n. trigemini, welche durch die äufsere Wand es Sinus cavernosus in die innere Fläche dieses Knoten eindringen. Einer derselben, N. tentorii cerebelli, schmiegt ich eng an die innere Fläche des N. ophthalmicus und geht on dem oberen Rande desselben an den N. oculomuscularis perior über, so dafs er eine, nur scheinbare Verbindung eser beiden Nerven vermittelt: alsdann tritt er (ohne mit m N. oculomuscularis superior unter Bildung eines wirkchen Knötchens sich zu vereinigen), rückwärts zwischen

die Blätter des Tentorium cerebelli, theilt sich in mehrere Zweige und ist von Arnold bis zu der Gefäfshaut des Sinus transversus verfolgt.

e) Zwei bis vier Fäden, die sich mit dem N. oculomuscularis externus, an der verdickten aufgelockerten Stelle desselben, vereinigen: (ehemals als Radix nervi sympathici a nervo abducente bezeichnet). Einer oder der andere dieser Fäden verläuft zuweilen nur eine Strecke mit dem N. oculomuscularis externus und geht von demselben zum Ganglion ciliare oder zum Ganglion sphenopalatinum über.

f) Ein Faden zum N. oculomuscularis communis, welcher zuweilen zu fehlen scheint.

g) *Radix media ganglii ciliaris*, ein einfacher oder doppelter Faden, welcher an der inneren Seite des N. ophthalmicus durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle dringt. Entweder gelangt er abgesondert in den hinteren Rand des Ganglion ciliare, oder er legt sich an den N. nasociliaris und an die Radix longa (S. 913. 972.) und vereinigt sich scheinbar mit dieser: oder wenn er doppelt ist, finden beide Anordnungen Statt.

h) Einer oder zwei zarte, aufwärtssteigende, in die Hypophysis cerebri sich einsenkende Fäden.

i) Einer oder zwei Fäden, welche die A. ophthalmica begleiten, von denen einer mit der A. centralis retinae in den Sehnerven eindringt und bis zur Netzhaut gelangt.

k) Mehrere Fäden umstricken die A. carotis interna bei ihrem Eintritte in die Höhle der Dura mater und lassen sich bis zu der A. fossae Sylvii und A. corporis callosi verfolgen.

2) *Plexus caroticus externus* s. *Plexus nervorum mollium*, äufseres Kopfschlagadergeflecht, beginnt an der Wurzel der A. carotis externa, vorzüglich aus den Nn. carotici externi s. molles des Ganglion cervicale superius (S. 962.), welche zum Theil zu einem kleinen länglich-runden Knoten, *Ganglion intercaroticum*, in der gabelförmigen Spaltung der A. carotis communis liegend, sich vereinigen: aufserdem geht aber dieses Geflecht mit Ästen der Nn. glossopharyngeus und vagus, namentlich mit dem Plexus pharyngeus, dem N. laryngeus superior, auch dem N. cardiacus superior, vielfache Verbindungen ein. Alsdann umstrickt

s die A. carotis externa in ihrem ganzen Verlaufe vermit-
lst zahlreicher kleiner Schlingen, welche hin und wieder
rte Knötchen enthalten und verbindet sich, indem es mit
er Arterie durch die Glandula parotis dringt und dieser
weige abgiebt, mit dem Ramus digastricus, stylohyoideus
nd anderen Ästen des N. facialis und mit dem N. auriculo-
mporalis. Es giebt zahlreiche Zweige an die Äste der
. carotis externa, welche an den gröfseren Arterien in
ehrfacher Anzahl vorhanden sind und untergeordnete Ple-
us bilden, auch nicht allein die Gefäfshäute versorgen,
ndern zum Theil sehr deutlich bis zu den Organen ge-
ngen, an welche jene Arterien sich vertheilen. Die an-
hnlichsten dieser Plexus sind:

a) *Plexus thyreoideus superior*, verbindet sich mit dem
. laryngeus superior und N. cardiacus superior.

b) *Plexus pharyngeus adscendens* steht vorzugsweise mit
em eigentlichen Plexus pharyngeus in Verbindung.

c) *Plexus lingualis*, giebt auch der Glandula sublingua-
s Zweige und verbindet sich mit dem Ramus lingualis n.
ossopharyngei.

d) *Plexus maxillaris externus* ist sehr ansehnlich und
streckt sich deutlich bis zu den Lippen und der Nase:
e Fäden, welche die A. submentalis begleiten, gehen vor-
iglich zur Gland. salivalis submaxillaris und verbinden
ch mit dem Ganglion maxillare.

e) *Plexus occipitalis* und *auricularis posterior* sind klein,
ben vorzüglich Äste zur Gland. parotis.

f) *Plexus maxillaris internus*, ansehnlich, giebt deutliche
den an die Aa. alveolares, zuweilen einen Faden an das
anglion sphenopalatinum: der *Plexus meningeus* an der A.
eningea media giebt einen oder zwei Verbindungszweige
das Ganglion oticum und gelangt bis in die Schädelhöhle.

g) *Plexus temporalis superficialis* ist schwächer; seine
den begleiten vorzüglich die zu dem Ohre und den Au-
enliedern gehenden Arterien.

3) *Plexus caroticus communis*, gemeinschaftliches
opfschlagadergeflecht, begleitet die A. carot. commun., besteht
er nur aus wenigen dünnen Fäden, welche unter einander
nd mit dem N. cardiacus superior Schlingen bilden; sie
hen zum Theil aus dem Ganglion intercaroticum und

Ganglion cervicale medium hervor und hangen mit den Plexus caroticus externus, thyreoideus inferior, vertebralis und cardiacus zusammen.

4) *Ganglion ciliare s. ophthalmicum*, Blendungs- oder Augenknoten, hat eine platte, rundlich viereckige Gestalt, ungefähr 1‴ Dm.: liegt im hinteren Theile der Augenhöhle, unmittelbar an der äufseren Seite des N. opticus, unter der A. ophthalmica. An seinem hinteren Umfange nimmt es seine sog. Wurzeln, nämlich die Verbindungsfäden mit dem N. ophthalmicus, N. oculomuscularis communis und dem Plexus caroticus internus auf: an seiner hinteren oberen Ecke die sog. *Radix longa* ganglii ciliaris vom N. nasociliaris: an seiner hinteren unteren Ecke die *Radix brevis* vom unteren Aste des N. oculomuscularis communis: zwischen beiden oder mit der Radix longa vereinigt die *Radix media* vom Plexus caroticus internus. Zuweilen finden sich noch Radices accessoriae, nämlich Verbindungsäste mit dem N. abducens und dem oberen Aste des N. oculomuscularis communis (welche vielleicht auch vom Plexus caroticus internus stammen und jenen Nerven nur anliegen): zuweilen auch ein Verbindungszweig mit dem Ganglion sphenopalatinum, welcher durch die Fissura orbitalis inferior dringt und an die Radix brevis sich anlegt (Tiedemann, Arnold). — Aus dem vorderen und oberen Rande des Ganglion gehen hervor die *Nn. ciliares* s. ciliares breves (S. 412.) und ein mit dem N. lacrymalis sich verbindender Zweig, welcher zur Thränendrüse geht; zuweilen auch ein zarter Faden, der in den N. opticus dringt (und die A. centralis retinae begleitet?).

5) *Ganglion sphenopalatinum* s. Meckelii s. rhinicum s. nasale, Gaumenkeilbeinknoten oder Nasenknoten, hat eine plattgedrückte, dreieckige oder rundlich-eckige Gestalt, mifst in seinem längsten Dm. ungefähr 2½‴; besteht zuweilen aus zwei kleineren zusammenhangenden rundlichen Knoten. Es liegt in der Tiefe der Fossa pterygopalatina, hinter der A. sphenopalatina, am inneren Umfange des N. maxillaris superior, zwischen diesem Nerven und dem Foramen sphenopalatinum, in welches Loch es oft zum Theil hineinragt. Nach aufsen steht es mit dem N. maxillaris superior vermittelst des kurzen, dicken, oft dop-

elten *N. sphenopalatinus* in Verbindung (S. 915.), nach hin-
n mit dem Plexus caroticus internus und dem N. facialis.
iese Verbindung wird vermittelt durch den scheinbar ein-
chen *N. Vidianus* s. pterygoideus, Vidischer oder Flügel-
erv, welcher durch den Canalis Vidianus läuft und aus
wei an einander geschmiegten Nerven besteht: der untere
ieser beiden Nerven ist der aus dem Plexus caroticus in-
rnus stammende *N. petrosus profundus* (S. 969.): der obere
t der *N. petrosus superficialis major:* dieser läuft, nach-
em er aus der hinteren Öffnung des Canalis Vidianus her-
orgekommen ist, rückwärts und auswärts, durch den Fibro-
rtilago basilaris und die äufsere Wand des Sinus caver-
osus, nahe oberhalb des Foramen caroticum internum, an
er äufseren Seite der A. carotis interna und an der inne-
n Seite des Ganglion Gasseri vorbei, alsdann auf der obe-
n Fläche der Pyramide des Schläfebeins von der Dura
ater bedeckt: tritt in den Hiatus canalis Fallopii und
nkt sich in das Ganglion geniculum n. facialis (S. 898.). —
ufserdem steht das Ganglion sphenopalatinum zuweilen in
erbindung mit dem Plexus caroticus internus durch einen
gesonderten oder an den N. oculomuscularis externus sich
hlegenden Faden, auch mit dem Ganglion ciliare und häu-
g mit dem N. opticus: diese Verbindungsfäden dringen
rch die Fissura orbitalis inferior.

Aus dem Ganglion sphenopalatinum gehen zahlreiche
ste für die Schleimhaut der Nase und des Mundes, für
e Schleimhaut und Muskeln des Gaumens und Schlundko-
es hervor: nämlich die Rami pharyngei, die Nn. nasales
osteriores, welche in die Nn. nasales septi, nasopalatinus,
nd nasales posteriores superiores, medius und inferior zer-
llen, und die Nn. palatini, externus, internus und anterior.

a) *Rami pharyngei ganglii sphenopalatini* s. Nn. nasales
periores posteriores Meckelii, zwei bis drei, von denen
ewöhnlich einer stärker als die übrigen ist, gehen rück-
ärts, zuweilen eine kurze Strecke weit in der Scheide des
l. Vidianus eingeschlossen: laufen sodann nach innen vom
analis Vidianus, zwischen der unteren Fläche des Corpus
ss. sphenoidei und dem Proc. sphenoidalis oss. palatini am
beren Umfange der Choana: geben feine Zweige an die
chleimhaut des Sinus sphenoidalis, vertheilen sich aber

vorzüglich an den obersten Theil des Pharynx, oberhalb und unterhalb der Mündung der Tuba Eustachii, auch an die Schleimhaut dieser Röhre und an die Mm. levator und tensor veli palatini.

b) *Nn. nasales septi*, Nasenscheidewandnerven, zwei bis drei kleine Nerven, die durch das For. sphenopalatinum in die Nasenhöhle dringen und am oberen Umfange der Choana bis zur Nasenscheidewand gelangen, an deren hinterem Theile sie sich verbreiten und mit der inneren Reihe der Nn. olfactorii sich verbinden.

c) *N. nasopalatinus* Scarpae, Nasengaumennerv, ist stärker und länger, gelangt auf demselben Wege an die Nasenscheidewand, läuft an derselben in leichter Biegung nach unten, vorn und dann wieder nach unten, bis in den Canalis incisivus, nachdem er am unteren vorderen Theile des Septum Fäden an die Schleimhaut gegeben hat. Im Foramen incisivum vereinigen sich der rechte und linke N. nasopalatinus durch den unpaaren, kleinen, platt dreieckigen oder ovalen Nasengaumenknoten, *Ganglion nasopalatinum*, aus welchem zarte Zweige an die Ductus nasopalatini und die Schleimhaut des harten Gaumens hinter den Schneidezähnen hervorgehen, die mit Endzweigen des N. palatinus anterior sich verbinden. Zuweilen fehlt das Ganglion nasopalatinum und findet sich an seiner Statt ein plattes Geflecht, welches beide Nn. nasopalatini vereinigt: zuweilen ist es paarweise vorhanden, indem jeder N. nasopalatinus zu einem Knötchen anschwillt, die durch einen kurzen Queerast sich verbinden.

d) *Nn. nasales posteriores superiores*, obere hintere Nasennerven, drei bis fünf zarte Äste, gehen durch das For. sphenopalatinum zur inneren Wand des Labyrinthus oss. ethmoidei, zum Meatus narium superior, Concha superior und media und zu den Cellulae ethmoidales posteriores: verbinden sich mit der äufseren Reihe der Nn. olfactorii.

e) *Nn. nasales posteriores, medius et inferior*, mittlerer und unterer hinterer Nasennerv, von welchen der erstere häufig doppelt vorhanden ist, laufen anfänglich im Canalis pterygopalatinus in der Scheide des N. palatinus anterior herab, so dafs sie von diesem zu entspringen scheinen: dringen zwischen der inneren Wand des Oberkieferbeins und

er Pars adscendens des Gaumenbeins an die Seitenwand der Nasenhöhle, und vertheilen sich an die Schleimhaut des inus maxillaris, der Concha media und inferior, des Meaus narium medius und inferior. Der N. nasalis posterior nedius schickt einen, durch ein Kanälchen der inneren Wand des Oberkieferbeins nach aufsen dringenden Zweig um *Ganglion supramaxillare* (S. 916.), wodurch das Ganglion phenopalatinum Antheil an der Bildung des Plexus dentalis nperior nimmt.

f) *Nn. palatini*, Gaumennerven, steigen eng an einander edrängt und anfangs von einer gemeinschaftlichen Scheide mschlossen, durch den Canalis pterygopalatinus herab, in egleitung der A. pterygopalatina, und dringen durch die or. palatina posteriora an den Gaumen. Der *N. palatinus externus* ist der schwächste dieser Gaumennerven und verreitet sich im äufseren Theile des Gaumensegels an die Muskeln und Schleimhaut der Gaumenbögen, an die Mandel und die Schleimhaut des harten Gaumens neben den interen Backenzähnen. Der *N. palatinus internus* geht zum aumensegel, vorzüglich zur Uvula, und vertheilt sich an ie Muskeln und Schleimhaut. Der *N. palatinus anterior* major ist überhaupt der stärkste der aus dem Ganglion phenopalatinum hervortretenden Nerven, scheint vorzügch viele Fasern aus dem N. sphenopalatinus und zuweilen nmittelbar aus dem N. maxillaris superior zu erhalten, nd verbreitet sich mit nach vorn laufenden Ästen an die chleimhaut des harten Gaumens, an dessen vorderem Theile r mit Fädchen aus dem Ganglion nasopalatinum sich verindet.

6) *Ganglion oticum* s. auriculare Arnoldi, der Ohrnoten, ist meistens oval und sehr platt, ungefähr 2‴ lang nd 1½‴ breit: zuweilen von einer weniger compacten, ehr geflechtähnlichen Beschaffenheit: — liegt unmittelbar nter dem For. ovale, genau an die innere Fläche des N. naxillaris inferior geheftet, vor der A. meningea media nd an der äufseren Seite der Tuba Eustachii und des M. ensor veli palatini: zuweilen etwas mehr nach hinten und er A. meningea media näher. Es steht in Verbindung mit em Plexus meningeus medius durch einen oder zwei Fäen, mit dem N. maxillaris inferior durch mehrere kurze

Fäden, welche vorzüglich mit dem N. auriculo-temporalis und dem N. pterygoideus internus, dessen Wurzel meistens von der Masse des Ganglion gänzlich umgeben wird, sich vereinigen: mit der Chorda tympani durch einen gerade herabsteigenden Faden (und nach Bidder zuweilen mit dem Ganglion sphenopalatinum durch einen, an den N. petrosus profundus geschmiegten Faden). Aus dem hinteren Umfange des Ganglion gehen drei nach hinten laufende Nerven hervor:

a) *N. musculi mallei externi*, ein sehr zarter Nerv, der unter der Spina angularis oss. sphenoidei und an der inneren Seite der A. meningea media vorbeilaufend in den Kopf dieses Muskels dringt und öfters zu fehlen scheint.

b) *N. musculi mallei interni*, begiebt sich abgesondert oder mit einem Faden vom N. pterygoideus internus verbunden in den Sulcus muscularis oberhalb der Pars ossea tubae Eustachii und senkt sich in den M. mallei internus s. tensor tympani.

c) *N. petrosus superficialis minor*, kleiner oberflächlicher Felsennerv, mehr nach oben und aufsen als der vorige verlaufend, zuweilen mit ihm gemeinschaftlich entspringend: dringt in die Schädelhöhle zwischen Spina angularis oss. sphenoidei und dem vorderen Winkel der Pyramide, oder durch ein kleines Loch zwischen For. ovale und spinosum: läuft nach hinten, anfänglich vom hinteren Rande des Ganglion Gasseri, dann von der Dura mater bedeckt, über die obere Fläche der Pyramide des Schläfebeins, nach aufsen vom N. petrosus superficialis major; tritt in den Hiatus canalis Fallopii und theilt sich in zwei Äste. Der obere kurze senkt sich in den hinteren Theil des Ganglion geniculum n. facialis (oder ist ein Verbindungsast zwischen dem Nerven und jenem Ganglion des N. facialis), und giebt zuweilen einen, oberhalb der Fenestra ovalis in das Vestibulum dringenden Faden (Verbindung mit dem N. ampullaris superior?): der untere steigt durch ein Kanälchen an der inneren Seite des Sulcus muscularis in die Paukenhöhle herab, an deren Boden er unterhalb des Sulcus muscularis erscheint und zum Plexus tympanicus geht. — Zuweilen erhält der N. petrosus superficialis minor noch einen Verstärkungszweig von dem durch das For. spinosum in die Schä-

lhöhle gelangten Plexus meningeus medius, welcher weir nach aufsen als der genannte Nerv auf der oberen Fläe der Pyramide läuft und in den Hiatus canalis Fallopii ingt.

7) *Plexus tympanicus*, das Paukengeflecht, die sog. cobsonsche Anastomose, ist ein kleiner, von oben nach ten länglicher, auf dem Boden der Paukenhöhle liegender exus. Er wird gebildet durch die Verbindungen von vier erven, nämlich des N. tympanicus s. Jacobsonii vom Ganion petrosum n. glossopharyngei (S. 901.), welcher vom teren Umfange der Paukenhöhle über das Promontorium raufsteigt: des von oben herabsteigenden unteren Astes s N. petrosus superficialis minor, und der von vorn her die Paukenhöhle dringenden Nn. carotico-tympanici infeor und superior vom Plexus caroticus internus. Durch eses Geflecht stehen das Ganglion oticum, der Plexus caticus internus, und das Ganglion petrosum des N. glossoaryngeus in unmittelbarem Zusammenhange: vermittelst s oberen Astes des N. petrosus superficialis minor, und rch den N. carotico-tympanicus superior stehen auch der facialis und das Ganglion sphenopalatinum u. a. m. mit esem Plexus in entfernterer Verbindung. — Aus diesem flecht gehen kurze Zweige an die Schleimhaut der Paunhöhle, vorzüglich nach hinten an die Fenestra rotunda d ovalis und an die Cellulae mastoideae, und ein längerer weig nach vorn an die Schleimhaut der Tuba Eustachii, r bis in den knorpeligen Theil derselben gelangt: zueilen auch ein Verbindungsfaden vom N. caroticotympacus superior zur Chorda tympani.

8) *Ganglion maxillare* s. linguale, der Kiefer- oder nterkieferknoten, ist gewöhnlich platt, dreieckig, $1\frac{1}{2}$‴ ng und 1‴ breit, liegt am Seitenrande der Zungenwurl, dem letzten Backenzahne gegenüber, nahe unter dem amm des N. lingualis, an der äufseren Seite des M. styglossus, oberhalb der Gland. saliv. submaxillaris, von der undschleimhaut bedeckt. In diesem Ganglion vereinigen h drei bis vier Äste des N. lingualis, ein Ast der Chorda mpani, der bis dahin in dem Neurilema des N. lingualis ngeschlossen war (S. 899.) und einer oder zwei Fäden vom exus maxillaris externus. Aus dem Ganglion gehen Fäden

zu den Gland. submaxillaris und sublingualis, welche den Ductus Whartonianus begleiten, und zur Mundschleimhaut: vielleicht gehen mehrere der Verbindungsäste zwischen dem Ganglion und dem N. lingualis von dem ersteren zu dem Nerven. —

Hinsichtlich des Antheils, welchen das Gangliensystem an der Bildung des Plexus pharyngeus und der Nn. laryngei nimmt, vgl. S. 904. 905. 962. 963. 970.

II. Ganglienplexus in der Brusthöhle.

Von den in der Brusthöhle liegenden Geflechten gehört der Plexus cardiacus und der Plexus aorticus thoracicus vorzugsweise dem Gangliensystem an: aufserdem nimmt dieses an der Bildung der Plexus pulmonales wesentlichen Antheil, trägt dagegen nur sehr wenig zur Bildung der Plexus oesophagei bei (S. 907. 966.)

1) *Plexus cardiacus*, das Herzgeflecht, ist ein ansehnliches unpaares Geflecht, welches aus ziemlich dünnen, in weiten Schlingen vereinigten Nerven besteht und ein unbeständiges, sehr weiches und graues Ganglion von unregelmäfsiger Gestalt, *Ganglion cardiacum*, den Herzknoten, enthält, deren sich zuweilen auch mehr als eins vorfinden. Es liegt dieses Geflecht in der Mitte des oberen Theiles der Brusthöhle, vom oberen Umfange des Arcus aortae bis zur Basis des Herzens herab sich erstreckend: sein Mittelpunkt, welcher das Ganglion cardiacum zu enthalten pflegt, liegt zwischen der hinteren Wand des Arcus aortae und dem unteren Ende der Luftröhre, über der Theilungsstelle der A. pulmonalis communis. Folgende Nerven setzen das Geflecht zusammen:

a) *Nn. cardiaci medii* s. magni *dexter et sinister* (S. 963.) gehen in die Mitte des Geflechts und vorzugsweise zum Ganglion cardiacum.

b) *N. cardiacus inferior* s. *parvus sinister* (S. 964.) geht, gewöhnlich mit dem N. cardiacus medius zum sog. N. cardiacus crassus verbunden, in die Mitte des Geflechts: der *N. cardiacus inferior* s. *parvus dexter* dagegen zum unteren Theile des Geflechts.

c) *Rami cardiaci n. recurrentis* (S. 906.) zahlreich, ver-

inden sich mit sämmtlichen Nn. cardiaci, vorzüglich aber
it den inferiores.

d) *Nn. cardiaci superiores* s. *superficiales* (S. 963.) gehen
ur zum oberen Theile des Geflechts.

e) *Rami cardiaci n. vagi* (S. 906.) und

f) *Rami cardiaci n. hypoglossi*, die Endigungen der Rami
rvicales der Nn. hypoglossi (S. 896.) gelangen, mit den
n. cardiaci superiores verbunden, zum oberen Theile des
eflechts.

Aus dem Plexus cardiacus gehen folgende Nerven hervor:

a) Zahlreiche Äste aus dem oberen Theile des Geflechts,
elche den Arcus aortae, die Ursprünge der Aa. anonyma,
rotides communes und subclaviae umstricken und in den
lexus aorticus thoracicus sich fortsetzen.

b) Zahlreiche, die Aa. pulmonales dextra und sinistra
nd ihre Äste begleitende dünne Nerven, welche in die
exus pulmonales sich einsenken.

c) *Plexus coronarii cordis, posterior et anterior*, Kranz-
flechte des Herzens, sind für das Herz selbst bestimmt.
er Plexus coronarius posterior s. sinister ist ansehnlicher,
tsteht aus dem Mittelpunkte des Herzgeflechts, geht vor
r A. pulmonalis sinistra zur Basis des Herzens herab und
rtheilt sich, in Begleitung der Ramificationen der A. co-
naria cordis sinistra, an die platte Fläche und die linke
ite des Herzens, vorzüglich an den linken Ventrikel.
r Plexus coronarius anterior s. dexter ist schwächer, ent-
ht aus dem unteren Theile des Geflechts und vorzüglich
m N. cardiacus inferior dexter; geht zwischen A. pul-
nalis communis und A. aorta adscendens rechterseits
rab, und verbreitet sich mit der A. coronaria cordis dex-
t an der convexen Fläche und rechtem Rande des Her-
ns, vorzüglich an der Vorderwand des Ventriculus dexter.

2) *Plexus aorticus thoracicus*, Brustaortengeflecht, unpaar, besteht aus dünnen Nerven, welche aus den
nglia thoracica n. sympathici und aus dem Plexus cardia-
s stammen, die Aorta desc. thoracica mit weiten Schlin-
n umgeben, mit dem Plexus oesophageus posterior durch
nige Fäden zusammenhangen und durch den Hiatus aor-
us des Zwerchfells zum Plexus coeliacus gelangen.

III. Ganglienplexus in der Bauchhöhle.

In der Bauch- und Beckenhöhle finden sich die ansehnlichsten Geflechte, *Plexus abdominales*, welche dem Gangliensystem allein angehören, in ihrer Zahl und Verlaufe den Arterien der Baucheingeweide entsprechen und von oben nach unten sämmtlich unter einander und mit dem Brust- und Bauchtheile der Nn. sympathici zusammenhangen. Das oberste ansehnlichste und wichtigste dieser Geflechte ist der Plexus coeliacus, welcher in die ihm untergeordneten Plexus phrenici inferiores, coronarius ventriculi superior, hepaticus und lienalis zerfällt, nach unten in den Plexus mesentericus superior übergeht und mit den Plexus renales und suprarenales und spermatici zusammenhängt. Unterhalb der letzteren steigt der Plexus aorticus abdominalis herab und geht in die Plexus mesentericus inferior und hypogastricus superior über: letzterer setzt sich in die Plexus hypogastrici inferiores fort.

1) *Plexus coeliacus* s. solaris s. semilunaris s. Ganglion semilunare s. Cerebrum abdominale, das Bauch- oder Sonnengeflecht, ist der ansehnlichste Plexus des ganzen Gangliensystems, unpaar, von unregelmäfsiger, länglich viereckiger oder doppelt halbmondförmiger Gestalt, ungefähr 3″ breit und 1″ von unten nach oben hoch, in der Mitte öfters niedriger als an den Seiten. Er liegt vor den inneren Schenkeln des Zwerchfells zu beiden Seiten des Hiatus aorticus und auf der vorderen Wand der Aorta, den kurzen Stamm der A. coeliaca genau umgebend und bis zur Wurzel der A. mesenterica superior herab sich erstreckend. Gewöhnlich enthält er ein rechtes und ein linkes, sehr grofses, halbmondförmiges Ganglion, *Ganglion semilunare dextrum et sinistrum*, welche in den Seitentheilen des Plexus, vor den inneren Schenkeln des Zwerchfells, das rechte hinter der V. cava inferior, liegen und mit ihrem oberen äufseren Ende die entweder ungetheilten, oder vielfach gespaltenen Stämme der Nn. splanchnici majores aufnehmen. Diese grofsen Knoten sind von einer grofsen Anzahl kleinerer Ganglien umgeben und hängen mit diesen und unter einander durch sehr zahlreiche kurze Äste zusammen. Aufser den Nn. splanchnici majores nimmt der Plexus coeliacus

ch Äste von den Nn. splanchnici minores, vom Plexus ticus thoracicus, von den Plexus oesophagei und gastrici, besondere vom Plexus gastricus posterior auf.

a) *Plexus phrenici, dexter et sinister*, Zwerchfellgehte, bestehen aus wenigen zarten Fäden mit einzelnen inen Knoten, Ganglia phrenica, verlaufen in Begleitung Aa. phrenicae inferiores zum Zwerchfell und verbinden h mit Ästen der Nn. phrenici.

b) *Plexus coronarius ventriculi superior*, oberes Kranzlecht des Magens, enthält zahlreiche kleine Ganglien, beitet die A. coronaria ventriculi sinistra an der oberen genkrümmung, vertheilt sich an der vorderen und hinen Magenwand, mit den Plexus gastrici, vorzüglich dem sterior sich verbindend; und geht am Pylorus in den xus hepaticus über.

c) *Plexus hepaticus*, Lebergeflecht, sehr ansehnlich, entt viele Ganglia, begleitet die A. hepatica und nimmt ter dem Magen einige Fäden aus dem Plexus oesophaus posterior auf. Hinter dem Pylorus vereinigt er sich t dem Plexus coronarius ventriculi superior, schickt Äste das Duodenum, Caput pancreatis, und einige Zweige, lche die A. gastroepiploica dextra an die grofse Magenimmung begleiten und hieselbst den *Plexus coronarius triculi inferior* bilden. Alsdann in Begleitung der Learterie in die Fossa transversa tretend, scheidet es sich den Plexus hepaticus dexter und sinister, deren Fäden den Arterienzweigen in die Lebersubstanz dringen.

d) *Plexus lienalis* s. *splenicus*, Milzgeflecht, schwächer das Lebergeflecht, enthält wenige, aber ziemlich ansehne Knoten; begleitet die A. lienalis und ihre Äste zum ncreas, zum Magengrunde und zur Milz.

2) *Plexus mesentericus superior*, oberes Gekröslecht, geht vom unteren Rande des Plexus coeliacus aus, unmittelbare Fortsetzung desselben; ist unpaar, ansehnh, enthält aber nur wenige und kleine Ganglien. Es umbt die Wurzel der A. mesenterica superior und begleitet Äste derselben mit langen, dünnen, geschlängelten Zweien, welche im Gekröse des Dünn- und Dickdarmes weite schen bilden: und verbreitet sich an den unteren Theil

des Duodenum, das Caput pancreatis und an das Jejunum Ileum, Coecum, Colon adscendens und transversum.

3) *Plexus renales, dexter et sinister*, Nierengeflechte schwächer als der vorige, beginnen an den Ursprüngen der Aa. renales aus Ästen des Plexus coeliacus und mesentericus superior und enthalten hieselbst einige Ganglien: begleiten sodann die Aa. renales und werden von den, aus den Nn. splanchnici minores stammenden Nn. renales posteriores (S. 966.) und von Ästen aus den obersten Ganglia lumbaria verstärkt: dringen sodann in die Nieren. — Neben geflechte der Plexus renales sind die kleinen Nebennierengeflechte, *Plexus suprarenales*, welche auch Fäden aus den Plexus coeliacus und Plexus phrenici aufnehmen.

4) *Plexus spermatici, dexter et sinister*, Samengeflechte, bestehen aus wenigen, zarten, hin und wieder in kleinen Ganglien verbundenen Nerven, welche mit den Aa. spermaticae internae herabsteigen, Fäden zu den Ureteren geben und beim männlichen Geschlecht in Verbindung mit Fäden vom N. spermaticus externus an den Nebenhoden, vorzüglich aber in das Innere des Hoden dringen; beim weiblichen Geschlecht zu den Ovarien, Tubae uterinae und Fundus uteri gehen.

5) *Plexus aorticus abdominalis*, Bauchaortengeflecht, unpaar, besteht aus ziemlich weiten Schlingen und einigen wenigen Ganglien. Er entsteht aus einigen Ästen der Plexus mesentericus superior und renales, wird aber, indem er längs der Aorta desc. abdominalis herabsteigt, durch mehrere starke Äste aus den Ganglia lumbaria der Nn. sympathici beträchtlich verstärkt; und geht am unteren Ende der Aorta in den Plexus mesentericus inferior und Plexus hypogastricus superior über, welche er mit den höher liegenden Geflechten in Verbindung setzt.

6) *Plexus mesentericus inferior*, unteres Gekrösgeflecht, ist unpaar, schwächer als das obere Gekrösgeflecht, enthält nur sehr wenige Ganglien und begleitet die Aa. colica sinistra und haemorrhoidalis superior mit zahlreichen Fäden zum Colon descendens, der Flexura iliaca coli und zur oberen Hälfte des Mastdarms: letztere werden *Nn. haemorrhoidales superiores* genannt.

7) *Plexus hypogastricus superior* s. medius s.

hypogastricus, das obere Beckengeflecht, unpaar, ansehn-
ı, ungefähr viereckig und platt, besteht aus eckigen und
glich rundlichen Ganglien und kurzen Ästen, welche sehr
e Schlingen bilden: liegt vor dem fünften Lendenwirbel
l Promontorium zwischen den Aa. iliacae communes.
gehen aus ihm kleine Geflechte zarter Fäden hervor,
lche die Vasa iliaca communia und externa begleiten,
h einige Nn. haemorrhoidales superiores, welche den
eren Theil des Plexus mesentericus inf. verstärken: alsdann
r theilt es sich in einen rechten und linken, platten,
Nervenschlingen zusammengesetzten Strang oder Bün-
, welcher an der Seite des Mastdarms, nach innen von
Aa. hypogastricae, in die Beckenhöhle herabsteigen und
die

8) *Plexus hypogastrici inferiores, dexter et ster,* s. laterales, untere Beckengeflechte, übergehen. Jedes ser unregelmäfsig gestalteten Geflechte enthält mehrere ehnliche Ganglien, wird von Ästen der Ganglia sacralia N. sympathicus und des Plexus pudendalis, namentlich den Nn. haemorrhoidales medii verstärkt (S. 958.): es t nahe über dem M. levator ani, an der Seite des Mast-ms, des Scheiden- und Blasengrundes. Im weiblichen chlecht sind die Plexus hypogastrici inferiores, so wie h der superior, stärker als im männlichen. Es gehen dem unteren Beckengeflechte folgende, unter einander ammenhangende kleinere Geflechte und Nerven hervor:

a) Einige Nn. haemorrhoidales medii, die mit denen ı Plexus pudendalis vereinigt zur unteren Hälfte des stdarms gehen und den *Plexus haemorrhoidalis medius* len.

b) *Plexus uterinus posterior* s. lateralis superior, hinte- oberes Gebärmuttergeflecht, zwischen den Blättern des . uteri latum, stammt von dem hinteren oberen Theile Plexus hypogastricus inferior und von Fäden aus dem xus hypogastricus superior, und verbreitet sich in Be-itung der A. uterina am Seitenrande und der hinteren and des Uterus.

c) *Plexus uterinus anterior* s. lateralis inferior, vorderes eres Gebärmuttergeflecht, vertheilt sich am Collum und

der Vorderwand der Gebärmutter. Beide Plexus uteri gehen am Fundus uteri Verbindungen mit den Plexus spermatici ein.

d) *Plexus vesicalis*, Blasengeflecht, vom unteren vorderen Theile des Plexus hypogastricus inferior, verbreitet sich mit *Nn. vesicales superiores* an den oberen Theil der Blase mit *Nn. vesicales inferiores* und *vaginales*, die mit denen vom Plexus pudendalis (S. 958.) zusammenhangen, an den Fundus und Collum vesicae, die Mutterscheide, die Vasa deferentia, Vesiculae seminales und Prostata.

e) *Plexus cavernosus penis*, das Zellkörpergeflecht der Ruthe, ist eine Fortsetzung des vorderen Theiles des Plexus vesicalis, beginnt neben der Prostata als *Plexus prostaticus* welcher einige kleine Ganglia prostatica s. pudenda enthält und Zweige zur Pars membranacea urethrae giebt: dringt dann unter dem Plexus venosus pudendalis und unter dem Lig. arcuatum inferius der Symphysis pubis, das Lig. puboprostaticum medium und zum Theil auch den M. urethralis transversus durchbohrend, an die Wurzel des Penis. Man unterscheidet die aus diesem Geflecht hervorgehenden *Nn. cavernosi minores*, welche sogleich in das Crus corporis cavernosi penis eindringen und in der Substanz des Zellkörpers sich verbreiten: und den *N. cavernosus major*, welcher auf dem Rücken des Penis zwischen A. und V. dorsalis penis bis ungefähr zur Mitte des Penis sich erstreckt, bald aber in geflechtartig verschlungene Zweige sich auflöset: diese umstricken theils die Dorsalgefäfse des Penis und verbinden sich mit denen der anderen Seite; theils und vorzüglich dringen sie aber durch die Tun. albuginea in die Substanz des Zellkörpers ein. Die Nn. cavernosi minores und besonders der N. cavernosus major gehen vielfache Verbindungen mit dem N. dorsalis penis ein, sowohl mit den Rami cavernosi desselben, als mit den zur Eichel dringenden Zweigen.

Wie der Plexus cavernosus im weiblichen Geschlecht sich verhält, ist noch nicht bekannt: höchst wahrscheinlich erhalten aber auch die Clitoris und Labia minora Nerven vom Gangliensysteme.

Literatur der Nervenlehre.

Schriften über das ganze Nervensystem.

1618. *R. Vieussens* Neurographia universalis. Lugd. 684. Fol. c. tabb. — Fcft. 1690. 8.

1619. *A. Monro I.* The anatomy of the human bones nd nerves. Edinb. 1726. 8. (Nr. 318.)

1629. *R. Martin* Institutiones nevrologicae. Holm. et ipps. 1781. 8.

1621. *J. G. Haase* Cerebri nervorumque c. h. anatome ppetita, c. duob. tabb. Lips. 1781. 8.

1622. *A. Monro II.* Observ. on the structure and functons of the nervous system. Edinb. 1783. Fol. (Nr. 322.)

1623. *V. Malacarne* Neuro - encefalotomia. Pavia. 791. 8.

1624. *G. Coopmans* Neurologia, etc. ed. alt. c. tabb. anequer. 1795. 8.

1625. *Ch. Bell* A series of engravings explaining the urse of the nerves. Lond. 1816. 8. Deutsch von Robbi. eipz. 1820. 8. (Allg. Encycl. No. 60. Bd. VII). — An position of the natural system of the nerves of the h. dy. Lond. 1824. 8. — Philosoph. Transact. 1826. — ectures on the nervous system, in London med. Gazette, 828. — K. Bell physiol. u. path. Unters. des Nervensyems, üb. v. *M. H. Romberg*. Berlin 1832. 8.

1626. *F. Magendie* et *A. Desmoulins* Anatomie du syème nerveux des animaux à vertèbres. à Paris 1825. Voll. 8.

1627. *C. M. J. Langenbeck* Icones anatomicae (Nr. 101). eurologiae Fasc. I — III. Fol. 1826 — 30. — Nervenlehre, it Hinweisung auf die Icones anat. Gött. 1831. 8.

1628. *J. Swan* A demonstration of the Nerves of the

Human Body, in IV Parts. Lond. 1830—1834. Fol. — Lond. 1834. 4.

Sömmering (Nr. 39.) Bd. V. Abth. I. — Meckel (Nr. 56.) Bd. III. — Hildebrandt her. v. Weber (Nr. 38.) Bd. III — H. Cloquet (Nr. 59) 6me edit. à Paris. 1836. — Münz (Nr. 58.) 4r Th. m. Abb. 1835.

1629. Scriptores neurologici minores selecti s. opp. minora ad anat. physiol. et pathol. nervorum spectantia, ed. *C. F. Ludwig.* Voll. IV. c. tabb. Lips. 1791—95. 4.

Centralorgan.

1630. *M. Malpighi* de cerebro, in Opp. (Nr. 122.)

1631. *Th. Willis* Cerebri anatome, cui accessit nervorum descriptio et usus, c. tabb. Lond. 1664. 4. u. in Manget Bibl. Tom. II.

1632. *H. Ridley* The anatomy of the brain etc. Lond. 1695. 8. — Anatomia cerebri, vert. M. E. Ettmüller, in Manget Bibl. T. II.

1633. *P. Tarin* Adversaria anat. Paris. 1750. 4.

1634. *J. C. A. Mayer* Anat. phys. Abhandlung vom Gehirn, Rückenmark u. Ursprung der Nerven. m. K. Berl. u. Leipz. 1779. 4.

1635. *V. Malacarne* Encefalotomia nuova universale. Torin. 1780. 8.

1636. *F. Vicq. d'Azyr* Traité d'anatomie et de physiologie, 1e partie, cerveau de l'homme, 5 cahiers av. planch. à Paris. 1786—90. Fol. — Recherches sur la structure du cerveau etc., in Mém. de l'ac. de Paris, 1781—83.

1637. *S. Th. Sömmering* Vom Hirn und Rückenmark. Mainz. 1788. 8. — Über das Organ der Seele, m. K. Königsb. 1796. 4.

1638. *F. B. Osiander* Cerebri humani circa basin incisi imago cum obs. de cerebro et medulla spinali, in Comment. soc. reg. Gött. Vol. XVI. 1804—7.

1639. *F. J. Gall* et *G. Spurzheim* Anatomie et physiol. du système nerveux en général et du cerveau en particulier. à Par. 1810—20. 4 Vol. 4. — Recherches sur le syst. nerveux. à Par. 1809. 4. — G. Cuvier Rapport. 1808. 4. —

nters. üb. d. Anat. d. Nervensyst. 2 Thle. Par. u. Strasb. 10 — 12. — J. Gordon Obs. on the structure of the brain. linb. 1817.

1640. *L. Rolando* Saggio sulla vera struttura del cer- llo dell' uomo e degli animali, e sopra le funzioni del st. nervoso. Sassari. 1809. 8.

1641. *C. G. Carus* Versuch einer Darstellung des Ner- nsystems u. insb. des Gehirns. m. K. Leipzig. 1814. 4.

1642. *C. F. Burdach* Vom Bau und Leben des Gehirns. Bde. m. K. Leipz. 1819 — 26. 4.

1643. *F. Tiedemann* Anatomie u. Bildungsgeschichte des hirns im Foetus. m. K. Nürnberg. 1816. 4.

1644. *F. Lallemand* Recherches anat. path. sur l'encé- ale et ses dépendances. 2 Voll. à Par. 1820 — 23. 8.

1645. *A. C. Bock* Darstellung des Gehirns, des Rük nmarks u. d. Sinneswerkzeuge. m. K. Leipzig. 1824. (Allg. Encycl. Nr. 60. Bd. VIII. Abth. I.)

1646. *P. J. Manec* Anatomie analytique: Tableau re- és. l'axe cerebro-spinal avec l'origine et les premières isions des nerfs. à Par. Fol.

1647. *H. Mayo* A series of engravings intended to ustrate the structure of the brain and spinal chord. Lond. 27. 4.

Rückenmark.

1648. *G. Blasius* Anatome medullae spinalis et nervo- m inde provenientium c. fig. Amstel. 1666. 12.

1649. *J. J. Huber* Comment. de medulla spinali, spe- tim de nervis ab ea provenientibus, c. icon. Göttingae. 41. 4.

1650. *R. B. Sabatier* Mém. sur quelques particularités la structure de la moëlle de l'épine, in Mém. de Par. 83.

1651. *G. C. Frotscher* Descriptio medullae spinalis isque nervorum, c. ic. Erl. 1788. Fol. — Ludwig Script. r. 1629.) Vol. IV.

1652. *G. G. Keuffel* Diss. de medulla spinali. Hal. 10. 8. — Reil's Archiv. Bd. X.

1653. *L. Rolando* Recherches anat. sur la moëlle allon-

gée, in Magendie Journal (No. 172.) Vol. IV. — Ricerche anat. sulla struttura della midolla spinale. Tor. 1824. 8.

1654. *C. F. Bellingeri* de medulla spinali nervisque ex ea prodeuntibus annot. anat. phys. Aug. Taurin. 1823. 4. c. tabb.

1655. *A. Desmoulins* Mém. sur le rapport qui unit le développement du nerf pneumogastrique à celui des parois du 4me ventricule, et sur la composition de la moëlle épinière. à Paris. 1823. 8.

1656. *C. P. Ollivier* Traité de la moëlle épinière et de ses maladies. 2de ed. à Par. 1827. 2 Voll. avec planch. 8. — Deutsch von J. Radius. Leipz. 1824. 8.

1657. *O. G. L. Girgensohn* Das Rückenmarkssystem. Riga. 1828. 8. m. Abb.

Encephalon.

1658. *C. Varolius* de nervis opticis nonnullisque aliis in hum. capite observatis. Fcft. 1591. 8.

1659. *G. Welsch* Anatome cerebri humani. Lips. 1739. 4.

1660. *N. Stenonis* sur l'anatomie du cerveau. Par. 1669. 12. — De cerebri anatome, in Manget Bibl. Vol. II.

1661. *F. de la Boe Sylvius* Diss. med. de spirituum animalium in cerebro cerebelloque confectione et in nervos distributione, in Opp. med. Amstelod. 1680. 4.

1662. *J. D. Santorini* de cerebro, in Obs. anat. c. III. — Tabb. posth. (Nr. 134.) tab. II. III.

1663. *J. G. Günz* Observationes anat. de cerebro, Progr. II. Lips. 1750. 4.

1664. *R. B. Sabatier* Mém. sur quelques particularités de la structure du cerveau, in Mém. de math. et de phys. Par. 1773. Vol. VII.

1665. *S. Th. Sömmering* De basi encephali et originibus nervorum cranio egredientium libri V. c. tabb. Gött. 1778. 4. u. in Ludwig Script. (Nr. 1629.) Vol. II. — Tabula baseos encephali. Fcft. ad M. 1799. Fol. — Annot. ac. de cerebri administrationibus anatomicis et de vasorum ejus habitu, in Denkschr. d. Akad. d. W. zu München. 1808.

1666. *A. Monro II.* Three treatises on the brain, the eye and the ear. Edinb. 1797. 8.

1667. *A. Rossi* Sur la structure du cerveau, in Mém. ee l'ac. de Turin. Vol. IX. 1805—8.

1668. *C. F. Burdach* Beiträge zur näheren Kenntnifs es Gehirns. 2 Thle. Leipz. 1806. 8.

1669. *J.* u. *K. Wenzel* Prodromus eines Werkes über as Hirn des Menschen u. d. Säugeth. Tüb. 1806. 4. — e penitiori structura cerebri hominis et brutorum. c. tabb. üb. 1812. Fol.

1670. *F. Chaussier* Exposition sommaire de la structure : des diff. parties de l'encéphale ou cerveau. à Paris. 807. 8.

1671. *Ch. Bell* The anatomy of the brain, explained a series of engravings. Lond. 1809. 4.

1672. *F. Rosenthal* Beitrag zur Encephalotomie, m. Abb. Weimar. 1815. 8. — Über d. Gehirn u. Nervensystem, n Frorieps Notiz. Nr. 530 u. 531. 1829.

1673. *F. Lauth* Sur la sfructure du cerveau et de ses nnexes, im Journal compl. Vol. III. IV. 1819.

1674. *G. R. Treviranus* Unters. über den Bau und die unctionen des Gehirns u. s. w. Bremen. 1820. (Nr. 165. dd. III.)

1675. *E. R. A. Serres* Anatomie comparée du cerveau, vec un Atlas. à Par. 1824—26.

1676. *Laurencet* Anatomie du cerveau dans les quatre lasses d'animaux à vertèbres, av. planch. à Paris. 1825. 8.

1677. *L. Rolando* Della struttura degli emisferi cere- rali, c. tav. Torin. 1830. 4.

1678. *G. H. Bergmann* Unters. über die innere Orga- isation des Gehirns, m. Abb. Hannover. 1831. 8.

1679. *E. d'Alton* S. Th. a Sömmering quatuor hominis dulti encephalum describentes tabulas commentario illustrat. .. tabb. Berol. 1830. 4. — Encyclop. Wörterb. d. med. Wiss. Berlin. 1834. Bd. XI. Art. Encephalon.

Mittel- und kleines Gehirn.

1680. *J. D. Santorini* Tabb. posth. III.

1681. *G. Prochaska* De structura nervorum, c. tabb. Vind. 1779. in Opp. min. (Nr. 151). Vol. I.

1682. *V. Malacarne* Nuova esposizione della vera strut-

tura del cerveletto umano. Torino. 1776. 8. — Questioni anatomiche etc., in Mem. della soc. Ital. Vol. VIII. P. I.

1683. *J. C. Reil* u. *J. F. Meckel* Unters. üb. d. Bau d. kleinen Gehirns im Menschen u. Thieren. Halle. 1807—10. — Reil's Archiv (Nr. 168). Bd. VIII. IX. XI. m. Abb.

1684. *E. R. A. Serres* Recherches phys. et path. sur le cervelet de l'homme et des animaux. av. fig. à Paris. 1823. 8.

1685. *L. Rolando* Recherches sur la moëlle allongée (Nr. 1653.)

1686. *F. Rosenthal* Beitrag (Nr. 1672.)

1687. *Ch. Bell* in Philosoph. Transact. for the Years 1834. 1835, P. II.

Einzelne Theile des grofsen Gehirns.

1688. *J. C. Brunner* resp. *Vorster* Diss. de glandula pituitaria. Heidelb. 1688. 4. — Fcft. 1715. 8.

1689. *J. B. Morgagni* Advers. an. VI.

1690. *A. Littre* Obs. sur la glande pituitaire — sur l'eau qui est dans les ventricules du cerveau — in Mém. de l'ac. de Paris. 1707. 1711.

1691. *H. F. Teichmeyer* Progr. de magna cerebri valvula — de septo pellucido — de lympha cerebri. Jen. 1728—29. 4.

1692. *C. A. v. Bergen* Exercit. splanch. anat., qua ventriculorum cerebralium later. novam sistit tabulam. Fcft. a. V. 1734. 4. u. in Haller Disp. Vol. II.

1693. *A. v. Haller* resp. *J. G. Zinn* Diss. sist. experimenta circa corpus callosum, cerebellum, duram meningem etc. Gött. 1749. 4. Haller Disp. Vol. VII. Ludwig Script. Vol. IV.

1694. *J. F. Meckel* sen. Obs. anat. de glandula pineali, septo lucido et origine paris septimi, in Mém. de l'ac. de Berlin. 1765. u. in Ludwig Script. Vol. IV.

1695. *J. Sidren* resp. *A. Murray* Obs. an. circa infundibulum etc. Upsal. 1772. 4. u. in Ludwig Script. Vol. II.

1696. *V. Malacarne* Questioni anatomiche, in Mem. della soc. Italiana. Vol. VIII. P. I. (ventricoli novelli).

1697. *J. Wenzel* Beob. üb. d. Hirnanhang fallsüchtiger Personen, her v. C. Wenzel. m. K. Mainz. 1810. 8.

1698. *S. Th. Sömmering* resp. Lisignolo, Diss. de pillis etc. — s. de acervulo cerebri. Mogunt. 1785. 8. in Ludwig Script. Vol. III.

1699. *J. G. Haase* De ventriculis cerebri tricornibus. ps. 1789. 4.

1700. *J. F. Isenflaum* de acervulo cerebri, in Nov. act. . N. C. Vol. VIII.

1701. *G. J. Wolff* Diss. sistens quaestiones varii argu- enti. Harderov. 1791. 4.

1702. *C. A. Rudolphi* über die Gehirnhöhlen, in dess. bh. (Nr. 161.)

1703. *J. C. Reil* in dess. Archiv Bd. IX. XI.

1704. *C. H. Pfaff* über den Hirnsand, in Meckels ntsch. Arch. Bd. III.

1705. *S. A. W. Stein* Diss. de thalamo optico et ori- ne n. optici in hom. et anim. vert. Havn. 1834. 4.

Hirnhäute.

1706. *J. G. C. Baumer* Diss. de meningibus. Giessen. 775. 4.

1707. *X. Bichat* Traité des membranes. à Paris. 1802. 8.

1708. *C. A. v. Bergen* Pr. de structura piae matris. ft. a. V. 1736. 4. Haller Disp. Vol. II.

1709. *B. S. Albin* in Annot. ac. Lib. I.

1710. *S. Th. Sömmering* Annot. ac. (Nr. 1665.)

1711. *H. Guyot* Essai sur les vaisseaux sanguins du rveau, in Magendie Journal de phys. 1829.

1712. *A. O. Goelicke* Diss. II. de membrana arachnoidea. ft. a. V. 1736—37. 4.

1713. *J. C. v. d. Broecke* Com. de membrana arachnoi- a, c. fig., in Annales ac. Gandaviensis. 1823. 4.

1714. *F. Magendie* in dess. Journal de physiol. 1825. liquide cérébro-spinal.)

1715. *Martin St. Ange* Recherches anat. et phys. du erveau et de la moëlle épin. et sur le liquide cérébro- inal, in Journal hebdom. de Méd. Janv. 1830.

1716. *J. H. Slevogt* resp. *Xylander* Diss. de dura ma- e. Jen. 1690. 4. in Haller Disp. Vol. II.

1717. *A. Pacchioni* Diss. phys. anat. de dura meninge umana — auctae et illustratae. Rom. 1721. 8.

1718. *J. Fantoni* Diss. de structura et motu durae matris etc., in Opusc. med. et phys. Genev. 1738. 4.

1719. *J. l'Admiral* Jcones II. durae matris. Amstel. 1738. 4.

Hirn-Rückenmarksnerven.

Ch. Bell Engravings (Nr. 1625.) Langenbeck (Nr. 1627.) J. Swan (Nr. 1628.).

Nerven des Kopfes.

1720. *A. Matthieu* Tentamen phys. anat. de nervis in genere, acc. primi, sec., tert. et quarti nervorum paris descriptione. Lgd. B. 1758. 4.

1721. *N. U. Stieck* Diss. de quinque prioribus encephali nervis. Gött. 1791. 8.

1722. *A. Murray* sciagraphica nervorum capitis descriptio: paris I — V, resp. Ackermann. Upsal. 1793. 4. — paris VI — XI, resp. J. Noraeus. Upsal. 1798. 4.

1723. *F. Arnold* Icones nervorum capitis. Heidelb. 1834. Fol.

Tractus u. N. olfactorius.

1724. *J. H. Slevogt* resp. *J. O. Horst* Diss. qua processus cerebri mammillares ex nervorum olfact. numero exemtos disquisitioni submittit. Jen. 1715. 4. Haller Disp. Vol. II.

1725. *J. E. Neubauer* de processuum cerebri mammil. cum naribus connexione, in Opp. (Nr. 154.)

1726. *A. Scarpa* De organo olfactus etc. in Annot. anat. (Nr. 152.) Lib. II. Disquisit. de aud. et olfactu. (Nr. 757.)

1727. *J. D. Metzger* Primi paris nervorum historia. Arg. 1766. 4. in Opusc. (Nr. 159). Ludwig Script. Vol. I.

1728. *J. G. Haase* Pr. de nervis narium internis. Lips. 1791. 4. — Ludwig Scriptor. Vol. IV.

1729. *S. Th. Sömmering* Abb. der Organe des Geruchs. (Nr. 994.)

1730. *F. Magendie* Le nerv olfactiv est il l'organe de l'odorat? in dess. Journal de phys. 1825.

1731. *D. F. Eschricht* De functionibus primi et quinti ris nervorum in olfactorio organo propriis, in Magendie arn. de Phys. 1826.

Chiasma opticum, N. opticus.

1732. *J. Juncker* resp. *Moeller* (Nr. 891.)

1733. *S. Th. Sömmering* resp. *F. N. Noethig* Diss. de cussatione nerv. opticorum. Mogunt. 1786. Ludwig ript. Vol. I. — Hessische Beiträge Hft. II. III. — Blu- enbach med. Bibl. Bd. II.

1734. *J. F. Ackermann* de nerv. opticorum inter se xu, in Blumenbach med. Bibl. Bd. III.

1735. *P. Michaelis* Über die Durchkreuzung der Seh- rven, mit Anm. v. Sömmering. Halle. 1790. 8.

1736. *W. H. Wollaston* On semidecussation of the op- nerves, in Phil. Transact. 1824. Part. I.

1737. *J. Müller* in Nr. 977.

Vgl. die Schriften üb. die Retina S. 598.

N. acusticus.

1738. *A. Monro II.* Three treatises (Nr. 1666.)

1739. *A. Scarpa* Disq. de auditu et olfactu (Nr. 757.)

1749. *S. Th. Sömmering* Abb. d. Gehörorgans (Nr. 759.)

1741. *Delmas* Recherches sur les nerfs de l'oreille. Paris. 1834. 8.

1742. *G. Breschet* Recherches anat. et phys. sur l'or- ne de l'ouie et sur l'audition. 2me éd. (Nr. 764.) à Par. 36. 4.

N. hypoglossus.

1743. *J. G. T. Boehmer* Diss. de nono pare nerv. ce- bri, c. tab. Gött. 1777. 4. u. in Ludwig Script. Vol. I.

1744. *A. Scarpa* in Tabb. neurol. (Nr. 1752.)

1745. *A. F. J. C. Mayer* üb. Gehirn, Rückenmark u. erven, in Nov. act. ac. Leop. Car. N. C. Vol. XVI. P. I. 334. m. Abb.

1746. *C. E. Bach* Annot. anat. de nervis hypoglosso t laryngeis. Turic. 1835. 4. c. tabb.

N. facialis, glossophar., vagus, accessorius.

1747. *J. B. Morgagni* in Epist. XVI. (Nr. 129.)

1748. *J. J. Huber* Epist. ad *Wigand* de nervo intercostali, de nervis octavi et noni paris, deque accessorio nonnulla tradens. Gött. 1744. 4.

1749. *J. F. Meckel* sen. Abh. von einer ungewöhnl Erweiterung des Herzens und denen Spannadern (Nerven) des Angesichts. Berlin. 1775. 4. m. Abb.

1750. *J. F. Lobstein* Diss. de nervo spinali ad par vagum accessorio. Argent. 1760. 4. Ludwig Script. Vol. II.

1751. *H. A. Wrisberg* de nervis arterias venasque comitantibus — de nervis pharyngis — in Comment. (Nr. 156.)

1752. *A. Scarpa* Commentarius de nervo spinali ad octavum cerebri accessorio c. tab., in Act. ac. med. chir. Vindob. Tom. I. 1788. — Tabulae neurologicae ad illustrandam historiam anat. cardiacorum nervorum, noni nervorum cerebri, glossopharyngei et pharyngei ex octavo cerebri. Ticin. 1794. Fol.

1753. *C. S. Andersch* Tractatio an. phys. de nervis h. c. aliquibus, quam ed. E. P. Andersch. P. I. II. Regiom. 1797. 8. c. tabb. — (Dess. Fragmentum descriptionis nerv. cardiacorum, ed. S. Th. Sömmering. 1791. in Ludwig Script. Vol. II.)

1754. *M. L. A. Caldani* Comment. acad. Fasc. I., de chordae tympani officio. Gött. et Lips. 1789.

1755. *A. Comparetti* Obs. an. de aure interna comparata. Patav. 1789. 4. (Ganglion u. Ram. auric. n. vagi u. a.)

1756. *Ehrenritter* in Salzburger med. chir. Zeit. 1790. Bd. IV. (Gangl. jug. n. vagi u. n. glossophar.)

1757. *J. G. Haase* Pr. de nervo phrenico duplici parisque octavi per collum decursu. Lips. 1790. 4. — De plexibus oesophageis nervosis, parisque vagi per pectus decursu. Lips. 1791. 4. — Ludwig Script. Vol. III.

1758. *L. Jacobson* in Nov. act. soc. reg. Hafniensis. Vol. I. 1818. — Beiträge zur Otoiatrie, in Meckels deutsch. Arch. Bd. V. (Gangl. petros., N. tympanicus.)

1759. *H. F. Kilian* anat. Unters. üb. d. neunte Hirnnervenpaar od. d. N. glossopharyngeus. m. Abb. Pesth. 1822. 4.

1760. *Ch. Bell* Exposition (Nr. 1625.)

1761. *D. F. Eschricht* (Nr. 1782.)

1762. *L. Hirzel* Diss. sistens nexus n. sympathetici c. rvis cerebralibus. Heidelb. 1824. 4. Deutsch in Tiedemann u. Treviranus Zeitschrift (Nr. 173.) Bd. I.

1763. *F. G. Theile* Diss. de musculis nervisque laryngis. Jen. 1825. 4. c. tabb.

1764. *L. W. Th. Bischoff* Comment. de nervi accessorii Willisii anat. et physiol. c. tabb. Darmst. 1832. 4.

1765. *A. F. J. C. Mayer* (Nr. 1745.)

1766. *J. Müller* in Med. Ver. Zeit. Berlin. 1833. (Ganglion jugul. n. glossophar.) — Archiv 1836, Jahrsbericht. (Nn. laryngei.)

1767. *C. E. Bach* Annot. an. (Nr. 1746.)

1768. *A. Retzius* üb. den Ursprung des 5ten und 7ten Nervenpaares, in Müllers Archiv, 1836.

1769. *B. Panizza* Ricerche sperimentali sopra i nervi. Pavia. 1834. 4.

1770. *Kronfeld* De functionibus nervorum linguae experimenta. Berol. 1836. 4.

1771. *H. C. B. Bendz* De connexu inter nervum vagum et accessorium. Havn. 1836. 4.

N. trigeminus.

1772. *J. F. Meckel* sen. Diss de quinto pare nervorum cerebri, c. tabb. Gött. 1748. 4. Ludwig Script. Vol. I.

1773. *A. B. R. Hirsch* Diss. paris quinti nerv. encephali disquisitio anat. Vienn. 1765. 4. (Gangl. »Gasseri«). Ludwig Script. Vol. I.

1774. *H. A. Wrisberg* Obs. anat. de quinto pare n. encephali, et de nervis, qui ex eodem duram matrem incidi falso dicuntur. — De nervis art. venasque comit. — Comment. (Nr. 156.) Ludwig Script. Vol. I.

1775. *J. B. Palletta* de nervis crotaphitico et buccinatorio. Mediol. 1784. 4. — Ludwig Script. Vol. III.

1776. *A. Scarpa* in Annot. an. Lib. II.

1777. *J. G. Haase* Pr. de nervo maxillari superiore. Traj. 1793. 4.

1778. *A. F. L. Fitzen* Diss. de tertio ramo quinti paris nervorum cerebri. Lips. 1811. 4.

1779. *G. H. Niemeyer* de origine paris quinti ner cer. monographia. Hal. 1812. 8. — Reils Archiv Bd. IX

1780. *A. C. Bock* Beschreibung des fünften Nerven paares und seiner Verbindungen mit anderen Nerven, vor züglich mit dem Gangliensysteme. Meifsen. 1807. Fo m. Abb. — Nachtrag dazu. Meifsen. 1821. Fol. m. Abb.

1781. *Ch. Bell* Exposition — Lectures — (Nr. 1625.)

1782. *D. F. Eschricht* De functionibus septimi et quint paris nervorum in facie propriis, in Magendie Journal d phys. 1826. Vol. VI.

1783. *V. Bochdalek* Unters. und Würdigung der Ner ven des Ober- u. Unterkiefers, m. Abb., in Medic. Jahrb. d Österreich. Staates, Bd. XIX. 1835.

1784. *A. Retzius* Ursprung u. s. w. (Nr. 1768.)

Rückenmarksnerven.

1785. *A. C. Bock* Die Rückenmarksnerven nach ihren ganzen Verlaufe, Vertheilungen u. Verzweigungen. m. Abb in Fol. Leipzig. 1827. 8. — Latine vertit A. F. Haenel Lips. 1828. 8.

1786. *J. Bang* Nervorum cervicalium anatome c. fig Havn. 8. in Ludwig Script. Vol. I.

1787. *G. Th. Asch* Diss. de primo pare nerv. medullae spinalis. Gött. 1750. 4. — Ludwig Script. Vol. I.

1788. *A. F. J. C. Mayer* (Nr. 1745.) (Wurzeln des ersten Halsnerven.)

1789. *F. Vicq d'Azyr* Mém. sur la description des nerfs de la 2de et 3me paire cervicale, in Mém. de l'ac. de Paris. 1777.

1790. *G. F. Peipers* Tertii et quarti nervorum cervicalium descriptio. Hal. 1793. 4. Ludwig Script. Vol. IV.

1791. *A. Murray* resp. O. Noraeus, nervorum cervicalium cum plexu brachiali descriptio. Upsal. 1794. 4.

1792. *E. Krüger* Diss. de nervo phrenico. Lisps. 1758. 4. u. in Sandifort Thesaurus diss. Vol. III.

1793. *C. S. Andersch* Tractatio (Nr. 1753.) P. II. (N. phrenicus.)

1794. *J. G. Haase* Pr. de nervo phrenico duplici etc. (Nr. 1757.)

1795. *H. Kronenberg* Plexuum nervorum structura et
tutes. c. tabb. Berol. 1836. 8. (Plexus brachialis.)

1796. *J. J. Klint* Diss. de nervis brachii. 1784. 4.
dwig Script. Vol. III.

1797. *Camus* Sur la distribution et la terminaison des
rfs dans la main, im Archiv. gén. de Méd. Féor. 1834.

1798. *C. G. Baur* Tract. de nervis anterioris super-
iei trunci humani, thoracis imprimis abdominisque. Tüb.
18. 4.

1799. *A. Murray* resp. G. H. Ahlstedt — resp. L. Ze-
is — Descriptio nervorum dorsalium atque lumbarium —
ralium c. plexu ischiadico. Upsal. 1796—97. 4.

1800. *J. A. Schmidt* Com. de nervis lumbalibus eorum-
e plexu. c. tabb. Vind. 1794. 4.

1801. *J. L. Fischer* Descr. an. nervorum lumbalium,
ralium et extremitatum inferiorum. c. tabb. Lips. Fol.

1802. *M. E. Styx* Descr. an. nervi cruralis et obtura-
rii icone illustr. Jen. 1782. 4.

1803. *J. C. Rosenmüller* Pr. nervi obturatorii mono-
aphia. Lips. 1814. 4.

1804. *A. Thomson* on the obturator nerve, in Lond.
ed. a. surg. Journ. f. Nov. 1833.

1805. *J. H. Joerdens* Descr. n. ischiadici icon. illustr.
l. 1788. Fol.

1806. *F. Schlemm* Obs. neurologicae. Berol. 1834. 4.
nm. sacralium et coccygeorum numero et gangliis.)

Gangliensystem.

1807. *J. M. Lancisi* Diss. de structura et usu ganglio-
m — Morgagni Advers. V.

1808. *C. A. v. Bergen* Diss. de nervo intercostali.
ft. a. V. 1731. 4. u. in Haller Disp. Vol. II.

1809. *A. Scarpa* De nervorum gangliis et plexubus, in
not. an. Lib. II. — De gangliis nervorum deque origine
essentia n. intercostalis, ad E. H. Weber. Mil. 1831. 8.

1810. *J. C. Reil* üb. die Eigenschaften des Ganglien-
stems u. s. Verhältnifs zum Cerebralsystem, in dess. Arch.
l. VII.

1811. *C. A. Rudolphi* Einige Bemerkungen üb. d. sym-

pathischen Nerven, in Abh. d. K. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 1814—15.

1812. *C. G. Wutzer* De c. h. gangliorum fabrica atque usu monograph. c. tabb. Berol. 1817. 4. — Üb. d. Zusammenhang des sympath. Nerven mit den Spinalnerven, in Müllers Archiv. 1834.

1813. *E. H. Weber* Anatomia comparata n. sympathici c. tabb. Lips. 1807. 8.

1814. *J. F. Lobstein* Com. de n. sympathetici hum. fabrica, usu et morbis. c. tabb. Paris. 1834. 4.

1815. *J. L. Brachet* Mém. sur les fonctions du système nerveux ganglionaire. à Par. 1823. 8. — 2de ed. 1836.

1816. *P. J. Manec* Anatomie analytique: Nerf grand sympathique. à Par. 1828. Fol.

1817. *J. C. M. Langenbeck* Tabb. (Nr. 1627.)

1818. *A. Retzius* Üb. d. Zusammenhang der Pars thor. n. sympathici mit d. Wurzeln der Spinalnerven, in Meckels Arch. f. A. u. Ph. 1832.

1819. *A. F. J. C. Mayer* (desgl.) in Nov. act. ac. L. C. N. C. Vol. XVI. (Nr. 1745.)

1820. *B. Panizza* (desgl.) in Richerche (Nr. 1769.)

1821. *J. Hyrtl* Neue Beob. a. d. Gebiete der menschl. u. vergl. Anat., in Med. Jahrb. des Öster. Staates, Bd. XIX. Hft. 3. 1835. (wandelbare Knoten).

Kopftheil des Gangliensystems.

1822. *F. P. du Petit* Mém. dans lequel est démontré, que les nerfs intercostaux fournissent des rameaux, qui portent des esprits dans les yeux, in Mém. de l'ac. de Paris. 1727.

1823. *A. v. Haller* resp. *H. W. L. Taube* Diss. de vera nervi intercostalis origine. Gött. 1743. 4, u. in Opp. min. T. I. Disp. Vol. II.

1824. *J. D. Santorini* Tab. posth. II. (Gangl. oticum.)

1825. *C. C. Schmiedel* Epist. an., qua de contraversa n. intercostalis origine quaedam disseruntur. c. tab. Erl. 1747. 4.

1826. *J. F. Meckel* sen. de quinto pare (Nr. 1772.) — De ganglio secundi rami quinti paris nerv. cerebri nuper detecto. Berol. 1749. 4. Ludwig Script. Vol. IV.

1827. *J. G. Zinn* Descr. an. oculi h. (Nr. 812.) (Gangl. ciliare.)

1828. *A. Scarpa* Annot. an. Lib. II., de organo olfac- etc. (Nr. 152.) (N. nasopalatinus u. a.)
1829. *D. Jwanoff* Diss. de origine nerv. intercostalium. gent. 1780. 4. Ludwig Script. Vol. III.
1830. *A. Comparetti* de aure interna (Nr. 1755.) (Gangl. cum, Plex. tympanicus.)
1831. *H. A. Wrisberg* Com. de nervis art. venasque mit. (Nr. 1751.)
1832. *M. Girardi* De nervo intercostali. Flor. 1791. dwig Script. Vol. III.
1833. *J. G. Haase* Pr. de nerv. narium internis. Lips. 01. 4. Ludwig Script. Vol. IV.
1834. *S. Th. Sömmering* Abb. d. menschl. Auges (Nr. .) (Gangl. ciliare.)
1835. *J. Munniks* Obs. variae, c. tabb. Groning. 1805. 4.
1836. *C. A. Bock* Beschr. des fünften Hirnnervenpaa- (Nr. 1780.)
1837. *H. Cloquet* Diss. sur les odeurs, sur le sens et les anes de l'olfaction. à Par. 1815. 4. (Gangl. nasopalat.)
1838. *L. Jacobson* (Nr. 1758.) (Plexus tympanicus.)
1839. *L. Hirzel* Diss. sist. nexus n. sympath. c. nervis ebralibus (Nr. 1762). Tiedemann u. Treviranus Zeitschr. I.
1840. *F. Tiedemann* Über d. Antheil des sympath. Ner- an d. Verrichtungen der Sinne, in Tiedemann u. Tre- anus Zeitschr. Bd. I. 1825.
1841. *F. Arnold* Diss. sist. obs. nonnull. neurol. de te cephalica n. sympathici in hom. Heidelb. 1726. 4. in Tiedemann u. Treviranus Zeitschr. Bd. II. III. — h. über d. Ohrknoten, m. Abb. Heidelb. 1828. 4. — Der pftheil des vegetativen Nervensystems, m. Abb. Heidelb. 0. 4. — Icones (Nr. 1723.)
1842. *R. Wagner* Über einige neuere Entdeckungen ngl. oticum), in Heusingers Zeitschr. Bd. III. Hft. 3.
1843. *G. Breschet* Note sur le véritable origine du f propre du muscle tenseur de la membrane du tympan, Répertoire (Nr. 174.) Vol. VI. u. Vol. II. Heusingers tschr. Bd. III. Hft. 6. (Nervenplexus der Paukenhöhle.) Recherches sur l'organe de l'ouie (Nr. 1742.)
1844. *J. B. Servais* Diss. de parte nervi sympathici halica in homine. Leod. 1830. 4.
1845. *F. Schlemm* in Frorieps Notizen Nr. 660. 1831. ngl. oticum.) — Observ. neurologicae, c. tabb. Berol. 4. 4. (Gangl. ciliare.)
1846. *C. Krause* Über den Ohrknoten. — Neurol. Be- cht. — Frorieps Notizen, 1832. Nr. 703. 760.
1847. *J. Müller* Über das Ganglion oticum, in Meckels h. f. A. u. Phys. 1832.

1848. *J. G. Varrentrapp* Obs. an. de parte cephalica n. sympathici, c. tab. Fcft. 1832. 4.

1849. *E. Hagenbach* Disq. an. circa musculos auris int. adj. animad. de ganglio auriculari, c. tabb. Basil. 1833. 4.

1850. *H. C. B. Bendz* Diss. de anastomosi Jacobsonii et Ganglio Arnoldi, c. tabb. Havn. 1833. 4.

1851. *A. F. J. C. Mayer* in Frorieps Notizen, 1833. Nr. 771. üb. d. Gangl. intercaroticum. — das. 1834. Nr. 853. üb. d. Gangl. oticum.

1852. *G. Valentin* Über das Ganglion intercaroticum, in Heckers Annalen f. wiss. Med. 1833. Aug.

1853. *Delmas* Recherches sur les nerfs de l'oreille. à Par. 1834. 8.

1854. *F. H. Bidder* Neurologische Beobachtungen, m. Abb. Dorpat. 1836. 4.

Hals- u. Brusttheil des Gangliensystems.

1855. *A. F. Walther* Pr. II. quo paris intercostalis et vagi c. h. nervorum anatomen exhibet. Lips. 1733 — 35. 4. Haller Disp. Vol. IV.

1856. *J. J. Huber* de nervo intercostali etc. (Nr. 1748.)

1857. *J. C. Neubauer* Desc. an. nervorum cardiacorum, c. icon. Fcft. et Lips. 1772. 4. u. in Opp. (Nr. 154.)

1858. *H. A. Wrisberg* de nervis art. venasque comit. (Nr. 1751.)

1859. *C. S. Andersch* Tractatio (Nr. 1753.)

1860. *A. Scarpa* Tabb. neurologicae (Nr. 1752.)

1861. *J. Munniks* Obs. an. (Nr. 1835.)

Bauchtheil des Gangliensystems.

1862. *C. G. Ludwig* Pr. de plexibus nervorum abdominalium. Lips. 1772. 4. — Ludwig Script. Vol. III.

1863. *H. A. Wrisberg* Obs. de nervis viscerum abdominalium. P. I. II. Sect. 1. in Comment. (Nr. 156.) u. in Com. soc. reg. Gött. Vol. II. 1779. XV. 1800 — 1803. — P. II. Sect. 2. in Com. soc. r. Götting. Vol. XVI. 1804—1807.

1864. *J. G. Walter* Tabulae nervorum thoracis atque abdominis. Berol. 1783. Fol.

1865. *F. Tiedemann* Tabulae nervorum uteri. Heidelb. 1822. Fol.

1866. *S. Goetz* Neurologiae partium genitalium masculinarum prodromus. Erl. 1823. 4.

1867. *J. Müller* Über die organischen Nerven der erectilen männl. Geschlechtsorgane des Menschen u. d. Säugeth. m. Abb. Berlin. 1836. 4. u. in Physik. Abh. d. K. Akad. d. Wiss. z. Berlin a. d. J. 1835. Berlin. 1837. — Med. Vereins-Zeit. Berlin. 1835. Nr. 18.

Tabellarische Übersicht

der

Vertheilung der Gefäfse und Nerven nach Ordnung der Gegenden und der einzelnen Organe.

(Die Bezeichnung »denselben« bezieht sich auf sämmtliche, den zunächst vorhergehenden Organen oder Gegend angehörigen Gefäfse, oder Lymphdrüsen, oder Nerven: die Häkchen „ „ nur auf den unmittelbar über ihnen stehenden Namen.)

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
Kopf				
Scheitelgegend	A. frontalis — A. ophthalmica	Vv. frontales — V. facial. ant.	Gl. facial. supf.,	N. frontalis — R. I n. trigem.
	„ tempor. supf. — „ carot. ext.	„ tempor. supf. — „ „ post.	„ submaxill. u.	„ temp. supf. — R. III n. trigem.
	„ auricul. post. — „ „ „	„ auric. post. — „ jugul. ext.	„ occipit.	„ occip. minor — Plex. cervicalis
	„ occipitalis — „ „ „	„ occipit. — V. jugul. ext. u. Vv. vertebr.		„ occip. major — R. post. n. cerv. II
Stirn				
Haut	A. front. u. supraorbit. — A. ophthalm.	Vv. frontales — V. facial. ant.	Gl. submaxill.	N. supratrochl., frontalis u. supraorbit.
	„ temp. supf. ant. — „ temp. supf.	„ tempor. supf. — „ „ post.		— R. I n. trigem.
	R. supraorbitalis — „ „ „	„ supraorbit — „ facial. ant. u. post.		
Mm. front., corrug. superc.	denselben	denselben	denselben	dens. u. Nn. tempor. — N. facial.
Hinterhaupt				
Haut	A. occipit. — A. carotis ext.	Vv. occipit. — V. jug. ext. u. vertebr.	Gl. occipit. u.	N. occipit. major — R. post. n. cerv. II
	„ auric. post — „ „ „		„ cervic. supf.	
M. occipitalis	denselben	denselben	denselben	dems. u. N. auric. post. prof. — N. fac.
Schläfengegend				
Haut	A. tempor. supf. — A. carot. ext.	V. tempor. superf. — V. fac. post.	Gl. fac. superf. u.	N. tempor. supf. — R. III n. trigem.
			„ submaxill.	R. temp. n. subcut. mal. — R. II n. trig.
Mm. auricul. sup. u. ant.	denselben	denselben.	denselben	dens. u. Nn. tempor. — N. facialis
M. temporalis	A. tempor. media — A. temp. supf.	V. tempor. med. — V. facial. post.	Gl. facial. prof. u.	Nn. temp. prof. — N. crot. bucc. — R. III n. trig.
	Aa. temp. profundae — „ maxill. int.	Vv. temp. prof. — Plex. max. int.	„ submaxill.	
Hintere Ohrgegend				
Haut	A. auricul. post. — A. carotis ext.	Vv. auric. post. — V. jugul. ext.	Gl. subauric. u.	N. occipit. minor — Plex. cervic.
			„ cervic. supf.	„ auric. post. supf. — „ „
M. auricul. post.	denselben	denselben	denselben	N. auric. post. prof. — N. facialis
				R. auricularis n. vagi
				N. occipit. minor — Pl. cervical.

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
Gehörorgan				
Äufseres Ohr	Aa. auric. ant. inf. — A. temp. supf.	Vv. auric. ant. inf. — V. facial. post.	Gl. subauric. u.	N. auric. inf. — Plex. cervical.
	„ „ ant. sup. — „ „ „	„ „ „ sup. — V. temp. supf.	„ cervic. supf.	„ temp. supf. — R. III. n. trigem.
	A. „ posterior — „ carotis ext.	„ „ posterior — V. jugul. ext.		
Mm. helicis, tragicus	denselben	denselben	denselben	dens. u. Nn. tempor. — N. facialis.
Mm. antitrag., transvers.	denselben	denselben	denselben	dens. u. N. aur. post. prof. — N. facial.
Äufserer Gehörgang	A. auric. poster. — A. carotis ext.	denselben und	denselben	Nn. meat. aud. - N. auric. temp. - R. III. n. trig.
	„ „ ant. inf. — „ tempor. supf.	V. auric. prof. — Pl. max. int. — V. fac. post.		N. membr. temp. - „ „ „ - „ „ „
	„ „ profunda — „ maxill. int.			R. auricul. — N. vagus
Paukenhöhle	A. tympanica — A. maxill. intern.	V. tympan. — V. facial. post.	Gl. cervic. prof. sup.	Pl. tymp.: N. tympanicus — N. glossopharyng.
	„ stylomast. — „ auric. post.	„ stylomast. — „ „ „		Nn. carot. tymp. — Plex. carot. int.
	R. petros. supf. — „ mening. media.			N. petros. supf. min. — Gangl. oticum.
Cellulae mastoid.	A. stylomast. — A. auric. post.	denselben und	denselben	
	„ auric. post. — „ carotis ext.	V. dipl. temp. post. — Sinus transvers.		
Tuba Eustachii	A. Vidiana — A. pterygopal. — maxill. int.	V. tympan. — Pl. max. int. — V. fac. post.	denselben	denselben
	„ pharyngobasil. — A. pharyng. adsc.	Vv. pharyngeae — V. jugul. int.		
M. mallei intern.	R. petros. supf. — A. mening. media	Vv. mening. med. - Plex. max. int. - V. fac. post.	denselben	Gangl. otic. u. N. pteryg. — R. III. n. trig.
M. mallei extern.	A. tympanica — A. maxill. int.	V. tympanica — „ „ „ — „ „ „	denselben	Ganglion oticum
M. stapedius	A. stylomast. — A. auricul. post.	V. stylomast. — V. facial. post.	denselben	N. stapedius — Gangl. genic. n. facialis
Labyrinth	A. auditiv. int. — A. basilaris.	Vv. audit. int. — Sin. petr. inf. u. transv.	denselben	N. acusticus
	„ stylomastoid. — „ auric. post.			R. n. petros. supf. min. — Gangl. otic.
Schädel	A. front. u. supraorb. — A. ophthalm.	Vv. diploicae: front. — Sin. long. sup. u. V. front.		
	„ temporal. supf. — „ carotis ext.	temp. ant. - Sin. sphenopar. u. V. temp. prof.		
	Aa. „ prof. — „ maxill. int.	temp. post. — Sin. long. sup., transv. u. V. auric. post.		
	A. auric. post. — „ carotis ext.	occipit. — Confluens sin. u. Vv. occip.		
	„ occipital. — „ „ „			
	„ pharyngobasil. — „ pharyng. adsc.	Vv. meningeae.		
	Aa. meningeae			

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
Dura mater	A. mening. media — A. maxill. int. „ „ ant. — A. ethmoid. — A. ophth. „ „ post. ext. — A. occipitalis „ „ „ int. — „ vertebralis R. a. pharyngobasil. — „ pharyng. adsc.	Vv. mening. med. — Sin. sphenopariet. u. Plex. maxill. int. Venulae meningeae — Sinus durae matris.	Gl. fac. prof. u. „ cerv. prof. sup.	N. tentorii cereb. — Plex. carot. int. R. plex. mening. med. — Pl. carot. ext. R. plex. vertebr. — Gangl. cerv. inf.
Cerebrum	A. corporis callosi — A. carotis int. „ choroidea — „ „ „ „ commun. post. — „ „ „ „ fossae Sylvii — „ „ „ „ cerebri prof. — „ basilaris	Vv. cerebr. sup. — Sin. longit. sup. „ corp. callos. — Sin. cavernos. „ cerebr. later. } — Sin. caver. petros. „ „ inf. } sup. u. transv. „ fossae Sylvii — Sin. cavernos. „ cerebral. magna — Sin. rectus	Gl. cerv. prof. sup.	
Cerebell. u. Mesencephalon	A. cerebelli inf. post. — A. vertebral. „ „ „ ant. — „ basilar. „ „ super. — „ „	Vv. cerebell. sup. — Sin. rect., transv. „ „ inf. — S. transv., petros. inf.	denselben	
Rückenmark, dessen Häute und Nervenwurzeln	A. spin. ant. — A. vertebral. „ „ post. — „ „ R. spinales — „ „ „ „ — Aa. intercostal. post. „ „ — „ lumbares „ „ — sacral. lat. u. med.	Vv. spin. long. ant. — Vv. vertebr., interc. lumb., sacr. lat. „ „ „ post. — Vv. spin. long. ant. u. Plex. vert. cerv., dors., lumb., sacral.	Gl. cerv. prof., „ intercost., „ lumbar., „ sacrales.	
Sehorgan *Augenlieder*	A. palpebr. sup. — A. ophthalm. „ „ inf. — „ „ R. palp. a. lacrym. — „ „ „ „ „ dors. nasi — „ „ „ „ „ frontal. — „ „ „ „ „ supraorb. — „ „ „ „ r. supraorbit. a. temp. supf. „ „ a. transv. fac. — A. temp. supf. „ „ „ infraorb. — „ maxill. int.	Vv. palp. sup. — V. fac. ant. u. temp. med. „ „ inf. — V. fac. ant.	„ fac. supf. u. „ submaxill.	Nn. palp. sup. — N. supraorb. — R. I n. trig. „ „ inf. — „ infraorb. — R. II n. trig. R. palp. n. infratrochl. — R. I n. trig. „ „ „ frontal. — „ „ „ „ „ „ „ lacrym. — „ „ „ „
M. orbic. palp.	denselben	denselben	denselben	dens. u. Nn. fac. temp. — N. facial. „ zygomat. — „ „

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
M. levat. palp. sup.	A. musc. u. supraorb. — A. ophthalm.	V. ophth. sup. — Sin. cav. u. V. fac. ant.		R. super. n. oculomusc. comm.
Gl. lacrymal.	„ lacrym. — „ „	V. lacrym. — V. ophthalm. sup.		N. lacrym. — R. I n. trig.
				Ramulus ganglii ciliaris
Saccus lacrym.	Ramuli a. ophthalmicae	V. ophthalm. sup.		N. infratrochlear. — R. I n. trigem.
M. lacrymalis	denselben	denselben		dems. u. N. zygom. — N. facial.
Tun. conjunct. bulbi	Aa. cil. ant. — A. ophth. u. deren Äste	V. ophth. sup. u. inf.		N. infratrochl. u. lacr. — R. I n. trig.
Tun. sclerotica	„ cil. ant. u. post. — „ „ „ „ „	denselben		
T. choroid., Coron. cil.	„ cil. post. breves — „ „ „ „ „	Vv. cil. brev. int. u. sup. — V. ophth. sup.		Ramuli nm. ciliar. — Gangl. ciliare
		„ „ „ ext. u. inf. — V. ophth. inf.		
Orbic. cil., Iris	„ cil. post. longae — „ „ „ „ „	„ ciliar. longae — V. ophth. sup.		Nn. ciliares — Gangl. ciliare
	„ „ anteriores — „ „ „ „ „			N. cil. long. int. — N. nasocil. — R. I „ „ „ ext. — A. lacrym. — n. trig.
Tun. retina	A. centralis retin. — A. ophthalm.	V. centr. retin. — V. ophth. sup.		N. opticus u. Zweige v. Plex. carot. int., Gangl. cil. od. sphenopal.
M. rectus oc. sup.	Aa. musc. oculi — A. ophth. u. deren Äste	Vv. musc. oc. — V. ophth. sup. u. inf.		R. super. n. oculomusc. comm.
„ „ „ *int.*				„ infer. „ „ „
„ „ „ *inf.*				demselben
„ „ „ *ext.*				N. oculomuscularis externus
„ *obliq.* „ *sup.*				A. oculomuscularis superior
„ „ „ *inf.*				R. inf. n. oculomusc. com. (Gangl. cil?)
Geruchsorgan				
Äufsere Nase	A. nasal. lat. — A. maxill. ext.	Vv. nasal. lat. — V. facial. ant.	Gl. submaxill.	Nn. nasal. lat. — N. infraorb. — R. II n. trig.
	„ dorsal. nasi. — „ ophthalm.	„ dors. nasi — „ „ „		N. infratrochl. — R. I n. trig.
	„ septi mobil. — „ coron. lab. sup.	„ labial. sup. — „ „ „		N. nas. ant. ext. — N. ethm. — R. I n. trig.
Nasenmuskeln	denselben	denselben	denselben	dens. u. Nn. zygom. — N. facial.
				„ buccal. — „ „
Nasenhöhle	A. nasal. post. — A. sphenopal. — A. max. int.	V. sphenopal. — R. prof. v. fac. ant. u. Plex. maxill. int.	Gl. fac. prof. u.	N. olfactorius
	„ nasopal. — „ „ — „ „ „		„ cerv. prof. sup.	Nn. nasal. post. — Gangl. sphenopal.
	„ nasal. ant. — „ ethm. — A. ophth.	Vv. nas. lat. u. lab. sup. — V. fac. ant.		N. nasopal. — „ „
	„ septi mob. - A. cor. lab. sup. - A. max. ext.			„ nas. ant. int. — N. ethm. — R. I n. trig.
				R. nas. u. dent. sup. ant. — N. infraorbit.
Sinus maxill.	A. alveol. sup. — A. maxill. int.	V. alveol. sup. — R. prof. v. fac. ant.	denselben	Nn. dent. sup. — R. II n. trig.
	„ infraorbit. — „ „ „	„ infraorb. — „ „ „ „ „		

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
Cell. ethm., Sin. front.	Aa. ethm. post. u. ant. — A. ophthalm.	V. sphenopal. u. Sin. longit. sup.		N. ethmoid. — N. nasocil. — R. I n. trig.
Sin. sphenoid.	A. sphenopal. — A. maxill. int.	V. sphenopal. — R. prof. v. fac. ant.		N. pharyng. — Gangl. sphenopal.
Wangengegend				
Haut	A. transv. fac. — A. maxill. ext.	V. transv. fac. — V. facial. post.	Gl. fac. supf. u.	N. subcut. malae — R. II n. trig.
	R. buccal. sup. — „ „ „	R. prof. v. facial. ant.	„ submaxill.	N. infraorbit. — „ „ „ „
Mm. zygom., levat. ang. oris, lev. lab. sup.	dens. u. A. infraorb. — A. max. int.	denselben	denselben	dens. u. Nn. zygom. — N. facial.
	„ buccin. — „ „ „			
Backengegend				
Haut	A. transv. fac. — A. tempor. supf.	Vv. buccales — V. fac. ant. u. post.	denselben	N. infraorbit. — R. II n. trig.
	R. buccal. inf. — „ maxill. ext.			„ mental. — R. III n. trig.
				„ buccinat. — „ „ „ „
M. risorius	R. buccal. inf. — A. maxill. ext.	denselben	Gl. submaxill.	Nn. bucc. u. subc. max. inf. — N. facial.
Gl. parotis	R. parotidei — A. carotis ext.	dens. u. V. transv. fac. — V. fac. post.	Gl. fac. supf.,	Plex. caroticus externus
	R. buccales inf. — „ max. ext.		„ cerv. supf. u.	N. auriculotemp. — R. III n. trig.
	A. transv. fac. — „ temp. supf.		„ cerv. prof. sup.	
M. masseter	A. masseterica — A. max. int.	Plex. maxill. int. — V. fac. post.	denselben	N. masset. — N. crot. bucc. — R. III n. trig.
	R. masset. — „ carot. ext.			
	R. bucc. inf. — „ max. ext.			
M. buccinator	A. buccinat. — A. maxill. int.	denselben	denselben	N. buccin. — N. crot. bucc. — R. III n. trig.
	R. buccal. inf. — „ maxill. ext.			Nn. buccales — N. facialis
Mm. pterygoidei	Aa. pterygoideae — A. maxill. int.	denselben	Gl. cerv. prof. sup.	Nn. pteryg. — N. crot. bucc. — R. III n. trig.
Mund				
Lippenhaut u. Schleimhaut	A. coron. lab. sup. — A. max. ext.	Vv. lab. sup., med. inf. — V. fac. ant.	Gl. submaxill.	Nn. lab. sup. — N. infraorb. — R. II n. trig.
	„ „ „ inf. — „ „ „			„ „ inf. — N. mental. — R. III n. trig.
	„ buccinatoria — „ „ int.			N. buccin. — N. crot. bucc. — R. III n. trig.
M. orbicul. oris	denselben	denselben	denselben	dens. u. Nn. buccales — N. facial.
Kinngegend				
Haut	A. coron. lab. inf. — A. max. ext.	V. labial. inf. — V. facial. ant.	denselben	N. mentalis — R. III n. trig.
	„ submentalis — „ „ „	„ subment. — „ „ „		
	„ ment. — A. alv. inf. — A. max. int.	„ mentalis — „ supf. colli ant.		
Mm. depr. ang. oris, quadr. u. levat. menti	denselben	denselben	denselben	dens. u. Nn. subcut. max. inf. — N. facial.

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
Regio submaxillaris				
Haut	A. submentalis — A. max. ext.	V. subment. — V. facial. ant.	denselben	N. mylohyoid. — R. III n. trig.
		„ mental. — V. supf. colli ant.		N. cervic. supf. — Plex. cervic.
M. digastr. max. inf.	ders. u. A. occip. u. aur. post. — A. car. ext.	denselben	denselben	N. digastr. — N. facialis
M. stylohyoideus	denselben	denselben	denselben	N. mylohyoid. — R. III n. trigem.
M. mylohyoideus	A. subment. u. A. subling. — A. lingual.	denselben	denselben	N. stylohyoideus — N. facialis
M. geniohyoideus	A. sublingualis — A. lingualis	V. lingualis — V. jugul. int.	Gl. cerv. prof. sup.	N. mylohyoideus — R. III n. trig.
Gl. saliv. submax.	A. submentalis — A. maxill. ext.	V. submentalis — V. facial. ant.	denselben	N. hypoglossus
Gl. saliv. subling.	A. sublingualis — A. lingual.	V. lingualis — V. jugul. int.	denselben	Gangl. maxillare
			demselben	
Mundhöhle				
Gaumen	A. pterygopalat. — A. max. int.	Vv. palat. — Vv. pharyng. — V. jug. int.	Gl. cerv. prof. sup.	N. palat. ant. — Gangl. sphenopal.
	„ nasopalat. — A. sphenopal. — A. max. int.			Ganglion nasopalat. — „ „
Gaumensegel, Tonsille	A. pharyngopal. — A. pharyng. adsc.	denselben	denselben	N. palat. int. u. ext. — Gangl. sphenopal.
	„ pterygopalat. — A. maxill. int.			R. palat. n. glossopharyngei
				„ „ „ lingual. — R. III n. trig.
Mm. levat. u. tensor v. pal.	A. pharyngobasil. — A. pharyng. adsc.	Vv. pharyngeae — V. jugul. int.	denselben	N. pharyngobasil. — N. glossophar.
	„ Vidiana — A. pterygopal. — A. max. int.			„ pharyng. — Gangl. sphenopal.
Schleimhaut d. Bodens	A. sublingual. — A. lingualis	V. lingualis — V. jugul. int.	denselben	N. ling. - R. III n. trig. - u. Gangl. maxill.
Zungenmuskeln	A. ranina — A. lingualis	denselben	denselben	N. hypoglossus
	„ dors. ling. — „ „			R. lingualis n. glossopharyngei
Zungenschleimhaut	denselben	denselben	denselben	N. lingualis — R. III n. trigem.
				R. lingual. n. glossopharyngei
Zahnfleisch u. Zähne, obere	A. alveolaris sup. — A. max. int.	V. alveol. sup. — R. prof. v. fac. ant.	denselben	Pl. dent. sup. { N. alveol. sup. — R. II n. trig.
	R. dent. sup. ant. a. infraorb. — „ „ „			„ infraorbit. — „ „ „ „
				„ nasal. post. med. — G. sphenopal.
untere	A. alveol. inf. — A. max. int.	V. alv. inf. — Plex. max. int. — V. fac. post.	denselben	N. alveol. inf. — N. mand. — R. III n. trig.
Hals				
Vordere u. seitliche Halsgegend				
Haut	A. thyreoid. sup. — A. carot. ext.	V. supf. colli ant. — V. jugul. com.	Gl. cervic. supf.	N. cervic. supf. — Plex. cervic.
	„ „ inf. — „ subclav.	„ „ „ inf. — „ „ „	„ „ prof. inf.	Nn. supraclavic. — „ „
	„ cervic. supf. — „ „	„ jugul. ext. — „ anonyma		
Platysma myoides	denselben	denselben	denselben	dens. u. Nn. subcut. colli — N. facial.

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
M. sternocleidomast.	R. sternocleidomast. — A. carot. ext. „ cerv. a. occipit. — „ „ „ A. mam. int. u. transv. scap. — A. subcl.	V. jugul. ext. u. com. — V. anon.	Gl. cerv. supf. u. „ prof. inf.	R. externus n. accessorii R. musc. — Plex. cervic.
Mm. sternohyoid. sternothyr.	R. musc. a. thyreoid. sup. — A. car. ext. „ „ „ „ inf. — „ subclav.	V. thyreoid. sup. — V. jugul. com. Vv. thyr. inf. — V. jug. com. u. V. anon.	denselben	R. cerv. n. hypoglossi (R. com. vom Plex. cervic. u. N. vagus)
M. thyreohyoideus	denselben	denselben	denselben	dens. u. N. laryng. sup. ext. — N. vag.
M. omohyoideus	dens. u. A. cerv. supf. — A. subclav.	dens. u. V. transv. scap. — V. subclav.	denselben	dens. u. N. suprascap. — Pl. brach.
Schilddrüse	R. thyr. a. thyr. sup. — A. carot. ext. „ „ „ „ inf. — „ subclav.	V. thyreoid. sup. — V. jugul. comm. Vv. thyr. inf. — V. jug. com. u. anon.	denselben	Plex. thyr. sup. — Pl. carot. ext. „ „ inf. — Gangl. cerv. med.
Kehlkopf				
Schleimhaut, Mm. cricothyr., thyreoaryt., cricoaryt. post. u. lat., aryt. transv.	A. laryng. sup. — A. thyreoid. sup. „ „ inf. — „ „ inf.	V. thyreoid. sup. — V. jugul. comm. Vv. thyr. inf. — V. jug. com. u. anon.	Gl. cerv. prof. sup. u. inf.	N. laryng. sup. — N. vag. u. Gangliensyst. „ lar. inf. - N. recurr. - N. „ „ „
Mm. aryep., thyreoepigl.	A. laryngea sup. — A. thyreoid. sup.	denselben	denselben	N. laryng. sup. — „ „ „ „
Luftröhre	R. tracheales — A. thyr. inf.	V. thyreoid. inf. — V. anon.	Gl. cerv. prof. inf.	Nn. trach. sup. - N. rec. - „ „ „ „
Schlundkopf	A. pharyng. adsc. — A. carot. ext. „ Vidian. — A. pterygopal. — A. max. int. R. phar. a. thyr. inf. — A. subclav.	Plex. pharyng. — V. jugul. int.	Gl. cerv. prof. sup.	Pl. phar. (R. pharyng. — N. vagus „ „ — „ glossophar. „ „ — Gang. cerv. sup.) R. pharyng. — Gangl. sphenopal. Rli n. buccinatorii — R. III n. trigem. Rli n. lar. sup. ext. — N. vagus „ „ „ „ inf. — N. rec. — „ „
M. stylophar.	A. pharyng. adsc. — A. carot. ext.	denselben	denselben	R. stylopharyng. — N. glossophar.
Speiseröhre	R. oesophagei — A. thyr. inf.	Vv. thyreoid. inf. — V. jug. comm.	Gl. cerv. prof. inf.	R. oesoph. n. recurr. — N. vagus
Mm. scaleni	A. cervic. adsc. — A. subclavia „ transvers. colli — „ „ „ cervic. prof. — „ „	V. transv. colli — V. subclav. Plex. vert. cerv. — Vv. vert. — V. anon.	Gl. cerv. prof.	R. musc. plex. cervic. u. brach.
Mm. rect. cap. ant., long. colli	A. cervic. adsc. — A. subclavia R. musc. a. vert. — „ „	Plex. vert. cerv. — Vv. vert. — V. anon.	denselben	denselben
Halswirbelsäule	dens. u. A. cerv. prof. — Aa. subclav.	demselben	denselben	

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
Nacken				
Haut	A. cervic. superf. — A. subcl. R. cerv. a. transv. colli — „ „ „ „ a. occipit. — A. car. ext.	V. jugul. externa — V. anonyma Plex. vert. cerv. — Vv. vert. — „ „	Gl. cerv. supf. u. „ „ prof. inf.	R. poster. nm. cervic. III—VIII Nn. supraclav. post. — Plex. cerv.
M. cucullaris	denselben	denselben	denselben	R. externus n. accessorii R. comm. ad access. — Plex. cervic.
Mm. d. 2ten, 3ten u. 4ten Schicht	denselben und A. cervic. adscend. — A. subcl. „ „ profunda. — „ „ R. musc. a. vertebr. — „ „	Plex. vert. cerv. — Vv. vert. — V. anon.	denselben	R. poster. nm. cervic. I—VIII
M. levator scapulae	denselben	demselben	denselben	dens. u. N. dors. scap. — Plex. cervic.
Rücken				
Haut	R. supraspin. a. transv. colli — A. subcl. A. dors. scap. — „ „ „ — „ „ R. dorsales nm. intercost. post. — A. aort.	Vv. transv. colli et scap. — V. subcl. „ intercost. post. — Vv. int. supr., azygos	Gl. axillares	R. poster. nm. dorsal. I—XII
M. cucullaris	denselben	denselben	denselben	R. ext. n. access. u. R. comm. plex. cerv.
Mm. rhomb., serr. post. sup.	denselben	denselben	denselben	N. dorsal. scap. — Plex. brachial.
Mm. latiss., serr. post. inf.	A. dors. scap. — A. transv. coll. — A. subcl. R. thor. dors. a. subscapul. — A. axill. R. dors. am. intercost. post. — A. aorta	Vv. transv. colli et scap. — V. subclav. „ subscapular. — V. axillaris „ interc. post. — Vv. interc. supr., azygos	denselben	N. thorac. dorsal. — Plex. brachial.
Mm. d. 3ten 4ten Schicht Rückenwirbelsäule	R. dors. am. interc. post. — A. aorta denselben	Plex. vert. dorsal. — „ „ „ „ demselben	Gl. intercost. denselben	R. posteriores nm. dorsal. I—XII
Brust				
Brustkasten Vorderwand				
Haut	R. perf. a. mammar. int. — A. subcl. Aa. thor. supr., acrom., longa — A. axill.	Vv. mammar. int. — V. anon. Vv. thorac. — V. cephal. u. V. axill.	Gl. infraclavic. u. „ axillares	Nn. supraclav. ant. — Plex. cerv. Nn. intercost. ant. — Nn. dors. I—VI
Mamma	denselben und R. infracost. am. interc. post. — A. aorta	denselben	dens. u. Gl. sternales	Nn. supraclav. ant. — Plex. cerv. Nn. cutan. pect. — Nn. dors. II—V
Mm. pectorales	denselben	denselben	denselben	Nn. thorac. ant. — Plex. brachial.
M. triang. sterni	A. mammar. int. — A. subclav.	Vv. mammar. int. — V. anonym.	Gl. sternales	Nn. intercost. ant. — Nn. dors. III—VI

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
Seitenwand				
Haut	A. thorac. longa — A. axillaris R. thorac. dors. a. subscap. — „ „	Vv. thorac. longa — V. axillaris „ subscapular. — „ „	Gl. axillares	Nn. cutan. pect. — Nn. dors. II — VI
M. serr. ant. maj.	denselben	denselben	denselben	N. thorac. long. — Plex. brachial. Nn. intercost. — Nn. dors. II — VIII
Mm. intercostales	A. intercost. suprema — A. subclav. Aa. intercost. post. — A. aort. thor. „ „ ant. a. mam. int. — A. subcl.	Vv. intercost. — Vv. interc. supr. — V. anon. — V. azygos, hemiazygos	Gl. intercost.	Nn. intercost. — Nn. dors. I — XI
Brusthöhle				
Thymus	Aa. mediast. ant. u. thym. — A. mammar. int.	Vv. thymicae — V. anonyma	Gl. mediast. ant.	Ramuli plexus cardiaci
Herzbeutel	A. pericard. phren. — A. mammar int. Aa. mediast. post. — A. aorta thor.	Vv. pericard. phrenicae — V. anonym. V. azygos u. hemiazygos	Gl. mediast. ant. „ „ post.	
Herz	Aa. coron. cord. dextr. u. sin. — A. aort. adsc.	Vv. cardiacae — Atrium dextrum	Gl. med. ant.	Plex. coron. cord. — Plex. cardiacus
Luftröhre, Bronchi	Aa. bronchial. ant. — A. mammar int. „ „ post. — A. aort. desc. thor. (A. interc. post. I)	Vv. bronchiales — Vv. anon., azygos	Gl. bronchiales	Nn. tracheal. inf. — N. vagus
Lungen	denselben	denselben	denselben	Plex. pulmon. — N. vagus u. Gangl. thorac. II — V. n. symp.
Speiseröhre	Aa. oesophageae — A. aort. desc. thor.	Vv. oesophag. — Vv. interc., azygos	Gl. mediast. post.	Plex. oesoph. ant. — N. vag. sin. „ „ post. — „ - „ dext.
Obere Extremität **Schulter**				
Haut	R. acrom. a. transv. scap. — A. subcl. „ „ „ thorac. acrom. — „ axill.	V. transv. scap. — V. subclav. „ cephalica — „ axillar.	Gl. cerv. inf.	Nn. supraclav. med. — Plex. brach.
M. deltoides, Schultergelenk	R. delt. a. thorac. acrom. — A. axill. A. coron. hum. ant. — „ „ „ „ „ post. — „ „	dens. u. Vv. coron. hum. — V. axill.	Gl. axillares	N. circumflex. brach. — Pl. brach.
Mm. coracobrach., biceps	A. cor. hum. ant. — A. axill.	denselben	denselben	N. musculocutan. — Pl. brach.

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
Schulterblattgegend				
Haut	A. transvers. scap. — A. subcl. R. supraspin. a. transv. colli — „ „ A. dors. scap. „ „ „ — „ „ „ circumfl. scap. — A. subscap. — „ axill.	Vv. transv. colli et scap. — V. subcl. „ subscapular. — V. axill. Plex. vert. dors. — Vv. intercost., azygos	Gl. axillares	Nn. supraclav. post. — Pl. brach. R. posteriores — Nn. dorsal. II—VII
M. supraspinatus	A. transversa scap. — A. subcl. R. supraspin. a. transv. colli — „ „	Vv. transv. colli et scap. — V. subcl.	denselben	N. suprascapul. — Plex. brachial.
M. infraspinatus	A. transversa scap. — A. subcl. „ circumfl. scap. — A. subscap. — „ axill.	dens. u. Vv. subscapul. — V. axill.	denselben	demselben
M. teres minor	A. circumfl. scap. — A. subscap. — A. axill.	Vv. subscapulares — V. axill.	denselben	N. circumflex. brach. — Pl. brach.
M. teres major	ders. u. R. thor. dors. — „ „ — „ „	denselben	denselben	N. subscapul. medius — Pl. brachial.
M. subscapularis	R. subscapulares — „ „ — „ „	denselben	denselben	N. subscapul. super. — „ „
Scapula	Aa. transv. u. circumfl. scap. — A. subcl., axill.	Vv. transv. u. circumfl. scap. — V. subcl., axill.		
Oberarm				
Haut	R. cut. a. thorac. long. — A. axillar. „ „ „ subscapul. — „ „ „ „ „ circumfl. br. post. — „ „ „ „ „ brachialis „ „ „ collat. ulnares — „ brachial. „ „ „ prof. br. u. coll. rad. — „ „	Vv. brachiales u. axillares V. cephalica — V. axill. „ basilica — „ brachial. int.	denselben	Nn. cutan. pect. — Nn. dors. II, III N. cut. brach. int. min. — Plex. brach. „ „ „ post. — N. circumfl. — „ „ R. cut. n. radialis — Plex. brachial.
M. biceps	R. musc. a. brachialis	Vv. brachiales	denselben	N. musculocutan. — Plex. brach.
M. brachial. int.	dens. u. Aa. collat. ulnares u. radial.	denselben	denselben	demselben
M. triceps	A. subscapul. — A. axillar. „ prof. br. u. coll. rad. — „ brachial. „ collat. ulnar. — „ „	Vv. collat. u. prof. br. — Vv. brach.	denselben	N. circumflex. — Plex. brach. „ radialis — „ „
Os brachii	A. nutrit. magn. — A. prof. brach.	V. prof. brach. — V. brach. int.		
Ellenbogen				
Haut u. Gelenk	Rete artic. cubiti: Aa. collat. rad. u magn. — A. prof. brach. „ „ „ uln. sup. u. inf. — A. brach. A. recurr. rad. — A. radial. „ recurr. uln. — „ ulnar. „ rec. intss. — A. intss. ext. — A. uln.	Vv. cephal., basilic, mediana „ collat. — Vv. prof. br., brach. „ recurr. — „ rad., uln., inteross.	Gl. cubit. u. axill.	N. cutan. br. int. min. — Plex. brach. „ „ ext. antibr. — N. radial.

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
Vorderarm				
Haut	R. cutanei a. radialis „ „ „ ulnaris „ „ „ inteross. ext. antibr.	V. basilica — V. brachial. int. „ cephalica — „ axillaris	Gl. axillares	N. cutan. brach. int. maj. — Pl. brachial. „ musculocutaneus — „ „ „ cut. extern. antibr. — N. radialis
Mm. pronat. rot., flex. carpi rad., palm. long., flex. dig. sublim.	A. recurr. ulnaris — A. ulnaris R. musc. a. ulnaris u. radialis	Vv. ulnares — Vv. brachiales „ radiales — „ „	denselben	R. musculares n. mediani N. inteross. int. — N. medianus R. muscul. n. ulnaris
Mm. flex. dig. prof., flex. poll. long., pron. quadr., fl. carp. uln.	A. inteross. int. antibr. — A. ulnar. R. muscul. a. ulnaris	Vv. inteross. int. — Vv. brachial. „ ulnares — „ „	denselben	denselben
Mm. supin., flexores carp. radiales	A. recurrens radial. — A. radial. „ recurr. inteross. — A. int. ext. — A. uln. R. muscul. a. radialis	Vv. radial., inteross. ext. — Vv. brach. V. cephalica — V. axillar.	denselben	N. radial. prof. — N. radialis
Mm. ext. dig. com., ext. indic. abd. long. poll., ext. indic., ext. dig. min., ext. carp. uln.	A. intss. ext. — A. intss. comm. — A. uln. „ „ int. — „ „ „ — „ „	Vv. inteross. antibr. — Vv. brachial.	denselben	dems. u. N. inteross. ext. — N. radialis
Radius u. Ulna	A. nutrit. radii, ulnae — A. inteross. int.	Vv. inteross. int. — Vv. brach.		
Carpus u. Metacarp.				
Rückenfläche, Haut	Rete carp. dorsale: R. dorsal. a. radialis „ „ „ ulnaris Aa. inteross. antibr. — A. ulnaris Aa. inteross. metac. dors. — Rete carp. dors. „ dors. poll., indic. rad. — A. radial. A. dors. dig. min. uln. — „ ulnaris	Rete venos. dors. manus — V. basilic. „ cephal.	denselben	N. radial. superf. — N. radialis N. musculocutan. — Plex. brach. N. ulnaris dorsalis — N. ulnaris
Handgelenk	Rete carp. dors. — Aa. rad., uln., inteross.	dems. u. Vv. rad., uln., inteross. antibr.	denselben	N. ulnar. dorsal. — N. ulnaris „ radial. superf. — „ radialis
Mm. inteross. dorsal.	Aa. inteross. metac. dors. — Rete carp. dors. u. Aa. inteross. vol.	denselben	denselben	N. uln. vol. prof. — N. ulnar.
Volarfläche, Haut	R. volar. superf. a. radialis Arc. vol. sublim. — A. ulnar u. rad. Aa. dig. comm. II—IV — Arc. vol. subl. A. vol. dig. min. uln. — A. ulnaris	V. basilica — V. brachial. int. V. cephalica — „ axillar.	Gl. cubit. u. axill.	R. palmar. longus n. mediani „ „ „ „ ulnaris R. cut. nm. dig. com. I-IV — N. med. „ „ „ „ „ V-VI — N. uln. vol. supf.

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
Handgelenk	Rete carp. vol. — Aa. rad., uln., inteross. int.	Vv. radial., ulnares, inteross. antibr.	Gl. cubit. u. axill.	N. inteross. int. — N. median. „ uln. vol. prof. — „ ulnaris
Mm. abd. brevis, flex. brev. u. opponens pollicis	R. volaris supf. a. radialis A. dig. comm. I — A. radialis	V. cephalica — V. axillaris Vv. radiales — V. brachial. ext.	Gl. axillares	N. dig. comm. I — N. median.
M. adduct. pollicis	A. dig. comm. I — A. radialis Aa. inteross. vol. I. II — Arc. vol. prof.	Arc. ven. vol. prof. — Vv. rad. u. uln.	denselben	N. uln. vol. prof. — N. ulnaris
Mm. lumbrical. I—III	Aa. dig. com. II. III — Arc. vol. subl.	Arc. ven. vol. subl. — Vv. ulnares	denselben	Nn. dig. comm. II-IV — N. median.
M. lumbric. IV	A. dig. com. IV — Arc. vol. subl.	demselben	denselben	N. dig. com. V — N. uln. vol. supf.
Mm. abd., flex. brev., adduct. dig. min.	R. volar. prof. a. ulnaris	Arc. ven. vol. prof. u. subl. — Vv. uln., rad.	denselben	N. uln. vol. prof. — N. ulnaris
Mm. inteross. volares	Aa. inteross. volares — Arc. vol. prof.	Arc. ven. vol. prof. — Vv. rad. u. uln.	denselben	demselben
Daumen	Aa. volares — A. dig. com. I — A. radial. u. Arc. vol. subl. „ dorsales — A. radialis	Rete ven. dors. man. — V. cephal. u. basil. Arc. ven. vol. subl. u. prof. — Vv. rad. u. uln.	denselben	N. volar. rad. — N. median. „ volar. uln. — „ „ Nn. dorsal. — N. rad. supf. u. musculocut.
Zeigefinger	A. vol. rad. — A. dig. com. I. — A. rad. „ inteross. vol. I - „ „ „ „ uln. — „ dig. com. II - Arc. v. subl. „ int. vol. II - „ „ prof. „ dors. radial. — A. radialis „ „ ulnar. - A. int. dors. II - Rete c. dors.	denselben	denselben	N. volar. radial. — N. medianus „ „ uln. — „ „ Nn. dorsales — N. radial. supf.
Mittelfinger	A. vol. rad. — A. dig. c. II — Arc. v. subl. „ int. vol. II — „ „ prof. „ „ uln. — „ dig. c. III — „ „ subl. „ int. vol. III - „ „ prof. „ dors. rad. — „ int. dors. II - Rete c. dors. „ „ uln. — „ int. dors. III - „ „ „	denselben	denselben	N. volar. radial. — N. medianus „ „ ulnaris — „ „ „ „ „ — N. median. „ dors. radial. — N. radial. supf. „ „ ulnar. — dems. u. N. uln. dors.
Ringfinger	A. vol. rad. — A. dig. c. III — Arc. v. subl. „ int. vol. III — „ „ prof. „ „ uln. — „ dig. c. IV — „ „ subl. „ int. vol. IV — „ „ prof. „ dors. rad. — „ int. dors. III — Rete c. dors. „ „ uln. — „ int. dors. IV — „ „ „	denselben — V. basilic. u. cephal. Vv. ulnares u. radial.	Gl. cubit. u. axill.	N. volar. radial. — N. medianus u. uln. vol. supf. „ „ ulnar. — N. uln. vol. supf. „ dors. rad. — N. uln. dorsal. „ „ uln. — „ „ „

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
Kleiner Finger	A. vol. rad. — A. dig. c. IV — Arc. v. subl. „ „ uln. — R. vol. prof. a. ulnaris „ dors. rad. - A. int. dors. IV — Rete c. dors. „ „ uln. - R. dorsal. a. ulnaris	denselben		N. volar. radial. — N. uln. vol. supf. „ „ ulnar. — „ „ „ „ „ dorsal. radial. — N. ulnar dors. „ „ ulnar. — „ „ „
Bauch				
Vordere Wand *Haut, Mm. rect., pyram.*	A. epigastr. sup. — A. mamm. int. — A. subcl. „ „ inf. — „ iliaca ext. „ „ supf. — „ femoralis	Vv. epig. sup. — Vv. mamm. int. — V. anon. „ „ inf. — V. iliac. externa „ „ supf. — „ saphen. mag. — V. fem.	Gl. axill., sternales, inguinales	N. interc. ant. — N. dorsal. VII Nn. musc. abdom. — „ „ VIII—XII N. iliohypogastr. — Plex. lumbaris
Seitenwand *Haut, Mm. oblig., transv.*	A. musculophren. - A. mam. int. - A. subcl. Aa. intercost. post. VI-XI - A. aort. desc. thor. R. ant. am. lumbar. — „ aort. d. abdom. A. iliolumbalis — „ hypogastr. „ epigast. inf. u. supf. — „ iliac. ext. „ circumfl. ilium — „ „ „	Vv. musc. phren. — Vv. mam. int. — V. anon. „ intercost. post. — V. azygos „ lumb. transv. u. adsc. - V. azyg., V. cav. inf. „ iliolumbal. — „ hypogastr. „ epigastr. inf. — „ iliac. ext. „ circumfl. ilium — „ „ „	Gl. axill., intercost., inguin.	Nn. cut. pect. u. interc. ant. — Nn. dors. VI, VII „ cutan. abdom. — Nn. dors. VIII—XII „ musc. abdom. — „ „ VIII—XII N. iliohypogastr. — Plex. lumbar.
M. quadrat. lumb.	R. anter. am. lumb. — A. aort. abdom. A. iliolumbal. — „ hypogastr.	Vv. lumb. transv. u. adsc. — V. azyg. u. cav. inf.	Gl. lumbares	R. musc. plexus lumbaris
Lumbargegend *Haut* *Mm. sacrospin. multif. etc.*	R. post. am. lumb. — A. aort. d. abd. denselben	denselben denselben (Plex. vert. lumb.)	Gl. axill., inguin. Gl. lumbares	R. post. nm. dors. XI, XII u. lumb. I—IV denselben
Kreuzgegend	R. post. am. sacral. lat. — A. hypogastr. „ „ a. sacral. med. — „ aort. d. abd.	Plex. sacral. ant. — V. hypogastr. V. lumb. adsc. — V. azygos	Gl. sacrales	Plex. sacr. post. — R. post. n. lumb. V u. nm. sacral. I—IV
Regio anoperinealis, *Haut, Mm. sphinct., levat. ani, transv. perin.*	Aa. haemorrh. ext. - A. pud. com. - A. hypog. A. transv. perin. - „ „ „ - „ „ „ haemorrh. med. - „ hypogastr.	V. pudend. comm. — V. hypogastr. Plex. haemorrh. — „ „	Gl. sacral., hypogastricae	Nn. anococcygei — Plex. coccyg. N. haemorrh. ext. — Plex. pudend. „ perin. — N. pudend. — „ „
Zwerchfell	A. pericard. phren. - A. mam. int. - A. subcl. „ musculophren. - „ „ „ - „ „ Aa. mediast. post. — A. aort. desc. thor. „ phrenic. inf. — „ „ „ abdom.	Vv. mammar. int. — V. anonyma „ lumbar. adsc. — „ azygos „ phrenic. inf. — „ cava inf.	Gl. mediast. post. „ lumbar.	N. phrenicus — Plex. cervicalis Plex. phrenicus — Plex. coeliacus

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
Verdauungsorgane				
Magen	A. coron. ventr. sin. — A. coeliaca „ „ „ dextr. — „ hepatica „ gastroepipl. dextr. - A. gastroduod. - A. hep. „ „ „ sin. — A. lienalis Aa. gastricae breves — „ „	V. cor. ventr. sup. — V. portarum „ gastroepipl. dextr. — V. mesent. — V. port. „ „ sin. — „ lienal. — „ „ Vv gastric. breves — „ „ — „ „	Gl. coeliacae	Plex. gastric. ant. — N. vagus sin. „ „ post. — „ „ dext. „ cor. ventr. sup. — Plex. coeliac. „ „ „ inf. — Pl. hep., lien. — Pl. coel.
Oment. gastrohepat.	A. coron. ventr. sin. — A. coeliaca „ hepatica — „ „	V. coron. ventr. sup. — V. port.	denselben	Plex. coron. ventr. sup. — Plex. coeliac.
Om. gastrocol. u. magn.	A. gastroep. dextr. u. sin. — A. hepat., lien.	Vv. gastroepipl. — A. mesent. — V. port.	denselben	Pl. cor. ventr. inf. — Pl. hep., lien. — Pl. coel.
Duodenum	A. pancr. duod. — A. gastroduod. — A. hepat. „ duoden. inf. — A. mesent. sup.	Vv. duodenales — V. mesenter. — V. port.	Gl. coel. u. intest.	Plex. hepat. — Pl. coeliac. „ mesent. superior
Jejunum	Aa. jejunales — A. mesent. sup.	Vv. jejun. — V. mesent. — V. port.	Gl. intestin.	Plex. mesent. superior
Ileum	Aa. ileae — „ „ „	Vv. ileae — „ „ — „ „	denselben	demselben
	A. ileocolica — „ „ „	V. ileocolica — „ „ — „ „		
Coecum, Colon adscend.	A. ileocolica — „ „ „	V. ileocolica — „ „ — „ „	Gl. mesocol., intest.	demselben
	„ colica dextra — „ „ „	„ colica dextra - „ „ — „ „		
Colon transversum	A. colica media — „ „ „	V. colica media - „ „ — „ „	denselben	demselben
Colon descendens	A. colica sinistra — A. mesent. inf.	V. colica sinistr. - V. mes. min. — „ „	Gl. mesocol., lumb.	Plex. mesent. inferior
Rectum	A. haemorrh. int. — „ „ „	V. haem. int. — „ „ „ — „ „	Gl. lumbares	Plex. haem. sup. — Pl. mesent. inf.
	„ „ media — A. hypogastr.	Plex. haemorrh. — V. hypogastr.	„ hypogastr.	Nn. haem. med. — Pl. hypog. inf. u. pud.
Leber	A. hepatica — A. coeliaca (Vena portarum)	Vv. hepaticae — V. cava inf.	Gl. coeliacae „ mediast. ant.	Plex. hepaticus — Plex. coeliacus
Milz	A. lienalis — A. coeliaca	V. lienalis — V. portarum	Gl. coeliacae	Plex. lienalis — Plex. coeliacus
Pancreas	A. pancr. duod. — A. gastroduod. — A. hepat. „ duodenalis inf. — A. mesent. sup. R. pancreatici — A. lienalis	Vv. pancr. — Vv. mes. u. lien. — V. port.	denselben	Plex. hepat., lien., mesent. sup.
Nebennieren	Aa. supraren. - A. phren. inf., renal., aort. abd.	Vv. suprarenales — V. cava inf.	Gl. lumbares	Plex. supraren. — Pl. coeliac., renalis
Harnorgane				
Niere	A. renalis — A. aorta desc. abdom.	V. renalis — V. cava inf.	Gl. lumbares	Plexus renalis
Harnblase	A. vesic. sup. — A. umbil. — A. hypog. „ „ inferior — „ „ (A. vesicovagin. — A. uterin. — „ „)	Plexus vesicalis — V. hypogastr. „ pudend. — „ „	Gl. hypogastr.	Nn. vesic. sup. — Plex. hypogastr. inf. „ „ inf. — dems. u. Pl. pudend.

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
Harnröhre, männl.	A. bulboureth. — A. perin. — A. pud. com.	V. pudenda comm. — V. hypogastr.	Gl. hypogastr.	N. pudendus — Plex. pudend.
	„ dors. penis — A. penis — „ „ „	Plex. pudendal. — „ „		(Pl. hypog. inf.)
weibl.	A. vesicovagin. — A. uterin. — „ hypog.	denselben		demselben
	„ clitoridea — „ pud. com.			
Geschlechtsorgane				
Hode, Nebenhode, Vas def.	A. spermat. int. — A. aorta desc. abd.	Vv. spermat. int. — V. cava inf.	Gl. lumbares	Plex. spermat. internus
	„ „ ext. — „ epig. inf. — A. il. ext.	„ „ ext. — „ iliac. ext.		N. sperm. ext. — Pl. lumbaris
	„ deferent. — A. vesic. inf. — A. hypog.			
M. crem., Tun. vag. com.	A. sperm. ext. — A. epig. inf. — A. iliac. ext.	Vv. spermat. ext. — V. iliac. ext.	Gl. inguinales	N. sperm. ext. — Plex. lumbaris.
Scrotum	Aa. scrot. ant. — Va. pud. ext. — A. femor.	Vv. pudendae ext. — V. saphen. magn.	denselben	Nn. scrot. ant. — N. ilioing. — Pl. lumb.
	„ „ post. — A. perin. — A. pud. comm.	V. pudenda comm. — V. hypogastr.	Gl. hypogastr.	„ „ post. — „ perin. — „ pud.
Penis, Haut	Aa. pudend. ext. — A. femoralis	Vv. subcutan. penis — denselben	Gl. inguinales	N. dors. penis — N. pud. — Pl. pudend.
	A. dorsal. penis — A. penis — A. pudend. com.			
Corp. cavern. penis	A. prof. pen. — A. penis — A. pud. comm.	Vv. prof. penis — Plex. pud. u. V. pud. com.	Gl. hypogastr.	Plex. cavern. penis — Plex. hypog. inf.
	R. cavern. a. dors. penis — „ — „ „ „	V. dors. med. penis — Plex. pud. — V. hypog.		R. cavern. n. dors. penis — N. pudend.
Bulbus urethrae	A. bulbourethr. — A. penis — A. pud. com.	Vv. bulbourethral. — V. pudend. com.	denselben	N. perinaei — N. pudend.
Eichel	A. dors. penis — „ „ — „ „ „	V. dors. med. penis — Pl. pud. — V. hypog.	Gl. inguinales	N. dors. penis — N. pud. — Pl. pudend.
				Plex. cavernos. pen. — Pl. hypog. inf.
M. bulbocavernos.	A. perin. u. A. penis — A. pudend. comm.	V. pudenda com. — V. hypogastr.	Gl. hypogastr.	N. perinaei — N. pudendus
M. ischiocavern.	denselben	denselben	denselben	N. dorsal. penis — „ „
Eierstock, Eileiter	A. spermat. int. — A. aorta desc. abd.	Vv. spermat. int. — V. cava inf.	Gl. lumbares	Plex. spermat. internus
Uterus	A. uterina — A. hypogastr.	Plex. uterinus — V. hypogastr.	Gl. hypogastr.	Plex. uterin. — Pl. hypogastr. sup. u. inf.,
	„ spermat. int. — „ aorta desc. abd.	Vv. spermat. int. — V. cava inf.	„ lumbares	Pl. pudendalis
	„ „ ext. — A. epig. inf. — A. il. ext.			„ spermaticus internus
Vagina	A. vesicovagin. — A. uterin. — A. hypog.	Plex. vagin. u. uterin. — V. hypog.	Gl. hypogastr.	Plex. vesicalis — Pl. hypog. inf.
	„ perinaei — A. pud. comm. — „ „			Nn. vaginales — Plex. pudend.
				N. perinaei — N. pud. — Plex. pudend.
Labia majora	Aa. labial. ant. — A. pud. ext. — A. fem.	Vv. pud. ext. — V. saphen. magn. — V. fem.	Gl. inguin. u.	Nn. lab. ant. — N. ilioing. } Plex.
	„ „ post. — A. perin. — A. pud. com.	„ „ comm. — V. hypogastr.	„ hypogastr.	„ sperm. ext. } lumbaris
				„ lab. post. — N. perin. — N. pud.
Labia min., Clitoris } *Mm. ischiocav., constr. cun.* }	A. clitoridea — A. pud. comm.	Plex. pudend. — V. hypogastr.	denselben	N. clitorid. — N. pudend.
	„ perinaei — „ „ „	V. pudend. com. — „ „		„ perinaei — „ „

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
Untere Extremität				
Hüfte u. Gesäfs				
Haut	R. post. a. lumb. IV, V — A. aort. abd., sacr. med.	Vv. lumbares — V. azygos, V. cava inf.	Gl. inguin.	N. iliohypogastr. — Plex. lumb.
	R. cut. a. gluteae — A. hypog.	Vv. glut., ischiad. — V. hypogastr.	„ hypogastr.	Nn. cut. clun. sup. — R. post. n. lumb. III-V
	„ „ „ ischiad. — „ „	„ circumfl. il. — „ iliac. ext.		„ „ „ post. — „ „ „ sacr. I-IV
	„ „ circumfl. ilium — „ iliac. ext.			N. cutan. fem. post. — Plex. ischiad.
M. gluteus max.	A. ischiadica — A. hypogasr.	Vv. glut. u. ischiad. — V. hypogastr.	denselben	N. gluteus inf. — Plex. ischiad.
	„ glutea — „ „	„ circumfl. fem. — „ prof. femor.		
	Aa. circumfl. fem. — „ profund. fem.			
Mm. glut. med., min., tens. fasc. lat.	A. glutea — A. hypogastr.	denselben	denselben	N. gluteus super. — Plex. ischiad.
	„ ischiadica — „ „			
	Aa. circumfl. fem. — „ profund. fem.			
Mm. pyrif. gemelli quadrat. fem.	denselben und	denselben	Gl. hypogastr.	N. ischiadicus — Plex. ischiad.
	A. obturator. — A. hypogastr.			
	„ perfor. I — „ profund. fem.			
Mm. psoas, iliac. int.	Aa. lumbares — A. aort. desc. abd.	Vv. lumbares — V. azyg., V. cava inf.	Gl. lumbares,	R. musculares plexus lumbaris
	A. iliolumb. — „ hypogastr.	„ iliolumb. — „ hypogastr.	„ hypogastr.,	N. cruralis — Plex. lumb.
	„ circumfl. il. — „ iliac. ext.	„ circumfl. il. — „ iliac. ext.	„ inguinal.	
	„ circumfl. fem. int. — „ prof. fem.	„ circ. fem. int. — „ prof. fem.		
Os ilium	A. iliolumb. — A. hypogastr.	Vv. iliolumb. — V. hypogastr.		
	„ glutea — „ „	„ gluteae — „ „		
Mm. obturat.	A. obturatoria — A. hypogastr.	Vv. obturat. — V. hypog., V. iliac. ext.	Gl. hypogastr.	N. obturatorius — Plex. lumbar.
	Aa. circumfl. fem. int. — „ prof. fem.	„ circumfl. fem. — V. prof. fem.		
	A. ischiadica — „ hypogastr.	„ ischiad. u. pud. com. — V. hypog.		
	„ pudend. comm. — „ „			
Os ischii, pubis	denselben.	denselben		
Hüftgelenk	A. acetabuli — A. obtur. — A. hypog.	Vv. obturat. — V. hypogastr.	denselben	demselben
	Aa. circumfl. fem. — „ prof. fem.	„ circumfl. fem. — „ prof. fem.		

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
Oberschenkel				
Haut	R. inguinal. u. cutan. — A. femoralis A. epigastr. supf. — „ „ -	V. saphena magna — V. femoralis Vv. ischiadicae — „ hypogastr. V. saphena parva — „ poplitea	Gl. inguinales „ hypogastr.	N. cut. fem. ant. ext. — Plex. lumb. „ lumboinguinalis — „ „ Ramus n. spermatici ext. — „ „
	R. desc. a. circfl. fem. ext. — A. prof. fem. R. cut. a. ischiadicae — „ hypogastr. „ „ am. perfor. — „ prof. fem. „ „ a. popliteae			N. cut. fem. ant. int. — N. cruralis „ „ „ int. — Nn. crur. u. obtur. „ perinaei — N. pud. — Plex. pudend. „ cut. fem. post. — Plex. ischiad.
Mm rectus, crural., vast. ext., sartor.	R. musc. a. femoral. u. popliteae „ desc. a. circfl. fem. ext. — A. prof. fem. „ musc. a. profundae femoris	V. femoral., poplit., prof. fem.	Gl. inguinales	R. musc. n. cruralis — Plex. lumb.
M. vast. int., sartor.	R. musc. am. femor., prof. fem., poplit. „ musculoarticul. — A. femoralis „ A. artic. genu supf. — „ „	denselben	denselben	denselben
M. pectineus	A. circumfl. fem. int. — A. prof. fem. „ obturatoria — „ hypogastr.	Vv. circumfl. fem. int. — V. prof. fem. „ obturator. — „ hypogastr.	denselben	R. musc. n. crural. u. obtur. — Pl. lumb.
M. gracilis	dens. u. R. musc. a. fem. u. poplit.	dens. u. V. saph. magna u. femoralis	denselben	R. ant. n. obturat. — Plex. lumb.
Mm. adduct. long. u. brev.	R. musc. a. femoralis A. circfl. fem. int. u. Aa. perfor. — A. prof. fem. „ obturatoria — A. hypogastr.	V. prof. fem. — femoralis Vv. obturat. — V. hypog. u. iliac. ext.	denselben	demselben
M. adduct. magnus	Aa. perforantes — A. profund. fem.	Vv. perforantes — V. prof. fem.	denselben	R. post. n. obturat. — Plex. lumb. „ musc. n. ischiad. — „ ischiad.
Mm. semitend., semimembr., biceps	Aa. perforantes — A. prof. fem. A. ischiadica — „ hypogastr. R. muscul. a. popliteae	Vv. perforantes — V. prof. fem. „ ischiadic. — „ hypogastr. V. poplitea	Gl. ing. u. hypog.	R. musc. n. ischiadici
Os femoris	A. nutrit. fem. sup. — A. perf. I — A. prof. f. „ „ „ magna — „ „ III — „ „ „	V. profunda femoris		

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
Knie	Retearticul. genu: A. art. genu supf. — A. femoral. R. musculoartic. — „ „ Aa. artic. g. sup. — „ poplit. „ „ „ inf. — „ „ A. recurr. tibial. — „ tibial. ant. A. artic. genu media — „ poplit.	V. saphena magna — V. femor. „ „ parva — „ poplit. Vv. articul. genu — „ „	Gl. poplit., inguin.	Nn. cutanei fem. — s. S. 1017. R. musc. (m. vasti int.) — N. crur. N. saphenus — N. cruralis
Unterschenkel				
Haut	R. cutan. a. tibialis anterioris „ „ „ peron. — A. tib. post. Aa. surales supf. — „ poplit.	V. saphena magna — V. femor. „ „ parva — „ poplit.	Gl. inguinales	N. saphenus — N. cruralis Nn. cut. cruris post. — N. peronaeus N. suralis — N. tibial. u. peron.
Mm. tib. ant., extens. long. halluc. u. digit. com.	A. tibial. rec. u. R. musc. — A. tibial. ant.	Vv. tibial. ant. — V. poplit.	denselben	N. peron. supf. — N. peron. — N. ischiad.
Mm. peronaei	A. peronaea com. — A. tibial. post.	Vv. peronaeae — V. poplit.	denselben	demselben
Mm. gastrocnem., soleus	Aa. surales prof. — A. poplitea R. musc. am. tibial. post. u. peron.	Vv. tib. post. u. peron. — V. poplit.	denselben	R. musc. n. tibialis — N. ischiad.
Mm. tib. post., flex. long. halluc. u. digit. com.	R. musc. a. tibialis post. „ „ a. peron. comm. u. peron. post.	denselben	denselben	denselben
Tibia	A. nutr. tib. sup. u. magna — A. tib. post.	Vv. tibiales post. — V. poplitea		
Fibula	A. nutr. fibulae — A. peronaea comm.	„ peronaeae — „ „		
Fufsgelenk	Aa. malleolar. ant. — A. tibial. ant. A. peronaea ant. — „ peron. com. Aa. malleol. post. — „ tibial. post. A. peronaea post. — „ peron. com. Aa. tarseae ext. u. int. — „ dorsal. pedis	Vv. malleol. — Vv. tib. ant., tib. post. u. peron.	denselben	N. saphenus — N. cruralis „ suralis — N. tibial. u. peron. „ peron. superficialis „ „ profundus
Fufs				
Ferse	R. calcan. ext. — A. peron. post. „ „ int. — „ tibial. post.	Vv. peron. u. tibial. post. — V. popl.	denselben	N. suralis — N. tibial. u. peron. R. cut. plantares — N. tibialis

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
Fufsrücken, Haut	Aa. tarseae int. — A. dorsal. ped. — A. tib. ant. A. tarsea ext. — „ „ „ — „ „ „ „ metatarsea — „ „ „ — „ „ „ Aa. inteross. dorsal. — A. dorsal. ped. u. Arc. dors ped.	Rete dorsale pedis — V. saphen. magn. — „ „ parva	Gl. inguinales	N. saphenus — N. cruralis „ cut. dors. ped. int. — N. peron. supf. „ „ „ „ med. — „ „ „ „ „ „ „ ext. — „ suralis
Mm. ext. brev. hall. u. digit., inteross. dors. I	denselben	demselben u. Vv. tibial. anteriores	denselben	N. peronaeus prof. — N. peronaeus
Mm. inteross. dors. II—IV	denselben	demselben	denselben	R. prof. n. plantar. ext. — N. tibial.
Fufssohle, Haut	A. supf. ped. int. — A. plant. int. R. cutan. a. plant. int. u. ext.	V. saphena magna — V. femor. „ „ parva — „ poplit. Vv. plant. ext. u. int. — Vv. tib. post.	denselben	R. cut. u. Nn. dig. plant. — N. plant. int. u. R. supf. n. plant. ext.
Mm. abduct. u. flex. brev. halluc.	A. plant. int. — A. tibial. post.	Vv. plant. int. — Vv. tib. post.	denselben	N. plant. int. — N. tibialis
Mm. flex. dig. com. brev., quadratus, lumbricales	A. plantar. int. — A. tibial. post. „ „ ext. — „ „ „	Vv. plant. int. — Vv. tib. post. „ „ ext. — „ „ „	denselben	N. plant. int. — N. tibialis R. supf. n. plant. ext. — „ „
M. abduct. dig. min.	A. plant. ext. — A. tibial. post.	Vv. plant. ext. — Vv. tib. post.	denselben	N. plantar. ext. — N. tibial.
Mm. adduct. hall., transvers. pl., inteross. plant., flex. brev. dig. min.	Aa. inteross. plant. — Arc. plant. prof. Arcus plant. prof. — A. plant. ext. u. R. plant. prof. a. dorsal. ped.	denselben und Vv. dorsal. pedis — Vv. tib. ant.	denselben	R. profund. n. plantar. extern.
Erste Zehe	A. plant. int. — A. plant. int. „ „ ext. — A. intss. pl. I - Arc. pl. prof. „ dorsales — „ „ dors. I - A. dors. ped.	Rete ven. dors. pedis — Vv. saphenae Vv. plantares int. u. ext. — „ tib. post. „ dorsal. pedis — „ „ ant.	denselben	Nn. plant. — N. plant. int. — N. tib. N. dors. int. — N. peron. supf. u. N. saphen. „ „ ext. — „ „ prof.
Zweite Zehe	Aa. plant. - Aa. intss. plant. I. II - Arc. pl. prof. A. dors. int. - A. „ dors. I - A. dors. ped. „ „ ext. - „ „ „ II - Arc. „ „	denselben	denselben	Nn. plant. — N. plant. int. — N. tib. N. dors. int. — N. peron. prof. „ „ ext. — „ „ supfic.
Dritte Zehe	Aa. plant. - Aa. intss. plant. II. III - Arc. pl. prof. „ dors. - „ „ dors. II. III - „ dors. ped.	denselben	denselben	Nn. plant. — N. plant. int. — N. tibial. „ dors. — „ peron. superfic.

Organe	Arterien stammen von den	Venen gehen zu den	Lymphgef. gehen zu den	Nerven stammen von den
Vierte Zehe	Aa. plant. — Aa. intoss. pl. IV. — Arc. pl. prof. „ dors. — „ „ dors. III. IV. — Arc. dors. ped.	denselben	Gl. inguinales	N. plant. int. — N. plant. int. — N. tib. „ „ ext. — „ „ ext. — „ „ „ dors. int. — „ peron. superfic. „ „ ext. — „ suralis — N. tib. u. per.
Kleine Zehe	A. plant. int. — A. intss. pl. IV. — Arc. pl. prof. „ „ ext. — „ plant. ext. — A. tib. post. „ dors. int. — „ intss. dors. IV. — Arc. dors. ped. „ „ ext. — „ metatars. — A. dors. ped.	denselben	denselben	Nn. plant. — N. plant. ext. — N. tib. „ dors. — N. suralis — N. tib. u. peron.

Die Knochen und Knorpel als Stellen des Ursprungs, der Insertion, der Befestigung und des Durchganges der weichen Theile.

✳ bedeutet „Ursprung des“
„ „Insertion des“
◎ „ „enthält“ oder „läfst hindurchgehen“

Wo kein Zeichen gesetzt ist, läfst sich die Befestigung des genannten Theils nicht genau als Ursprung oder als Insertion bezeichnen.

Kopf

Os sphenoideum

Corpus: Sella turcica	◎ Hypophysis cerebri, Sinus circularis Ridleyi.
Proc. clinoid. post.	Tentorium cerebelli.
Proc. clinoid. ant.	✳ Mm. recti oculi extern. u. sup.
Foramen opticum	✳ Mm. levator palpebrae superioris, rectus oculi superior, obliquus oculi superior.
	◎ A. ophthalmica, N. opticus.
Seitenfläche	✳ Mm. rectus oculi internus, externus u. inferior.
Sulcus caroticus	◎ A. carotis cerebralis, Plexus caroticus internus.
a magna, untere Fläche	✳ Mm. pterygoideus ext., mallei internus.
Spina angularis	✳ Lig. maxillare internum, Mm. tensor veli palatini, mallei ext.
Superfic. temporalis	✳ M. temporalis.
perf.int., Sulc.mening.	◎ A. meningea media.
Fissur. orbital. sup.	◎ Vv. ophthalm. sup. u. inf., Nn. ophthalmicus, oculomuscularis externus, superior u. communis.

Foramen rotundum	◎ N. maxillaris superior.
„ ovale	◎ N. maxillaris inferior.
„ spinosum	◎ A. memingea media, Plexus meningeus.
Emissarium diploicum	◎ V. diploica temporalis anterior.
Proc. pterygoideus, Lam. externa	✳ M. pterygoideus externus.
Lam. interna	✳ Mm. tensor veli palatini, pterygopharyngeus.
Hamulus pteryg.	Fascia buccopharyngea, Tendo m. tensoris veli palat., ✳ M. pterygopharyngeus.
Fossa pterygoid.	✳ M. pterygoideus internus.
Sulcus tub. Eust.	Pars cartilaginea tubae Eustachii.
Canalis Vidianus	◎ A. Vidiana, N. petrosus superficialis major, N. petrosus profundus.
Os occipitis	
For. magnum occipit.	◎ Sinus basilares, Plex. circularis for. magni, Aa. vertebrales, spinales ant. u. posteriores, Nn. accessorii, Wurzeln des N. cervicalis I, Medulla oblongata.
Hinterer Umfang	Lig. obturatorium atlantis posterius.
Pars basilaris	⋕ Mm. recti capitis anteriores. — Lig. obturatorium atlantis anterius, Apparatus ligamentosus vert. colli.
Sulcus basilaris	◎ Sinus petrosus inferior.
Pars condyloidea	⋕ M. rectus capitis lateralis.
Proc. condyloideus	Lig. capsul. artic. capitis, Lig. alare dentis.
For. condyl. poster.	◎ V. diploica occipitalis.
„ „ anter.	◎ N. hypoglossus.
Sulcus jugularis	◎ Sinus transversus.
Protub. occip. ext.	✳ Lig. nuchae, M. cucullaris.
Crista occip. ext.	✳ Lig. nuchae.
Linea semicirc. sup	✳ Mm. occipitalis, cucullaris. ⋕ M. splenius capitis.
	⋕ M. biventer et complexus.

Linea semicirc. inf.	# Mm. recti capitis poster. major u. minor, obliquus capit. sup.
rotuberant. occip. int.	Falx cerebri, Tentorium cerebelli (Confluens sinuum).
Sulcus longitudinalis	Falx cerebri. ◎ Sinus longitudinalis superior.
Sulci transversi	Tentorium cerebelli. ◎ Sinus transversi.
Crista occip. interna	Falx cerebelli.
Fossae occipit. super.	◎ Lobi cerebri posteriores.
„ „ infer.	◎ Hemisphaerae cerebelli.
Os temporum	
quama, äufsere Fläche	✳ M. temporalis.
Sulcus mening.	◎ A. meningea media.
Proc. zygomaticus	✳ M. masseter, Lig. auriculare anterius, Lig. maxill. externum.
avit. glenoid., Tuberc. art.	Lig. capsulare artic. maxillaris.
Pars mastoidea	✳ M. auricularis posterior. # M. splenius capitis.
Proc. mastoideus	✳ Lig. auriculare posterius. # Mm. sternocleidomastoideus, trachelomastoideus.
Incisura mastoidea	✳ M. digastricus maxillae inferioris.
For. mastoideum	◎ Emissarium mastoideum (V. diploica temp. post.), A. meningea posterior externa.
Canaliculus mastoideus	◎ Ram. auricularis n. vagi.
Fossa sigmoidea	◎ Sinus transversus.
yramis	
Superficies inferior	✳ M. levator veli palatini, M. cephalopharyngeus.
Fissura Glasseri	◎ A. u. V. tympanica, M. mallei externus.
Angulus anterior	✳ M. mallei internus.
issura petroso angularis	◎ Chorda tympani, N. petrosus superficialis minor.
Fossa jugularis	◎ Bulbus venae jugularis internae.

Proc. styloideus	✳ M. stylohyoideus, Lig. stylomylohyoideum, M. styloglossus, M. stylopharyngeus.
For. stylomastoideum	◎ A. u. V. stylomastoidea, N. facialis.
Canalis Fallopii	◎ N. facialis, Chorda tympani, A. stylomastoidea, Ram. petrosus superfic. a. meningeae mediae.
Canalis caroticus	◎ A. carotis cerebralis, Plexus caroticus internus.
Fossula petrosa	◎ Ganglion petrosum n. glossopharyngei, N. tympanicus.
Apertura aquaed. cochl.	◎ Venulae auditivae internae.
Fissura petrobasilaris	Fibrocartil. basilaris. ◎ N. petrosus superfic. major.
Angulus superior	Tentorium cerebelli.
Sulc. petros. superior	◎ Sinus petrosus superior.
Hiatus can. Fallop.	◎ Nn. petros. superficial. major u. minor, Ram. petros. superfic. a. meningeae mediae.
Porus acusticus int.	◎ N. facialis, N. acusticus, A. u. Vv. auditivae internae.
Apertura aq. vestib.	◎ Venulae auditivae internae.

Knochen u. Knorpel des Gehörorgans

Ohrknorpel, Hinterfläche	⋕ Mm. auriculares superiores, retrahentes, transversus.
Spina helicis	⋕ M. auricularis anterior. ✳ M. helicis major.
Crus helicis	✳⋕ M. helicis minor.
Tragus	✳⋕ M. tragicus.
Anthelix u. Antitragus	✳⋕ M. antitragicus.
Sulcus tympani	Membrana tympani.
Fenestra ovalis	◎ Basis stapedis.
Fenestra rotunda	Membrana tympani secundaria.
Sulcus promontorii	◎ N. tympanicus.
Canalis chordae	◎ Chorda tympani.
Eminent. papillaris	✳◎ M. stapedius. ◎ N. stapedius.

Sulcus muscularis	✳◎ M. mallei internus.
For. caroticotympanica	◎ Nn. caroticotympanici.
Collum mallei	⋕ M. mallei externus.
Manubrium mallei	Membrana tympani. ⋕ M. mallei internus.
Proc. brevis mallei	Membrana tympani.
Collum stapedis	⋕ M. stapedius.
estibulum	
Macula cribros. sup.	◎ N. saccularis major, Nn. ampullares superior u. externus.
„ „ inf.	◎ N. ampullaris inferior.
„ „ recessus hemisphaerici	◎ N. saccularis minor.
ochlea, Tubulus centralis u. spiralis	◎ Ramuli n. cochleae.
Meatus audit. internus	◎ N. facialis, N. acusticus, A. u. Vv. auditivae internae.
Apert. int. can. Fall.	◎ N. facialis.
For. posteriora	◎ Nn. saccularis major, ampullares sup. u. ant., Gefäfse des Vorhofs.
For. inferius	◎ N. ampullaris inferior.
Tractus spiralis	◎ N. saccularis minor, N. cochleae, Gefäfse der Schnecke.

Os frontis

Glabella	✳ M. frontalis.
Arcus superciliaris	✳ Mm. frontalis, corrugator supercilii.
Linea semicircul.	Fascia temporalis.
Proc. zygomaticus	Fascia temporalis. ✳ M. temporalis.
Crista frontal. int.	Falx cerebri.
Sulcus longitudinalis	Falx cerebri, ◎ Sinus longitudinalis superior.
Incisura supraorbitalis	◎ A. frontalis, N. frontalis.
For. supraorbitale	◎ A. supraorbitalis, N. supraorbit.
ovea (Spina) trochlearis	Trochlea m. obliqui oculi superioris.
Fossa glandularis	◎ Glandula lacrymalis superior.
or. ethmoideum anter.	◎ A. ethmoidalis anterior, N. ethmoidalis.
„ „ poster.	◎ A. ethmoidalis posterior.

Pars nasalis	✳ Mm. frontalis, orbicularis palp., levator labii sup. alaeq. nasi, pyramidalis nasi.
For. coecum	◎ Venula (anast. zwischen Sin. longit. sup. u. Vv. nasales internae anter.).
Os parietale	
Linea semicircularis	Galea aponeurotica, Fascia temporalis, ✳ M. auricularis super.
Planum semicircul.	✳ M. temporalis.
For. parietale	◎ Emissarium parietale (V. dipl. temp. post.).
Sulcus transversus	◎ Sinus transversus.
Sulci meningei	◎ Rami a. meningeae mediae.
Os ethmoideum	
Crista galli	Falx cerebri.
For. cribrosa	◎ Nn. olfactorii, ethmoidalis, A. ethmoidalis anterior.
Os maxillare superius	
Proc. nasalis	✳ M. orbicularis palpebrarum, Lig. palpebrale internum.
Sulcus nasolacrymalis	◎ Ductus nasolacrymalis.
Margo infraorbitalis	✳ Mm. levator labii sup. proprius, obliquus oculi inferior.
Fissura orbital. infer.	◎ N. subcutaneus malae, V. ophthalmica inf., A. u. V. infraorbitalis, N. infraorbitalis.
Canalis infraorbitalis	◎ A. u. V. infraorbitalis, N. infraorbitalis, Nn. dentales superiores medius und anterior.
Tuber maxillare	✳ M. pterygoideus internus.
For. maxillaria super.	◎ A. u. V. alveolaris superior, N. dentalis posterior superior.
Superficies facialis	✳ M. compressor nasi.
Fovea maxillaris	✳ M. levator anguli oris.
For. infraorbitale	◎ Nn. palpebrales inf., nasales laterales, labiales superiores, A. infraorbitalis.

Canalis alveolaris ant.	◎ N. dentalis superior anterior, Ganglion supramaxillare.
„ „ medius	◎ N. dentalis superior medius.
„ „ posterior	◎ N. dentalis superior posterior.
Proc. alveolaris	✳ M. buccinator.
Kanälchen der Knochenmasse	◎ Plexus dentalis superior, Nervuli gingivales, dentales superiores.
Jug. alveol. dent. incis. II	✳ M. incisivus superior.
Jug. alveol. d. angul.	✳ M. depressor alae nasi.
Canalis incisivus	◎ Canalis nasopalatinus, Rli a. palatinae anterioris, Ganglion nasopalatinum.
Os palatinum	
Spina palatina	✳ M. uvulae.
Proc. pyramidalis	✳ M. pterygoideus externus.
Fossa pterygopalatina	◎ Ram. prof. v. facialis anterioris, V. ophthalmica inferior, V. pterygopalatina, V. sphenopalatina, N. subcutaneus malae, N. maxillaris superior, A. maxillaris interna, A. pterygopalatina, A. sphenopalatina, Ganglion sphenopalatinum, Ram. pharyngeus gangl. sphenopalatini.
For. sphenopalatinum	◎ A. u. V. sphenopalatina, Nn. nasales posteriores superiores, nasopalatinus.
Canal. pterygopalatinus	◎ Nn. palatini, nasales posteriores medius u. inferior, A. u. V. pterygopalatina.
For. palatina post.	◎ Nn. palatini, Rami a. pterygopalatinae.
Os zygomaticum	
Pars facialis	✳ Mm. zygomatici major u. minor
Arcus zygomaticus	Fascia temporalis. ✳ M. masseter.
Proc. maxillaris	✳ M. levator labii sup. proprius.
Proc. frontalis	✳ Lig. palpebrale externum.
Superfic. temporalis	✳ M. temporalis.

Canal. zygomaticus	◎ N. subcutaneus malae, Rlus a. lacrymalis.
Os nasi	
Äufsere Fläche	✳ M. frontalis.
Sulcus d. inneren Fläche	◎ N. nasalis anterior internus.
Nase	
Cartil. lateralis	⋕ M. compressor nasi.
Cart. alae nasi	⋕ Mm. levator alae nasi, depressor alae nasi.
Septum mobile	⋕ M. depressor septi mobilis.
Os lacrymale	
Crista lacrymalis	✳ M. lacrymalis.
Fossa lacrymalis	◎ Saccus lacrymalis.
Maxilla inferior	
Basis	⋕ M. digastricus max. inf. ✳ Mm. depressor anguli oris, quadratus menti.
	⋕ M. masseter.
Corpus, äufsere Fläche	dieselben.
Jugum alv. d. incis. II	✳ M. incisivus inferior.
„ „ „ angularis	✳ M. levator menti.
Linea obliqua externa	✳ M. buccinator.
Foramen mentale	◎ N. mentalis, A. mentalis.
Innere Fläche des Corpus	⋕ M. pterygoideus internus.
Spina mentalis int.	✳ Mm. geniohyoideus, genioglossus.
Linea obliqua int.	Fascia buccopharyngea. ✳ Mm. mylohyoideus, mylopharyngeus.
Canalis maxillaris	◎ N. (Plexus) dentalis inferior, A. alveolaris inferior, N. mentalis.
Angulus max. inf.	⋕ Mm. masseter, pterygoideus internus, Lig. stylomaxillare.
Incisura semilunaris	◎ A. u. Vv. massetericae, N. massetericus.
Proc. coronoideus	⋕ M. temporalis.
Collum proc. condyl.	Lig. maxillare externum, Lig. capsul. artic. maxillaris.
Fovea proc. condyl.	⋕ M. pterygoideus externus.

For. maxillare post.	⋕ Lig. maxillare internum. — ◎ N. mandibularis, A. u. Vv. alveolaris inf.
Sulcus mylohyoideus	◎ N. mylohyoideus.
Os hyoides	
Basis	Fascia cervicalis. ✳ Vord. Bauch des M. digastricus max. inf. ⋕ Mm. mylohyoideus, geniohyoideus. ✳ M. baseoglossus. ⋕ Mm. sternohyoideus, omohyoideus, thyreohyoideus. — Lig. thyreohyoideum medium. ✳ Lig. hyoepiglotticum.
Cornu majus	⋕ M. thyreohyoideus. ✳ Mm. ceratoglossus, ceratopharyngeus. — Membr. thyreohyoidea, Lig. thyreohyoideum laterale.
Cornu minus	⋕ M. stylohyoideus, Lig. stylohyoideum. ✳ Mm. chondroglossus, chondropharyngeus.
Kehlkopf	
Cartilago thyreoidea	
Lamina, ob. Rand	Membrana thyreohyoidea.
Incisura thyr.	Lig. thyreohyoideum medium. ✳ Lig. thyreoepiglotticum.
Cornu superius	✳ M. thyreopharyngeus. — Lig. thyreohyoideum laterale.
äufsere Fläche	⋕ M. sternothyreoideus. ✳ Mm. thyreohyoideus, thyreopharyng.
unterer Rand	Lig. cricothyreoideum medium. ⋕ M. cricothyreoideus.
Cornu inferius	✳ M. cricopharyngeus. — Lig. cricothyreoideum laterale.
innere Fläche	✳ Mm. thyreoarytaenoideus, thyreoepiglotticus. ⋕ M. cricothyreoideus.
innerer Winkel	✳ Ligg. thyreoarytaenoideum sup. u. inf.

Cartilago cricoidea	
Arcus	Lig. cricothyreoideum laterale u. medium, Lig. thyreoarytaenoideum inferius. ✳ Mm. cricothyreoideus, cricoarytaenoideus lateralis.
Lamina	Lig. cricoarytaenoideum. ✳ M. cricoarytaenoideus posticus.
Cartilago arytaenoidea	
Basis	Lig. cricoarytaenoideum, Lig. thyreoarytaenoideum inferius. ⋕ M. cricoarytaenoideus posticus. ✳ M. arytaenoideus obliquus.
vorderer Rand	Ligg. thyreoarytaenoideum sup. u. inf..
äufsere Fläche	⋕ Mm. thyreoarytaenoideus, cricoarytaenoideus lateralis.
äufserer Rand	⋕ M. thyreoarytaenoideus. — M. arytaenoideus transversus.
hintere Fläche	M. arytaenoideus transversus.
Spitze	⋕ M. arytaenoideus obliquus. ✳ M. aryepiglotticus.
Epiglottis	
vordere Fläche	⋕ Lig. hyoepiglotticum.
Seitenwand	⋕ Mm. thyreoepiglotticus, aryepiglotticus.
Spitze	⋕ Lig. thyreoepiglotticum.

Wirbelsäule

Vertebrae colli

Atlas, Tuberculum ant.	⋕ M. longus colli. ✳ Lig. longitudinale anterius.
Arcus anterior	Lig. obturatorium anterius.
Massa lateralis	✳ M. rectus capitis ant. minor. — Lig. caps. artic. capitis, Lig. cruciatum.
Processus transvers.	
Tuberc. ant.	⋕ M. scalenus medius. ✳ Mm. rectus capitis ant. major, lateralis.

Tuberc. post.	✳ M. levator scapulae. ⫽ Mm. splenius colli, transversalis cervicis, obliquus capitis inferior. ✳ Mm. rectus cap. lateralis, obliquus capitis superior.
Arcus posterior	Lig. obturatorium posterius, Lig. intercrurale I.
Tuberculum post.	Lig. nuchae. ✳ Mm. cucullaris, rectus capitis post. minor.
ɔistroph., Proc. odont.	Ligg. suspensorium u. alaria dentis.
ɔrpora vert. colli II—V	⫽ M. longus colli.
II—VII	Lig. longitudinale anterius.
III—VII	Lig. longitudinale posterius.
II	Lig. cruciatum.
III	Apparatus ligamentosus vert. colli.
V—VII	✳ M. longus colli.
Arcus II—VII	Ligg. intercruralia.
ɔocessus transversi	Ligg. intertransversaria.
Tuberc. ant. I—VII	⫽ M. scalenus medius.
II—VII	✳ ⫽ M. intertransversarii colli anteriores.
III—VI	✳ Mm. rectus capitis ant. major, longus colli.
IV—VI	⫽ M. scalenus anterior.
V—VII	⫽ M. scalenus posticus.
VI—VII	⫽ M. longus colli.
VII	✳ Lig. colli costae I internum.
Tuberc. post. I—IV	✳ M. levator scapulae. ⫽ M. splenius colli.
I—V	⫽ M. transversalis cervicis.
III—VII	✳ M. trachelomastoideus, biventer et complexus, multifidus spinae.
VI—VII	✳ M. transversalis cervicis.
VII	⫽ M. sacrolumbalis. ✳ M. levator costae I.
II—VII	✳⫽ Mm. intertransversarii colli posteriores.
Canalis vertebralis	◎ A. vertebralis, V. vertebralis interna, Plexus gangliosus vertebralis.

Processus spinosi II - VII	Lig. nuchae. ✳ M. cucullaris.
II	✳ Mm. rectus capitis post. major, obliquus cap. inferior.
III — VII	✳ M. splenius capitis.
VI — VII	✳ Mm. rhomboideus, serratus posticus superior.
VII	✳ M. biventer cervicis.
II — VII	⋕ Mm. semispinalis colli, multifidus, ✳⋕ Mm. interspinales. — Ligg. interspinalia.
Processus obliqui	Ligg. capsularia.
For. intervertebralia	◎ Nn. cervicales, Rami spin. a. vertebralis, Rami vv. spinalium longitudinalium.

Vertebrae dorsi

Corpora I — XII	Lig. longitudinale anterius u. posterius, Ligg. capitulorum costarum anteriora.
I — III	✳ M. longus colli.
XII	✳ M. psoas major.
Arcus I — XII	Ligg. intercruralia.
Proc. transversi I — III	✳ M. trachelomastoideus.
I — IV	✳ M. transversalis cervicis.
I — VII	✳ M. biventer et complexus.
I — X	✳ M. semispinalis dorsi et colli.
I — XI	✳ Mm. levatores costarum.
I — XII	⋕ Fasciculi int. m. longissimi dorsi. ✳ M. multifidus spinae. — Ligg. costotransversaria post. u. intermedia. ✳⋕ Mm. intertransversarii. — Ligg. intertransv.
I — X	Lig. colli costae int. u. externum.
Proc spinosi I — XII	✳ M. cucullaris. — Lig. apicum.
III — XII	Lamina post. fasciae lumbodorsalis.
I — III	✳ M. splenius capitis.
III — IV	✳ M. splenius colli.
I — IV	✳ M. rhomboideus.
I — II	✳ M. serratus posticus superior.
I	✳ M. biventer cervicis.

I — V	⋕ M. semispinalis dorsi.
II — VIII	⋕ M. spinalis dorsi.
X — XII	✳ M. spinalis dorsi.
I — XII	⋕ M. multifidus spinae. ⋕ ✳ Mm. interspinales dorsi. — Ligg. inspinalia.
Proc. obliqui	Ligg. capsularia.
For. intervertebralia	◎ Nn. dorsales, Rami spin. am. intercostalium supremae et posteriorum, Rami vv. spin. longitudinalium.
Vertebrae lumborum	
Corpora. I	✳ Crus externum diaphragmatis, M. psoas minor.
II	✳ Crus medium diaphragmatis.
III — IV	✳ Crus internum diaphragmatis.
I — V	Fascia transversalis. ✳ M. psoas major — Lig. longitudinale ant. u. post.
Arcus	Ligg. intercruralia.
Proc. transversi I	Arcus tendineus fasciae lumbodorsalis ✳ Crus externum diaphragmatis.
I — IV	⋕ M. quadratus lumborum.
I — V	✳ Mm. psoas major, quadratus lumborum. — Lamina ant. fasciae lumbodorsalis. ✳ Mm. sacrospinalis, multifidus spinae. ✳⋕ Mm. intertransversarii lumborum. — Ligg. intertransversaria.
V	✳ M. iliacus internus. ✳ Lig. iliolumbale.
Proc. spinosi I — V	Lamina post. fasciae lumbodorsalis, Lig. apicum. ⋕ M. multifidus spinae. ✳⋕ Mm. interspinales lumborum. Lig. interspinalia.
I — III	✳ M. spinalis dorsi.
Proc. obliqui	Ligg. capsularia vertebrarum.

For. intervertebralia	◎ Nn. lumbares, Rami spin. an lumbarium, Rami vv. spinalium longitudinalium.
Os sacrum	
Obere Fläche	Lig. iliolumbale, Ligg. sacroiliaca anteriora.
Proc. obliquus I	Lig. capsulare.
Apert. sup. can. sacr.	Lig. intercrurale lumbare V, Lig longitudinale posterius.
Vorderfläche	Fascia pelvis. ✳ M. pyriformis. — Ligg. sacroiliaca anteriora, Lig sacrococcygeum anterius.
For. sacralia anter.	◎ Rami ant. nervorum sacralium I — IV, Rami spin. am. sacralium lat. u. mediae, Rami vv spin. longitudinalium.
Incisura sacrococcygea	◎ Ramus ant. n. sacralis V.
Seitenrand	Ligg. sacrotuberosum, sacrospinosum, sacrococcygeum laterale.
Hinterfläche	Lamina post. fasciae lumbodorsalis Fascia lata. ✳ Mm. gluteus maximus, sacrospinalis, multifidus intertransversarius lumb. V. — Ligg. sacroiliaca posteriora Ligg. iliosacra postica longum et breve.
Cornu sacrale	Lig. sacrococcygeum posterius.
For. sacralia post.	◎ Rami post. nm. sacralium I—IV.
Apert. inf. can. sacr.	◎ N. sacralis V, N. coccygeus.
Os coccygis	
Vorderfläche	Fascia pelvis, Lig. sacrococcygeum anterius.
Seitenrand	⋕ M. coccygeus. — Ligg. sacrotuberosum, sacrospinosum, sacrococcygeum laterale.
Cornu coccygeum	Lig. sacrococcygeum posterius.
Spitze	Fascia perinaei, M. sphincter ani externus.

Thorax

Costae

Capitulum I—X	Lig. capituli costae anterius.
II—X	Lig. capituli costae intermedium.
Collum I—X	Lig. costotransversarium intermed.
I—XI	Lig. colli costae internum.
II—X	Lig. colli costae externum.
Tuberculum I—XII	Lig. costotransversarium posterius.
Angulus III—XII	Lamina post. fasciae lumbodorsalis.
Sulcus costalis I—XII	Ramus infracostalis am. intercostalium supremae et posteriorum.
iintere Extremität I-XII	⋕ Fasciculi ext. m. sacrolumbalis, Mm. levatores costarum. ✳⋕ Mm. intercostales externi.
I—V	✳ M. cervicalis adscendens.
II—V	⋕ M. serratus posticus superior.
III—XII	⋕ Fasciculi ext. m. longissimi dorsi.
VI—XII	✳ Fasciculi int. m. sacrolumbalis.
XII	⋕ M. quadratus lumborum.
Mittelstück I	✳ M. scalenus medius.
II	✳ M. scalenus posticus.
I—XII	✳⋕ Mm. intercostales externi u. interni.
IX—XII	⋕ M. serratus posticus inferior.
XII	⋕ M. sacrolumbalis. — Arcus tendineus fasciae lumbodorsalis.
ordere Extrem. I—XII	✳⋕ Mm. intercostales externi u. interni.
I—IX	✳ M. serratus anterior major.
III—V	✳ M. pectoralis minor.
V—XII	✳ M. obliquus externus abdominis.
X—XII	✳ M. latissimus dorsi. ⋕ M. obliquus internus abdominis.
Rippenknorpel I—XII	✳⋕ Mm. intercostales interni, externi (III—X Ligg. coruscantia).
I	⋕ M. subclavius. ✳ M. sternothyreoideus. — Lig. rhomboides claviculae.

II — VII	✳ M. pectoralis major. — Ligg. sternocostalia radiata.
II — V	Ligg. sternocostalia interarticularia.
III — VI	# M. triangularis sterni.
V — VII — VIII	✳ M. rectus abdominis.
VI — XII	✳ M. transversus abdominis.
VII	Lig. costoxiphoideum.
VII — XII	✳ Pars costalis diaphragmatis.
IX — X	# Aponeurosis m. obliqui int. abdominis.
Sternum	
Manubrium	✳ Mm. pectoralis major, sternocleidomastoideus. — Lig. sternoclaviculare, Fascia cervicalis. ✳ Mm. sternohyoideus, sternothyreoideus.
Incisura semilunaris	Lig. interclaviculare.
Corpus	✳ Mm. pectoralis major, triangularis sterni.
Incis. costales II — VI	Ligg. sternocostalia.
Cartil. xiphoides	Linea alba. — ✳ M. rectus abdominis. — Lig. costoxiphoideum. ✳ Mm. triangularis sterni, Pars sternalis diaphragmatis.
Obere Öffnung des Thorax	◎ Mm. sternohyoidei, sternothyreoidei, Vv. anonymae, mammariae internae, Nn. phrenici, Aa. mammariae int., Nn. vagi, Aa. subclaviae, carotides communes, V. thyreoidea ima, Trachea, Truncus lymph. bronchiomediastinus dexter, Truncus lymph. sinister, Vv. vertebrales communes, Nn. recurrentes, cardiaci, Oesophagus, Ganglia cerv. inferiora nm. sympath., Aa. intercostales supremae, Mm. longi colli.

Obere Extremität	
Clavicula	
Extrem. sternalis	✳ Mm. sternocleidomastoideus, pectoralis major. — Ligg. sternoclaviculare, interclaviculare.
Tuberositas	Lig. rhomboides claviculae.
Corpus	✳ Mm. pectoralis major, subclav.
Extr. acromialis	✳ M. deltoides. — Ligg. acromioclaviculare, coracoclaviculare.
Scapula	
Basis	⋕ Mm. rhomboideus, serratus anterior major.
Margo anterior	
Labium ant.	✳ Caput longum m. tricipitis, M. subscapularis.
Labium post.	✳ Mm. teres minor, teres major.
Margo superior	✳ M. omohyoideus. — Lig. transversum scapulae.
Incisura scapul.	◎ A. u. V. transversa scapulae.
Angulus superior	⋕ M. levator scapulae.
Angulus inferior	✳ M. teres major. ⋕ M. serratus anterior major.
Superficies ant.	✳ M. subscapularis.
Spina scapulae	
Labium sup.	⋕ M. cucullaris.
Labium inf.	✳ M. deltoides.
Acromion	⋕ M. cucullaris. M. deltoides. — Lig. acromioclaviculare, coracoacromiale.
Fossa supraspin.	✳ M. supraspinatus.
Fossa infraspin.	✳ Mm. infraspinatus, teres minor.
Cavitas glenoidea	✳ Caput longum m. bicipitis brachii.
Collum scapulae	Lig. capsul. articulationis humeri.
Proc. coracoideus	⋕ M. pectoralis minor. ✳ Mm. coracocervicalis, coracobrachialis, Caput breve m. bicipitis. — Ligg. accessorium artic. humeri, coracoclaviculare, — acromiale.

Os brachii	
Collum	Lig. capsulare articulationis humeri.
Tuberculum majus	# Mm. supraspinatus, infraspinatus, teres minor.
Tuberculum minus	# M. subscapularis.
Spina tub. majoris	# M. pectoralis major.
Spina tub. minoris	# Mm. coracobrachialis, teres major, latissimus dorsi.
Sulcus intertubercularis	◎ Caput longum m. bicipitis.
Corpus, Äufsere Fläche	✳ Caput externum u. internum m. tricipitis.
Innere Fläche	# M. deltoides. ✳ M. brachialis internus, (✳ Caput accessorium m. bicipitis).
Äusferer Winkel	# M. deltoides. ✳ Caput externum m. tricipitis, Mm. brachialis internus, supinator longus, extensor carpi radialis longus. — Lig. intermusculare externum.
Innerer Winkel	✳ Caput internum m. tricipitis, M. brachialis internus. — Lig. intermusculare internum.
Vorderer Winkel	# M. deltoides. ✳ M. brachialis internus.
Condylus externus	✳ Mm. extensor carpi radialis brevis, extens. digitorum communis u. digiti minimi proprius, extens. carpi ulnaris, Caput internum m. tricipitis, M. anconaeus, M. supinator brevis, Lig. laterale ext. artic. cubiti.
Condylus internus	✳ Mm. palmaris longus, pronator rotundus, flexores carpi radialis, digitorum communis sublimis, carpi ulnaris, Lig. laterale int. artic. cubiti.
Proc. cubitalis	Lig. capsulare articulationis cubiti.
Ulna	
Olecranon	# M. triceps brachii. ✳ M. flexor carpi ulnaris.

Proc. coronoideus	⋕ M. brachialis internus. ✳ Mm. flexores digit. comm. sublimis u. profundus, flexor pollicis longus.
Tuberositas	⋕ M. brachialis internus. — Lig. cubito-radiale teres.
Incis. semilun. major	Lig. capsul. u. laterale internum artic. cubiti.
Incis. semilun. minor	Lig. annulare radii.
Hintere Fläche	⋕ M. triceps brachii. ✳ M. pronator quadratus.
Äufserer Winkel	⋕ Mm. triceps brachii, anconaeus.
Äufsere Fläche	⋕ M. anconaeus. ✳ Mm. extensores pollicis longus, indicis proprius.
Crista ulnae	✳ Mm. abductor pollicis longus, extensores pollicis longus u. brevis, indicis proprius. — Lig. interosseum antibrachii.
Innere Fläche	✳ M. flexor digitorum communis profundus.
Innerer Winkel	✳ Mm. flexor carpi ulnaris, flexor digit. communis profundus, pronator quadratus.
Capitulum	Lig. carpi dorsale, Lig. capsul. cubito-radiale inferius.
Proc. styloideus	Ligg. carpi dorsale, capsul. u. laterale ulnare artic. carpi.
Radius	
Tuberositas	⋕ Tendo m. bicipitis, M. supinator brev. — Lig. cubitorad. teres.
Vordere Fläche	⋕ Mm. pronator rotundus, supinator brevis.
Innerer Winkel	✳ M. flexor pollicis longus. ⋕ Mm. pronator quadratus, supinator longus. — Lig. carpi dorsale.
Innere Fläche	✳ Mm. flexor digit. communis sublimis, flexor pollicis longus. ⋕ Mm. supinator brevis, pronator quadratus.

Crista	Lig. interosseum antibrachii.
Äufsere Fläche	✳ Mm. extensor digitorum communis, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis.
Eminentiae radii	Lig. carpi dorsale.
Cavitas glenoidea	Ligg. accessorium obliquum, rhomboides u. capsulare artic. carpi.
Proc. styloideus	Lig. carpi dorsale, Ligg. accessorium obliquum u. laterale radiale artic. carpi.
Ossa carpi	Ligg. ossium carpi dorsalia, volaria, interossea, Ligg. ossium carpi et metacarpi.
Os naviculare	Ligg. accessorium obliquum, laterale radiale u. capsulare artic. carpi.
Tuberositas	Lig. carpi volare proprium. ✳ Caput externum m. flexoris pollicis brevis.
Os lunatum	Ligg. accessorium obliquum, access. rectum, rhomboides u. capsulare artic. carpi.
Os triquetrum	Lig. carpi dorsale, Ligg. accessorium obliquum, access. rectum, rhomboides, laterale ulnare u. capsulare artic. carpi.
Os pisiforme	⋕ M. flexor carpi ulnaris. ✳ M. abductor digiti minimi. — Ligg. carpi volare proprium, carpi dorsale, pisometacarpeum, pisouncinata.
Os multangulum majus	⋕ M. abductor pollicis longus. ✳ M. abductor indicis (inteross. dors. I).
Tuberositas	✳ Mm. abductor pollicis brevis, opponens pollicis. — Lig. carpi volare proprium.
Sulcus	⊛ Tendo m. flexoris carpi radialis.
Os multangulum minus	✳ Caput internum m. flexoris pollicis brevis.

Os capitatum	✳ Caput int. m. flexoris pollicis brevis, M. adductor pollicis.
Os hamatum	✳ Caput int. m. flexoris pollicis brevis.
Uncus	✳ Mm. flexor brevis u. adductor digiti minimi. — Lig. carpi volare proprium, Ligg. piso-uncinata.
ig. carpi volare propr.	✳ Mm. abductor pollicis brevis, opponens pollicis, Caput ext. m. flexoris poll. brevis: Mm. abductor, flexor brevis u. adductor digiti minimi. ◎ Tendines mm. flexorum dig. com. sublimis u. profundi, flexoris pollicis longi, N. medianus.
Lig. carpi dorsale	◎ Tendines mm. abductoris poll. longi u. extensoris poll. brevis, extens. pollicis longi, extensoris carpi radialis longi u. brevis, extensoris indicis propr. u. digit. communis, extens. digiti minimi proprii, extensoris carpi ulnaris.
Ossa metacarpi	
Bases	Ligg. carpi et metacarpi, Ligg. baseos metacarpi.
Capitula II—V	Ligg. capitulorum oss. metacarpi, Ligg. capsularia.
O. met. pollicis	∦ M. abductor pollicis longus, ✳ M. abductor indicis (inteross. dors. I) ∦ M. opponens pollicis.
O. metac. II	∦ M. extensor carpi radialis longus, flexor carpi radialis. ✳ Mm. interossei dorsales I. II, volaris I.
O. metac. III	∦ M. extensor carpi radialis brevis. ✳ Mm. adductor pollicis, interossei dorsales II. III, volaris I.

O. metac. IV	✳ Mm. interossei dorsales III. IV., volaris II.
O. metac. V	♯ Lig. pisometacarpeum (M. flexor carpi ulnaris), M. adductor digiti minimi. ✳ Mm. interossei dorsalis IV, volaris III.
Tuberositas	♯ M. extensor carpi ulnaris.
Phalanges dig. manus	
Mittelstücke	Ligg. vaginalia u. cruciata vaginarum tendinum.
Enden	Ligg. annularia vaginarum tendinum, transversa volaria, lateralia, capsularia.
Phal. pollicis I	♯ Mm. extensores pollicis brevis u. longus, abductor poll. brevis, flexor poll. brevis, adductor pollicis.
„ „ II	♯ Mm. extensor pollicis longus, flexor pollicis longus.
Digitorum II—V	
Phal. I	♯ Aponeuroses m. extensoris digitorum communis et mm. lumbricalium.
„ II	♯ Crura media tendinum m. extensoris digit. communis, M. flexor dig. communis sublimis.
„ III	♯ Crura lateralia tendinum m. flexoris dig. communis, M. flexor dig. communis profundus.
Phal. I dig. indicis	♯ Mm. interosseus dorsalis I (abductor indicis), inteross. volaris I.
„ „ „ medii	♯ Mm. interossei dorsales II, III.
„ „ „ annul.	♯ Mm. interosseus dors. IV, inteross. volaris II.
„ „ „ minimi	♯ Mm. abductor u. flexor brevis dig. minimi, interosseus volaris III.

)ssa sesamoidea pollicis externum	M. abductor pollicis brevis, Caput externum m. flexoris poll. brevis.
internum	Caput int. m. flexoris poll. brevis, M. adductor pollicis.
phalangis II	M. flexor pollicis longus.
Untere Extremität	
Os coxae	
Supercil. acetabuli	✳ M. rectus femoris, Lig. capsul. artic. coxae. — Labrum cartilaginum u. Lig. transversum acetabuli.
Incisura acet.	◎ A. acetabuli.
Fossa acetabuli	✳ Lig. teres acetabuli.
Os ilium	
Äufsere Fläche	✳ Mm. gluteus medius u. minimus.
Linea arcuata ext.	✳ M. gluteus minimus.
Innere Fläche	✳ M. iliacus internus. — Ligg. sacroiliaca anteriora.
Linea arcuata int.	Fascia iliaca, Fascia pelvis.
Tuberositas	Ligg. sacroiliaca posteriora.
Crista oss. ilium	✳ M. sacrospinalis. — Lig. iliolumbale.
Labium ext.	Lamina post. fasciae lumbodorsalis. ⧺ M. obliquus externus abdominis. — Fascia lata. ✳ Mm. gluteus medius u. maximus.
Lin. intermed.	✳ M. obliquus internus abdominis.
Labium int.	✳ M. transversus abdominis. — Fascia iliaca. ✳ M. iliacus internus.
Spina anterior sup.	Arcus cruralis. ✳ Mm. obliquus internus u. transversus abdominis, iliacus internus, sartorius, tensor fasciae latae, gluteus medius.
Spina anterior inf.	✳ Mm. iliacus internus, rectus femoris.

Spina posterior sup.	Ligg. sacrotuberosum, iliosacrum posticum longum.
Spina posterior inf.	Ligg. sacrotuberosum, iliosacrum posticum breve.
Margo incis. isch. sup.	✳ M. pyriformis.
Os ischii	
Spina	✳ M. gemellus superior. — Lig. sacrospinosum. ✳ M. coccygeus. — Arcus tendineus fasciae pelvis. ✳ M. levator ani.
Tuber	Fascia lata. ✳ Mm. semitendinosus, semimembranosus, Caput longum m. bicipitis, Mm. adductor magnus, gemellus inferior, quadratus femoris. — Lig. sacrotuberosum, Fascia perinaei. ✳ Mm. transversus perinaei, ischiocavernosus.
Ramus adscendens	Fascia lata. ✳ M. adductor magnus. — Lig. sacrotuberosum, falciforme. Fascia perinaei. ✳ Mm. transversus perinaei, ischiocavernosus.
Incis. ischiadica superior	◎ A. u. Vv. gluteae, N. gluteus superior, M. pyriformis, A. u. Vv. ischiadicae, N. gluteus inferior, N. ischiadicus, N. cutaneus femoris posterior, A. u. Vv. pudendae communes, N. pudendus, N. haemorrhoidalis inf.
Incis. ischiadica inf.	◎ M. obturator internus, A. u. Vv. pudendae communes, N. pudendus, N. haemorrhoidalis infer.
Os pubis	
Tubercul. iliopectineum	Lig. iliopectineum.
Ramus horizontalis	Fascia recta abdominis, # Crus ext. m. recti abdominis. — Lig. arcuatum superius. ✳ Mm. gracilis, adductor longus u. bre-

	vis. — Fascia iliaca, Fascia pelvis, Lig. puboprostaticum (pubovesicale) laterale.
Tuberculum pubis	⋕ Arcus cruralis. — Fascia lata.
Crista pubis	Lig. cristae pubis. ⋕ Arcus cruralis, Fascia iliaca, Portio pectinea fasciae latae, Lig. Gimbernati. ✳ M. pectineus.
Symphysis pubis	Linea alba, Lig. triangulare lineae albae, Fascia recta abdominis. ✳ M. pyramidalis. — Lig. suspensorium penis. ⋕ Crus internum annuli inguinalis externi, Crus ext. u. int. m. recti abdominis.
Ramus descendens	Fascia lata. ✳ Mm. gracilis, adductor magnus. — Fascia perinaei. ✳ M. levator ani. — Lig. puboprostaticum (pubovesicale) medium, Lig. arcuatum inferius.
Foramen obturatum Ränder	✳ Mm. obturator externus u. internus. — Lig. obturatorium. ◎ Canalis obturatorius fasciae pelvis, A. u. Vv. obturatoriae, N. obturatorius.
Os femoris	
Fovea capitis	⋕ Lig. teres acetabuli.
Collum, Hinterfläche	⋕ Lig. capsul. artic. coxae.
Trochanter major	⋕ Mm. gluteus maximus, medius, minimus. ✳ M. vastus extern.
Fossa trochanterica	⋕ Mm. pyriformis, gemelli, obturatores.
Trochanter minor	⋕ Mm. psoas major, iliacus intern.
Linea intertroch. ant.	⋕ Lig. capsul. artic. coxae. ✳ M. cruralis.
Lin. intertroch. post.	⋕ M. quadratus femoris.
Vordere Fläche	✳ Mm. cruralis, subcruralis.

Innere Fläche	✳ Mm. vastus internus, cruralis.
Äufsere Fläche	✳ Mm. vastus externus, cruralis.
Linea aspera, Labium int.	Fascia lata. ✳ M. vastus internus. ╫ Mm. pectineus, adductor longus, brevis, magnus. ✳ M. gastrocnemius internus.
Labium ext.	Fascia lata. ╫ M. gluteus maximus. ✳ M. vastus externus, Caput breve m. bicipitis, gastrocnemius externus.
Condylus internus	╫ M. adductor magnus. ✳ M. gastrocnemius internus, Lig. laterale genu internum. — Lig. capsulare genu. ╫ Lig. cruciatum posterius genu.
Condylus externus	✳ Mm. gastrocnemius externus, plantaris, popliteus, Lig. laterale genu externum. — Lig. capsulare genu, Lig. popliteum. ╫ Lig. cruciatum anterius genu.
Tibia	
Condylus internus	╫ M. semimembranosus, Lig. laterale internum genu. Lig. popliteum, capsulare genu.
Condylus externus	✳ Mm. tibialis anterior, extensor dig. comm. longus. — Lig. capsulare genu, Lig. capituli fibulae.
Emin. intercondyloid.	✳ Ligg. cruciata genu. — Fibrocartilagines falciformes.
Tuberositas	╫ Lig. patellae (Mm. rectus femoris, cruralis, vasti).
Innere Fläche	╫ Mm. sartorius, gracilis, semitendinosus.
Innerer Winkel	╫ M. semimembranosus, popliteus. ✳ M. soleus.
Crista tibiae	Fascia cruralis, Lig. transversum.
Äufsere Fläche	✳ M. tibialis anterior.
Äufserer Winkel	✳ M. flexor digit. communis longus. — Lig. interosseum cruris.

Hintere Fläche	⋕ M. popliteus. ✳ Mm. soleus, flexor dig. communis longus, tibialis posticus.
Untere Extremität	Ligg. malleoli externi anterius u. posterius.
Incisura peronaea	Lig. malleoli externi superius.
Malleolus internus	Ligg. cruciatum tarsi, laciniatum, deltoides artic. pedis.
Sulcus malleoli int.	◎ Tendo m. tibialis postici.
Vaginae lig. laciniati	◎ Sehnen der Mm. tibialis posticus, flexor dig. comm. longus, flexor hallucis longus.
Vaginae lig. cruciati	◎ Sehnen der Mm. tibialis anterior, extensor hallucis longus, A. u. Vv. dorsales pedis, N. peronaeus profundus, Sehnen des M. extensor dig. com. longus u. peronaeus tertius.
Patella	
Vorderfläche	⋕ M. rectus femoris.
Ränder	⋕ Mm. rectus femoris, vasti, cruralis. — Lig. capsulare genu.
Apex	✳ Lig. patellae.
Fibula	
Capitulum	⋕ M. biceps femoris, ✳ Mm. extensor digit. comm. longus, peronaeus longus, soleus. ⋕ Lig. laterale externum genu. — Lig. capituli fibulae.
Crista	Fascia cruralis, Lig. transversum. ✳ Mm. extensor dig. comm. longus u. peronaeus tertius, peronaeus longus u. brevis.
Innere Fläche	✳ M. extensor hallucis longus.
Innerer Winkel	✳ M. tibialis posticus. — Lig. interosseum cruris.
Äufsere Fläche	✳ Mm. peronaeus longus u. brevis.
Äufserer Winkel	✳ Mm. peronaeus longus, soleus, flexor hallucis longus.

Hintere Fläche	✳ Mm. soleus, flexor hallucis long.
Malleolus externus	Lig. cruciatum tarsi, Retinaculum tendinum peronaeorum, Ligg. malleoli externi superius, ant. u. posterius, Lig. tali fibulare anterius.
Fovea mall. ext.	Lig. tali fibulare posterius.
Apex	Lig. triquetrum artic. pedis.
Vaginae retinaculi	◎ Sehnen d. Mm. peronaei longus u. brevis.
Ossa tarsi	Ligg. talocalcanea, talonavicularia, calcaneonavicularia, calcaneocuboidea, cubonavicularia, cuneonavicularia, cuneocuboidea, ossium cuneiformium, tarsometatarsea.
Talus	
Collum	Lig. tali fibulare anterius.
Tuberculum	Lig. tali fibulare posterius.
Incisura	◎ Sehne d. M. flexor hallucis longus.
Seitenfläche	Lig. deltoides artic. pedis.
Sulcus (Sinus tarsi)	Ligg talocalcanea interossea.
Calcaneus	
Tuberositas	⋕ Tendo Achillis (Mm. gastrocnem. u. soleus). — Fascia plantaris. ✳ Mm. flexor digitorum brevis, abductor hallucis, abductor dig. minimi.
Untere Fläche	✳ M. quadratus plantae. — Lig. calcaneocuboideum plantare.
Innere Fläche	Lig. laciniatum. ✳ M. abductor hallucis.
Proc. lateral.	Lig. deltoides artic. pedis.
Äufsere Fläche	Lig. cruciatum tarsi. ✳ M. extensor digitorum brevis. — Retinaculum tendinum peronaeorum, Lig. triquetrum artic. pedis.
Obere Fläche	✳ M. extensor digitorum brevis.
Sulcus	Ligg. talocalcanea interossea.
Os naviculare	Lig. cruciatum tarsi.

Tuberositas	✳ M. abductor hallucis. ⋕ M. tibialis posticus.
***Os cuneiforme* I**	Lig. cruciatum tarsi. ✳ M. abductor hallucis. ⋕ Mm. tibialis anterior, peronaeus longus, tibialis posticus.
Os cuneiforme II, III	✳ M. flexor hallucis brevis. ⋕ M. tibialis posticus.
Os cuboideum	
Plantarfläche	⋕ Mm. peronaeus longus, tibialis posticus.
Tuberositas	Lig. calcaneocuboideum plantare.
Sulcus	◎ Sehne d. M. peronaeus longus.
Lig. calcaneocuboid. plant.	✳ Mm. quadratus plantae, flexor hallucis brevis, adductor hallucis, flexor dig. minimi brevis.
Ossa metat arsi	
Basis I—V	Ligg. tarsometatarsea, baseos metatarsi dorsalia.
„ II—V	Ligg. baseos metatarsi plantaria.
Capit. I—V	Ligg. capitulorum oss. metatarsi.
Os metat. hallucis	⋕ Mm. tibialis anterior, abductor hallucis, peronaeus longus. ✳ M. interosseus dorsalis I.
Os metatarsi II	⋕ M. peronaeus longus. ✳ Mm. interossei dorsales I u. II.
Os metat. III	⋕ M. peronaeus longus. ✳ Mm. transversalis plantae, interossei dorsales II. III., interosseus plantaris I. — Lig. calcaneocuboideum plantare.
Os metat. IV	✳ M. transversalis plantae, Mm. interossei dorsales III., IV, interosseus plantaris II. — Lig. calcaneocuboideum plantare.
Os metat. V	⋕ M. peronaeus tertius. ✳ Mm. flexor brevis dig. minimi, transversalis plantae, interosseus dorsalis IV, inteross. plantaris III.

Tuberositas	# Mm. peronaeus brevis, abductor dig. minimi.
Phalanges digit. pedis	Ligg. vaginalia, annularia, lateralia, transversa plantaria, capsul.
hallucis I	# M. extensor hallucis brevis, Aponeurosis m. extensoris hall. longi, Mm. abductor, flexor brevis u. adductor hallucis, transversalis plantae.
II	# M. extensor hallucis longus.
dig. II—V, Phal. I	# Aponeuroses mm. extensorum dig. com. longi u. brevis u. mm. lumbricalium.
Phal. II	# Crura media m. extensoris dig. com. longi, M. flexor dig. com. brevis.
Phal. III	# Crura lateralia m. extensoris dig. com. longi, M. flexor dig. com. longus.
Phal. I digiti II	# Mm. interossei dorsales I. II.
„ „ „ III	# Mm. interosseus dorsalis III, inteross. plantaris I.
„ „ „ IV	# M. interosseus dorsalis IV, interosseus plantaris II.
„ „ „ V	# Mm. abductor u. flexor brevis digiti minimi, interosseus plantaris III.
Phal. III digiti II	# M. flexor hallucis longus.
Ossa sesamoidea	
capitis tali	M. tibialis posticus.
oss. cuneiformis I	M. tibialis anterior.
oss. cuboidei	M. peronaeus longus.
hallucis internum	Mm. abductor u. flexor brevis hallucis.
externum	Mm. flexor brevis u. adductor hallucis, transversalis plantae.
„ phal. II	M. flexor longus hallucis.

Register

der lateinischen und latinisirten Benennungen.

	Seite
Abductio	272
Acervulus cerebri	871
Acetabulum	181
Acini	90
" hepatis	513
" mammae	586
" Malpighii	524
Acromion	166
Adductio	212
Adeps	14
Aditus ad aquaed. Sylvii	873
" ad infundibulum	873
Admiculum lineae albae	267
Alae inferiores	111
" laterales	110
" lobuli centralis	843
" magnae	110
" nasi, narium	428
" palatinae	111
" pterygoideae	111
" superiores	110
" vespertilionis	563
" vomeris	130
Alveoli	124. 130
Alveus communis	388
Amphiarthrosis	47
Ampullae osseae	387
" tubulor. semic.	388
Amygdalae	438
Anastomosis	18
Anastomoses arteriarum	727—737
Anastomosis Jacobsonii	977
Anguli costarum	159
" frontalis	119
" mastoideus	120
" maxillae inf.	131
" occipitalis	119
" oris	433
" ossium pubis	188
" sphenoidalis	120
Animalcula spermatica	553
Annulus abdominalis	272
" cartilaginei trach.	468
" conjunctivae	406
" cruralis	288
" inguinalis ant., ext.	272
" " post., int.	276
" iridis	410
Ansae	37
" cervicales	928
" lumbares	947
" sacrales	947
" subclavialis	964
" Vieussenii	964
Antagonistae musculi	63
Anthelix	375
Antitragus	376
Antrum Highmori	123
" pylori	487
Anus	97. 501
Aorta	648
Apertura aquaed. cochleae	116
" aquaed. vestibuli	117
" canalis chordae	381
" " inguinalis s. Annuli ing.	
" int. can. crural. s. Annulus cruralis	
" pelvis inferior	187
" " superior	186
" pyriformis	139. 141
" spinalis	145
" scalae vestibuli	386
Apex cordis	635
" malleoli	197
" nasi	428
" patellae	196
Aponeuroses	54
" cruris	288
" m. bicipitis	250. 255
" mm. obliq. abdom.	271. 273
" m. transversi abdom.	275

	Seite
Aponeurosis palmaris	251
" plantaris	289
" temporalis	220
" volaris	251
Apophysis	44
Apparatus ligamentosus	154
Appendices epiploicae	503
" vermiformis	500
Aquaeductus cochleae	393
" Cotunnii	393
" Fallopii	393
" Sylvii	840
" vestibuli	393
Aquula labyrinthi, Cotunnii	388
" vitrea auditiva	388
Arbor medullaris cerebelli	844
" " vermis	847
" vitae	844
" " uteri	565
Arcus aortae	648
Varietäten	739
" atlantis ant, post.	147
" carpi dorsalis	687
" cart. cricoideae	457
" cruralis	271
" dentales	435
" glossopalatinus	438
" ossium pubis	188
" palati	438
" palatopharyngeus	438
" pharyngopalatinus	438
" plantaris profundus	725
" superciliaris	117
" superficialis volae	688
" tarseus	665
" tendin. fasc. lumbodors.	233
" tendin. fasciae pelvis	574
" tonsillaris	902
" venosi volares	774
" vertebrales	145
" volaris subl., prof.	688
" zygomaticus	128
Area Martegiani	417
Areola mammae	586
Arteriae	16. 20
" abdominalis externa	711
" " Halleri	735
" " subcutanea	712
" acetabuli	703
" acromialis	677
" alveolaris inferior	659
" " superior	661
" angularis	656
" anonyma	650
Varietäten	741

	Seite
Arteriae	
" antibrachii	681
Varietäten	747
" aorta descendens	648
Varietäten	739
" aorta desc. abdom.	649. 693
Varietäten	749
" aorta desc. thorac.	649. 691
Varietäten	749
" articul. genu access.	718
" " " inf. ext., int.	718
" " " media	717
" " " superfic.	715
" " " super. ext., int.	716. 771
" " " suprema	715
" aspera	467
" auditiva interna	670
" auriculares ant. inf.	658
" auricularis ant. sup.	658
" " posterior	657
" " profunda	659
" axillaris	676
Varietäten	745
" basilaris	669
" brachialis	679
Varietäten	746
" bronchiales	475
" bronchialis ant., sup.	671
" " post., inf.	691
" buccalis	660
" buccinatoria	660
" bulbourethralis	707
" capsularis	417
" carotis cerebralis	662
" " communis	651
" " externa	652
" " facialis	652
" " interna	662
Varietäten	742
" centralis retinae	416. 663
" cerebelli inf., sup.	670
" cerebralis anterior	666
" media	666
" " posterior	670
" cervicalis adscendens	673
" " profunda	675
" superficialis	673
" choroidea	666
" ciliares	664
" " ant. u. post. long.	411
" " post. breves	409
" circumflexae femoris	713. 714
" " humeri	679
" " ilium	711
" " scapulae	679

Arteriae	Seite
" clitoridea	707
" coeliaca	694
" colicae	697. 698
" colica sinistra sup.	750
" collateralis magna	680. 681
" " media	681
" " radialis	680
" " ulnaris sup., inf.	681
" communicans anterior	666
" " posterior	665
" coronariae cordis	650
" " labiorum	655
" " ventr. dextra	695
" " " sinistra	694
" corporis callosi	666
" " cavernos. urethrae	707
" cricothyreoidea	653
" cristae pubis	710
" cruralis	708
" cruris	719
" cystica	695
" deferentialis	704
" dentalis inferior	659
" dentalis superior	661
" diaphragmatica sup.	671
" digitales com. manus	688
" " " pedis	725
" " dors., volar. manus	689. 690
" " dorsales pedis	721. 726
" " plantares	725. 726
" digiti minimi	686
" dorsalis clitoridis	707
" " hallucis	721
" " linguae	654
" " nasi	665
" " pedis	719
" " penis	707
" " scapulae	675. 676
" duodenalis inferior	696
" emulgentes	698
" epigastrica inf., int.	709
Varietäten	753
" " superficialis	712
" " superior	672
" ethmoidales, ethmoideae	664
" facialis anterior	654
" " profunda	659
" " transversa	658
" femoralis	711
Varietäten	754
" " communis	712
" " profunda	713
" " superficialis	712
" fibularis	723

Arteriae	Seite
" fossae Sylvii	666
" frontalis	665
" gastricae breves	696
" " inferior dextra	695
" " " sinistra	696
" " super. dextra	695
" " " sinistra	694
" gastrocnemicae	718
" gastroduodenalis	695
" gastroepiploica dextra	695
" " sinistra	696
" gemellae surae	718
" glutea sup.	703
" " inferior	704
" haemorrhoidales ext.	706
" " inferiores	706
" " interna	698
" " media	705
" " superior	698
" helicinae	550
" hepatica	694. 511
" hypogastrica	701
Varietäten	751
" jejunales	696
" ileae	696
" ileocolica	697
" iliaca communis	701
" " externa	708
" " interna	701
" " posterior	703
" " primitiva	701
" iliolumbalis	702
" indicis	683
" infraorbitalis	661
" infrascapularis	678
" intercostales ant.	672
" " aorticae	691
" " inferiores	691
" " posteriores	691
" " prima	674
" " secunda	675
" " suprema	674
" interosseae antibrachii comm., ext., int.	685
" " dorsalis I	721
" " dorsales metacarpi	687
" " " metatarsi	721
" " perforans inferior	685
" " " superior	685
" " plantares	725
" " recurrens	685
" " volares	689
" intestinales	696
" ischiadica	704
" labiales oris	655

Seite

Arteriae
" labiales pud. ant. 713
" " pud. post. 706
" lacrymalis 663
" laryngea inferior 673
" " superior 652
" lienalis 695. 519
" lingualis 653
" lumbares 699
" lumbaris quinta 700
" malleolares anteriores 720
" " posteriores 723. 724
" mammariae ext. 672. 678
" mammaria interna 671
" manus 681
Varietäten 747
" masseterica 660
" maxillaris externa 654
" " inferior 659
" " interna 659
" mediastinae anteriores 671
" " poster. 691
" meningea anterior 664
" " media 660
" " post. ext. 656
" " " int. 669
" mentalis 659
" mesaraica sup. 696
" " inf. 698
" mesenterica sup. 696
" " inf. 698
" metatarsea 721
" musculares oculi 664
" musculophrenica 672
" nasalis 665
" " lateralis 656
" " posteriores 662
" nasopalatina 662
" nutritiae femoris 715
" " magna oss. brachii 680
" " tibiae 722. 723
" obturatoria 702
Varietäten 751
" occipitalis 656
" oesophageae 691
" ophthalmica 663
" palatina adscendens 653
" " anterior 661
" " descendens 661
" palpebralis sup., inf. 665
" pancreaticoduodenalis 695
" pediaea 719
" pedis 719
" penis 706
" perforantes 714. 715
" pericardiacophrenica 671

Seite

Arteriae
" perinaei 706
" peronea com., ant., post. 723
" pharyngea adscendens 653
" " suprema 661
" pharyngobasilaris 653
" pharyngopalatina 653
" phrenica inferior 693
" " magna 693
" plantaris ext., int. 724
" pollicis 683
" princeps pollicis et indicis 683
" profunda brachii 680
" " cerebri 670
" " clitoridis 707
" " femoris 713
" " linguae 654
" " penis 707. 549
" pterygoideae 660
" pterygopalatina 661
" pubica 710
" pudenda communis 705
" " externae 712
" " interna 705
" pulmonalis communis 793
" " dextra, sinistra 794. 474
" radialis 682
" ranina 654
" recurrens interossea 685
" " radialis 682
" " tibialis 720
" " ulnaris 684
" renalis 698. 524
" renocapsulares 698
" sacra lateralis 702
" sacralis lateralis 702
" " media 700
" scrotales ant., post. 713. 706
" septi mobilis 655
" " narium posteriores 662
" spermatica externa 710
" " interna 699. 537. 541
" sphenopalatina 662
" spinales ant., post. 669
" spinosa 660
" splenica 695
" stylomastoidea 657
" subclavia 666
Varietäten 744
" sublingualis 654
" submentalis 655
" subscapularis 678
" superficialis pedis int. 724
" " volae 683
" supraorbitalis 664
" suprarenales aortic., med. 698

	Seite
Arteriae	
" suprarenales inferiores	699
" " superiores	694
" suprascapularis	674
" surales prof., supf.	718
" tarsea externa	720
" " interna	719
" tarseae internae	721
" temporalis media	658
" " profundae	660
" " superficiales	657. 658
" thoracica humeraria	677
" " interna	671
" " longa	678
" " prima	677
" " suprema	677
" thoracico-acromialis	677
" thyreoidea ima	741. 745
" " inferior	673
" " superior	652
" tibialis anterior	719
" " postica	722
Varietäten	755
" transversa colli	675
" " faciei	658
" " perinaei	706
" " scapulae	674
" transversalis cervicis	673
" tympanica	659
" ulnaris	683
" umbilicalis	704
" uterina	705
" vertebralis	668
" vesicales	704. 705
" vesicovaginalis	705
" Vidiana	661
Arthrodia	47
Articulatio	46
" acromioclavicularis	167
" capitis	153
" carpi	176
" costotransversariae	161
" costovertebrales	161
" coxae	194
" cubiti	172
" cubitoradiales	171
" digitorum manus	180
" " pedis	207
" genu	198
" humeri	169
" maxillaris	131
" ordinum oss. carpi	175
" oss. carpi et metacarpi	178
" oss. tarsi	203
" " tarsi et metatarsi	206
" pedis	204

	Seite
Articulatio sternoclavicularis	167
" sternocostales	163
Astragalus	200
Atrium ant, dextrum	642
" post., sinistrum	645
Atlas	147
Aura seminalis	553
Auricula	375
Auriculae cordis	642. 645
Auris	375
" intima	385
" media	379
Axilla	98
Axis	147
Balanus	550
Barba	82
Basis cerebri	850. 852
" cranii	135
" cordis	635
" maxillae inferioris	130
" modioli	390
" oss. hyoidei	132
" ossium metacarpi	177
" " metatarsi	205
" prostatae	545
" scapulae	165
" stapedis	383
" ventriculi tertii	871
Bilis	515
Blastema dentis	84
" pili	81
Brachia corp. quadrigeminorum	857
Brachium	98
Bronchi	467
Bronchia	468
Buccae	96. 434
Bulbus aortae	648
" cinereus	854
" fornicis	869
" oculi	403
" olfactorius	854
" pili	81
" rhachidicus	834
" venae jugularis	761
" urethrae	550
Bursae mucosae	69
" synoviales	69
(Die einzelnen s. Schleimbeutel.)	
Calamus scriptorius	836
Calcaneus	201
Calcar avis	863
Calx	100
Calyces renales	525

	Seite
Camera oculi anterior	422
" " posterior	423
Canales	
" alimentarius	347. 432
" alveolares	123
" alveolaris inferior	131
" caroticus	116
" chordae tympani	394
" corticales	523
" cruralis	288
" diploici	109
" epididymidis	539
" Fallopii	116. 393
" gutturalis auris	381
" hyaloideus	417
" incisivus	125
" infraorbitalis	123
" inguinalis	277
" intestinalis	485
" maxillaris	131
" nasalis	129. 142
" nasolacrymalis	129. 142
" nasopalatinus	437
" obturatorius	574
" Petiti	422
" pterygoideus	112
" pterygopalatinus	126
" sacralis	148
" secretorii	91
" semicirculares	387. 388
" spinalis	156
" vertebralis	156
" Vidianus	112
" zygomaticus	127
Canaliculi lacrymales	401
" mastoideus	904
" seminales	537
Canthi oculi	396
Capilli	82
Capitulum brachii	169
" costae	159
" fibulae	197
" mallei	382
" oss. metacarpi	177
" " metatarsi	205
" radii	171
" stapedis	383
" ulnae	170
Capsulae atrabiliariae	534
" cellulosa renis	521
" dentis	83. 85
" externa, interna	860
" fibrosae	53
" Glissonii	511
" hyaloidea	417
" lentis	419
Capsulae nuclei lentiformis	860
" suprarenales	534
" synoviales	68
Caput claviculare	226
" coli	500
" cruciatum	134
" epididymidis	539
" gallinaginis	531
" humeri	168
" musculare	60
" oss. brachii	168
" oss. femoris	193
" pancreatis	516
" penis	550
" sternale	226
" tali	200
Cardia	487 (635)
Caro quadrata Sylvii	306
Carpus	98. 174
Cartilagines	48
" alae nasi	429
" annularis	457
" articulares	49
" arytaenoideae	457
" auriculae	375
" costales	159
" cricoidea	457
" formativa	41
" ligamentosa	50
" lingualis	442
" nasi lateralis, inf.	429
" ossescentes	41
" permanentes	50
" pyramidalis	457
" Santorinianae	458
" scutiformis	456
" septi nasi	429
" suturarum	49
" thyreoidea	456
" Wrisbergiana	462
Caruncula lacrymalis	399
" mammillaris	853
" myrtiformes	567
" sublingualis	444
Cauda corporis striati	858
" epididymidis	539
" equina	922
" muscularis	60
" pancreatis	516
Caudex cerebri	850
Cavitas cotyloidea	181
" glenoidea	114
" " radii	171
" " scapulae	166
" " tibiae	196
" sigmoidea maj., min.	170

	Seite
Cavitas tympani	379
Cavum abdominis	572
" articulationis	68
" dentis	83
" laryngis	462
" mediastini ant., post.	480
" nasi	141. 430
" oris	143. 432
" pelvis	187. 572
" thoracis	163. 478
" uteri	561
Cella lateralis	862
Cellulae aëreae	473
" coli	501
" ethmoideae	121
" mastoideae	115. 381
" pulmonales	473
Centrum encephalo-spinale	32. 829
" geminum semicirculare	859
" ovale Vieussenii	863
" semiovale medullare	860
" tendineum	278
Cercaria spermatica	553
Cerebellum	840
Cerebrum	849
" abdominale	980
Cerumen	378
Cervix	96
" uteri	560
" vesicae	526
Cesaries	82
Chiasma Camperi	262
" opticum	872
" tendinosum	262
Choanae	141
Chondros	48
Chondrosyndesmos	50
Chordae arter. umbilical.	527. 704
Chorda ductus arteriosi	794
Chordae cerebri	876
" longitudinales	866
" tendineae	641
Chorda transversalis	171
" tympani	898
" venae umbilicalis	510
" vocales	459
Chylus	499
Chymificatio, Chymus	491
Cilia	398
Cingulum	861
Circelli venosi	781
Circuli arter. iridis	411
" arteriosus Willisii	671
" sanguinis	17
" venosus orbic. ciliaris	412
Circumferentia articularis	171
Cisterna chyli	797
Claustrum	861
Clava	836
Clavicula	165
Clitoris	569
Clivus	112
Clunes	97
Cochlea	389
Coecum	500
Coles	547
Colliculi em. quadrig.	840
Colliculus n. optici	415
" seminalis	531
Collum dentis	83
" costae	159
" fibulae	197
" glandis	551
" humeri	168
" mallei	382
" oss. brachii	168
" oss. femoris	193
" proc. condyloidei	131
" radii	171
" scapulae	166
" stapedis	383
" tali	200
" uteri	560
" vesicae felleae	514
" " urinariae	526
Colon	500
Colostrum	587
Columella	390
Columnae fornicis	868
" rugarum	567
" spinalis, vertebralis	144. 154
Coma	82
Commissura anterior	870
" brevis	847
" cerebelli	837
" labiorum oris	433
" " pudendi	568
" magna	866
" medullae spinalis	830
" mollis	870
" palpebrarum	396
" posterior	870
" tenuis	846
" tractuum opticorum	872
Conarium	871
Concha auriculae	376
" inferior, infima	129
" media	121
" Morgagniana	121
" Santoriniana	122
" superior	121
Condylus ext., int. humeri	169

	Seite
Condylus extensorius	169
" flexorius	169
" oss. femoris ext., int.	193
" tibiae	195
Confluens sinuum	762. 883
Coni tubulosi	522
" vasculosi	538
Conjugata	188
Conus medullaris	829
Cor	635
Corium	72
Corniculum	458
Cornu ammonis	864
" ant., desc., post.	863
Cornua cart. thyreoideae	457
" coccygea	149
" gland. thyreoideae	466
" lateralia oss. hyoid.	133
" limacum	401
" oss. hyoidei maj. min	132. 133
" processus falciformis	287
" sacralia	149
" sphenoidalia	110
Corona ciliaris	408
" dentis	83
" glandis	551
" radiata	861
Corpus callosum	866
" cavernosum clitor.	570
" " penis	548
" " inferius	550
" " urethrae	550
" ciliare	407. 408
" " cerebelli	844
" dentatum olivae	835
" " cerebelli	844
" fimbriatum	844
" fornicis	868
" geniculata	857
" Highmori	537
" luteum	559
" mammillaria	869
" medullare hem. cerebelli	843
" " " cerebri	860
" " vermis	847
" olivare	835
" papillare	70
" pyramidale	834
" quadrigemina	839
" restiforme	836
" rhomboideum olivae	835
" " cerebelli	844
" spongiosum	548. 550
" striatum	858
" thyreoideum	465
" triticeum	133

	Seite
Corpus uteri	560
" vesicae	526
" vitreum	417
Corpuscula lienis	520
" Malpighii	524
Costae	159
" asternales, sternales, spuriae, verae	161
Costa scapulae	165
Coxae	97
Cranium	133
Crassamentum sanguinis	26
Crines	80
Crista basilaris	112
" capituli costae	160
" ethmoidalis	124. 126
" fibulae	197
" frontalis int.	117
" galli	120
" lacrymalis	124. 129
" mentalis externa	130
" nasalis	125
" occipitalis ext., int.	113
" ossis ilium	182
" pubis	183
" pyramidalis	386
" radii	170
" sphenoidalis	110
" tibiae	195
" turbinalis	123. 126
" ulnae	170
Cruor	26
Crus externum annuli ing. ant.	273
" internum "	271. 272
" cerebelli ad emin. quadrig.	845
" " " medull. oblong.	836. 845
" " " pontem	845
" cerebri	855
" clitoridis	569
" curvilineum	383
" diaphragmatis	278
" fornicis ant., post.	868
" helicis	375
" incudis breve, longum	383
" medullae obl. ad emin. quadr.	839
" penis	548
" rectilineum	383
" uteri	560
Cryptae ceruminosae	378
" Lieberkühnianae	497
" mucosae	87
" praeputiales	552
" sebaceae	88
Cubitus	170

	Seite
Culmen	846
Cuneus	854
Cunnus	568
Cupula	389
Curvaturae ventriculi	487
Cuticula	76
Cutis	72
Cystis fellea	514
Declive	846
Decussatio pyramidum	833
" tractuum opticor.	873
Dentationes	62
Dens epistrophei	147
Dentes	83
" angulares	435
" bicuspidati	436
" canini	435
" cuspidati	435
" decidui	85. 436
" incisivi, incisores	435
" infantiles, lactei	85. 436
" laniarii	435
" molares	436
" permanentes	85. 437
" primores	435
" sapientiae	436
Diametros anteroposterior	188
" pelvis	188
" conjugata	188
Diaphysis	44
Diarthrosis	46
Diastole	647
Didymus	536
Digitationes	62
Digiti manus, pedis	99. 100
Diploë	44. 109
Discus oophorus	557
" proligerus	557
Diverticulum Meckelii	393
" Vateri	495
Dorsum	97
Dorsum linguae	441
" nasi	428
" penis	548
Ductus Bartholinianus	450
" biliarii, biliferi	513
" choledochus	515
" cysticus	514
" deferens	539
" ejaculatorius	545
" excretorii	85
" galactophori	586
" hepaticus	514
" lactiferi	586
" nasolacrymalis	402
Ductus pancreaticus	517
" Riviniani	450
" semicirculares	388
" Stenonianus	448
" Whartonianus	449
" Wirsungianus	517
Duodenum	492
Dura mater	879
Ebur	83
Ejaculatio seminis	555
Embryo	571
Eminentia bigemina	839
" candicantes	869
" carpi rad., uln.	175
" capitata	169
" collateralis Meckelii	865
" digitalis	864
" intercondyloidea	195
" intermedia	195
" medullares	869
" papillaris	380
" pyramidalis	380
" quadrigemina	839
" radii	171
Emissaria diploica	109
" Santorini	767
Emissio seminis	554
Enarthrosis	47
Enteron	491
Ependyma	876
Ephippium	110
Epidermis	76
Epididymis	539
Epiglottis	458
Epiploon majus	503
" minus	510
Epistropheus	147
Epithelium	76
" ventriculorum cerebri	876
Erectio penis	554
Excavatio recto-uterina	585
" rectovesicalis	585
" vesico-uterina	585
Extensio	212
Extremitates abdominales	98
" acromialis	165
" scapularis	165
" sternalis	165
" thoracicae	98
Facies	139
Faeces	505
Falx cerebelli	885
" cerebri	884

	Seite
Fascia antibrachii	249
" brachialis	248
" buccalis	218
" buccopharyngea	219
" bulbi oculi	395
" cervicalis, colli	224
" coracoclavicularis	242
" cruralis	288
" dentata	865
" dorsalis manus	252
" " pedis	289
" iliaca	283
" lata femoris	284
" longitudinalis ant., post.	151
" lumbodorsalis	232
" musculares	54
" musculi transversi	275
" nuchae	233
" palmaris	251
" parotideo-masseterica	219
" pelvis	574
" penis	551
" perinaei	576
" plantaris	289
" recta abdominis	269
" renum	521
" subscapularis	249
" superficialis	54
" suprascapularis	248
" temporalis	220
" transversalis	275
" volaris	281
Fasciculus arcuatus	861
" cuneatus	836
" decussantes	832
" longitudinales coli	504
" longitudinalis inferior	862
" medullares accessorii	861
" musculares	57
" nervei	32
" nuclei olivae	835
" pyramidum	832
" unciformis	861
Fasciolae cinereae	837
Fauces	451
Fel	515
Fenestra ovalis, rotunda	380
Fibrae, Fibrillae elasticae	55
" " musculares	57
" " nerveae	32
" " " motivae	39
" " " sensitivae	39
" " tendineae	51
Fibrocartilago	50
" basilaris	135
" falciformis, falcata	198

	Seite
Fibrocartilag. interarticulares	51
" intermedia	176
" intervertebrales	150
" semilunaris	198
" sesamoideae	51
" symphysium	50
" triangularis	176
Fibula	196
Filamenta nervea	32
Filum terminale	876
Fimbria	865
Fimbriae linguae	444
" tubae uterin.	559
Fissurae cerebri 852. 853.	855
" Glaseri	115
" longit. med. spinal.	830
" orbitalis inferior 123.	140
" " superior 111.	140
" oris	433
" petrobasilaris	135
" petrosa superficialis	117
" pterygoidea	111
" sphenoidalis	111
" sphenomaxillaris	123
" transversa cerebelli	849
" " cerebri	851
" " parva cerebri	849
Flexio	212
Flexurae coli	500
Flexura iliaca coli	501
Flocculi retinae	416
Flocculus, Floccus	843
Fluida	7
Focile majus, minus	170
Foetus	571
Folliculi dentium	85
" Graafiani	556
" mucosi	87
" pilorum	81
" sebacei	88
Folium cacuminis	846
Foramina	
" caroticum ext., int.	116
" centrale retinae	415
" coecum	118
" " linguae	441
" " medull. oblong.	834
" condyloideum ant., post.	113
" ethmoidea 118. 120.	141
" incisivum	125
" infraorbitale	123
" intervertebralia 146.	155
" jugulare	116
" lacerum	116
" " anterius	135
" magnum occipitale	112

Seite

oramina
" mastoideum 115
" maxillare anterius 130
" " posterius 131
" maxillaria superiora 123
" medullae spinalis 145
" mentale 130
" Monroi 869
" nutritia 43
" obturatum 184
" opticum 110
" ovale 111
" ovale 184
" palatinum anterius 125
" palatina posteriora 126
" parietale 119
" quadrilaterum 278
" rotundum 110
" sacralia ant, post. 148. 149
" scleroticae 404
" sphenopalatinum 127
" spinosum 111
" stylomastoideum 116
" supraorbitale 118
" Thebesii 643
" transversaria 146
" venae cavae 278
" Winslovii 510. 584
" zygomaticum orbitale 127. 140
" " faciale, temporale 127
orceps corp. callosi 867
ornix 868
" cranii 133
ossa acetabuli 181
" anonyma 376
" axillaris 98. 247
" cochleariformis 381
" condyloidea 113
" ductus venosi 507
" glandularis 118
" hyaloidea 418
" iliaca 182
" iliopectinea 282
" infraclavicularis 97. 242
" infraspinata 166
" inguinalis ext., int., med. 581
" intercondyloideae 193. 194
" jugularis 116
" lacrymalis 129. 141
" longitudinalis dextr. sin. 507
" Morgagni 530
" navicularis urethrae 530
" " vulvae 568
" occipitales inf., sup. 113
" ovalis 643

Seite

Fossae
" patellae 193
" peduncularis 842
" poplitea 283
" poplitea oss. fem. 194
" posterior oss. brach. 169
" pterygoidea 111
" pterygopalatina 144
" scaphoidea 376
" semiovalis 386
" sigmoidea 115
" sphenomaxillaris 144
" subrotunda 386
" subscapularis 166
" supraclavicularis 224
" suprascapularis 96
" supraspinata 166
" Sylvii 852
" temporalis 134
" transversa hepatis 507
" triangularis 376
" trochanterica 193
" venae cavae 507
" " umbilicalis 507
" vesicae felleae 507
Fossula petrosa 116
Foveae
" anterior major, minor 169
" capitis oss. fem. 193
" costales 156
" digitata 863
" inguinalis externa 582
" " interna 581
" malleoli 197
" maxillaris 123
" ovalis 286
" proc. condyloidei 131
" rhomboidalis 836
" trochlearis 118
Frenulum aryepiglotticum 462
" clitoridis 570
" epiglottidis 441. 445. 462
" labii sup., inf. 434
" labiorum pudendi 568
" linguae 442. 444
" praeputii 552
" veli medullaris 848
Frons 95
Fundus uteri 560
" vaginae 566
" ventriculi 487
" vesicae felleae 514
" " urinariae 526
Funiculus gracilis 833. 836
Funiculi medullae spinalis 832

	Seite
Galea aponeurotica cap.	214
Ganglia	36. 38
" Arnoldi	975
" auriculare	975
" cardiacum	978
" caroticum	968
" cavernosum	968
" cerebri posterius	856
" " anterius	858
" cervicale inferius	963. 964
" " medium	963
" " superius	962
" " supremum	962
" ciliare	972
" coccygeum	967
" Gasseri	910
" geniculum	897. 898
" intercaroticum	970
" jugulare n. glossophar.	901
" " n. vagi	903
" linguale	977
" lumbaria	967
" lymphatica	29. 796
" maxillare	977
" Meckelii	972
" Mülleri	901
" nervosa composita	38
" nasale	972
" ophthalmicum	972
" oticum	975
" petrosum	901
" phrenica	981
" prostatica	984
" pudenda	984
" rhinicum	972
" sacralia	967
" semilunare	910
" semilunaria	980
" sphenopalatinum	972
" spinalia	923
" supramaxillare	916. 975
" thyreoideum	963
" thoracica	965
" " primum	964
" vascularia	25
Gaster	487
Genae	96
Geniculum canalis Fallopii	394
Genu	99
" corporis callosi	867
Gestatio	571
Gingivae	434
Ginglymus	47
Glabella	117
Glandulae	85
" acinosae	90
Glandulae	Seite
" agglutinatae	89
" aggregatae	89
" agminatae	498
" Brunnerianae, Brunnii	497
" buccales	434
" compositae	89
" congregatae Monroi	400
" conglobatae	29. 796
" conglomeratae	89
" Cowperi	547
" Haversianae	68
" innominatae Galeni	400
" labiales	434
" lacrymalis sup., inf.	400
" Lieberkühnianae	497
" linguales	445
" Littrii	531
Gland. lymphaticae	29. 796
" " axillares	802
" " brachiales	803
" " bronchiales	469. 806
" " cervicales prof. inf.	801
" " " " sup.	800
" " " superfic.	800
" " coeliacae	813
" " cubitales	803
" " epigastrica	803
" " faciales profund.	799
" " " superfic.	799
" " gastroepiploicae	814
" " hepaticae	813
" " hypogastricae	809
" " iliacae ant., ext.	808
" " " internae	809
" " " superiores	809
" " infraclaviculares	802
" " inguinales	807
" " intercostales	805
" " jugulares inf., sup.	801. 800
" " lumbares	810
" " mediastinae	805
" " mesaraicae	811
" " mesentericae	811
" " mesocolicae	812
" " pectorales	803
" " popliteae	808
" " pulmonicae	475. 806
" " sacrales	809
" " splenicopancreaticae	814
" " sternales	804
" " subauriculares	799
" " submaxillares	800
" " substernales	804

	Seite
Glandulae	
" lymph. supraclaviculares	801
" " tibiales	807
" " tracheales	806
" " zygomaticae	799
Gland. Meibomianae	398
" molares	434
" parotis	447
" Peyerianae	498
" pinealis	871
" pituitaria	872
" prostata	545
" simplices	87
" solitariae intest.	497
" spuriae	25
" salivales	447
" " sublingualis	449
" " submaxillaris	449
" suprarenales	534
" thymus	481
" thyreoidea	465
" tubulosae	91
" Tysonianae	552
Glans clitoridis	569
" penis	550
Globuli medullares	869
" sanguinis	25
Glomeruli	524
Glomus choroideus	878
Glottis	460
Gomphosis	46
Granula glandulosa	90
" sanguinis	25
Granviditas	571
Gula	483
Gyri cerebelli	842. 844
" cerebri	851 852. 862
" cinguli	854
" fasciculi arcuati	854
" hippocampi	854. 865
" insulae	855
Hamuli frontales	120
Hamulus lacrymalis	129
" laminae spinalis	391
" pterygoideus	111
Hallex, Hallux	100
Harmonia	45
Haustra	501
Helicotrema	392
Helix	375
Hemisphaerae cerebelli	842
" cerebri	852
Hepar	507
Hiatus aorticus	279
" canalis Fallopii	117
Hiatus oesophageus	279
Hippocampus	864
Hilus lienis	815
" renalis	521
" ovarii	555
Humores	8
" aqueus	422
" oculi	404
" vitreus	417
Hymen	567
Hypochondria	98
Hypophysis	872
Ileum	492
Impressiones digitatae	109
Incisura acetabuli	181
" auris	376
" clavicularis	158
" costales	158
" ethmoidalis	118
" fibularis	196
" iliaca	183
" interlobularis	470. 507
" intertragica	376
" ischiadica maj., min.	183
" jugularis	113. 115
" marginalis	841
" mastoidea	115
" nasalis	118
" pallii	850
" peronaea	196
" sacrococcygea	149
" scapularis	165
" septi	870
" semilunaris maj., min.	170
" " max. inf.	131
" " radii	171
" " sterni	158
" sigmoidea	131
" supraorbitalis	118
" tali	200
" tentorii cerebelli	884
" thyreoidea	457
" vertebrales	145
" vomeris	130
Inclinatio pelvis	192
Index	99
Infundibulum cochleae	390
" cerebri	872
Inscriptiones tendineae	269
Interfemineum	575
Internodia	179
Intestinum amplum	500
" crassum	500
" coecum	500
" colon	550

Seite

Intestinum duodenum 492
" gracile 491
" ileum 492
" jejunum 492
" rectum 501
" tenue 491
Insula 854
Interstitia intercostalia 163
" interosseum antibrach. 171
" " cruris 197
" " metacarpi 178
" " metatarsi 206
Introitus vaginae 566
Intumescentia ganglioformis n. facialis 898
" " n. vagi 903
" semilunaris 910
Involucrum linguae 444
Iris 409
Irritabilitas musculorum 59
Isthmus faucium 432
" gland. thyreoideae 465
" urethrae 530
" Vieussenii 643
Jejunum 492
Juga alveolaria 124
" cerebralia 109
Jugum 128
Jugulum 96. 224
Junctura 46

Labia cristae oss. ilium 182
" lineae asperae 192
" orificii uteri 561
" oris 433
" pudendi ext., maj. 568
" " int., min. 569
Labrum glenoideum 51
" " scapulae 166
" cartilagineum acetab. 194
Labyrinthus auris 385
" oss. ethm. 121
" Santorini = Plex. ven. pudendalis
Lac femininum 587
Lacerti adscitii 176
Laciniae 559
Lacrymae 400
Lactatio 587
Lacunae 87
" Morgagnii 531
Lacunar orbitae 140
Lacus lacrymalis 401
Lamina cart. cricoideae 457
" " thyreoideae 456
" cellulosa 486

Seite

Lamina ciliaris 416
" cinerea sinus rhomb. 837
" cornea 859
" cribrosa = Septum annuli cruralis
" cribrosa cerebri 852
" " oss. ethmoid. 120
" " scleroticae 404
" fusca scleroticae 405
" genu 867
" medullaris ventric. 876
" modioli 390
" papyracea 121
" perpendicularis 120
" pterygoidea ext., int. 111
" spinalis 391
" terminalis 872
Lanugo 82
Laqueus 839
Latus extensorium 246
" flexorium 246
Lema 398
Lemniscus 839
Lens crystallina 418
Lien 518
Ligamenta
" accessoria articulat. 53
" " costarum 162
" accessorium humeri 169
" " obliquum 177
" " rectum 177
" acromioclaviculare 167
" alaria genu 199
" " dentis 154
" annularia digit. 263
" " carpi ant., post. 251. 250
" " radii 171
" " tarsi ant., ext., int. 289
" apicum 152
" arcuatum inf., sup. 185
" armillare 250
" arteriosum 794
" aryepiglottica 462
" auricularia 376
" baseos metacarpi 179
" " metatarsi 206
" brachiocubitale 173
" brachioradiale 173
" calcaneocuboidea 203
" calcaneonavicularia 203
" capituli cost. ant. 161
" " " interart. 161
" " fibulae 197
" " oss. metacarpi 179
" " " metatarsi 206
" capsularia fibrosa 53

	Seite
gamenta	
" capsulare sacciforme	172
" carpi dorsale	250
" " volaria, dors., later., inteross.	175. 176
" " volare commune	251
" " " proprium	251
" carpometacarpea	179
" ciliare	407
" claviculae acromiale	167
" coli	504
" colicolienale	502
" colli costae ext., int.	162
" conoides	168
" coracoacromiale	167
" coracoclaviculare	168
" coronarium hepatis	509
" coruscantia	163
" costoclaviculare	167
" costotransverseria	162
" costoxiphoideum	163
" cricoarytaenoidea	459
" cricothyreoidea	459
" cricotracheale	468
" cristae pubis	183
" cruciatum atlantis	153
" cruciata digitorum	263
" " genu	198
" " tarsi	289
" cubiti ant., lateralia	173
" cubitoradiale teres	171
" cubonavicularia	204
" cuneocuboidea	204
" cuneonavicularia	204
" deltoides	204
" denticulatum	875. 880
" duodenohepaticum	510
" duodenorenale	502
" epididymidis	540
" falciforme	185
" Fallopii	271
" fibulare calcanei	205
" gastrohepaticum	489. 510
" gastrolienale	488. 518
" Gimbernati	287
" glossepiglotticum	441. 445. 462
" glottidis	459
" hepatocolicum	502. 511
" hepatoduodenale	510
" hepatorenale	511
" hyoepiglotticum	459
" hyothyreoidea	458
" iliolumbale	185
" iliopectineum	284
" iliosacra	185
" inguinale externum	271

	Seite
Ligamenta	
" inguinale internum	276
" interclaviculare	167
" intercruralia	151
" intermuscularia	55
" " brachii	249
" interosseum antibrachii	171
" " cruris	197
" interspinalia	151
" intertransversaria	151
" intervertebralia	150
" laciniatum	289
" lateralia cubiti	173
" " dentis	154
" " genu	200
" " phalang. dig.	180. 207
" " pedis	204
" " radiale, ulnare	177
" longitudinale ant , post.	151
" malleoli ext. ant., post., sup.	197
" maxillare ext., int.	132
" mucosa digit.	263
" mucosum genu	199
" muscularia	55
" nitentia	163
" nuchae	152
" obliquum antibr.	171
" obliqua digit.	263
" obturatoria atlantis	153
" obturatorium	184
" ossium carpi et metac.	179
" " cuneiformium	204
" ovarii	563
" palpebrale ext. int.	397
" patellae	196. 296
" pelvis ant., postica	185
" peritonaei	582
" phrenicogastrica	488
" phrenicolienale	518
" popliteum	199
" posticum genu	199
" Poupartii	271
" pubis	183
" puboprostatica lat.	546. 574
" " medium	545. 576
" pubovesicalia lat.	531. 574
" " medium	531. 576
" pulmonis	479
" radiata costarum	161
" rhomboides carpi	177
" " claviculae	167
" rotundum acetab.	194
" " hepatis	510
" sacrococcygea	152
" sacroiliaca	184

Ligamenta	Seite
" sacroischiadica	185
" sacrospinosum	185
" sacrotuberosum	185
" scleroticochoroidale	407
" serosa	67
" serratum	880
" spinososacrum	185
" splenicogastricum	488
" sternoclaviculare	167
" sternocostalia radiata	162
" stylohyoideum	133
" stylomaxillare	133
" stylomylohyoideum	133
" subcruentum	176
" subflava	151
" suspensorium dentis	154
" " hepatis	510
" " lienis	518
" " penis	551
" tali fibularia	204. 205
" talocalcanea	203
" talonavicularia	203
" tarsometatarsea	206
" teres acetabuli	194
" " hepatis	510
" thyreoarytaenoidea	459
" thyreoepiglotticum	459
" thyreohyoidea	458
" tibiae fibularia	197
" transversaria int.	162
" transversum acetabuli	194
" " atlantis	153
" " cruris	288
" " genu	198
" " scapulae	165
" " propria scapulae	167
" " plantare digit.	207
" " volare dig.	180
" trapezoides	168
" triangularia hepatis	509
" triangulare lineae albae	267
" " scapulae	167
" " urethrae	576
" " vesicae	545. 576
" triquetrum	205
" tuberculi costae	162
" tuberososacrum	185
" uteri ant. inf.	562
" " lata	562
" " rotunda	560. 562
" vaginae vasorum cruralium	284
" vaginalia digitorum	263
" vaginale tibiae	288
" Valsalvae	376

Ligamenta	Seite
" vesicae anteriora	546
" " lateralia	527
" vesicale medium	527
" vocalia	459
Limbus alveolaris	124. 130
" fossae ovalis	643
" luteus	415
" palpebrae	396
Linea alba	267
" arcuata ext., int.	182
" aspera	192
" cruciatae	113
" innominata	186
" intermedia cristae il.	182
" intertrochantericae	193
" obliquae max. inf.	131
" semicircularis Douglas.	270
" " oss. frontis	117
" " " occip.	113
" " " pariet.	119
" semilunaris Spigelii	275
" terminalis pelvis	186
Lingua	441
Lingula	848
Liquor follicul. Graaf.	557
" Morgagnii	419
" pericardii	637
" prostaticus	553
Lobulus auriculae	376
" centralis	846
Lobuli hepatis	512
" pulmonum	470. 474
Lobus biventer	843
" caudatus	508
" caudicis	854
Lobi cerebelli	842
" cerebri	853
Lobus cuneiformis	843
" gracilis	843
" quadrangularis	842
" quadratus	508
" semilunaris	842. 843
" Spigelii	508
Lotium	532
Lumen	18
Lunula	79
Lyra	868
Maculae cribrosae	386
Macula flava	415
" germinativa	558
Malleolus externus	197
" internus	196
Malleus	382
Mammae	585

	Seite
lammae maris	588
landibula	130
lanubrium mallei	382
" sterni	158
largo ciliaris	410
" coronalis	117. 119
" flocculosus	416
" infraorbitalis	123. 140
" lambdoideus	113. 119
" mastoideus	113
" orbitalis ext., int.	127. 140
" pupillaris	410
" sagittalis	119
" supraorbitalis	118. 140
" temporalis	119
lassa lateralis	147
latrix unguis	79
laxilla inferior	130
leatus auditorius ext.	377
" " int.	393
" narium	142
lediastinum ant., post.	480
" testis	537
ledulla dorsalis	829
" oblongata	834
" ossium	43
" spinalis	829
Membranae	
" cellulosae	15
" Descemeti	423
" Desmoursii	423
" fibrosae	52
" granulosa	557
" humoris aquei	406. 423
" hyothyreoidea	458
" interspinales	151
" Jacobi, Jacobiana	414
" medullaris	43
" mucosae	70
" " gastropulmonalis	72
" " genitourinaria	72
" " pneumenterica	72
" obturatoria	184
" laryngis	458
" stapedis	385
" pigmenti	414
" pituitaria narium	430
" pulmonis	476
" Ruyschiana	406
" sacciformis	172
" Schneideriana	430
" serosae	66
" sterni	159
" synoviales	68
" tertia	397
" thyreohyoidea	458

	Seite
Membranae	
" tympani	379
" " secundaria	392
" vasculosae	24
Membrum virile	547
Meninges	875
Meninx fibrosa	879
" serosa	878
" vasculosa	875
Mesencephalon	833
Mesenteriolum	502
Mesenterium	493
Mesocolon	502
Mesorectum	504
Modiolus	390
Mons pubis, Veneris	97
Monticulus cerebelli	846
Motus peristalticus	486. 491
Mucro cordis	635
" sterni	158
Mucus	71. 88
Musculi	56
" abdominales	267
" abducens oculi	425
" abductor dig. min. manus	266
" " " " pedis	307
" abductor hallucis	306
" " indicis	267
" " pollicis brevis	265
" " " longus	259
" accelerator urinae	579
" accessorius perforantis	306
" adducens oculi	425
" adductor dig. minimi	266
" " femoris brevis, longus	296
" " " magnus	297
" " hallucis	307
" " pollicis	265
" anconaeus ext., magnus	256
" " int., brevis	256
" " longus	256
" " quartus, parvus	259
" antagonistae	63
" antitragicus	377
" aryepiglotticus	461
" arytaenoideus obliquus	461
" " transversus	461
" attollens auriculae	220
" " oculi	425
" attrahens auriculae	220
" auricularis ant., sup., post.	220
" azygos uvulae	439
" baseoglossus	442
" bicipites	61

Musculi	Seite
" biceps brachii	254
" " femoris	298
" bicornis	259
" biventres	61
" biventer cervicis	239
" " maxillae inf.	226
" brachialis externus	256
" buccinator	219
" buccopharyngeus	453
" bulbocavernosus	579
" capitis	229. 240. 241
" cephalopharyngeus	454
" ceratoglossus	442
" ceratopharyngeus	453
" cervicalis adsc., desc.	237
" chondroglossus	442
" chondropharyngeus	453
" ciliaris	215
" cleidomastoideus	226
" coccygeus	280
" colli	223
" complexus et biventer	238
" complexus major	238. 239
" " minor	238
" compressor nasi	216
" constrictor cunni	580
" " isthmi faucium	439
" " pharyngis inf.	452
" " " med. sup.	453
" coracobrachialis	253
" coracocervicalis	229
" coracohyoideus	228
" coracoradialis	255
" corrugator supercilii	215
" costohyoideus	228
" cremaster	274. 542
" cricoarytaenoideus lat., post.	460
" cricopharyngeus	453
" cricothyreoideus	460
" crotaphites	221
" cruralis, crureus	295
" cucullaris	233
" deltoides, deltoideus	252
" depressor alae nasi	217
" " anguli oris	218
" " labii inferioris	218
" " septi mobilis	217
" deprimens oculi	425
" digastrici	61
" " maxillae inf.	226
" detrusor urinae	528
" ejaculator seminis	579
" erector clitoridis	579
" " penis	578

Musculi	Seite
" extensor carpi rad. long., brev.	257
" " " ulnaris	258
" " dig. min. proprius	258
" " dig. man. communis	257
" " " pedis com. brev.	304
" " " " " long.	300
" " dorsi communis	236
" " hallucis brevis	304
" " " longus	299
" " indicis proprius	260
" " pollicis brev., long.	260
" flexor antibrachii	254
" " carpi radialis	261
" " " ulnaris	261
" " dig. man. com. prof.	262
" " " " " sublim.	261
" " " perforans	262
" " " perforatus	262
" " " pedis com. brev.	305
" " " " " longus	303
" " " " perforans	303
" " " " perforatus	305
" " " min. manus brev.	266
" " " " pedis brev.	307
" " hallucis brevis	306
" " " longus	304
" " pollicis brevis	265
" " " longus	263
" frontalis	214
" fusiformes	61
" gastrocnemii	301
" gemelli	292
" " surae	301
" gemini	292
" genioglossus	442
" geniohyoideus	227
" geniopharyngeus	454
" glenoradialis	255
" glossopalatinus	439
" glossopharyngeus	453
" gluteus maximus	291
" " med., minim.	292
" gracilis	294
" helicis major	376
" " minor	377
" Horneri	401
" hyoglossus	442
" hyothyreoideus	228
" iliacus externus	292
" " internus	291
" incisivi	216
" indicator	260
" infracostales	245
" infrascapularis	254

Musculi	Seite
" infraspinatus	253
" intercostales	245
" interossei bicipites man.	266
" " " ped.	305
" dorsales, ext. 266.	305
" interni manus, ped. 266.	308
" plantares	308
" volares	266
" interspinales	240
" intertransversarii	240
" ischiocavernosus	578
" laryngis proprii	460
" latissimus colli	225
" " dorsi	234
" laxator tympani	384
" levator anguli oris	217
" " " scapulae	235
" " ani	577
" " costarum breves, longi	241
" " gland. thyreoideae	466
" " humeri	252
" " intestini recti	577
" " labii sup. alaeq. nasi	216
" " labii sup. proprius	217
" " menti	218
" " palpebrae superioris	399
" " penis	579
" " scapulae	235
" " veli palatini	439
" longissimus dorsi	237
" longus colli	229
" lumbricales manus	264
" " pedis	306
" lacrymalis	401
" mallei externus, ant.	384
" " internus	383
" masseter	221
" multifidus spinae	240
" mylohyoideus	227
" mylopharyngeus	453
" nasalis labii inf.	217
" obliquus capitis inf., maj.	241
" " " sup., min.	241
" oblique adscendens	273
" " descendens	270
" obliquus externus abdom.	270
" " internus "	271
" " oculi inferior	426
" " " superior	426
" obturator ext., int.	293
" occipitalis	214
" oculi obliqui	425

Musculi	Seite
" oculi recti	424
" omohyoideus	228
" orbiculares	62
" orbicularis oris	215
" " palpebrarum	215
" opponens dig. minimi	266
" " pollicis	265
" palati	439
" palatopharyngeus	439
" palatostaphylinus	439
" palmaris brevis, cutan.	252
" " longus	251
" papillares	641
" patheticus	426
" pectinati	644
" pectineus	296
" pectoralis major	242
" " minor	243
" pennati	62
" perforatus Casserii	253
" peristaphylinus ext.	440
" " int.	439
" peronaeus brevis	301
" " longus	300
" " tertius	300
" petrosalpingostaphylinus	439
" pharyngopalatinus	439
" phrenicus = Diaphragma	
" plantaris	290
" popliteus	302
" procerus	216
" pronator quadratus	264
" " rotundus, teres	260
" psoas major, magnus	290
" " minor, parvus	284
" pterygoideus ext., int.	221
" pterygopharyngeus	454
" pubocavernosus	579
" pubourethralis	577
" pyramidalis	292
" " abdominis	269
" " nasi	216
" pyriformis	292
" quadratus femoris	293
" " lumborum	275
" " menti	218
" " plantae	306
" radialis ext. brev., long.	257
" " internus	261
" rectus abdominis	269
" " capit. ant. maj., min.	229
" " " lateralis	240
" " " post. major	240
" " " " minor	241

	Seite
Musculi	
" rectus femoris (ant.)	294
" " " internus	294
" " oculi ext., inf., int., sup.	245
" retrahentes auriculae	220
" rhomboideus	235
" risorius Santorini 217.	226
" sacrolumbalis	237
" sacrospinalis	236
" salpingopharyngeus	454
" sartorius	294
" scaleni	230
" semimembranosus	298
" semipennati	62
" semispinalis colli	239
" " dorsi	239
" semitendinosus	297
" serratus ant. major	244
" " " minor	243
" " post. inf.	235
" " " sup.	235
" soleus	302
" sphenosalpingostaphylinus	440
" sphincter ani ext.	578
" " " int.	504
" " oris	215
" " palpebrarum	215
" " vesicae	528
" spinalis dorsi	239
" stapedius	384
" sternalis	243
" sternocleidomastoideus	226
" sternocostalis	245
" sternohyoideus	228
" sternomastoideus	226
" sternothyreoideus	228
" styloglossus	443
" stylohyoideus	227
" stylopharyngeus	454
" subclavius	243
" subcruralis	295
" subcutaneus colli	225
" subscapularis	254
" supinator brevis	259
" " longus	256
" supraspinatus	253
" sustentator penis	578
" syndesmopharyngeus	453
" temporalis	221
" tensor fasciae latae	285
" tensor tarsi	401
" " tympani	383
" " veli palatini	440

	Seite
Musculi	
" teres major	254
" " minor	253
" thyreoarytaenoideus	461
" thyreoepiglotticus	461
" thyreohyoideus	228
" thyreopharyngeus	453
" tibialis anterior, anticus	299
" " posticus	303
" trachelomastoideus	238
" tragicus	377
" transversalis cervicis	238
" " plantae	307
" transversus abdominis	274
" " auriculae	377
" " perinaei	578
" trapezius	233
" triangularis menti	218
" " nasi	216
" " sterni	245
" tricipites	61
" triceps brachii	256
" " femoris	297
" " surae	302
" trochlearis	426
" ulnaris externus	258
" " internus	261
" urethralis transversus	530
" uvulae	439
" vastus ext., int.	295
" zygomaticus maj., min.	217
Myologia	211
Mystax	433
Nares externae	428
" internae 141.	428
Nasus	428
Nates	97
" cerebri	840
Nervi	35
" accessorius	908
" acusticus	892
" abducens	894
" alveolares ant., post.	915
" alveolaris inferior	921
" ampullares	892
" anococcygei	960
" auditorius	892
" auricularis anterior 919.	920
" " inf., magnus	930
" " post. superfic.	930
" " " prof.	899
" auriculotemporalis	919
" axillaris	936

Nervi	Seite
" brachiales	933. 934
" buccinatorius	918
" cardiaci	978
" cardiacus crassus	965
" " inf., parvus	964
" " medius, magnus	963
" " profundus	963
" " superficialis	963
" " superior	963
" caroticotympanici	969
" carotici externi	962
" caroticus internus	962
" " adscendens	962
" cavernosi	984
" cervicales	927
" cervicales superficiales	930
" ciliares	972. 412
" " longus externus	911
" " longi interni	913
" circumflexus brachii	936
" clunium inferiores	953
" " sup., post.	946
" coccygeus	945
" cochleae	892. 392
" communicans faciei	897
" crotaphitico-buccinatorius	917
" cruralis	950
" " posterior	950
" cubitalis	937
" cutanei abdominales	944
" " brachii externus	935
" " " ext. sup.	939
" " " int. major	935
" " " int. minor	934
" " " int. post.	934
" " " medius	935
" " " posterior	936
" " cruris posteriores	952. 954
" " " internus	952
" " dorsi pedis communis	954
" " " " externus	956
" " " " internus	954
" " " " medius	954
" " externus antibrachii	939
" " femoris ant. ext.	949
" " " ant. medius	951
" " " ant. int.	951
" " " internus	951
" " " posterior	953
" " longus cruris et pedis	955

Nervi	Seite
" cutanei pectorales	943
" dentalis inferior	921
" " superior	915
" dentales inf., sup.	921. 916
" digitales manus	940
" " pedis	957
" " plantares comm.	956. 957
" " volares comm.	937. 939
" digitorum manus dorsales	938. 940. 941
" " volares	937. 939. 941
" " pedis dorsales	954. 955. 956
" " plantares	956
" divisus	909
" dorsales	942
" dorsalis clitoridis	960
" " penis	959
" " scapulae	934
" encephalospinales	35. 886
" ethmoidalis	913
" facialis	897
" faciales inf., med., sup.	900
" faciales temporales	900
" femoralis	950
" fibularis	954
" frontalis	912
" gangliosus	961
" genitocruralis	948
" gingivales inferiores	921
" " superiores	916
" glossopharyngeus	901
" gluteus inferior	953
" " superior	952
" gustatorius	920
" haemorrhoidalis inferior	958
" " medii	958. 983
" " superiores	982. 983
" hypoglossus	894
" iliohypogastricus	948
" ilioinguinalis	948
" infraoccipitalis	927
" infraorbitalis	915
" infratrochlearis	913
" inguinalis	948
" intercostales	943
" " anteriores	944
" intercostalis maximus	961
" interosseus antibr. ext.	940
" " " int.	937
" ischiadicus	953
" Jacobsonii	901
" labiales anteriores	948
" " inferiores	921
" " posteriores	959

Nervi	Seite
" labiales superiores	917
" lacrymalis	911
" laryngeus inferior	906
" laryngeus superior	905
" linguae	446
" lingualis	920
" " medius	894
" loquens	894
" lumbares, lumbales	945
" lumboinguinalis	949
" lumbosacralis	947
" malares	900
" mandibularis	921
" massetericus	918
" maxillaris inferior 917.	921
" " superior	914
" meatus auditorii ext.	919
" medianus	936
" membranae tympani	920
" mentalis	921
" musculares abdominales	944
" musculi mallei ext., int.	976
" " tensoris tympani	976
" musculocutaneus	935
" molles	962
" mylohyoideus	921
" nasales anteriores	913
" " laterales	917
" " post. inf.	974
" " " med., sup.	974
" " septi	974
" " sup. post. Meckel.	973
" nasociliaris	912
" nasodentalis	915
" nasoocularis	912
" nasopalatinus Scarpae	974
" occipitalis maj., magnus	928
" " minor, parvus	929
" oculomotorius	893
" oculomuscularis comm.	893
" " externus	894
" " superior	896
" olfactorius 890.	430
" ophthalmicus	911
" opticus 891.	415
" palatini ext., int., ant.	975
" palpebrales inferiores	917
" " superiores	912
" patheticus	896
" pectorales anteriores	934
" " interni	944
" " posteriores	933
" " profundi	944
" perforans Casserii	935

Nervi	Seite
" peronaeus	954
" " superficialis	954
" " profundus	955
" petrosus profundus 969.	973
" " " major	969
" " " minor	969
" " superfic. major	973
" " " minor	976
" pharyngei	904
" phrenicus	931
" plantaris ext., int.	956
" pneumogastricus	902
" popliteus	955
" pterygoideus	918
" pterygopalatinus	915
" pudendus	958
" " communis	958
" " externus	949
" " infer., (int.)	959
" " super. (ext.)	959
" radialis	939
" " profundus	940
" " superficialis	940
" recurrens	906
" renales posteriores	966
" respiratorius ext. inf.	934
" " " sup.	908
" " internus	931
" sacculares	892
" sacrales	945
" saphenus inferior	955
" " major	951
" " minor, super.	951
" scapularis superior	933
" scrotales anteriores	948
" " posteriores	959
" spermaticus externus	949
" sphenopalatinus 915.	973
" spinales	922
" spinalis accessorius	908
" splanchnicus maj., minor	966
" stapedius	898
" subclavius	933
" subcostales	943
" subcutanei colli	901
" subcutaneus malae	914
" subcutanei maxillae inf.	900
" " nasi	917
" subcutaneus temporalis	920
" suboccipitalis	927
" subscapulares	934
" superficiales nasi	917
" supraclaviculares	930
" supraorbitalis	912

	Seite
Nervi	
" suprascapularis	933
" supratrochlearis	912
" suralis	955
" sympatheticus	961
" sympathicus (maximus)	961
" temporales faciales	900
" " profundi	918
" " subcutaneus	920
" " superficialis	919. 920
" tentorii cerebelli	969
" thoracici anteriores	934
" " longus	934
" " posteriores	933
" thoracicodorsalis	934
" tibialis	955
" " anterior	955
" tracheales inf., sup.	907. 906
" trifacialis	909
" trigeminus	909
" trisplanchnicus	961
" trochlearis	896
" tympanicus	901
" ulnaris	937
" " dorsalis	938
" " volaris prof.	939
" " " superfic.	938
" vaginales	984
" vagus	902
" vesicales inf., sup.	984
" vestibuli	892. 389
" Willisii accessorius	908
" zygomatici	900
Neurilema	36
Neurologia	829
Nictitatio	399
Nidus	849
Nodulus	847
Noduli Arantii, Morgagnii	645. 646
Nodus cerebri	837
Nucha	96
Nucleus amygdalae	862
" cerebelli	844
" dentis	84
" lentiformis	859
" lentis	419
" medullae spinalis	831
" olivae	835
Nymphae	569
Obex	836
Occiput	95
Oculus	345
Oesophagus	483
Olecranon	170
Olivae	835
Omentum colicum	503
" gastrocolicum	489. 503
" gastrohepaticum	510
Omentum majus, magnum	489. 503
" minus	489. 510
Omoplata	165
Operculum	853
Ophthalmos	395
Opisthotenar	236
Ora serrata	408
Orbiculus ciliaris	407
Orbita	139. 395
Organa	
" auditus	375
" chylopoëtica	485
" digestionis	483
" erectilia	25
" genitalia fem., mul.	555
" " maris, viril.	535
" gustus	432
" ingestionis	483
" loquelae	432
" olfactus	428
" respirationis	467
" tactus	75
" uropoëtica	521
" visus	395
" vocis	456
Orificium ani	501
" urethrae	530. 570
" uteri	561
" vaginae	566. 570
Os	433
Os uteri	561
Ossa	41
" alaeforme	109
" basilare	109
" brachii	168
" bregmatis	119
" brevia	44
" calcis	201
" carpi	173
" capitatum	174
" clunium	148
" coxae	181
" coxendicis	182
" cribriforme	120
" cuboideum	202
" cuneiforme carpi	174
" cuneiformia tarsi	201
" cylindrica	43
" ethmoideum	120
" femoris	192

Ossa	Seite
" frontis	117
" hamatum	174
" humeri	168
" hyoides, hypideum	132
" ilium	181
" innominatum	181
" ischii	182
" jugale	127
" lacrymale	128
" latum	148
" lata	43
" lenticulare	383
" longa	43
" lunatum	173
" magnum carpi	174
" malare	127
" maxillare inferius	130
" " superius	122
" metacarpi	177
" metatarsi	205
" multangulum maj., min.	174
" multiformia	44
" nasi, nasalia	128
" naviculare carpi	173
" " tarsi	201
" occipitis	112
" orbiculare	383
" palatinum	125
" parietale	119
" pectinis	183
" pectoris	158
" pelvis laterale	181
" petrosum	115
" pisiforme	173
" plana	43
" pubis	183
" sacrum	148
" scaphoideum carpi	173
" " tarsi	201
" semilunare	173
" sesamoidea manus	180
" " pedis	207
" sphenoideum	109
" sphenoidea tarsi	201
" spongiosum inferius	129
" subrotundum	173
" tarsi	200
" temporum	114
" trapezium	174
" trapezoides	174
" triangulare	173
" triquetrum	173
" turbinata	121
" turbinatum inferius	129

Ossa	Seite
" unciforme	174
" unguis	128
" verticis	119
" vespiforme	109
" zygomaticum	127
Ossicula auditus	382
" suturarum	134
" Sylvii, Sylvianum	383
" triquetra	134
" Wormiana	134
Osteologia	107
Ostium abdominale	559
Ostia arteriosa	638
" " aorticum	646
" " pulmonale	645
" atrioventricularia	638
" " dextrum	644
" " sinistrum	646
" duodenale	487
" oesophageum	487
" pharyngeum laryngis	463
" " tubae Eust. 382.	455
" tracheale	463
" tympanicum	381
" uterinum	560
" vaginae	566
" venosa	638
" " dextr., sinistr. 644.	646
Otoconia	389
Otolithi	389
Ovarium	555
Ovulum	557
Ovula Graafiana	556
" Nabothi	565
Ovum	571

Palatum durum, osseum, stabile 143.	437
" molle	437
Pallium	851
Palma	99
Palmae plicatae	565
Palpebra inf., sup.	396
Palpebra tertia	397
Pancreas	516
" Asellii	811
Panniculus adiposus	16
Papillae circumvallatae	446
" clavatae	446
" conicae	445
" filiformes	445
" fungiformes	446
" gustus	445

	Seite
Papillae linguales	445
" mammae	586
" nervi optici	415
" obtusae	446
" renales	522
" tactus	74
" vallatae	446
Parastata adenoides	545
" cirsoides	539
Parenchyma	92
Paria nervorum cerebr., spin.	887
" " cervicalia	927
" " coccygeum	945
" " decimum	902
" " dorsalia	942
" " duodecimum	894
" " lumbaria	945
" " nonum	901
" " octavum	892
" " primum	890
" " quartum	896
" " quintum	909
" " sacralia	945
" " secundum	891
" " septimum	897
" " sextum	894
" " tertium	893
" " undecimum	908
Parietes orbitae	140
Parotis	447
" accessoria	448
Pars abdomin. n. sympath.	967
" basilaris oss. occip.	112
" cartilaginea tub. Eust.	382
" cavernosa urethrae	530
" cervicalis n. symp.	962
" condyloidea oss. occ.	112
" coronalis oss. front.	117
" infraclavic. plex. brach.	934
" jugularis oss. occip.	112
" lumbosacralis n. symp.	967
" mastoidea oss. temp.	114
" membranacea ureth.	529
" nasalis oss. front.	118
" occipitalis oss. occ.	113
" ossea tub. Eust.	381
" orbitalis oss. front.	118
" petrosa oss. temp.	115
" prostatica ureth.	529
" spongiosa "	530
" squamosa oss. temp.	114
" supraclavic. plex. brach.	933
" thoracica n. symp.	965
Partus	571
Patella	196

	Seite
Pavimentum orbitae	140
Pecten pubis	183
Pedunculus cerebelli	836
" cerebri	855
" conarii	857. 871
" flocculi	843. 845
" gland. pinealis	857. 871
Pedunculus septi pellucidi	869
Pelvis major, superior	186
" minor, inferior	186
" renalis	525
Penis	547
Pericardium	636
Perichondrium	48
Pericranium	109
" internum	881
Periglottis	445
Perimysium	58
Perinaeum	98. 575
Periosteum	43
Periorbita	141. 395
Peritonaeum	580
" abdominale	580
" intestinale, viscer.	485. 582
Perone	196
Perspiratio cutanea	75
Pes anserinus	899
" hippocampi maj., min.	864
Phalanges dig. manus	179
" " pedis	206
" unguiculares	180. 206
Pharynx	451
Philtrum	433
Pia mater	875
Pigmentum nigrum	413
" sanguinis	26
Pili	80
Pinguedo	14
Pinnae nasi	428
Placenta sanguinis	26
Planta	100
Planum orbitale	122
" semicirculare	134
Platysma myoides	225
Pleurae	479
Pleura costalis	479
" phrenica	479
" pulmonalis	476. 479
Plexus gangliosi	38
Plexus lymphatici	786
" " axillaris	802
" " cervicalis	802
" " dorsalis manus	803
" " hypogastricus	809
" " iliacus ant., ext.	808

	Seite
Plex. lymph. inguinalis	807
" " intercostales	805
" " jugularis	802
" " lumbaris	810
" " mammarius int.	804
" " sacralis	809
Plexus nervosi	37
" " abdominales	980
" " aorticus abdom.	982
" " " thoracic.	979
" " auricularis poster.	971
" " brachialis	933
" " cardiacus	978
" " caroticus commun.	971
" " " externus	970
" " " internus	968
" " cavernosus n. carot.	969
" " cavernosus penis	984
" " cervicalis	929
" " coccygeus 947.	960
" " coeliacus	980
" " coronarii cordis	979
" " " ventriculi	981
" " dentalis inferior	921
" " " superior	916
" " ganglioformis n. vagi	903
" " gastrici	908
" " haemorrhoidalis med.	983
" " hepaticus	981
" " hypogastricus inf., lat.	983
" " " sup., med.	982
" " iliohypogastricus	983
" " ischiadicus 947.	952
" " lienalis	981
" " lingualis	971
" " lumbaris	947
" " lumbosacralis	947
" " mammarius int.	964
" " maxillaris ext.	971
" " " int.	971
" " meningeus med.	971
" " mesentericus inf.	982
" " " sup.	981
" " nervorum mollium	970
" " " spinalium	926
" " nodosus	903
" " occipitalis	971
" " oesophagei	907
" " parotideus 898.	899
" " pharyngeus	905
" " " adscend.	971

	Seite
Plexus nervosi	
" " phrenicus	981
" " prostaticus	984
" " pudendalis 947.	958
" " pulmonalis	907
" " renalis	982
" " sacralis	952
" " " posterior	946
" " semilunaris	980
" " solaris	980
" " spermaticus	982
" " splenicus	981
" " suprarenales	982
" " temporalis superf.	971
" " thyreoideus inf.	963
" " " sup.	971
" " tympanicus	977
" " uterini	983
" " vertebralis	964
" " vesicalis	984
Plexus venosi	756
" " choroidei 876.	877
" " circularis for. magni	764
" " digitales	775
" " haemorrhoidalis	786
" " maxillaris int.	771
" " pampiniformis 788.	541
" " " 789.	563
" " pharyngeus	768
" " pterygoideus	771
" " pudendalis	787
" " sacralis ant.	786
" " spinalis ant., post.	780
" " uterinus	788
" " vaginalis	788
" " vertebralis cervic.	773
" " " dorsalis	779
" " " lumbaris	789
" " vesicalis	786
Plica centralis retinae	415
Plicae ciliares	408
" conniventes	494
" cubiti	248
" epigastricae perit.	581
" longitudinalis duod.	495
" palmatae	565
" puboumbilicales	581
" rectouterinae	562
" rectovesicales	528
" semilunaris conjunct.	387
" " fasciae transv.	276
" semilunares Douglas 528.	562
" sigmoideae coli	505
" urachi	581

	Seite
licae uretericae	529
" vesicouterinae	528. 562
" villosae	490
ollex	99
ons Varolii	837
onticuli sinus rhomboid.	836
orta hepatis	507
ortio dura paris VII	897
" iliaca fasciae lat.	286
" intermedia Wrisbergii	897
" major, minor paris V	909. 910
" minor paris VIII	901
" mollis paris VII	892
" pectinea fasc. lat.	286
" pylorica	487
" splenica	487
" vaginalis	561
orus acusticus ext.	114
" " int.	117
rocessus ossium	44
" ad Vomerem	112
" alveolaris	124
" anconaeus	170
" anonymus	113
" arciformes	835
" articulares	145
" brevis mallei	382
" ciliares	408
" clinoideus ant., med., post.	110
" cochlearis	381
" condyloideus oss. occ.	112
" " max. inf.	131
" coracoideus	166
" coronoideus max. inf.	131
" " ulnae	170
" cubitalis	169
" dentalis	124
" durae matris	881
" ensiformis oss. sphen.	110
" " sterni	158
" ethmoidalis	129
" Folianus, Folii	383
" falciformis cerebelli	885
" " cerebri	884
" " fasciae latae	286
" frontalis oss. max. sup.	123
" " oss. zygom.	127
" incudis brev., long.	383
" jugularis	113
" lacrymalis	129
" lateralis calcanei	201
" longus mallei	383
" mammillaris	115
" mastoideus	115
" maxillaris o. zyg.	128

	Seite
Processus	
" maxillaris conchae inf.	129
" nasalis oss. front.	118
" " o. max. sup.	123
" obliqui	145
" odontoideus	147
" orbitalis	126
" palatinus	124
" pterygoideus	111
" pyramidalis	125
" Ravii	383
" sphenoidalis	127
" spinosus mallei	383
" spinosi vertebr.	145
" styloideus oss. temp.	116
" " radii	171
" " ulnae	170
" temporalis	128
" transversi	145
" uncinatus oss. ethm.	121
" " " ham.	174
" vaginalis	112
" vermiformis	500
" xiphoides	158
" zygomaticus oss. front.	118
" " oss. max. sup.	124
" " oss. temp.	118
Praeputium clitoridis	570
" penis	552
Promontorium	155
" tympani	380
Pronatio	172
Pronaus	570
Prostata	545
Prostatae inferiores	547
Protuberantia annularis	837
" laryngea	96
" mentalis ext.	130
" occipitalis ext., int.	113
Psalterium	868
Pubes	82
Pudendum muliebre	568
Pulmones	469
Pulpa dentis	84
" pili	81
" testis	537
Pulsatio	21
Puncta lacrymalia	401
Punctum adhaesionis	60
" fixum	60
" insertionis	60
" mobile	60
Pupilla	409
Pylorus	487
Pyramides anteriores	834

	Seite
Pyramides Ferreinii	523
" laterales	836
" Malpighii	522
" medullae oblong.	834
" posteriores	836
" renales	522. 523
Pyramis gland. thyreoid.	466
" oss. temporum	115
" vermis	847
Radiatio centralis	861
" corporis callosi	861. 866
Radius	170
Radix dentis	83
" ganglii ciliaris brev.	894
" " " media	970
" " " longa	913
" " " access.	972
" linguae	441
" mesenterii	493
" nasi	428
" nervi optici	857
" n. sympathici	969. 970
" penis	548
" pulmonis	470
Rami arteriosi	
" abdominales	700
" acromialis	674. 678
" alares	656
" anastomoticus prof.	722
" auricularis	657
" buccales inf., sup.	655. 656
" calcanei ext., int.	723. 724
" cervicales	656
" cervicalis posterior	675
" deltoideus	678
" dentales	659
" " superiores	661
" descendens circumflexae	714
" dorsales	692. 700
" dorsalis a. rad.	683. 684
" " a. uln.	685
" dorsales nasi	656
" epigastricus	672
" frontalis	658
" hepatici	695
" hyoideus	653
" infracostales	692
" infraspinatus	675
" inguinales	711
" intercostales	692
" interossei perforantes	689
" lienales	696
" mammarii ext.	692
" marginalis	665

	Seite
Rami arteriosi	
" masseterici	657
" musculoarticularis	715
" obturatorius	710
" occipitalis	656. 657. 658
" oesophagei	673
" pancreatici	696
" parotidei	657
" perforans post. primus	722
" perforantes	672
" " metatarsi	725
" petrosus superficialis	660
" pharyngei	673
" plantaris profundus	722
" pterygoidei	657
" pubicus	703
" scapularis superfic.	674
" spinales	692. 669. 700
" sternocleidomastoideus	656
" submaxillares	655
" subscapulares	678
" supracostales	692
" supraorbitalis	658
" supraspinatus	675
" tarseus	665
" thoracicodorsalis	678
" thyreoidei	653. 673
" tracheales	673
" volaris profundus	683. 686
" " superfic.	683. 686
" zygomaticoorbitalis	658
Rami nervorum	
" anteriores nm. spinal.	926
" auricularis n. vagi	904
" buccalis n. dental.	915
" cardiacus n. hypogl.	896
" cardiaci n. vagi	906
" caroticus adscendens	962
" communicans n. peron.	954
" " n. tibial.	955
" cervicalis n. hypogloss.	895
" cutaneus n. rad.	940
" " palmaris	935
" " plantares	956
" " ulnaris	935
" descendens n. hypogl.	895
" digastricus	899
" dorsalis n. rad.	940
" " n. uln.	938
" inferior n. max. inf.	920
" laryngopharyngei	962
" lingualis n. glossoph.	902
" " n. hypogl.	896
" muscularis n. peron.	955
" " n. rad.	940

	Seite
Rami nervorum	
" nasalis n. dent. sup. ant.	916
" " n. ophthalm.	912
" oesophagei	906
" palmaris long. n. med.	937
" " " n. uln.	938
" pectorales laterales	943
" pharyngei gangl. sphen.	973
" " n. glossoph.	902
" pharyngobasilaris	902
" phrenicoabdominales	931
" posteriores nm. spinal.	925
" primus n. trigem.	911
" profundus n. plant. ext.	957
" " n. radial.	940
" " n. Vidiani	969
" secundus n. trigem.	914
" stylohyoideus	899
" stylopharyngeus	902
" superior n. max. inf.	917
" superfic. n. plant. ext.	956
" " n. radial.	940
" tertius n. trigem.	917
" volaris n. ulnaris	938
Ramus maxillae inferioris	131
Ramus ossis ischii	183
" " pubis	183
Ramus profundus venae fac.	769
Ramificatio vasorum	17
Raphe corporis callosi	866
" perinaei	575
" scroti	543
Receptaculum chyli, Pecqueti	797
Recessus hemiell., hemisphaer.	386
Rectum	501
Regiones	95
" costalis	97
" epigastrica	98
" gastrica	98
" hypochondriaca	98
" iliaca	98
" inguinalis	98
" lumbaris	98
" mammillaris	97
" mesogastrica	98
" ocularis	97
" pubis	98
" sacralis	97
" scapularis	97
" sternalis	97
" subauricularis	96
" submaxillaris	96
" submentalis	96
" umbilicalis	98
Ren, Renes	521

	Seite
Renculi	521
Renes succenturiati	534
Respiratio	477
Rete articulare cubiti	686
" " genu	718
" calcaneum	724
" carpeum dors., volare	687
" malleolare ext., int.	720
" vasculare	18
" vasculosum Halleri	538
" venosum dorsale manus	775
" " " pedis	784
Retina	414
Retinaculum tend. peron.	289
Rima clunium	97
" glottidis	460
" pudendi, vulvae	568
Rostrum corporis callosi	867
" sphenoidale	110
Rotatio	47. 212
Rotula	196
Rudimentum can. vagin.	542
Ruinae proc. vaginalis	542
S romanum	501
Sacculus hemiellipt., semi-ovalis	388
" rotundus, sphaericus	388
Saccus lacrymalis	402
" lacteus	797
" peritonaei	580
" pleurae	479
Saliva	450
Salpinx	381
Sanguis	25
Scala tympani	392
" vestibuli	392
Scapha	376
Scapula	165
Sceleton, Sceletus	41
" feminae	207
Scissura longit. cerebelli	841
" " cerebri	850
Sclerotica	404
Scrobiculus cordis	97
Scrotum	543
Scybala	506
Scyphulus	392
Scyphus	390
Sebum cutaneum	89
" palpebrale	398
Sella turcica	110
Semen	552
Semicanalis oss. brachii	169

	Seite
Septula fibr. penis	549
" testis	537
Septum annuli cruralis, crurale	276. 288
Septum atriorum	638
" cordis	637
" lucidum	869
" mobile narium	428
" nasi, narium	143
" pellucidum	869
" penis	548
" scroti	543
" transversum	277
" ventriculorum	638
Serum membran. seros.	67
" sanguinis	25
" telae cellulosae	14
Sinciput	95
Sinus	
" alae parvae	763
" basilares	764
" cavernosi	763
" circularis for. magni	764
" " Ridleyi	763
" columnae vertebralis	780
" communis	388
" costales	158
" durae matris	882
" frontales	119
" longitudinalis inf.	763
" " sup.	762
" mammarum	585
" maxillares	123
" maximus	169
" nasi accessorii	430
" occipitales	764
" perpendicularis	763
" petrosi inferiores	764
" " superiores	763
" quartus	763
" rectus	763
" rhomboideus	836
" sphenoidales	109
" sphenoparietalis	763
" squamosopetrosus	764
" tarsi	203
" tentorii	763
" transversus	762
" tympani	380
" Valsalvae	648
" venarum cavarum	642
" venae portarum	791
" venarum pulmonalium	645
Smegma	89
" praeputii	552
Solida	10
Speculum Helmontii	278
Sperma	552
Spermatozoa	553
Spina angularis	111
" ant. sup. oss. ilium	182
" " inf. " "	182
" dorsi	144
" frontalis ext., int.	118. 117
" helicis	375
" ischii	183
" jugularis	113
" mentalis interna	131
" nasalis anterior	125
" " oss. frontis	118
" " posterior	125
" oss. ilium	182
" palatina	125
" post. inf., sup. oss. il.	182
" scapulae	166
" tibiae	196
" trochlearis	118
" tuberculi maj., min.	168
" vertebrarum	145
Splanchna	91
Splen	518
Splenium corp. callosi	867
Squama	114
Staphyle	438
Stercora	505
Sternum	158
Stigmata Malpighii	520
Stomachus	487
Stratum germinativum	558
" musculare urethrae	530
" zonale	857
Stria cornea, terminalis	860
Striae longitudinales lat.	861. 866
" medullares	837
Stroma	556
Subiculum cornu ammonis	854
Substantia celluloso-vasculosa	512
" cellularis ossium	42
" cinerea	31
" compacta ossium	42
" cornea	76
" corticalis encephali	33. 34
" " ossium	42
" " renum	522
" medullaris	31
" nervea	31
" nigra	856
" ossea dentium	83
" perforata antica	852
" " media	871

	Seite
Substantia propria acinosa	512
" reticularis ossium	42
" spongiosa ossium	42
" tubulosa renum	522
" vasculosa renum	522
" vitrea dentium	84
Succus entericus	499
" " coeci	505
" gastricus	490
" pancreaticus	517
Sudor	75
Sulci	
" atrioventricularis	635
" basilaris	112
" calcanei	201
" caroticus	110
" cerebelli	842
" cerebri	852
" circularis cordis	635
" costalis	159
" infra nates	99
" infrapalpebralis	96
" intertubercularis	169
" jugularis	113
" lacrymalis 123. 124.	129
" laterales med. spinalis	830
" longitudinalis cordis	635
" " cranii	136
" " oss. frontis	117
" " oss. occip.	113
" " oss. parietal.	119
" magnus horizontalis	842
" malleoli interni	196
" meningei	109
" mentolabialis 95.	433
" muscularis	381
" mylohyoideus	131
" nasolabialis 95.	433
" ossis cuboidei	202
" oss. multanguli maj.	174
" petrosus superior	116
" " inferior	138
" pterygopalatinus 112.	126
" scleroticae	404
" stapedis	383
" tali	200
" tractus olfactorii	853
" transversi 115.	120
" tubae Eustachii	112
" tympani	377
Supercilium	395
" acetabuli	181
Superficies auricularis 149.	182
" lunata	181
Supinatio	172

	Seite
Suspensorium penis	551
Sustentaculum tali	201
Suturae	45
" coronalis	119
" frontalis	119
" lambdoidea	119
" mastoidea	115
" palatina	125
" sagittalis	119
" squamosa 119.	134
Symphysis	46
" pubis	185
" sacrococcygea	152
" sacroiliaca	184
Synarthrosis	45
Synchondrosis	46
Syndesmologia	107
Syndesmosis	46
Synovia	68
Systemata organica	12
Systole	647
Tabula vitrea	109
Taenia (=Fimbria)	865
Taeniae coli	501
Taenia semicircularis	859
Taeniola corp. callosi	867
Talus	200
Tapetum choroid.	406
Tapetum ventr. lat.	868
Tarsi palpebrarum	396
Tarsus	202
Tegmentum ventr. lat.	863
Tela cellulosa	13
" " subcutanea	14
" choroidea inf., sup.,	877
" interlobularis	512
" mucosa	13
Tempora	95
Tenacula	263
Tendines	53
" intermedii	61
Tendo Achillis	302
Tentorium cerebelli	883
Testes	536
" cerebri	840
" muliebres	555
Testiculus	536
Textus cellulosus	13
" papillaris	70
Thalamus opticus, n. opt.	856
Theca folliculi Graaf.	557
" vertebralis	156
Thenar pollicis	247
Thorax 163.	478

	Seite
Thymus	481
Tibia	195
Tonsilla	438
" cerebelli	843
Torcular Herophili	762
Trabeculae carneae	640
" corp. cavernos.	549
" lienis	519
Trabes carneae	641
Trabs cerebri	866
Trachea	467
Tractus olfactorius	853. 899
" opticus	857
" spiralis	390
Tragus	375
Trigonum cerebrale	868
" cervicale	223
" commiss. post.	871
" deltoideopectorale	242
" vesicae	529
Trochanter maj., min.	193
Trochlea ossea	47
" fibrocartilaginosa	51
" m. obliqui sup.	426
" oss. brachii	169
Trochoides	47
Truncus anonymus	650
" com. carot. et subclav.	650
" corporis callosi	866
" costocervicalis	674
" innominatus	650
" lymph. bronchiomediast.	799. 806
" " com. dexter, min.	798
" " " sinister	797
" " intestinalis	798. 812
" " jugularis	798. 799. 802
" " lumbaris	811
" " subclavius	799. 804
" pili	80
" thyreocervicalis	673
Tuba Eustachii	381
" Fallopii, uterina	559
Tuber cinereum	871
" frontale	117
" ischii	183
" maxillare	123
" parietale	119
" valvulae	847
Tuberculum articulare	114
" atlantis ant., post.	147
" caudatum	508
" costae	159
" iliopectineum	183
" jugulare	113

	Seite
Tuberculum Loweri	643
" majus, minus oss. brach.	168
" papillare	508
" pubis	183
" super. ant. thalami	856
" " post. "	857
" tali	200
Tuberositas calcanei	201
" claviculae	165
" oss. capitati	174
" " cuboidei	202
" " ilium	182
" " metacarpi V	178
" " metatarsi V	205
" " multanguli maj.	174
" " navicularis carpi	173
" " " tarsi	201
" radii	171
" tibiae	196
" ulnae	170
" unguicularis	180
Tubuli Belliniani	523
" centralis	390
" contorti	523
" secretorii	91
" semicirculares	388
" seminiferi	537
" spiralis	391
" uriniferi	522. 523
" " corticales	523
" " recti	523
Tubus alimentarius	483
" digestiv., digestorius	485
" ingestorius	483
Tunicae	
" adnata oculi	406
" albugineae	52
" albuginea lienis	519
" " oculi	404
" " ovarii	556
" " penis	548
" " renis	521
" " testis	536
" arachnoidea	878
" " oculi	405
" cellulosae	15
" cerebri	875
" choroidea, chorioidea	406
" conjunctiva bulbi	406
" " palp.	397
" cornea	405
" " opaca	404
" " pellucida	405
" dartos	543
" Demoursiana	406

	Seite
Tunicae	
" Descemeti	406
" erythroides	542
" fibrosae	52
" fibrosa cerebri	879
" folliculi Graaf.	557
" humoris aquei	423
" hyaloidea	417
" intestinorum	485
" musculares	65
" nervea intestinorum	486
" " oculi	414
" oculi	403
" propria cerebri	875
" " intestin.	486
" " lienis	519
" " ovarii	556
" " renis	521
" " testis	536
" retina	414
" sclerotica	404
" serosae	66
" serosa cerebri	878
" " testis	536
" uvea	410
" vaginalis communis	542
" " propria	540
" vasculosae	24
" " cerebri	875
" " intestinorum	486
" " oculi	406
" vasorum elast., med.	19
" " ext., intima	18
" villosa	495
" vitrea	417
Tutamina oculi	395
Tympanum	379
Ulna	170
Umbilicus	97. 267
Umbo membr. tymp.	379
Uncus (cerebri)	854. 864
" oss. hamati	174
Unguis (cerebri)	863
Ungues	78
Urachus	526. 527
Ureter	525
Urethra femin., mul.	531
" maris, vir.	529
Urina	532
Uterus	560
Utriculus	388
Uvea	410
Uvula	438
" vermis	847
Vaginae mucosae	69
" musculi rect. abd.	269
" synoviales	69
" tendinosa cruris	288
" tendinum fibrosae	55
" " mm. flex. dig.	263
" vasorum cruralium	283
Vallecula	841
Valvula Bauhini	495
" bicuspidalis	646
" cerebelli, cerebri	848
" coeci	495
" coli	495
Valvulae conniventes	494
Valvula Eustachii	643
" Fallopii	495
Valvulae Kerkringii	494
Valvula mitralis	646
" pylori	487. 489
Valvulae semilunares cerebelli	848
" " aorticae	646
" " pulmonales	645
Valvula Thebesii	643
" tricuspidalis, triglochis	644
" Tulpii	495
" vaginae	567
Valvulae venarum	22
Varietates arteriarum	738—786
Vas aberrans Halleri	540
" deferens	539
Vasa absorbentia	795
" capillaria	23
" chylifera	811
" interlobularia	512
" lactea	811
" lymphatica	16. 28. 795
" " intestinalia	811
" " subcutanea	796
" nutritia ossium	43
" pulmonalia	792
" sanguifera	16
" serpentina	537
" vasorum	19
" vorticosa	408
Vascula efferentia testis	538
Velum choroides	877
" medullare ant., post.	848
" palatinum	437
" pendulum palati	437
" sinus rhomboidei	836
Venae	16. 21. 756
" absorbentes	795
" alveolaris superior	769
" angularis	769
" anonyma	760

	Seite
Venae	
" arteriosa	793
" articulares genu	784
" auditivae internae	767
" auriculares ant., inf., sup.	770
" axillaris	774
" azygos, azyga	777
" " minor, sinistra	778
" basilica	775
" basivertebrales	781
" brachialis ext., int.	774
" brachiocephalica	760
" bronchiales	475
" " ant., post.	777. 778
" buccales	770. 771
" bulbourethrales	786
" calcaneae	784
" cardiacae	757
" cavernosae	787. 549
" cava adscendens, inf.	781
" " descendens, sup.	759
" centrales lobulorum	792. 512
" centralis retinae	767. 416
" cephalica	761
" " pollicis, brachii	775
" cerebelli inf., sup.	765
" cerebrales	764. 765
" cerebralis magna	765
" cerebralis profunda	772
" " superficiales	771
" choroidea lateralis	766
" ciliares	767. 768. 412
" circumflexae brachii	774
" " femoris	784
" " ilium	784
" colicae	790
" collaterales rad., uln.	774
" colli superficiales	771
" cordis	757. 758
" coronariae cordis dext., med., min., post.	758
" " cordis sinistra, magna	757
" " ventriculi dextr., inf., sup.	790
" corporis callosi	765
" " striati	766
" cruralis	783
" cutanea rad., uln.	775
" digitales	774
" diploicae	766
" dorsalis clitoridis	787
" " linguae	768
" " penis mediana prof.	787
" " " subcutaneae	787

	Seite
Venae	
" dorsi spinales	779
" durae matris	766
" emulgentes	788
" epigastricae inf.	784
" " superfic.	785
" " superior	777
" facialis anterior	769
" " communis	768
" " posterior	770
" femoralis	783
" fossae Sylvii	765
" frontales	769. 770
" Galeni	765
" gastricae breves	790
" gastrocnemicae	784
" gastrocolica	790
" gastroepiploicae	790
" gluteae	786
" haemorrhoidales ext., med.	786
" " int., sup.	790
" hemiazygos	778
" hepaticae	792. 512
" hypogastrica	786
" ileocolica	790
" iliaca communis, int.	783
" " externa	783
" " interna	786
" " primitiva	783
" iliolumbalis	786
" infraorbitalis	768
" inguinales	785
" intercostales poster.	779
" " suprema	777
" interlobulares	791. 512
" interosseae	774
" intestinales	790
" intralobulares	786. 512
" ischiadicae	786
" jugularis communis	760. 761
" " cerebralis	761
" " externa	771
" " " ant.	772
" " " post.	771
" " interna	761
" labiales oris	769. 770
" " pudendi	785. 786
" lacrymalis	767
" laryngea superior	769
" lienalis	790. 519
" lingualis	768
" lumbaris adscendens	789
" lumbares transversae	789
" magna Galeni	765

Venae	Seite
" malleolares	784
" mammariae int.	777
" massetericae	770. 771
" maxillaris int.	771
" " " ant.	769
" mediana antibrachii	776
" " colli	771
" mediastinae	777. 778
" meningeae	766
" mentalis	772
" mesaraica	790
" mesenterica	790
" " inf.	790
" metatarseae	784
" musculophrenicae	777
" nasales laterales	769
" " post.	769
" obturatoria	786
" occipitales	771. 773
" oesophageae	778
" ophthalmica inf., fac.	767
" " sup., cerebr.	767
" palatinae	768
" palpebrales	769. 770
" parotideae	770
" perforantes	784
" pericardiacae	777
" " post.	778
" peronaeae	784
" pharyngeae	768
" phrenicae inf.	789
" " sup.	777
" plantares	784
" poplitea	783
" portarum, portae	789. 791. 511
" profundae brachii	774
" " cruris et fem.	784
" " femoris	784
" " penis, clitor.	787
" pterygoideae	771
" pudenda comm., int.	786
" " externae	785
" pulmonales	794. 474
" radiales	774
" raninae	768
" recurrentes	774
" renales	788. 524
" sacrales lat., med.	786
" salvatella	775
" saphena magna	785
" " parva, minor	785
" scrotales ant., post.	785. 786
" sine comite, sine pari	777
" spermaticae ext.	784

Venae	Seite
" spermaticae int.	788. 537. 541
" sphenopalatina	769
" spinales	779
" " long., propr.	780
" splenica	790
" stylomastoidea	770
" subclavia	773. 760
" subcutaneae brachii	774
" " cruris et. fem.	785
" sublinguales	768
" subscapulares	774
" superficiales brachii	774
" " cruris et fem.	785
" " colli ant.	771
" " " inf.	771
" supraorbitales	769. 770
" suprarenales	788
" suprascapulares	776
" tarseae	784
" temporalis communis	770
" " media, prof.	770
" " profundae	771
" " superficiales	770
" thoracicae	774
" thoracicoacromialis	776
" thymicae	777
" thyreoidea ima	772
" " infer.	772
" " super.	769. 761
" " lat., med.	761
" tibiales ant., post.	784
" transversa colli	776
" " faciei	770
" " perinaei	786
" " scapulae	776
" tympanicae	770
" ulnares	774
" uterinae	788
" vertebralis communis	773
" " ext., superf.	772
" " int., prof.	772
" vesicales	787
" vorticosae	409
Venter musculi	60
Ventriculus	487
" anterior cordis	644
" Arantii	836
" aorticus	646
" cerebelli	848
" dexter cordis	644
" laryngis	463
" lateralis cerebri	862
" magnus cerebri	862
" Morgagnii	463

	Seite
Ventriculus posterior cordis	646
" primus	870
" pulmonalis	644
" quartus	848
" quintus	870
" septi	870
" sinister cordis	646
" tertius	873
" tricornis	862
Vermis	846
Vertebrae cervicales, colli	146
" dorsi, thoracis	146
" lumbares, lumborum	147
" prominens	148
" spuriae 145. 148.	149
" verae	145
Vertex	95
" vesicae	526
Veru montanum	531
Vesica fellea	514
" urinaria	526
Vesicula bilis	514
" germinativa	558
Vesicula Graafiana	556
" prolifera	558
" pulmonales	473
" seminales	544
Vestibulum	385
" vaginae	570
Vibrissae	430
Villi	495
Vincula vasc. tendinum	263
Virga	547
Vis musculorum	59
Viscera	91
Vitrina auditiva	388
Vola manus	99
Vomer	130
Vulva	568
Zona granulosa	557
" pellucida	558
Zonula ciliaris	416
" laminae spiralis 391.	392
" Zinnii	416
Zygoma	128

Register

der deutschen Benennungen.

	Seite
Absteigender Bauchmuskel	270
" " Halsmuskel	237
Abziehen	212
Abzieher des Daumens 259.	265
" der grofsen Zehe	306
" des kleinen Fingers	266
" der kleinen Zehe	307
" des Zeigefingers	267
Accessorische Markbündel	861
Achillessehne	302
Achsel	98
Achselblutader	774
Achseldrüsen	802
Achselhöhle	247
Achselnerv	936
Achselschlagader	676
Varietäten	745
Adamsapfel	96
Aderhäute	24
Aderhaut des Auges	406
Adergeflechte	876
Adergeflechtsschl.	666
After	501
Afterheber	577
Afterschlagader	706
Afterschliefser 504.	578
Alcohol-Fleischextract	6
Ambos	383
Ammonshorn	864
Ampullen	388
Anastomosen d. Schl. 727—	737
Anlage	45
Animalisches Nervensystem	40
Antlitzblutadern	768
Antlitzdrüsen	799
Antlitznerv	897
Antlitzschl., äufsere	654
" queere	658
Anziehen	212
Anzieher des Daumens	265
" der grofs. Zehe	307
Anzieher des klein. Fingers	266
" d. Oberschenkels 296.	297
" " Ohrs.	220
Aorte, absteigende	649
" aufsteigende	648
Aortenbogen	648
Aorte, Varietäten	739
Aortengeflecht 979.	982
Aortenherz	638
Aortenherzkammer	646
Aortenschlitz	279
Aortensystem	648
Aortenwurzel, -zwiebel	648
Armbein	168
Armblutadern	774
Armgeflecht	933
Armmuskel, innerer	255
" runde 253.	254
Armnerven 933.	934
Armschlagader	679
Varietäten	746
Arnold'scher Knoten	975
Athmen	477
Athmungswerkzeuge	467
Aufhängeband d. Leber	509
" d. Milz	518
" d. Ruthe	551
Aufheber des Augenlieds	399
" " Kniees	218
" " Mundwinkels	217
" der Oberlippe u. Nasenflügels	216
" " Oberlippe	217
" " Ohrs	220
" " Ruthe	578
Aufrichter der Ruthe	578
Aufsteigender Bauchmuskel	273
" Halsmuskel	237
Auge	395
Augapfel	403
Augenbewegender Nerv	893

	Seite
Augenblutadern	767
Augenbraue	395
Augenbrauenrunzler	215
Augenbutter	398
Augenflüssigkeiten	404
" " wässerige	422
Augenhäute	403
Augenhöhle	139. 395
Augenknoten	972
Augenlieder	396
Augenliedbänder	397
Augenliedbogen	665
Augenliedknorpel	396
Augenliednerven, obere	912
" untere	917
Augenliedschlagadern	665
Augenliedschliefser	215
Augenkammern	422. 423
Augenmuskeln	424
Augenmuskelnerv, äufserer	894
" gemeinschaftl.	893
" oberer	896
Augenmuskelschlagadern	664
Augennerv	911
Augenschlagader	663
Augenschwarz	413
Augenspalte	396
Augenstern	409
Augenwimpern	398
Augenwinkel	396
Äufseres Ohr	375
Backen	434
Backendrüsen	434
Backenmuskel	219
Backenmuskelnerv	918
Backennerven	900
Backenschlagader	660
Backenzähne	436
Ballen des Daumens	247
" " klein. Fingers	247
Balken	866
Balkenknie	867
Balkennath	866
Balkenschlagader	666
Balkenschnabel	867
Balkenstamm	866
Balkenstrahlung	861. 866
Balkenwulst	867
Balkenzange	867
Bandhaft	46
Bauch	97
Bauchaorte	649. 693
Bauchaortengeflecht	982
Bauchbinde, gerade	269
Bauchbinde, queere	275
Bauchdeckenschlag., obere	672
" oberflächl.	712
" untere	709
Varietäten	753
Bauchfell	580
Bauchfellbänder	582
Bauchgeflechte	980
Bauchhöhle	572
Bauchmuskeln, gerader	269
" schräger äufserer	270
" " innerer	273
" queerer	274
Bauchmuskelscheide	269
Bauchring	272
Bauchspeichel	517
Bauchspeicheldrüse	516
Bauchwirbel	147
Bauchwirbelnerven	945
Baudelocque's Linie	191
Bauschmuskeln	236
Becher	390
Becken	186
Beckenausgang	187
Beckenblutader	786
Beckendrüsen	809
Beckendurchmesser	188
Beckeneingang	186
Beckengeflechte	982
Beckenhöhle	187. 573
Beckenneigung	192
Beckenschlagader	701
Varietäten	751
Bedeckte Bänder	867
Begattungsorgane	535
Beinerv	908
Beinhaut	42
Berg des Wurms	846
Beuger des Daumens	263. 265
" der Finger	262
" " grofsen Zehe	304. 306
" des klein. Fingers	266
" der " Zehe	307
" des Unterschenkels	299
" " Vorderarms	254
" der Zehen	303. 305
Beugung	212
Beutelförmiger Ausschnitt	841
Bewegungen	308—317
" des Gaumens	440
" " Kehlkopfes	464
" Reflexions-	889
" wurmförmige	486. 491. 499
" der Zunge	444
Bildungsgewebe	13

	Seite
Bildungsknorpel	41
Bildungssäfte	8
Bindearme	845
Bindehaut	397
Birnförmiger Muskel	292
Blasenblutadern	787
Blasengeflecht	984
Blasengrund, -hals	526
Blasennerven	984
Blasen-Scheideschlaga.	705
Blasenscheitel	526
Blasenschlagader	701. 704
Blendung	409
Blendungsknoten	972
Blendungsnerven	412. 972
" lange	912. 913
Blendungsschlagadern	644. 409. 411
Blinddarm	500
Blinddarmsaft	505
Blind-Grimmdarmschl.	697
Blinzeln	399
Blut	25
Blutadern	16. 21
Blutdrüsen	25
Blutgefäfse	16
Blutgefäfsknoten	25
Blutkörnchen, -kügelchen	25
Blutkuchen	26
Blutleiter d. Hirnhaut	762
Blutroth	7. 26
Blutserum	26. 28
Bogen	868
Bogenbündel	861
Bogengänge	386
Bogenröhren	387
Botallischer Gang	794
Breiter Halsmuskel	225
Breiter Rückenmuskel	234
Briesel	481
Bronchialblutadern	475. 777. 778
Bronchialdrüsen	806
Bronchialschl.	691. 671. 475
Brückchen d. Rautengrube	836
Brücke	836
Brückenarm	845
Brückenschenkel	845
Brunner'sche Drüsen	497
Brust	163. 478
Brüste	585
Brustaorte	649. 691
Brustaortengeflecht	979
Brustbein	158
Brustbeindrüsen	804
Brustbeinmuskel, dreieck.	245
Brustbeinschildmuskel	228
Brustbeinschlüsselgelenk	167
Brustblutadern, innere	777
Brustdrüse (Thymus)	481
Brustfelle	479
Brustförmige Körper	869
Brustgang	797
Brusthöhle	478
Brustkasten	163
Brustkastennerven	933. 934
Brustknoten	965
" oberer	964
Brustmuskel, gr., kl.	242. 243
Brust-Muskelnerven	934
Brustschlaga., äufsere	672
" äufs. obere	677
" " lange	678
" innere	671
Brüsteschlagadern	678
Brustschulterschlagader	677
Brustwarze	586
Brustwirbel	146
Brustzungenbeinmuskel	228
Capacität des Herzens	638
Carotischer Knoten	968
Casserischer Nerv	935
Centralläppchen	842. 846
Centralorgan des Nervensystems	32. 829
Cholëin	516
Cholesterin	7. 516
Chorden	876
Chylificationsorgane	485
Chylusgefäfse	812
Ciliarfalten, -fortsätze	408
Ciliarschlagadern	664
Commissur, weiche, vord., hint.	870
Cotunnische Wasserleitungen	393
Cowpersche Drüsen	547
Crystallinse	418
Dach der Augenhöhle	140
Dach der Seitenhöhle	863
" " Sylvischen Grube	853
" " vierten Höhle	849
Damm	98. 575
Dammmuskeln	578
Dammnerven	959
Dammschlagader	706
Darmbein	181
Darmbeinkamm	182
Darmkanal	485
Darmkoth	505
Darmmuskel, innerer	291

	Seite
Darmsaft	499
Daumenballen	247
Daumenbeuger	263. 265
Daumenschlagadern	683
Daumenstrecker	260
Deltamuskel	252
Descemetsche Haut	423
Desmourssche Haut	406. 423
Dimensionen des Körpers	101
Dornmuskel des Rückens	239
Dotterhaut	558
Douglas'sche Falten	527
" Linie	270
Dreher	147
Drehgelenk	47
Dreigetheilter Nerv	909
Dreiköpfiger Armmuskel	256
" Schenkelmuskel	297
Dreiseitiges Bein	173
Dreizipfelige Klappe	644
Drillingsnerv	909
Drosselblutadern, äufsere	771
" gemeinsch.	761
" innere	761
Drüsen	85
Drüsensäfte	9
Dünndarm	491
Dünndarmblutadern	790
Dünndarmgekröse	493
Dünndarmschlagadern	696
DurchbohrendeSchlagadern	714.715
Durchflochtener Nackenm.	239
Eckzähne	435
Ei, Eichen	557
Ei	571
Eichel	550. 569
Eichelkrone	551
Eiförmige Grube d. Schenkelb.	286
" " " Herzens	643
Eiförmiges Loch	184
Eierstöcke	555
Eileiter	559
Eingeweide	91
Eingeweidedrüsen	813
Eingeweidenerven	966
Eingeweideschlagader	694
Eischeibe	557
Elastische Substanz	11. 55
" Organe	56
Ellenbogendrüsen	803
Ellenbogengelenk	172
Ellenbogengrube	248
Ellenbogenmuskel, äufserer	258
" innerer	261
Ellenbogennerv	937
Ellenbogennetz	686
Ellenbogenröhre	170
Ellenbogenschlagader	684
Email	84
Endfaden d. Rückenm.	876
Endplatte, graue	872
Erbsenbein	173
Erectile Organe	25
Erection	554
Erschlaffer d. Paukenfells	384
Eustachische Klappe	643
" Trompete	381
Excremente	506
Fallopisches Band	271
Fallopischer Kanal	393
Faltenkranz	408
Faserkapseln	53
Faserknorpel	50
Faserstoff	6
Fasersystem	57
Felsenbein	115
Felsenblutleiter	763. 764
Felsenknoten	901
Felsennerv, oberfl. grofser	973
" " kleiner	976
" tiefer	969
Fenster, ovales, rundes	523
Ferrein'sche Pyramiden	523
Ferse	100
Fersenbein	201
Fersennetz	724
Fersenschlagadern	723. 724
Fett	7. 14
Fetthaut	15
Fibröse Häute	52
Finger	99
Fingerbeuger, gemeinsch.	262
Fingerblutadern	774
Fingergelenke	180
Fingerglieder	179
Fingergrube	863
Fingernerven	941
Fingerschlagadern	689. 690
Fingerstrecker, gemeinsch.	257
Fingerförmige Erhabenheit = Sporn	863
Flechse	53
Fledermausflügel	563
Fleischhaut d. Hodensacks	543
Fleischige Platte	225
Flocke	843
Flockenkranz	416
Flockenstiel	843
Flügel des Centralläppchen	842

	Seite
Flügelgaumenmuskel	144
Flügelgaumennerv	915
Flügelgaumenschlagader	661
Flügelmuskeln	222
Flügelmuskelnerven	918
Flügelmuskelschlagadern	660
Flügelschlundkopfmuskel	454
Frauenmilch	587
Frucht	571
Fruchthälter	560
Fuge	46
Fufsgelenk	204
Fufsmuskeln	304
Fufsrückenblutadern	784
Fufsrückennerv, äufserer	956
" innerer, mittl.	954
Fufsrückenschlagader	719
Fufsschlagadern	719
Varietäten	755
Fufssohlenbogen	725
Fufssohlenschlagadern	724
Fufswurzel	202
Fufswurzelgelenke	203
Fufswurzelknochen	200
Fufswurzelschlagadern	720. 721
Galle	515
Gallenblase	514
Gallenblasengang	514
Gallenblasenschlagader	695
Gallengang, gemeinsch.	515
Gallengänge	513
Gallenstoff	516
Gangliennerven	961
Gangliennervensystem	37. 960
Gänsefufsgeflecht	899
Gasser'scher Knoten	910
Gaumen	143. 437
Gaumenbeine	125
Gaumenbögen	438
Gaumenfortsatz	124
Gaumenheber	439
Gaumenkeilbeinknoten	972
Gaumenmuskeln	439
Gaumennerven	975
Gaumenschlaga., absteig.	661
" aufsteig.	653
Gaumenschnürer	439
Gaumensegel	437
Gaumenspanner	440
Gebärmutter	560
Gebärmutterblutadern	788
Gebärmuttergeflecht	983
Gebärmutternerven	983
Gebärmutterschlagadern	705
Gedärme, dünne	491
" dicke	500
Gefäfshäute	24
Gefäfshaut des Auges	406
" " Hirns	875
Gefäfslehre	635
Gefäfssystem	16
Gefäfsvorhang	877
Gefiederte Muskeln	62
Geflecht s. Nerven-, Venen-, Saugadergeflechte	
Geflechte der Rückenmarksnerven	926
Gefühlswärzchen	74
Gegenden des Körpers	96
Gegenecke	376
Gegenleiste	375
Gegensteller d. Daumens	265
Gehen	319
Gehirn	833
" grofses	849
" kleines	840
Gehörgang, äufserer	377
" innerer	393
Gehörgangsnerven	919
Gehörknöchelchen	382
Gehörnerv	892
Gehörorgan (vgl. Ohr)	375
Gekröse	493
Gekrösblutadern	790
Gekrösdrüsen	811. 812
Gekrösgeflechte	981. 982
Gekrösschlaga., obere	696
" untere	698
Gelber Fleck	415
Gelber Körper	559
Gelenkbänder	53
Gelenkknorpel	49
Gelenkschmiere	68
Geruchsnerv	430. 890
Geruchsorgan	428
Gesäfsmuskeln	291. 292
Gesäfsnerve	952. 953
Gesäfsschlagader	703. 704
Gesäfsspalte	97
Geschlechtsorgane, männl.	535
" weibl.	555
Gesicht	139
Gesichtsorgan	395
Gesichtsblutadern	768. 769. 770
Geschmacksnerv	920
Geschmacksorgan	432
Geschmackswärzchen	445
Gestreifter Körper	858
Gewebe	XXVIII. 12

	Seite
Gewindegelenk	47
Gewölbe	868
Gezahntes Band	875. 880
Gezahnte Leiste	865
Gieſsbeckenknorpel	457
Gieſsbeckenmuskel, queerer	461
Gimbernat'sches Band	287
Gipfel d. vierten Hirnhöhle	849
Glasflüssigkeit	417
Glaskörper	417
Graafsche Bläschen	556
Gränzstreif	860
Gränzstrang d. Gangliensyst.	961
Grauer Höcker	871
Graue Leisten	837
Graue Nervensubstanz	31
Graue Schicht	837
Griffellochschlagader	657
Griffelfortsatz	116
Griffelschlundkopfmuskel	454
Griffelzungenmuskel	443
Griffelzungenbeinmuskel	227
Grimmdarm	500
Grimmdarmblutadern	790
Grimmdarmgekröse	502
Grimmdarmgekrösdrüsen	812
Grimmdarmklappe	495
Grimmdarmschlagadern	697. 698
Grundbein	109
Grundblutleiter	764
Grundfläche des Gehirns	850
" " Schädels	135. 137
Grundschlagader	669
Haare	80
Haargefäfse	23
Haarschaft	80
Haarkeim, Haarzwiebel	81
Hahnenkamm	120
Haken	854
Hakenbein	174
Hakenbündel	861
Hakenganglion	854. 865
Hakenmuskel	253
Halbdornmuskel	239
Halbhäutiger Muskel	298
Halbmondförmige Klappen	645. 646
Halbmondförmiger Knoten	980
Halbsehniger Muskel	297
Halbunpaarige Blutader	778
Halsblutadern, oberflächl.	771. 772
" tiefe	772
Halsdrüsen, oberflächl.	800
" tiefe	800. 801
Halsgeflecht	929
Halsknoten, oberer	962
" mittlerer	963
" unterer	964
Halsmuskeln	223
Halsnerven	927
" oberflächl.	930
Halsnervenschlinge	928
Halsschlagader, aufsteig.	673
" oberflächl.	673
" queere	675
" tiefe	675
Halswirbel	146
Halswirbelblutadern	772
Halszitzenmuskel	238
Hammer	382
Hammermuskeln	383. 384
Handgelenk	176
Handrückenband	250
Handrückenblutadern	775
Handrückennetz	775
Handschlagadern	681
Varietäten	747
Handteller	99
Handwurzelbeine	173
Handwurzel-Hohlhandnetz	687
Handwurzel-Rückennetz	687
Harn	532
Harnblase (vgl. Blase)	526
Harnblasengeflecht	984
Harnblasenschlagadern	704. 705
Harnkanälchen	523
Harnleiter	525
Harnröhre, männl.	529
" weibl.	531. 570
Harnröhrenmuskel	577
Harnröhrenzwiebel	550
Harnschneller	579
Harnstoff	6. 532
Harnstrang	526
Harnwerkzeuge	521
Harte Augenhaut	404
" Hirnhaut	879
Haut, äufsere	72
Häute des Darmkanals	485
Hautausdünstung	75
Hautmuskel d. Halses	225
Hautnerven des Arms	934. 935
" " Bauches	944
" der Brust	943
" des Fufsrückens	954. 956
" der Fufssohle	956
" des Gesäfses	946. 953
" " Oberschenkels, hint.	953
" " " innerer	951

Seite

Hautnerv des Oberschenkels, vord. äufs. 949
" " " vord. inn. 951
" " Untersch. 952. 954
" langer, d. Untersch. u. Fufses 956
" äufserer, d. Vorderarms 939
Hautschmiere 89
Hauptschlaga. d. Daumens u. Zeigefingers 683
Havers'sche Drüsen 68
Heiligbein 148
Heiligbeinnerven 945
Hemisphaeren 842. 852
Hemisphaerenbaum 844
Herabzieher des Mundwinkels 218
" " Nasenflügels 217
" der Unterlippe 218
Herumschweifender Nerv 902
Herz 635
Herzbeutel 636
Herzbeutelzwerchfellschl. 671
Herzgeflecht 978
Herzgrube 97
Herzkammern 644. 646
Herzknoten 978
Herznerven 978. 963. 965
Herzohr 642. 645
Highmor'sche Höhle 123
" Körper 537
Hinterhauptbein 112
Hinterhauptblutleiter 764
Hinterhauptmuskel 214
Hinterhauptnerven 928. 929
Hinterhauptschlagader 656
Hirn 834
Hirnanhang 872
Hirnblutadern 764
Hirnganglien 34., 856. 858
Hirnhäute 875
Hirnhautblutleiter 766
Hirnhautschlaga., mittl. 660
Hirnhöhlen, dritte 873
" seitliche 862
" vierte 848
Hirnklappen 848
Hirnlappen 853
Hirnlein 840
Hirnnerven 886
Hirn-Rückenmarksnerven 886
Hirnsand 871. 878
Hirnschenkel 855
Hirnschlagader, mittlere 666
" tiefe 670
Hirnschwiele 866

Seite

Hirnsichel 884
Hirnspalte 850. 841
Hirnstiel 855
Hirnzelt 883
Höcker, grauer 871
Hode 535
Hodenmuskel 542
Hodensack 543
Hodensacknerven 948. 959
Hodensackschlagadern 706. 713
Hohle Muskeln 65
Hohlhand 99
Hohlhandast, tiefer 683
Hohlhandband 251
Hohlhandbögen 688
Hohlhand-Ellenbogennerv 938
Hohlhand-Fingernerven 937. 939. 941
Hohlhandmuskeln 251
Hohlhandnerv, tiefer 939
Hohlhandschlagader, oberfl. 683
Hohlvene, absteig., obere 759
" aufsteig., untere 781
Hohlvenensack 642
Hohlvenensystem 756
Hornblatt 859
Hornhaut 405
Hornstreif 860
Hornsubstanz 11. 76
Hörner der Seitenhöhle 863. 864
" d. sichelförm. Fortsatzes 287
Hörnerv 892
Hüftbeckennerv 948
Hüftbein 181
Hüftbeinkamm 182
Hüftbeinloch 184
Hüftbeinlochmuskeln 293
Hüftbeinlochnerv 950
Hüftbeinlochschlagader 702
Varietäten 751
Hüftbeinmuskel, innerer 291
Hüftblutadern 783
Hüftdrüsen 808
Hüftgeflecht 952
Hüftgelenk 194
Hüftkranzschlagader 711
Hüftleistennerv 948
Hüftlendenschlagader 702
Hüftmuskeln 290
Hüftnerv 953
Hüftschlaga., gem., innere 701
" äufsere 708
" hintere 703
Hülfsbänder 53
Hülsenstrang 835

	Seite
Hundszähne	435
Hymen	567
Ingestionsorgane	483
Inneres Ohr	379
Insel	854
Insertion	60
Intermediäre Marksubst.	861
Isolirte Ganglien	38
Jacobsche Haut	414
Jacobsonsche Anastomose	977
Jacobsonscher Nerv	901
Jochbein	127
Jochbeinmuskeln	217
Jochbogen	128
Jochfortsatz	124
Jungfernhäutchen	567
Kahnbein	173. 201
Kahnförmige Grube	530
Kammuskel	221
Kammuskeln	644
Kappenmuskel	233
Kapseln d. Linsenkerns	860
Katzenzunge	848
Kaumuskeln	296
Kaumuskelnerv	819
Kaumuskelschlagader	660
Kehldeckel	458
Kehlkopf	456
Kehlkopfbänder	458
Kehlkopfhöhle	462
Kehlkopfknorpel	456
Kehlkopfmuskeln	460
Kehlkopfnerven	905. 906
Kehlkopfschlagadern	652. 673
Kehlkopftasche	463
Keilbein	109
Keilbein d. Fufswurzel	201
Keilbeingaumenknoten	972
Keilbeingaumennerv	915
Keilbeingaumenschlagader	662
Keilbeinhörner	110
Keilförmiger Lappen	843
Keilstrang	834. 836
Keimbläschen	558
Keimfleck	558
Keimlager	556
Keimscheibe	557
Keimschicht	558
Kern der Brücke	838
Kern des grofs. Gehirns	851
" " kleinen Gehirns	844
Kernstrang	831
Keule	836
Kiefergelenk	131
Kieferknoten	977
Kieferschlaga., äufsere	654
" innere	659
Kieferzungenbeinmuskel	227
Kindszähne	436
Kinnnerv	921
Kinnschlagader	659
Kinnzungenbeinmuskel	227
Kinnzungenmuskel	442
Kitzler	569
Kitzlernerv	960
Kitzlerschlagader	707
Klappdeckel	853
Klappenwulst	847
Klassen der Nerven	887
Kleinhirn	840
Klein-Gehirnschlagadern	670
Klein-Fingerschlagadern	686
Klettern	320
Knie des Antlitznerven	897
Knie des Fallop. Kanals	394
Knieblatt	867
Kniegaglion	897. 898
Kniegelenk	198
Kniegelenknetz	718
Kniegelenkschlagadern	715—718
Kniekapsel	199
Kniekapselmuskel	295
Kniekehle, Kniegrube	283
Kniekehlenblutader	783
Kniekehlendrüsen	808
Kniekehlenmuskel	302
Kniekehlenschlagader	716
Knöchel	196. 197
Knöchelbein	200
Knöchelnetze	720
Knöchelschlagadern	720. 723. 724
Knochenbänder	53
Knochenerde	41
Knochenknorpel	41
Knochenmark	43
Knochensubstanz	11. 41
Knochensystem	41
Knorrenmuskel	259
Knorpel	48
Knorpelhaft	46
Knorpelhaut	48
Knorpelsubstanz	11. 48
Knötchen	847
Kolben d. Streifenhügels	858
Kopf-Armblutader	760
Kopfbein	174
Kopfblutader	761

	Seite
Kopfgelenk	153
Kopfmuskeln	213
" gerade 229. 240.	241
" schräge	241
Kopfnicker	226
Kopfschlagader, äufsere	652
" gemeinschaftl.	651
" innere	662
" Varietäten	742
Kopfschlagadergeflecht, äufs.	970
" inneres	968
Koprikin	506
Körperkreislauf	17
Kranzband	509
Kranzblutadern d. Herzens 757.	758
Kranzgeflechte d. Herz.	979
" d. Magens	981
Kranznath	119
Kranznerv d. Arms	936
Kranzschlagadern d. Arms	679
" d. Herzens	650
" d. Hüfte	711
" d. Lippen	655
" d. Magens 694.	695
" d. Oberschenkels 713.	714
Kreuz	97
Kreuzbänder d. Kniegel.	198
Kreuzband d. Fufses	289
Kreuzbein	148
Kreuzbeindrüsen	809
Kreuzdarmbeinfuge	184
Kreuzgeflecht	952
Kreuzknorrenband	185
Kreuzknoten	967
Kreuzlendenmuskel	237
Kreuznerven	945
Kreuzschlagadern 700.	702
Kreuzstachelband	185
Kreuzung der Pyramiden	834
" " Sehstreifen	873
Kronenfortsatz 131.	170
Krystallinse	418
Krummdarm	492
Kuckuksbein	149
Kuppel	389
Labyrinth des Ohrs	385
" " Siebbeins	121
Lachmuskel	218
Lambdanath	119
Langer Halsmuskel	229
Langer Rückenmuskel	237
Längenbündel, untere	862
Längenspalte d. gr. Gehirns	850
Lappen d. gr. Gehirns	853
Lappen d. kl. Gehirns	842
Laufen	320
Leber	507
Leberbänder	509
Leberblutadern 792.	512
Leberdrüsen	813
Lebergang	514
Lebergeflecht	981
Leberlappen	508
Leberläppchen	512
Leberschlagader 694.	511
Lederhaut	72
Leerdarm	492
Lefzen d. Muttermundes	561
Leiste, gezahnte	865
Leisten, graue	837
Leistenband, äufseres	271
" inneres	276
Leistendrüse	806
Leistenkanal	277
Leistenring, hinterer, inn.	276
" vorderer, äufs.	272
Lendenblutadern	789
Lendendrüsen	810
Lendengeflecht	947
Lendenknoten	967
Lendenkreuzgeflecht	947
Lendenleistennerv	949
Lendenmuskel, grofser	290
" kleiner	284
" viereckiger	275
Lendennerven	945
Lendenschlagadern 699.	700
Lendenwirbel	147
Leyer	868
Lieberkühnsche Drüsen	497
Linse	418
Linsenkapsel	419
Linsenkern	419
Linsenkern (d. Hirns)	859
Linsenknöchelchen	383
Lippen	433
Lippenbändchen	434
Lippendrüsen	434
Lippenschlagadern	655
Löffelförmige Grube	381
Lücke für d. Schenkelgef.	283
Luftgefäfse	473
Luftröhre	467
Luftröhrendrüsen	806
Luftröhrennerven 906.	907
Luftröhrenschlagadern 691.	671
Luftwege 373.	467
Luftzellen	473

	Seite
Lungen	469
Lungenbläschen	473
Lungenblutadern	794. 474
Lungendrüsen	806. 475
Lungengefäfse	792. 474
Lungengeflecht	907
Lungengewicht	471. 472
Lungenhaut	476
Lungenherz	638
Lungenherzkammer	644
Lungenkreislauf	17
Lungenlappen	470
Lungenläppchen	470. 474
Lungenmagennerv	902
Lungennerven	476. 907
Lungenschlagader	793. 794. 474
Lungenwurzel	470
Lungenzellen	473
Lymphdrüsen	29. 796
Lymphgefäfse	28. 795
" einzelner Organe,	s. Saugadern.
Lymphknoten	29. 796
Magen	485. 487
Magenblutadern	790
Magengeflechte	908
Magenkranzgeflechte	981
Magenkranzschlagadern	694. 695
Magen-Netzdrüsen	814
Magen-Netzschlagadern	695. 696
Magensaft	490
Magenschlagadern, kurze	696
Magen-Zwölffingerdarmschl.	695
Malpighische Pyramiden	522
Mandel	438
Mandel (des klein. Gehirns)	843
Mandelkern	862
Männliches Glied	547
Mantel d. gr. Gehirns	851
Mark, verlängertes	834
Markbaum	844
" des Wurms	847
Markblätter	844
Markbündel, accessorische	861
Markhaut	414
Markknopf	834
Markknopfschenkel	845
Markkörper	860
" d. klein. Gehirns	843
" d. Wurms	847
Markkügelchen	869
Marklager	843
Marksegel	848
Markstamm	850
Marksubstanz	31
Markzapfen	829
Markzwiebel	834
Mastdarm	501
Mastdarmblutadern	786. 790
Mastdarmgeflecht	983
Mastdarmheber	577
Mastdarmnerven	958. 982. 983
Mastdarmschlaga.	698. 705. 706
Meckelsche Erhabenheit	865
Meckelscher Knoten	972
Meibomsche Drüsen	398
Milch	587
Milchbrustgang	797
Milchdrüse	585
Milchdrüsenschlagadern	672
Milchgänge	586
Milchgefäfse	811
Milchsaft	499
Milchsaftbehälter	797
Milchzähne	85. 436
Milz	518
Milzblutader	790. 519
Milzdrüsen	814
Milzgeflecht	981
Milzschlagader	695. 519
Mischungsbestandtheile	3
Mittelarmblutader	776
Mittelarmnerv	936
Mittelfelle	480
Mittelfelldrüsen	805
Mittelfellhöhlen	480
Mittelfellschlagadern	671. 691
Mittelfleisch	98. 575
Mittelfleischgrube	575
Mittelfleischnerv	959
Mittelfleischschlagader	706
Mittelfufsknochen	205
Mittelfufsschlagadern	721
Mittelgehirn	834
Mittelhandbeine	177
Mittelhandgelenke	178
Mittleres Ohr	379
Mönchskappenmuskel	233
Mondbein	173
Monro'sches Loch	869
Morgagnische Grube	530
" Tasche	463
Mulde	865
Mundhöhle	143. 432
Mundschliefser	215
Mundspalte	433
Mundwinkel	433
Muscheln	121. 129
Muskeln	56. 211

	Seite
Muskeln, hohle	65
" solide	60
Muskelbauch, - kopf, - schwanz	60
Muskelbinde	54
Muskelfaser	11. 57
Muskelhaut	65
Muskel-Hautnerv	935
Muskellagen d. Herzens	639
Muskellehre	211
Muskelnerven des Bauchs	944
Muskelreizbarkeit	59
Muskelscheide	58
Mutterbänder, breite	560
" runde	560. 562
Muttergang	566
Muttergrund, Mutterhals	560
Muttermund	561
Mutterröhre	559
Mutterscheide	566
Muttertrompete	559
Mützenförmige Klappe	646
Nabel	97. 267
Nabelschlagader	704
Naboth'sche Eier	565
Nackenband	152
Nackenmuskeln	231
Nackenschlaga., tiefe	675
Nägel	78
Nagelbeine	128
Nagelglied	180
Nagelmutter	79
Nahrungsflüssigkeiten	8
Nahrungsschlauch	483
Nase	428
Nasenaugennerv	912
Nasenbeine	128
Nasengänge	142
Nasengang = Nasenkanal.	
Nasengaumenknoten, -nerv	974
Nasengaumenschlagader	662
Nasenhöhle	141. 430
Nasenhöhlenschlagader	662
Nasenkanal	129. 142
Nasenknorpel	429
Nasenknoten	972
Nasennerven, hintere	974
" seitliche	917
" vordere	913
Nasenrückenschlagader	665
Nasenscheidewand	143. 429
Nasenscheidewandnerv	974
Nasenschlagader, seitliche	656
Nasenschleimhaut	430
Nath d. Mittelfleisches	575
" " Hodensackes	543
Näthe d. Knochen	45. 119
Nathknorpel	49
Nathknochen	134
Nebenhode	539
Nebenhöhlen der Nase	430
Nebennieren	534
Nebennierenblutadern	788
Nebennierengeflecht	982
Nebennierenschlagadern	694. 698
Nebenschlagadern d. Arms	680. 681
Nerven	35. 886
Nervengeflecht	37
Nervenhaut des Auges	415
Nervenknoten	36. 37. 38
Nervenlehre	829
Nervenmark	31
Nervenmarkhaut	37
Nervenpaare	887
Nervenscheide	36
Nervenschlinge	37
Nervensubstanz	11. 31
Nervensystem	31. 829
Nervenwurzeln	36. 887
Nester	849
Netz, grofses	489. 503
" kleines	489. 510
Netzhaut	414
Netzhautschlagader	663
Niederzieher d. Mundwinkels	218
" " Nasenflügels	217
" " Nasenscheide-wand	217
Nieren	521
Nierenbecken	525
Nierenblutadern	788. 524
Nierengeflecht	982
Nierenkapseln	534
Nierenkelche	525
Nierenkörperchen	524
Nierenmark	522
Nierenschlagadern	698. 524
Nierenwärzchen	522
Nufsgelenk	47
Oberarmbein	168
Oberaugenhöhlennerv	912
Oberaugenhöhlenschlagader	664
Oberbauchschlagader	709
Obergrätenmuskel	253
Oberhaut	76
Oberkieferbein	122
Oberkieferknoten	916
Oberkiefernerv	914

	Seite
Oberlippennerven	917
Oberrollnerv	912
Oberschenkelbein	192
Oberschenkelmuskeln	294
Oberschenkelschlagader	711
" durchbohrende	714
" tiefe	713
Oberschlüsselbeinnerven	930
Oberschulterblattnerven	933
Ohr	375
Ohrast d. Lungenmagennerven	904
Ohrblutadern, innere	767
Ohrdrüsen, untere	799
Ohrecke	375
Ohrenschmalz	378
Ohrkalk	389
Ohrknorpel	375
Ohrknoten	975
Ohrläppchen	376
Ohrleiste	375
Ohrmuschel	376
Ohrmuskeln 220.	376
Ohrnerv, grofser, unterer	930
" hinterer oberfl.	930
" " tiefer	899
" vorderer	920
Ohrschläfenerv	919
Ohrschlagader, hintere	657
" innerste	670
" tiefe	659
" vordere	658
Ohrspeicheldrüse	447
Ohrsteinchen	389
Ohrtrompete	381
Olive	835
Olivenkern, -bündel	835
Organe	XXVIII.
" zusammengesetzte	373
Organenknorpel	49
Organisches Nervensystem	40
Organische Systeme	12
Osmazom	6

	Seite
Pacchionische Drüsen	878
Pathetischer Nerv	896
Pauke	379
Paukenfell	379
Paukenfellnerv	920
Paukenfellspanner	383
Paukengeflecht	977
Paukenhöhle	379
Paukennerv	901
Paukensaite	898
Paukenschlagader	659
Paukentreppe	392
Pecquet'scher Behälter	797
Peripherisches Nervensystem	35
Peyersche Drüsen	498
Pfanne	181
Pfeilnath	119
Pferdeschweif	922
Pflugscharbein	130
Pfortader 789. 791.	511
Pförtner	487
Pförtnerklappe	489
Pigmente	7
Pigment, schwarzes	413
Pigmenthaut	414
Pikromel	516
Polster	857
Poupart'sches Band	271
Ptyalin	450
Purkinje'sches Bläschen	558
Pyramide d. Schläfebeins	115
" Ferrein'sche	522
" hintere	836
" Malpighische	522
" seitliche	836
" vordere	834
" des Wurms	847
Pyramidenbündel 832. 838. 839.	856
Pyramidenfortsatz	125
Pyramidenmuskel d. Bauchs	270
" d. Nase	216
Queerblutleiter	763
Queergrimmdarm	500
Queerer Bauchmuskel	274
" Dammmuskel	578
" Gieſsbeckenmuskel	461
Queere Halsschlagader	675
" Schulterblattschlaga.	674
Queermuskel der Fufssohle	307
" des Nackens	238
" " Ohrs	377
Queerschlitz d. grofs. Gehirns	851
" " klein. Gehirns	849

	Seite
Rabenschnabelfortsatz	166
Rachen	451
Rachenenge	432
Rachenschnürer	439
Randwülste d. gr. Geh. 851. 852.	862
" " kl. Geh.	842
Rankengeflecht 789. 541.	563
Rautengrube	836
Rautenmuskel	235
Reflexionsbewegungen	889
Regenbogenhaut	409

	Seite
Reifszähne	435
Respiration	477
Respirationsmuskeln	312
Riechbein = Siebbein	120
Riechbeinnerv	913
Riechkolben	854
Riechnerv	890
Riechstreifen	853. 899
Riegel	836
Riemenmuskel	236
Riffe	844
Ringförmige Erhabenheit	836
Ringgiefsbeckenmuskeln	460
Ringknorpel	457
Ring-Luftröhrenband	468
Ringmuskeln	62
" der Augenlieder	215
" des Mundes	215
Ringschildmuskel	460
Ringschlundkopfmuskel	453
Rippen	159
Rippenhalter	230. 231
Rippenheber	241
Rippenknorpel	159
Rippennerven	943. 944
Rippenschlaga., hintere	691
" oberste	674
Röhrenknochen	43
Röhrensubstanz	522
Rollen	212
Rollhügel	193
Rollmuskel d. Auges	426
Rollnerv	896
Rosenadern	785
Rosennerven	951
Rücken-Ellenbogennerv	938
Rücken-Fingernerven	938. 940
Rückenmark	829
Rückenmarksfaden	876
Rückenmarkskern	831
Rückenmarksnerven	886. 922
Rückenmarksschlaga.	669
Rückenmarksspalten	830
Rückenmarksstränge	832
Rückenmuskeln	231
Rückennerven d. Finger	937. 939 941
Rückenschlagader d. Fufses	719
" d. grofsen Zehe	722
" " Ruthe	707
" " Schulterblatts	676
Rückenwirbel	146
Rücken-Zehennerven	954. 955. 957
Rückgrat	144
Rückgratsstrecker	236

	Seite
Rückwärtsdreher	256. 259
Rückwärtszieher d. Ohrs	220
Runde Armmuskeln	253. 254
Ruthe	547
Ruthenblutadern	787
Ruthennerv	959
Ruthenschlagadern	706. 707
Säbelfortsatz	110
Sägemuskeln, hintere	235
" vordere	243
Sägenath	45
Samen	552
Samenbläschen	544
Samenblutadern	788. 537. 541
Samengeflecht	982
Samenhügel	531
Samenleiter	539
Samenröhrchen	537
Samenschlagadern	537. 541
" äufsere	710
" innere	699
Samenschneller	579
Samenstrang	541
Samenstrangmuskel	274
Samenthierchen	553
Santorini's Emissarien	767
" Knorpel	458
" Muschel	122
Sattel, Sattellehne	110
Säulen des Gewölbes	868
Säule der Spindel	390
Saugadern (s. Lymphgef.)	28. 795
Saugadergeflechte	796
Saugadern d. Afters	809
" d. Arms	803
" " Bauchfells	809. 811
" " Bauchhöhle	810
" " Bauchspeicheldrüse	814
" " Blase	809
" " Blinddarms	812
" " Brust	803
" " Brustfells	805. 806
" " Brusthöhle	804
" " Dammes	809
" " Dünndarms	812
" " Eierstöcke	810
" " Fufses	807
" " Gebärmutter	809. 810
" " Gesäfses	808. 809
" " Geschlechtsth., äufseren	808. 809
" " Gesichts	800
" " Grimmdarms	810. 812

	Seite
Saugadern d. Halses	800. 801
" d. Hand	803
" " Herzens	805. 806
" " Hoden	810
" " Kehlkopfes	801
" " Kopfes	799. 801
" " Leber	813. 805
" " Lendengegend	808
" " Luftröhre	801. 806
" " Lungen	806
" " Magens	813
" " Mastdarms	809
" " Milchdrüse	803. 805
" " Milz	814
" " Mundhöhle	800
" " Nackens	804
" " Nase	800
" " Netze	814
" " Nieren	810
" " Oberbauchs	803
" " Prostata	809
" " Rückens	804
" " Scheide	809
" " Scheidenhäute	810
" " Schenkels	807. 809
" " Schlundkopfes	801
" " Schulter	804
" " Zunge	801
" " Zwerchfells	804. 805. 811
" " Zwölffingerdarms	812. 813
Saum	865
Saumnath	45
Schädel	133
Durchmesser	138
Schädelgewölbe	133
Schambändchen	568
Schamberg	97
Schambein	183
Schambeinfuge	185
Schambeinschlagader	710
Schamgeflecht	958
Schamglied, weibl.	568
Schamlefzen	706. 713
Scham-Lendennerv	948
Schamnerv	958
" äufserer	949
" oberer, unterer	959
Schamschlaga, äufsere	712
" gem., innere	705
Schamschnürer	580
Schamspalte	568
Scheide	566
Scheideneingang	566. 570
Scheidengewölbe, -grund	566
Scheidenhaut, gemeinsch.	542
Scheidenhaut, eigene d. Hoden	540
Scheidenklappe	567
Scheidenschlagader	705
Scheidentheil d. Gebärm.	561
Scheidewand, halbdurchsichtige	869
" d. Herzens	637
" d. Nase	143. 429
Scheitelbein	119
Schenkel d. gr. Gehirns	855
" " klein. Geh.	845
" " Gewölbes	868
" " Leistenringes	272
Schenkelbinde	284
Schenkelblutadern	783. 784
Schenkelbogen	271
Schenkelfläche d. vord. Leistenring.	274
Schenkelkanal	288
Schenkelmuskeln	294
" dicke	295
" gerader	294
" schlanker	294
" viereckiger	293
" zweiköpfiger	298
Schenkelnerv	950
Schenkelring	288
Schenkelschlagader	708
" tiefe	713
Varietäten	754
Schienbein	195
Schienbeinmuskeln, vord.	299
" hint.	303
Schienbeinnerv	955
Schienbeinschlagader, vord.	719
" hintere	722
" zurücklauf.	720
Schiffbein	173
Schildblutadern	761. 769. 772
Schilddrüse	465
Schildgiefsbeckenmuskel	461
Schildkehldeckelmuskel	461
Schildknorpel	456
Schildschlagader, obere	652
" untere	673
Schildschlundkopfmuskel	453
Schildzungenbeinmuskel	228
Schläfebein	114
Schläfeblutadern	770
Schläfemuskel	221
Schläfenerven	900
" oberflächlicher	919. 920
" tiefe	918
Schläfeschlagader, mittlere	658
" oberflächl.	657

	Seite
Schläfeschlagader, tiefe	660
Schlagadern	20. 648
" der Bauchhöhle, Variet.	749
" " Brusthöhle, Variet.	749
Schlagaderbogen d. Fufses	721. 725
" " Hand	688
Schlauch, gemeinschaftl.	388
Schleife	839
Schleim	71. 88
Schleimbälge, Schleimdrüsen	87
Schleimbeutel (Schleimbälge)	69
" einzelne	221. 226. 234. 252
	253. 254. 255. 256
	257. 258. 261. 285
	291. 292. 293. 294
	297. 298. 302. 440
Schleimdrüsen	87
Schleimgewebe	13
Schleimhäute	70
Schleimscheiden	69
Schliefsmuskel d. Afters	504. 578
" d. Augenlieder	215
" " Harnblase	528
" " Mundes	215
Schlingen, Schlucken	440. 446. 455
Schlund	483
Schlundgeflechte	907
Schlundkopf	451
Schlundkopfblutadern	768
Schlundkopfgaumenmuskel	439
Schlundkopfgaumenschlaga.	653
Schlundkopfgeflecht	905
Schlundkopfmuskeln	452. 454
Schlundkopfnerven	904
Schlundkopfschlaga., aufsteig.	653
Schlundkopfschnürer	452. 453
Schlundschlagadern	691
Schlüsselbein	165
Schlüsselbeinblutader	760. 773
Schlüsselbeinschlagader	666
Varietäten	744
Schlüssel-Schulterblattgelenk	167
Schmelz	84
Schnauzbart	433
Schnecke	389
Schneckenhörner	401
Schneckenkanal	391
Schneckennerv	892
Schneidermuskel	294
Schneidezähne	435
Schnepfenkopf	531
Schoofsbein	183
Schreibfeder	836
Schulterblatt	165

	Seite
Schulterblattschlaga., obere	674
" queere	674
" Rücken-	676
" umgebogene	679
Schultergelenk	169
Schultergräte	166
Schulterhöhe	166
Schulterzungenbeinmuskel	228
Schuppe	114
Schuppennath	45. 119
Schüsselförmige Grube	418
Schutzmittel d. Auges	395
Schwalbennest	849
Schwangerschaft	571
Schwanzbein	149
Schwanzwirbelnerv	945
Schweifs	75
Schwerdtfortsatz	148
Secrete	9
Seepferdfufs	864
Sehhügel	856
Sehloch	409
Sehnen	53
Sehnenfasern	11. 51
Sehnenhaube	214
Sehnenscheide, fibröse	55. 263
" Synovial-	69
Sehnerv	891. 415
Sehnervenvereinigung	872
Sehorgan	395
Sehstreifen	857
Seitenbeckenknochen	181
Seitenhöhlen d. Gehirns	862
Seitenkammer	862
Seitenstrang	835
Seitenwandbein	119
Seröse Häute	66
Serum	14. 26. 67
Sesambeine d. Fufses	207
" " Hand	180
Sesamknorpel	51
Sichel d. Gehirns	884
Sichelblutleiter	762. 763
Sichelförmiger Fortsatz	286
Siebbein	120
Siebbeinnerv	913
Siebbeinschlagadern	664
Siebbeinzellen	121. 141
Siebplatte	120
" d. Gehirns	852
Sinnesnerven	887
Sinnesorgane	373
Sitzbein	182
Sitzbeinhöcker, -stachel	183
Sitzbeinzellkörpermuskel	578

	Seite
Sitzknorren	183
Skelet	41. 107
" weibliches	207
Sohlenmuskel	302
" viereckiger	306
Sohlennerven	956
Sohlenspanner	290
Sohlenschlagadern	724
Sohlen-Zehennerven	956. 957
Sonnengeflecht	980
Spanner d. Schenkelbinde	285
Speichel	450
Speicheldrüsen	447
Speiche	170
Speichenmuskel, äufserer	257
" innerer	261
Speichennerv	939. 940
Speichenschlagader	682
Speisebrei	491
Speisekanal	483
Speiseröhre	483
Speiseröhrenschlitz	279
Speisesaftröhre	797
Spermatin	553
Spiegel'scher Lappen	508
" Linie	275
Spinalnerven	923
Spindel	390
Spindelblatt	390
Spinnwebenhaut	878
Spiralblatt	391
Spirallöcher	390
Spitzenband	152
Sporn	864
Sprachorgan	373. 432
Sprung	320
Sprungbein	200
Spulmuskeln des Fufses	306
" der Hand	264
Stabkranz	861
Stammganglion	36
Stammlappen	854
Stammstrahlung	861
Stehen	318
Steigbügel	383
Steigbügelmuskel	384
Steigbügelnerv	898
Steifsbein	149
Steifsbeinmuskel	280
Steifsgeflecht	960
Steifsknoten	967
Steifsnerv	945
Stenson'scher Gang	448
Stimmbänder	459
Stimmnerv	902
Stimmorgan	456
Stimmritze	460. 463
Stirnbein	117
Stirnmuskel	214
Stirnnerv	912
Stirnschlagader	665
Stockzähne	436
Strahlenband	407
Strahlenkörper	407
Strahlenkranz	408
Strahlenplättchen	416
Stränge d. Rückenmarks	832
Strangförmiger Körper	836
Strecker d. grofsen Zehe	299. 304
" " klein. Fingers	258
" " Zeigefingers	260
Streckung	212
Streifenhügel	858
Structur	XXVIII
Strudelgefäfse	409
Substanz, einfache organ.	10
Sylvische Grube	852
" Knöchelchen	383
" Wasserleitung	840
Symmetrie	100
Sympathischer Nerv	961
Synovialhäute, -kapseln	68
Synovialscheiden	69
Systeme d. vord., mittl., hint. Stränge	873
Talgdrüsen	88
Tapete	863. 868
Tapete der Choroidea	406
Taschenbänder	459
Tastorgan	75
Tellerförmige Grube	418
Textur	XXVIII
Thal	853
Thal d. kleinen Gehirns	841
Thebesische Klappe, Löcher	643
Thränen	400
Thränenbeine	128
Thränendrüsen	400
Thränenkanälchen	401
Thränenkarunkel	399
Thränenmuskel	401
Thränennasengang	402
Thränennerv	911
Thränenorgane	399
Thränenpunkte	401
Thränensack	402
Thränensackgrube	129
Thränenschlagader	663
Thränensee	401

	Seite
Thymusdrüse	481
Träger	147
Traubenhaut	410
Treppen	391
Trichter der Schnecke	390. 392
" des Hirns	872
Trommelfell	379
Trommelhöhle (s. Pauke)	379
Trompete, Eustachische	381
" Fallopische	559
Trompetermuskel	219
Ungenannte Blutader	760
" Schlagader	650
Varietäten	741
Unpaarige Blutader	777
Unteraugenhöhlennerv	915
Unteraugenhöhlenschlaga.	661
Untergrätenmuskel	253
Unterhautnerven	
d. Unterkiefers	900
" " Halses	901
" " Wange	914
Unterhautzellgewebe	14
Unterkiefer	130
Unterkieferdrüsen	800
Unterkieferknoten	977
Unterkiefernerv	917. 921
Unterkiefer-Speicheldrüse	449
Unterkinnschlagader	655
Unterlippennerven	921
Unterrollnerv	913
Unterschenkelmuskeln	299
Unterschenkelschlagadern	719
Unterschlüsselmuskel	243
Unterschlüsselschlagader	666
Unterschulterblattmuskel	254
Unterschulterblattnerven	934
Unterschulterblattschlaga.	678
Unterzungennerv	894
Unterzungenschlagader	654
Unterzungen-Speicheldrüse	449
Urin (s. Harn)	532
Urinblase	526
Urthierstoff	10
Varietäten d. Schlagadern	738-756
Vegetatives Nervensystem	40
Venen, -klappen, -wurzeln	22
Verbindungsknorpel	49
Verbindungsschlaga., hintere	665
" vordere	666
Verdauungsorgane	483
Verlängertes Mark	834
Verstopfungsband, -loch	184
Vieleckige Beine	174
Vielgespaltner Rückenmuskel	240
Viereckiger Lendenmuskel	275
" Schenkelmuskel	293
" Sohlenmuskel	306
a Vorwärtsdreher	264
Vierhügel	839
Vierhügelschenkel	845
Vieussens Nervenschlinge	964
" Centrum	863
Vogelklaue	864
Vorberg	155
Vorderarmschlagadern	681
Vorderzähne	435
Vorhaut	552. 570
Vorhof d. Herzens	642. 645
" " Ohrs	385
" " Scheide	570
Vorhofsnerv	892
Vorhofstreppe	392
Vorkammern	642. 645
Vormauer	861
Vorstehdrüse	545
Vorwärtsdreher	260. 264
Wadenbein	196
Wadenbeinmuskeln	300. 301
Wadenbeinnerv	954. 955
Wadenbeinschlagader	723
Wadenmuskeln	301. 302
Wadennerv	955
Wadenschlagadern	717
Wangenhautnerv	914
Wangennerven	900
Warzenhof	586
Warzengebilde, -körper	70
Wasserhaut	423
Wasserleitung, Cotunnische	393
" Sylvische	840
Wechselzähne	85. 436
Weibliches Schamglied	568
Weiche Hirnhaut	875
Weiche Nerven	962
Weifse Linie	267
Weifse Streifen	837
Weisheitszahn	436
Whartonscher Gang	448
Widderhorn	864
Willis'scher Beinerv	908
" Kranz	671
Wilson'scher Muskel	577
Wimpern	398

	Seite
Wimpermuskel	215
Winslowscher Beutel	583
" Schlitz, -Loch	510. 583
Wipfel d. Hemisphärenbaums	845
Wipfelblatt	846
Wirsungscher Gang	517
Wirbel	144
Wirbelblutadern	772
Wirbelgeflecht	964
Wirbelsäule	154
Wirbelschlagadern	668
Wollhaar	82
Wrist	98
Würfelbein	202
Wurm	846
Wurmförmige Bewegung	486. 491 499
Wurmfortsatz	500
Wurmpyramide	847
Wurzel d. Aorte	648
Wurzeln d. Augen- od. Blendungsknoten	894. 913. 970
Wurzeln d. Gewölbes	869
Wurzel d. Lunge	470
Wurzeln d. Rückenmarksnerven	922
Wurzel d. Sehnerven	857
Wurzelganglion	36

Zahn d. Drehers	147
Zähne	83. 434
Zahnbein	83
Zahnfleisch	434
Zahnfleischnerven	916. 921
Zahnfortsatz	147
Zahngeflecht, oberes	916
" unteres	921
Zahnhöhle	83
Zahnkapsel	85
Zahnkeim, -kern	84
Zahnnath	45
Zahnnerven	915. 921
Zahnsäckchen	85
Zahnschlagadern	659. 661
Zahnzellen	124. 130
Zahnzellenfortsatz	124
Zapfen, Zäpfchen	438
Zapfen d. Wurms	847
Zapfenmuskel	439
Zapfenschlagader	669
Zarter Lappen	842
Zarter Strang	834. 836
Zehen d. Seepferdfufses	865
Zehenbeuger	303. 305
Zehenblutadern	784
Zehengelenke	207
Zehenglieder	206
Zehennerven	957
Zehenrückennerven	954. 956
Zehenschlagadern	725. 726
Zehenstrecker	300. 304
Zeigefingerschlagadern	683. 749
Zellblutleiter	763
Zellgewebe	13
Zellhäute	15
Zellkörper d. Harnröhre	550
" d. Kitzlers	570
" d. Ruthe	548
Zellkörpergeflecht	984
Zellstoff	11. 13
Zelt d. vierten Hirnhöhle	849
" d. kleinen Gehirns	883
Zeltblutleiter	763
Zeugungsorgane	535
Zirbel	871
Zirbelstiel	857. 871
Zitze	586
Zitzentheil, -fortsatz	114
Zitzenzellen	381
Zotten	495
Zottenfalten	490
Zottenhaut	495
Zunge	441
Züngelchen	848
Zungenbändchen	442. 444
Zungenbein	132
Zungenbeinkiefernerv	921
Zungenbeinschlundkopfmuskel	453
Zungenbein-Zungenmuskel	442
Zungenblutader	768
Zungendrüsen	445
Zungenfleischnerv	894
Zungengaumenmuskel	439
Zungenknorpel	442
Zungenmuskeln	442
Zungenmuskel, eigener	443
Zungennerv	920
Zungennerven	446
Zungenrückenschlagader	654
Zungenschlagader	653
" tiefe	654
Zungenschlundkopfnerv	901
Zungenwärzchen	445
Zurücklaufender Nerv	906
Zurücklaufende Schlagadern	682 684. 685. 720
Zusammendrücker d. Nase	216
Zweibäuchiger Kiefermuskel	226

	Seite
Zweibäuchiger Nackenmuskel	239
Zweiköpfiger Armmuskel	254
" Schenkelmuskel	298
Zweizipfelige Klappe	646
Zwerchfell, -muskel	277
Zwerchfellblutadern	789
Zwerchfellgeflecht	981
Zwerchfellnerv	930
Zwerchfellschlaga., untere	693
Zwerchfell-Herzbeutelschlaga.	671
Zwickel	855
Zwiebel d. Aorte	648
" " Harnröhre	550
Zwillingsbinde	868
Zwillingsmuskeln	292
Zwillings-Wadenmuskeln	301
Zwinge	861
Zwingenwulst	854
Zwischencarotischer Knoten	970
Zwischendornmuskeln	240

	Seite
Zwischengelenkknorpel	51
Zwischenknochenband	171. 197
Zwischenknochenmuskeln	266. 305 308
Zwischenknochenschl. d. Fufses	721. 725
" d. Hand	687. 689
" d. Vorderarms	685
Zwischenqueermuskeln	240
Zwischenrippendrüsen	805
Zwischenrippenmuskeln	244
Zwischenrippennerven	943. 944
Zwischenrippenschlagadern hintere	691
" oberste	674
" vordere	672
Zwischenwirbelknorpel	150
Zwölffingerdarm	492
Zwölffingerdarmschlaga.	695. 696

Berichtigungen.

S. X. Z. 2 v. u. l. Microscopic Cabinet
„ 35 „ 2 v. o. l. Meninges
„ 119 „ 2 v. o. statt gewöhnlich l. selten
„ 168 „ 6 v. o. statt -acromiale l. -claviculare
„ 173 „ 6 v. o. statt minor l. major
„ 189—191 die erste Columne enthält die Dimensionen des weiblichen Beckens, die zweite die des männlichen.
„ 230 Z. 11 v. o. statt dritten l. fünften
„ 239 „ 4 v. u. statt transversi l. spinosi
„ 241 „ 1 v. o. l. semicircularis inferior
„ 282 „ 7 u. 8 v. o. statt extensor l. flexor
„ 300 „ 7 v. o. statt internus l. externus
„ 15 v. o. statt vierten l. fünften
„ 307 „ 1 v. o. l. Plantarfläche der ersten Phalanx der grofsen Zehe
„ 333 „ 8 v. u. l. Breschet
„ 7 v. u. statt 1827 l. 1826
„ 332 „ 21 v. o. statt J. C. l. J. E.
„ 702 „ 13 v. o. l. iliolumbalis
„ 786 „ 10 v. o. desgleichen
„ 715 „ 15 v. u. statt von l. an
„ 867 „ 7 v. u. l. Crura
„ 868 „ 8 v. o. l. Trigonum cerebrale
„ 908 „ 17 v. o. l. respiratorius
„ 919 „ 3 v. u. l. meatus